




ننگرهار پوهنتون
طب پوهنځی

د زړه او رگونو ناروغی



Ketabton.com

پوهندوي دوكتور دل آقا دل

ل ۱۳۹۰



د زړه او رگونو ناروغی

Cardiovascular Diseases

پوهندوي دوكتور دل آقا دل




Nangarhar University
Medical Faculty

Dr. Del Aqa Del

Cardio

Funded by: Kinderhilfe







د لوړو زده کړو وزارت
د ننگرهار پوهنتون
د طب پوهنځي
د داخلي خانگه

د زړه او رگونو ناروغي

مولف : پوهندوي دوکتور دل آقا دل

کال : ۱۳۹۰

د کتاب نوم	د نړۍ او د نړۍ ناروغۍ
ليکوال	پوهندوي دوکتور دل آقا دل
خپرونډوی	د ننگرهار طب پوهنځی
ویب پاڼه	www.nu.edu.af
چاپ ځای	سهرمطبعه، کابل، افغانستان
چاپ شمېر	۱۰۰۰
د چاپ نېټه	۱۳۹۰
د کتاب ډاونلوډ	www.ecampus-afghanistan.org

دا کتاب د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې (www.Kinderhilfe-Afghanistan.de)

لخوا تمويل شوی دی.

اداری او تخنیکي چارې يې د افغانستان موسسې لخوا ترسره شوې دي.

د کتاب د محتوا او ليکنې مسؤليت د کتاب په ليکوال او اړونده پوهنځي پورې اړه لري. مرسته کوونکي

او تطبيق کوونکي ټولني په دې اړه مسوليت نه لري.

د تدريسي کتابونو د چاپولو لپاره له موږ سره اړيکه ونيسئ:

ډاکتر يحيی وردک، دلوړو زدکړو وزارت، کابل

دفتري: ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰

موبايل: ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴

ايډيميل: wardak@afghanic.org

د چاپ ټول حقوق له مؤلف سره خوندي دي.

ای اس بی ان: ISBN: 978 993 640 0351

بسم الله الرحمن الرحيم

تقریظ:

د داخلی خانگی د استاد بناغلی پوهندوی ډاکتر دل آقا (دل) دغه علمي تدریسي اثر چی د زړه او رگونو ناروغۍ تر عنوان لاندی لیکل شوی، ما په غور سره د پېل څخه تر پایه لوستلی او د هغی علمي ارزښت په لاندی ډول ارزوم:

کتاب د داسی موضوع په هکله لیکل شوی چی د عصري طبابت د شته امکاناتو سره سره په ټوله نړی کی د انسانانو د مړینی او معیوبیت لومړی درجه لامل دي.

کتاب د الله (ج) په نوم پېل شوی، له لیک لږ او سړیزی وروسته پکی د څلورم ټولگی د لومړی سمستر د منل شوی نوی درسي کیوریکولوم مطابق اتیروسکلروزس، د زړه اسکیمیک ناروغی، هاپرنتشن، په لویانو کی د زړه ولادي ناروغی، د زړه د ریټ او ریتم گډوډي، د زړه عدم کفایه، کارډیومیویتی، میوکارډایټس، کور پلمونل، Pericarditis، شک، د زړه او رگونو کولپس د زړه درېدنه او ناڅاپي قلبي مړینه، په جراحی او امېدواری کی د زړه ناروغي او په پای کی ماخذونه چی په نړیوال معیار برابر دي ځای پر ځای شويدي.

کتاب په پښتو خوږه ژبه او په ډېر روان سبک لیکل شوی، د لاتین او انگلیسي ژبو ډېری کلمی په پښتو ژبه اړول شوي چی هر لوستونکی په یو ځل ویلو سره د هری ناروغی په هکله بشپړ معلومات په خپل مغز کی ځای او اعظمی گټه تری اخیستلی شي.

د کتاب په تالیف کی د اعتبار وړ نړیوالو سرچینو، ټکسټ کتابونو، ژورنالونو، د انټرنیت د منل شویو ویب پاڼو او د داخلی خانگی د علمي ذېرمو څخه گټه اخیستل شویده. شکلوته، شیماکانی، او جدولونه په پوره مهارت سره په مناسبو ځایونو کی ځای پر ځای شوي. شکلوته یي دومره روښانه او څرگند دي چی د لیدلو او لوستلو څخه یي هیڅوک د ستړیا احساس نه کوي.

د کتاب په لیکنه کی ټول هغه نړیوال منل شوي شرطونه چی د یو درسي کتاب لپاره اړین بلل کېږي په پام کی نیول شوي او د یو درسي کتاب ټولی ځانگړتیاوی پکی شته دي.

په پای کی د نوموړی درسی کتاب د بشپړ کېدلو، او ددی علمي دندی د سرته رسولو له امله استاد ته د زړه له کومی مبارکي وایم او د پوهنوال علمي رتبې ته د لوړتیا لپاره یي د نورو شرایطو د بشپړ کېدو تر څنگ کافي بولم او د چاپ او خپرېدو سپارښتنه یي کوم.

په درناوي

پوهاند دوکتور محمد ظاهر ظفرزی

د داخلی خانگی شف

بسم الله الرحمن الرحيم

تقریظ:

د داخلی خانگی محترم و غړو ته! اسلام علیکم و رحمته الله و برکاته:
د طب پوهنځي د څلورم ټولگی د لومړي سمسټر د داخله مضمون د درسي کتاب (د زړه او رگونو ناروغۍ) د تالیف دنده چې د پوهندوی علمي رتبې څخه پوهنوال علمي رتبې ته د لوړتیا لپاره، د داخلی خانگی له خوا ښاغلي پوهندوی ډاکټر دل آقا دل ته ورکړل شوی او د طب پوهنځي د علمي شورا او د لوړو زدکړو د وزارت د اړونده مقاماتو له خوا د کتاب مفردات تائید شوي، ما په غور سره ولوست او په اړه یې خپل نظر په لاندې توګه څرګندوم:

د کتاب په مفرداتو کې؛ Atherosclerosis، د زړه اسکیمیک ناروغۍ، هاپیرتنشن، په لویانو کې د زړه ولادي ناروغۍ، د زړه د ریتم او انتقالی سیستم ګډوډي، د زړه عدم کفایه (Heart failure)، Cardiomyopathy، کورپلمونل، د میوکارډ ناروغۍ، شاک، د زړه او رگونو کولپس، د زړه درېدنه او ناڅاپي قلبي مړینه، په جراحي او امېدواري کې د زړه ناروغۍ او ماخډونه شامل دي.

کتاب په پښتو ساده او روانو کلمو او جملو لیکل شوی چې ټول د طب مینه وال ورڅخه اعظمي استفاده کولای شي. د کتاب منځپانګه د نوي ټکسټ کتابونو، ژورنالونو او انټرنېټ څخه پوره بډایه شوی ده. له بلې خوا کتاب د څلورم ټولگی د لومړي سمسټر د کیوریګولوم سره سم لیکل شوی چې ټول محصلین ورڅخه د قلبي ناروغیو په هکله پوره ګټه اخیستلای شي.
باید ووايم چې ددې کتاب په لیکلو او نشر سره د لکچر او پولي کاپي په هکله د محصلینو ټولې ستونځې پوره له منځه ځي. د کتاب د موضوعاتو د پوره پوهېدلو لپاره جدولونه او انځورونه په مناسبو ځایو کې ځای پرځای شوي دي.

په ډاډ سره ویلای شم چې نوموړی علمي کتاب هم د محصلینو لپاره او هم د ځوانو ډاکټرانو د استفادې لپاره یو ښه ماخذ ګڼل کېږي.

د پورته ټکو په پام کې نیولو سره دا درسي کتاب د پوهندوی علمي رتبې څخه پوهنوالۍ علمي رتبې ته د لوړتیا لپاره د نورو شرایطو د بشپړ کولو تر څنګ کافي بولم، د چاپ او نشر سپارښتنه ئې کوم، او د خدای تعالیٰ څخه ښاغلي ډاکټر صاحب ته په علمی ډګر کې لازيات بریالیتوبونه غواړم.

الحاج پوهاند دوکتور عبدالواحد الکوزی

د داخلی خانگی استاد

بسم الله الرحمن الرحيم

تقریظ:

د داخلی خانگی د استاد ښاغلی پوهندوی دوکتور دل اقا دل، ارزښتناکه علمی تدریسي کتاب چی د زړه او رگونو ناروغۍ تر عنوان لاندې ئې تالیف کړې دی ما په غور سره ولوست او په اړه یې په لاندې ډول نظر څرگندوم:

کتاب په لیک لپ او سرلیکنې سربېره په ۲۷۱ مخونو کی لیکل شویډی چی د هری ناروغۍ په تعریف سربېره پتوجنیزس، کلینیکي بڼه، تشخیص، توپیري تشخیص او د تشخیص په منظور ډول ډول لارموا لبر اتواري کتنو څخه یادونه شوی او د درملنې بېلابېلې لاری چاری په گوته شویډي.

کتاب د محتوا له نظره د ډول ډول علمي منابعو په مټ بډایه شویډه. د اړونده موضوعاتو په هکله بشپړه، هر اړخیزه او تازه علمي معلومات د نړیوالو اعتبار وړ منل شویو تکست کتابونو، انترنیټ پایو او ژورنالونو څخه راټول شویډي. د کتاب د لیکنې سبک یې ساده، روان او داسی ده چی مغلق او پیچلي جملی پکی نه تر سترگو کیږي او ټول لوستونکی تری د موضوع په هکله ښه گټه اخیستلای شي. د موضوع د بشپړ پوهاوي او روښانتیا لپاره گڼ شمېر شکلونه، جدولونه او شیمیا گانی په مناسبو ځایونو کی ځای پر ځای شویډي.

باید ووايم چی نوموړی کتاب د څلورم ټولگي د درسي کیوري کولوم او مفرداتو مطابق لیکل شوی او په چاپ سره به یې د څلورم ټولگي د لومړی سمستر د محصلینو اړتیا له منځه لاړه شي، او هم د نورو ځوانو ډاکترانو لپاره په دی برخه کی پوره اسانتیا رامنځته شي.

د کتاب په پای کی ماخذونو ته ځای ورکړ شوي چی په نړیواله کچه د اعتبار وړ او منل شویډي. په پای کی ویلای شم چی دغه علمي تدریسي کتاب د طبابت په ډگر کی د علمي تدریسي ارزښت په لرلو سره یوه لویه علمي پانگه گڼل کیږي. زه د استاد دغه زیار او هاند چی ددی علمي اثر د سرته رسولو لپاره یې گاللی دی ستایم او د نورو شرایطو د بشپړ کېدو ترڅنگ یې پوهنوالي علمي رتبې ته د لوړتیا لپاره کافي بولم او اړونده مقاماتو ته یې د چاپ او نشر سپارښتنه کوم او خپله استاد ته د لوی خدای (ج) څخه نور بریالیتوبونه غواړم.

په درنښت

الحاج پوهاند دوکتور محمد طیب نشاط

د داخلی خانگی استاد

﴿ یادونه ﴾

قدرمنو استادانو او گرانو محصلینو!

د افغانستان په پوهنتونونو کې د درسي کتابونو کموالی او نشتوالی یوه لویه ستونزه ګڼل کېږي. ددې ستونزې د هوارۍ لپاره موږ په تېرو دوو کلونو کې د ننگرهار، کندهار، بلخ او خوست د طب پوهنځیو د درسي کتابونو چاپ د آلمان د اکاډمیکو همکاريو د ټولنې (DAAD) له خوا ۲۵ طبي درسي کتابونه چاپ او د افغانستان ټولو طب پوهنځیو ته ورکړل شول. د هېواد د پوهنتونونو، لوړو زده کړو وزارت او آلمان په غوښتنه موږ خپل دغه پروګرام نورو پوهنتونونو او پوهنځیو ته هم غځوو.

د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ۲۰۱۰-۲۰۱۴ کلونو په ملي ستراتیژیک پلان کې راغلي چې :

"د لوړو زده کړو او د ښوونې د ښه کیفیت او محصلینو ته د نویو، کره او علمي معلوماتو د برابرولو لپاره اړینه ده چې په پښتو او دري ژبو د درسي کتابونو د لیکلو فرصت برابر شي، د تعلیمي نصاب د ریفورم لپاره له انګلیسي ژبې څخه دري او پښتو ژبو ته د کتابونو او مجلو ژباړل اړین دي، له دې امکاناتو څخه پرته د پوهنتونونو محصلین او استادان نشي کولای عصري، نویو، تازه او کره معلوماتو ته لاس رسی پیدا کړي".

د افغانستان د طب پوهنځیو محصلین او استادان له ډېرو ستونزو سره مخ دي، دوی په زاړه مېتود تدریس کوي، محصلین او استادان نوي، تازه او عصري معلومات په واک کې نلري، درسي میتود ډېر زوړ دی، محصلین له کتابونو او هغه چې پټرونو څخه ګټه اخلي، چې زاړه او په بازار کې په ټیټ کیفیت کاپي کېږي. لکه څنګه چې زموږ هېواد تکړه او مسلکي ډاکټرانو ته اړتیا لري، نو باید د هېواد د طب پوهنځیو ته لازياته پاملرنه وشي.

ددې ستونزې د حل لپاره هغه گټور کتابونه چې د طب پوهنځيو د استادانو لخوا ليکل شوي، بايد راټول او چاپ شي، په دې لړ کې مو د ننگرهار، کندهار، بلخ،خوست او هرات له طب پوهنځيو څخه درسي کتابونه ترلاسه او چاپ کړي، چې دغه کتاب يې يوه نمونه ده.

څرنگه چې د کتابونو چاپول زموږ د پروگرام يوه برخه ده، غواړم دلته زموږ د نورو هڅو په اړوند څو ټکي راوړم:

۱. درسي طبي کتابونه

دا کتاب چې ستاسو په لاس کې دی د درسي کتابونو د چاپ د لړۍ يوه برخه ده. موږ غواړو چې دې کار ته دوام ورکړو او د چيپټر او نوټ ورکولو دوران ختم شي.

۲. د نوي مېتود او پرمختللو وسايلو په کارولو سره تدريس

د ننگرهار او بلخ پوهنتونونو طب پوهنځی يوازې د يو پراجيکتور درلودونکې وو، چې په ټول تدريس کې به ترې گټه اخيستل کېده او ډېرو استادانو به په تيوريکي شکل درس ورکاوه. تير کال مو د DAAD په مرسته وکولای شول د ننگرهار، خوست، مزار، کندهار او هرات طب پوهنځيو ټولو تدريسي ټولگيو کې پروجکټورونه نصب کړو.

۳. د هېدل برگ پوهنتون په نړيوال طب کې ماسټري

په نظر کې ده چې د هېواد د طب پوهنځيو د عامې روغتيا د څانگو استادان د جرمني هيدل برگ پوهنتون ته د ماسټرۍ لپاره ولېږل شي.

۴. د اړتياوو ارزونه

په کار ده چې د پوهنځيو روان وضعيت (اوسنی ستونزې او راتلونکي چلنجونه) وارزول شي، او بيا ددې پر بنسټ په منظمه توگه اداري، اکاډميک کارونه او پرمختيايي پروژې پلې شي.

۵. کتابتونونه

په انگليسي ژبه په ټولو مهمو مسلکي مضمونونو کې نوي نړيوال معياري کتابونه د پوهنځيو کتابتونونو ته وسپارل شي.

۶. لابراتوارونه

په هر طب پوهنځي کې بايد په بېلابېلو برخو کې لابراتوارونه موجود وي.

۷. کدري روغتونونه (د پوهنتون روغتونونه)

د هېواد هر طب پوهنځي بايد کادري روغتون ولري او يا هم په نورو روغتونونو کې د طب محصلينو لپاره د عملي زده کړو زمینه برابره شي.

۸. ستراتيژيک پلان

دا به ډېر ګټور وي، چې د طب هر پوهنځي د اړونده پوهنتون د ستراتيژيک پلان په رڼا کې خپل ستراتيژيک پلان ولري.

له ټولو محرمو استادانو څخه هيله کوم، چې په خپلو مسلکي برخو کې نوي کتابونه وليکي، وژباړي او يا هم خپل پخواني ليکل شوي کتابونه، لکچر نوټونه او چيپټرونه ادب او د چاپ کولو لپاره يې تيار کړي. او زموږ په واک کې يې راکړي، چې په ښه کيفيت يې چاپ او په وړيا توګه يې د محصلينو په واک کې ورکړو. همدارنګه د پورته يادو شوو نورو ټکو په اړوند خپل وړانديزونه موږ ته په لاندې آدرس وسپارئ، خو په ګډه اغېزمن ګامونه واخلو.

له ګرانو محصلينو هيله کوم، چې په يادو چارو کې له خپلو استادانو او موږ سره مرستندوی شي.

د آلمان د اکاډميکو همکاريو ټولنې DAAD مؤسسې څخه ډېره مننه کوو، چې تر اوسه يې د ۲۵ طبي درسي کتابونو د چاپ او په پينځو طب پوهنځيو (ننګرهار، خوست، کندهار، هرات او بلخ) کې د پروګکټرونو لګښت په غاړه اخيستی.

په آلمان کې د افغاني ماشومانو سره د مرستې ټولنې (Kinderhilfe-Afghanistan e.V.) او د ټولنې مشر ښاغلي Dr Eroes نه د زړه له کومې مننه کوم، چې په ورين تندي يې د دغه کتاب د چاپولو لګښت منلی دی او د لانورو مرستو وعده يې کړې ده. په افغانستان کې د کتابونو په چاپ کې د لوړو زدکړو وزارت همکارانو، د پوهنتونونو او پوهنځيو له رييسانو او استادانو مرستې د قدر وړ بولم او منندوی یم.

ډاکټر يحيی وردګ

د لوړو زده کړو وزارت، کابل، ۲۰۱۱ م، اکتوبر

د دفتر تليفون: ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰، موبایل تليفون: ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴

ايميل: wardak@afghanic.org

لیکچر

مخ	عنوان
الف	سریزه
	لومپی فصل
	د زړه دندیزه اناتومی فزیالوژی او پلتنی
۱	دندیزه اناتومی او فزیالوژی
۲	د زړه او رگونو د ناروغیو لابراتواری پلتنی
۲	د زړه بریښنايي گراف
۷	Exercise (Stress) ECG
۹	را دیو لوژي
۱۰	ایکوکاردیوگرافي
۱۲	Computed tomographic (CT) Imaging
۱۳	Cardiovascular Magnetic Resonance
۱۳	Cardiac Catheterisation
۱۴	Radionuclide Imaging
۱۵	Therapeutic Procedure
	دوهم فصل
	اتیروسکلروزس Atherosclerosis
۱۷	تعریف

۱۷	د خطر فکتورونه
۱۷	ثابت فکتورونه
۱۸	د بدلون وړ فکتورونه
۲۰	پتوجنېزس
۲۰	د اټېرسکلروزس پېل
۲۲	د اټېروما پرمختګ او اختلاطات
۲۳	د ایتروسکلروزس کلینیکي سندرومونه
۲۴	وقایه او درملنه

درېم فصل

د زړه اسکېمیک ناروغۍ Ischemic Heart Disease

۲۲	تعریف
۲۲	لاملونه
۲۷	پتوفزیولوژي
۲۸	د اسکیمیا اغیزی
۲۹	د ټیټر ثابته انجینا
۲۹	تعریف
۲۹	پتوفزیولوژي
۲۹	کلینیکي بڼه
۳۳	لابراتورې پلټنې
۳۳	تشخیص
۳۸	درملنه
۴۲	انزار
۴۴	بېړنۍ اکلېلی سندرومونه
۴۵	بي ثباته انجېنا او د میوکارد احتشا پرته د ST د لوړوالي څخه

۴۵	تعریف
۴۵	پتوفزیالوژی
۴۶	کلینیکی بیه
۴۶	لابراتواری پلتهنی اوتشخیص
۴۷	درملنه
۴۹	انزار
۴۹	بی عرضه اسکیمیا
۴۹	تعریف
۵۰	پتوفزیولوژی
۵۰	کلینیکی بیه
۵۱	لابراتوار اوتشخیص
۵۱	درملنه
۵۲	انزار
۵۲	د میوکارڈ بېړنۍ احتشا د ST د لوړوالۍ سره
۵۲	تعریف
۵۲	لاملونه
۵۳	پتوفزیولوژی
۵۵	کلینیکی بیه
۵۷	لابراتواری معاینات
۶۱	درملنه
۶۱	روغتون ته له رسیدو مخکی خارنه
۶۱	په بیړنۍ خانگه کی درملنه
۶۵	په روغتون کی درملنه
۶۸	اختلاطات او د هغوی درملنه
۷۷	له احتشا وروسته د خطر ارزونه او اهمات

دوهمي يا ثانوي وقايه ۷۹

خلورم فصل

Hypertensive Vascular Disease درگونودلورفشار ناروغي

تعريف ۸۱

د هايپرتينشن ویش ۸۲

پتوجنيزيس ۸۵

ابتدایي هايپرتنشن ۸۵

تشديد کونکي فکتورونه ۸۷

دوهمی يا ثانوی هايپرتنشن ۸۷

د هايپرتنشن اغېزی ۹۰

له ناروغ سره چلند ۹۲

تاريخچه ۹۳

فيزيکي کتني ۹۴

لابراتواري کتني ۹۶

درملنه ۹۷

د درملني استطببات ۹۷

دوايي درملنه ۹۸

د درملنی موخی ۱۰۷

خبیث هايپرتينشن ۱۰۹

درملنه ۱۱۰

پنځم فصل

Congenital Heart Disease in Adults په لویانوکی د زړه ولادی ناروغی

لاملونه او وقايه ۱۱۱

پتوفزیالوژی ۱۱۲

۱۱۴	د زړه ځانگړې ولادی نیمگړتیاوې
۱۱۴	د زړه غېر سیانوتیکې ولادی ناروغۍ د کینې څخه ښې لورې ته د شنت سره
۱۱۴	د دهلیزونو ترمنځ د دیوال نقصان
۱۱۶	د بطناتو ترمنځ پردې نقصان
۱۱۷	Patent Ductus Arteriosus
۱۱۹	د زړه غیر سیانوتیکه ولادی ناروغي پرته له شنت څخه
۱۱۹	د ابهر د دسام ولادی تنگوالۍ
۱۱۹	د ابهر دسامی تنگوالۍ
۱۲۰	سب اور تیک تنگوالۍ
۱۲۰	د ابهر فوق دسامی تنگوالۍ
۱۲۱	د ابهر کوارکټیشن
۱۲۲	د پلمونری دسام تنگوالی
۱۲۴	ولادی سیانوتیکې ناروغۍ سږو ته د وینې د جریان د کموالې سره
۱۲۴	ترای کسپید اتریزیا
۱۲۴	فالوټ تترالوژی
۱۲۶	د زړه غېر نورمال موقعیتونه
۱۲۶	ولادی سیانوتیکې ناروغۍ سږو ته د وینې د جریان د زیاتوالی سره
۱۲۶	د لویو شریانونو د موقعیت مکمل بدلون
۱۲۷	یو بطن
	شپږم فصل
	د زړه د ریتم او انتقال گډوډي
۱۲۸	د زړه د لیږدونکې سیستم اناتومی
۱۲۹	برې اریتمیا

۱۲۹	د سینوس غوتی د دندو خرابوالی
۱۳۲	د AV نوډ د انتقال بی نظمي
۱۳۳	لومړی درجه ازیڼی بطنی بلاک
۱۳۳	دوهمه درجه ازیڼی بطنی بلاک
۱۳۵	درېمه درجه ازیڼی بطنی بلاک
۱۳۶	تکی اریتمیا The Tachyarrhythmia's
۱۳۶	Premature complex
۱۳۶	ازېڼی پریمچور کامپلکس
۱۳۷	AV-Junctional complex
۱۳۷	بطنی پریمچور کامپلکس
۱۴۰	تکي کارډیا
۱۴۰	سینوس تکي کارډیا
۱۴۱	اذینی فبریلیشن
۱۴۵	اذینی فلتر
۱۴۷	حملوي فوق بطني تکي کارډیا
۱۴۸	AV نوډل ري انترانت تکي کارډیا
۱۵۱	Preexcitation syndromes
۱۵۲	بطني تکي کارډیا
۱۵۵	Accelerated Idioventricular rhythm
۱۵۶	بطني فلتر
۱۵۶	بطني فبریلیشن
	اوم فصل
	د زړه عدم کفایه Heart Failure
۱۵۷	تعریف

۱۵۷	لاملونه
۱۵۹	تشديدونكي فكتورونه
۱۵۹	د زړه د پاتي والي ډولونه
۱۵۹	د زړه بېړنۍ اوځنډنۍ عدم كفايه
۱۵۹	د زړه د بنۍ او كينۍ خوا عدم كفايه
۱۶۰	سيستوليک او دياستوليکه عدم كفايه
۱۶۰	High out put and Low out put H.F
۱۶۰	Forward and Backward H.F
۱۶۰	د زړه د دهانۍ بيا وېشنه
۱۶۱	د اوبو او مالگي احتباس
۱۶۱	كلينيكې بڼه
۱۶۵	پلټنې
۱۶۷	توپيري تشخيص
۱۶۸	اختلاطات
۱۶۸	درملنه
۱۷۸	د زړه پېوند
۱۷۹	د زړه بېړنۍ عدم كفايه او د سږو اذيما
۱۸۰	درملنه

اتم فصل

کارډیومايوپټي Cardiomyopathy

۱۸۲	تعريف
۱۸۲	د کارډیومايوپټي سببي ویش
۱۸	کلينیکي وېش
۱۸	ډایليټيد کارډیومايوپټي

۱۸۴	لاملونه
۱۸۵	کلینیکې موندنې
۱۸۵	فزیکي ازموینه
۱۸۶	لابراتواری ازموینی
۱۸۶	درملنه
۱۸۷	الکولیک کارډیومیوپاتی
۱۸۷	پریپارتم کارډیومیوپاتي
۱۸۸	عصبی عضلی ناروغی
۱۸۸	درمل
۱۸۹	هاپرتروفیک کارډیومیوپاتی
۱۹۰	هیموډینامیک
۱۹۰	کلینیکي بڼه
۱۹۱	لابراتواری ازموینی
۱۹۱	درملنه
۱۹۲	رستړکتیف کارډیومیوپاتی
۱۹۴	سترس کارډیومیوپاتی
۱۹۴	Endomyocardial fibrosis
۱۹۵	Eosinophilic Endomyocardial Disease

نهم فصل

کورپلمونل Corpulmonal

۱۹۶	تعریف
۱۹۶	د ریوي دوران نورمالی دندی
۱۹۷	پتوفزیالوژي
۱۹۸	دسړو د رگونو ناروغي

۱۹۸	کلینیکي بڼه
۱۹۹	لابراتواري پلټنې
۱۹۹	درملنه
۱۹۹	د سپرو برانشیمي ناروغۍ
۲۰۰	کلینیکي څرگندونې
۲۰۱	لابراتواري ازموینې
۲۰۱	درملنه
	لسم فصل
	میوکارډایټیس
۲۰۲	تعریف
۲۰۲	لاملونه
۲۰۳	HIV میوکارډایټیس
۲۰۴	باکټریایي میوکارډایټیس
۲۰۴	Chagas ناروغۍ
۲۰۵	Giant cell Myocarditis
۲۰۶	Lyme carditis
	یوولسم فصل
	د پریکارد ناروغۍ
۲۰۷	د پریکارد نورمالۍ دندې
۲۰۷	وېشنه
۲۰۷	کلینیکي وېش
۲۰۷	لاملۍ وېش
۲۰۹	بیرنۍ پریکارد ایټس

۲۰۹	د پریکارډ انصاب
۲۱۲	حاد ویروسي او ایډیوپاتییک پریکارډ ایتس
۲۱۳	Post cardiac injury syndrome
۲۱۴	توپیری تشخیص
۲۱۶	د پریکارډ ځنډنی انصبابونه
۲۱۷	ځنډنی التصاقی پریکارډ ایتس
۲۱۷	تعریف
۲۱۸	کلینیکي څرگندونی
۲۱۸	تشخیصیه پلټنې
۲۱۹	توپیری تشخیص
۲۱۹	درملنه
	دولسم فصل
	شاک Shock
۲۲۰	پتوجنیزیس اود غړوغبرگون
۲۲۴	د ناروغ سره چلند
۲۲۵	د شاک ځانگړې ډولونه
۲۲۵	کارډیوجنیک شاک
۲۲۷	سیپتیک شاک
۲۲۹	Hypovolemic
	د یارلسم فصل
	سپنکوپ، د زړه او رگونو کولپس، د زړه درېدنه او ناڅاپي قلبي مړینه
۲۳۱	سپنکوپ
۲۳۴	د زړه او رگونو کولپس، د زړه درېدنه او ناڅاپي قلبي مړینه
۲۳۴	تعریف

۲۳۴	ایپیدیمولوژی او لاملونه
۲۳۵	پتالوژي
۲۳۶	کلینیکي څرگندونې
۲۳۷	تر خطر لاندې ناروغانو پیژندنه او وقایه
۲۳۹	درملنه
	څوارلسم فصل
	په جراحي او امیدواری کی د زړه ناروغۍ.
۲۴۵	د زړه ناروغۍ او جراحي عملیات
۲۴۶	د اکلیلی شریانونو ناروغۍ او جراحي عمل
۲۴۷	هایپرتنشن او جراحي عملیات
۲۴۷	د زړه پاتې والی او غیر قلبي جراحي
۲۴۷	اریتمیا او جراحي عملیات
۲۴۸	د زړه دسامي ناروغۍ او جراحي عملیات
۲۴۹	د زړه ناروغۍ او امیدواري
۲۴۹	د زړه دسامي روماتیزمل ناروغۍ او امېدواري
۲۵۲	هایپرتنشن او امیدواری
۲۵۳	د زړه اسکیمیکي ناروغۍ او امیدواري
۲۵۳	کارډیومیوپتي او امېدواری
۲۵۵	ماخذونه
۲۵۸	اختصارات

سریزه :

پدی دورکی د نورو علومو په شان د طبابت په ډگر کی هم ډیر پرمختگونه ترسترگو کيږي . زیات شمیر ناروغۍ چی پخوا ئي لامل نه پېژندل کېده او رغیدونکی نه وې ، اوس د تشخیص د پرمختللو لارو چارو د شتون له امله د درملنی وړدي . خو ددی پرمختگونوسره سره بیا هم د زړه او رگونو ناروغۍ د انسانانو د مړینی د لاملونو په لومړی لیکه کی ځای لري . له ۱۹۰۰ زېږدیز کال څخه مخکی اتناني ناروغۍ او خوارځواکي په نړېواله کچه د انسانانو د مړینی غوره لاملونه ول ، او د زړه او رگونو ناروغۍ ئي د ۱۰% څه لږه برخه جوړوله . خو نن د زړه او رگونو ناروغۍ په نړېواله کچه د کلنی مړینی ۳۰% برخه جوړوي .

د زړه او رگونو ناروغۍ د طب پوهنځي د څلورم ټولگی د لومړی سمستر د تدریسی کیوريکولوم برخه ده . سره لدی چی پخواهم د داخلی د قدر وړ استادان پدی برخه کی کتابونه لیکلی دي ، خو پدی وروستيو دېرش کلونو کی د داخلی څانگه پدی اړوند کوم ځانگړی نوی درسی کتاب په واک کی نه درلود . د دغه تدریسی نیمگړتیا د پوره کولو په موخه د داخلی څانگی لخوا دنده راکړل شوه ترڅو د منل شوی کیوريکولوم مطابق د پوهنوال علمی رتبې ته د لوړتیا د پاره دغه درسی کتاب (د زړه او رگونو ناروغۍ) ولیکم . په کتاب کی هڅه شوی ترڅو د هغه ناروغیو په اړوند چی ډیر عمومیت لری او زموږ په هېواد کی د قلبي ناروغیو د پتالوژي لویه برخه جوړوي ، زیات معلومات وړاندی شی . ترڅو محصلین او ځوان ډاکټران د نوموړو ناروغیو په هکله ډیر معلومات ترلاسه کړي .

د کتاب منځپانگه د منل شویو ، تازه روغتیائی سرچینو (ټکسټ بوکونه ، انټرنیټ ، ژورنالونه) څخه جوړه او بډایه شویده . د موضوعاتو د پوره روښانه کولو او آسانه پوهاوی په موخه اړونده شکلونه ، جدولونه او شیمایانې په مناسبو ځایونو کی ځای پرځای شوي دي . د کتاب د حجم د کمولو او د اصطلاحاتو د تکراری لیکلو د مخنیوی په موخه د کتاب په پای کی د اصطلاحاتو اختصار ته ځای ورکړل شویدی . د کتاب په متن کی ډیره هڅه شویده چی د پښتو ولسی او روانو کلمو او جملو څخه گټه واخیستل شي ترڅو لوستونکو ته ئی لوستل او پوهیدل آسانه شي .

خو د ناچاری له مخی ځینی انگلیسی او لاتینی اصطلاحات چی د هغوی لپاره مو سوچه پښتو ژباړه نه ده موندلی هم په متن کی راغلی دي .

پدی ځای کی اړین بولم چی د داخلی خانگی د شف پوهاند دوکتور محمد ظاهر ظفرزی او د خانگی د نورو تجربه لرونکو استادانو خدمتونه ته چی هریو د داخلی با ارزښته علمی آثار او تدریسی کتابونه لیکلی د قدر په سترگه وگورم . او هم ددی اثر په بډاینه کی د دوی مرستو او لارښونو څخه د مننی ترڅنگ د لوی خدای (ج) څخه ورته د لوی اجر غوښتنه وکړم .

په پای کی که درنو لوستونکو ته د کتاب د لوستلو په وخت کی د املا او انشاء کومه ناسمی ترسترگو شي ، هیله مند یم چی راپه گوته ئی کړي .

په درنښت

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه دندیزه اناتومي فزیالوژی او پلټنې

لومړۍ فصل

د زړه دندیزه اناتومي فزیالوژی او پلټنې

دندیزه اناتومی او فزیالوژی:

زړه د دوه جلا پمپونو په توګه په یو وخت کې فعالیت کوي. ښی زړه د وینې جریان سږو ته برابرې او کیڼ زړه وینه ټول بدن ته رسوي. د بدن څخه وینه د علوی او سفلی اجوافو د وریدونو پواسطه ښی اډین ته او بیا د ترای کسپید د سام له لیاری ښی بطن کی توئېري چی ښی بطن بیا نوموړی وینه د سږو شریان ته پمپ کوي.

د سږو څخه د اکسیجن او غذائی موادو نه بډایه وینه د څلور پلمونری وریدونو پواسطه کیڼ اډین ته راځی لدی ځایه د مایترل د سام د لیاری کیڼ بطن ته اچول کیږی. د کیڼ بطن څخه د بطیني سیستول په وخت کی د ابهر په لور پمپ کیږي. د بطیناتو د تقلص په وخت کی دواړه اډیني بطیني د سامونه تړلي وي خود ابهر او پلمونری د سامونه خلاص وی. لکن د دیاستول په وخت کي د ابهر او پلمونری دسامونه تړلی او اډیني بطیني دسامونه خلاص وي. په چپ بطن کی فشار د ښی بطن په پرتله څلور ځلی زیاته ده. د کیڼ بطن د دیوال پیروالی یو سانتی متر او د ښی بطن ۳-۲ دی. اډینات په میدیاستین کی د مری او نازله ابهر قدام ته ځای لري، بطینات د اډین قدام کی موقیعت لري او د زروی (Apex) خواته چی د بدن د منځنی کربنی کیني خواته پرته ده نری کیږي. ښی بطن نیغ په نیغه د ستیرنوم هډوکی لاندی د کیڼ بطن ښی او قدام لورته واقع شویده. په نورمال حالت کی زړه د ګوگل دننه د ۵۰٪ څخه لږه برخه جوړوی چی دا تناسب د ګوگل په رادیو ګرافي کی لیدل کیږي. د زړه د کیني خوا منظره د ابهر د قوس، Pulmonary Trunk، د کیني اډین Appandage او کیڼ بطن څخه جوړه شویده. په ښی خوا کی ښی اډین چی د علوی او سفلی Vena cava سره یوځای شویده ځای لري. او د ښی سرحد ښکتنی برخه د ښی بطن څخه جوړه شویده.

د زړه اورگونو ناروغۍ.

د زړه دندیزه اناتومي فزیالوژي او پلټنې

اکلیلی دوران Coronary circulation :

کین لوی او ښی اکلیلی شریان د چپ او ښی کورونری سینوسونو څخه د ابهر د دسام څخه لږ څه وړاندې سرچینه اخلي. کین لوی اکلیلی شریان له دوه نیم سانتی متره غځیدنی وروسته په دوه برخو ویشل کیږي: کین قدامی نازلہ شریان (Left Anterior descending (LAD))، چی د بطیناتو ترمنځ قدامی کره کی شوخی او کین circumflex (CX) شریان چی د بطیناتو ترمنځ خلفی کره کی غزیدلی ده. د LAD شریان څخه ځینی خانگی جلا کیږي چی د بطیناتو ترمنځ پردي قدامی برخه د چپ بطین قدامی دیوال او د زړه څوکی ته وینه رسوی. CX شریان د کین بطین شا، ښکتنی او وحشی خواوو ته وینه ورکوی. د ښی اکلیلی شریان د خانگو پواسطه ښی اذین او ښی بطین سفلی خلفی برخه اروا کیږي. شاتنی نازلہ اکلیلی شریان (Posterior descending) د زړه خلفی برخی ته وینه رسوی دغه شریان په ۹۰% پیښو کی (dominant Right system) د ښی اکلیلی شریان څخه او په پاته پیښو کی د (dominant left system) CX څخه سرچینه اخلي. SA نوډ په ۲۰% او AV نوډ په ۹۰% پیښو کی د ښی اکلیلی شریان څخه وینه اخلي. نولدی امله د ښی اکلیلی شریان د نږدی برخی بندیدنه سینوس بردی کار دیا او AV بلاکونه پیدا کیږي که ښی اکلیلی شریان د ترمبوزس پواسطه ناخپه بند شي د کین بطین د ښکتنی برخی او زیاتره د ښی بطین د انفارکشن لامل گرځي. د LAD او CX شریانونو د فوری بندش له امله به د کین بطین په اړونده ساحه کی انفارکشن راشی خو د کین لوی کورونری شریان بندش زیاتره وژونکی دی.

کورونری شریانونه د دیاستول په صفحه کی له وینی ډکیږي، ځکه چی پدی صفحه کی شریانونه د دسام د Casp پواسطه نه بندېږي او میوکارډ د تقلص د فشار لاندی هم نه وی. په عامه توگه د زړه وریدی سیستم د کورونری شریانونو جریان تعقیبوی په ښکتنی اذینی بطینی groove کی دننه په Coronary Sinus او بیا په ښی اذین کی تشریږي. لمفاتیک سیستم ئی د کورونری شریان سره یو ځای سیر کوی او په Thoracic duct کی تشریږي.

د زړه اورگونو ناروغۍ.

د زړه دندیزه اناتومي فزیالوژي او پلټنې

د زړه تعصیب :

زړه د سمپا تیک او پا را سمپا تیک اعصابو په وسیله تعصیب شوی دی او د رینر جیک اعصاب د اذیناتو او بطنیناتو او انتقالی سیستم عضلي الیا ف تعصیبوي. β_1 ادرینر جیک اخذی مثبت Inotropic او کرونتروپیک اغیزه لري β_2 اخذی چي د رگونو په ملسا عضلاتو کي بارز دي د Vasodilatation سبب گرځي. پا را سمپا تیک Preganglionic او حسي الیا ف د واگوس عصب له لیا ري زړه ته رسیږي کولینر جیک اعصاب د (H₂) Muscarinic اخذوله لیاري SA نود او AV نود تعصیبوي. د دمي په حالت کي د واگوس منع کوونکي اغیزي با رزي وي اود زړه چټکتیا ورو وي. د تمرین، روحی فشارونو، تبې او نورو له کبله ادرینر جیک تنبه د زړه چټکتیا زیاتوي.

هغه فکتورونه چي د زړه په دهانه (Cardiac Out put) اثر لري:

د زړه دهانه د Stroke volume او د زړه د چټکتیا د حاصل څخه عبارت دی. ستروک والیم په end diastolic فشار (Preload) اود محیطي رگونو مقاومت (After load) پوري اړه لري. د زړه د عضلاتو کشش (د پري لوی د زیاتوالي له کبله) د تقلص د قوی د زیاتیدو لامل کیږي او ستروک والیم زیاتوي، دی اړیکي ته د زړه Starling قانون وایي د ویني فشار په تیتیدو سره افتیرلو کمیږي چي دا کار د عضلي فایبرونو د زیات لنډیدو او ستروک والیم د زیاتوالي سبب کیږي. د میو کارد تقلصیت تر یوه حده د نیو رو اندوکرین سیستم په وسیله کنترولېږي همدارنگه مختلف انو تروپیک او د هغوي انتاگونست درمل د میوکارډ په تقلص باندې اثر لري.

د زړه او رگونو ناروغۍ.

د زړه دندیزه اناتومي فزیالوژي او پلټنې

هغه فکتورونه چې د ویني د سیسټمیک جریان په ټینګار باندې اثر لري:

Factors Influencing resistance to systemic blood flow

د ویني سیسټمیک جریان د رگونو ټینګار یا مقاوېت سره نږدې اړیکه لري لدې امله د شریان د قطر لږ بدلون هم د ویني په جریان شدید اثر کوي. د رگونو نیوروژنیک تقبض د الفا ادرینرژیک آخزو او د رگونو پراخه کېدل (Dilatation) د Muscarenic او β_2 ادرینرژیک آخزو د اغیزې له امله چې د رگونو په ملسا عضلات کې لري منځته راځي. سربیره پردې سیسټمیک او ځایي Vasoactive توکي د رگونو په تون باندې اغیزه کوي. Angiotensin، Endothelin او Vaso construtor مواد دي. پداسې حال کې چې اډینوزین، پروستاگلانډین او BradyKinin او نایتريک اکساید وازو ډایلیټر توکي دي. د ویني د غلظت په زیاتېدو سره د جریان په وړاندې ټینګار زیاتېږي.

هغه فکتورونه چې د کورونری جریان په مقاومت باندې اثر لري:

کورونری رگونه د سمپاتیک او پاراسمپاتیک عصبي ریښو په وسیله تعصیب شوي دي. د الفا ادرینورسپټورونو هڅونه د رگونو د تنګیدو او د β_2 رسیپټورونو هڅونه د رگونو د پراخیدو لامل کېږي. نو د سمپاتیک سیسټم بارز اثر د کورونری شریانونو Dilatation یا پراخیدل دی. پاراسمپاتیک اعصاب هم نورمال کورونری شریان باندې منځنۍ کچه پراخوونکې اغیزه لري. د اکلیلې شریان ناروغ اندوتیلیم نایتريک اکساید آزادوي چې د رګ د پراخه کیدو لامل کېږي. خو که چیرې اندوتیل د اتیروما په وسیله زیانمنه شوي وي، د رګ تنګیدنه به رامنځته شي. سیسټمیک هورمونونه لکه، نیوروپیتایډونه او ځایي فکتورونه لکه اندوتیلین چې ډیر قوي رګ تنګونکي توکي دي، د شریان په تون او کورونري جریان باندې اغېزه لري.

د زړه او رگونو ناروغۍ. د زړه دندیزه اناتومي فزیالوژي او پلټنې

د وعائي تنظیم د شتون له امله ترهغی چي د شریان په قطر کي تر ۷۰% کموالی نه وی راغلی. د کورونری شریان اتیرومایي تنگوالي حتي د تمرین په وخت کي هم د جریان د کمښت لامل نه کیږي (۱۴).

د تنفس هیمو دینا میک اغیزی :

د شهیق په وخت کي چي د ګوګل داخلي فشار وغورځي سيني ته د ويني د زیات راتګ له امله ښي زړه ته د ويني جریان زیاتوالی مومي . کله چي سږی پراخه شي یو څه وینه په سینه کي پاته کیږي او هم د سږو وعائي ظرفیت کي زیاتوالي راځي. په شهیق کي کيڼی بطن ته د ويني جریان کمیږي.

د پورته حالت په خلاف په ذفیر کي د وریدي ويني راتلنه ښي زړه ته راکمه اود ښي زړه دهانه کمیږي خو کيڼی زړه ته د ويني په راتګ کي زیاتوالي راځي، اود کيڼی بطن دهانه زیاتیږي.

د زړه سایکل (The Cardiac Cycle)

د زړه د یو تقلص د پیل څخه د بل تقلص ترپېله پوري د قلبي پېښو پیداکیدو ته د زړه سایکل وائي . د زړه د سایکل لومړنۍ پېښه د اذینا تو ډیپولرایزیشن دی (په ECG کي د P څپه) چي د ښي اذین او ورپسي کيڼ اذین د تقلص سره دوام مومي. له یو لنډ تم (د PR واټن) وروسته د بطنیناتو فعالیت پیل کیږي . لومړي کيڼ بطن ورپسي ښي بطن په تقلص پیل کوي د بطن فشار د اذین د فشار څخه زیاتیږي چي له امله ئي لومړي مایترل اوبیا ترای کسید دسامونه تړل کیږي. د ابهر او پلمونري دسامونو تر خلاصیدو پوري بطنینات پرته د حجم له بدلون څخه تقلص کوي (Isovolumetric contraction) . کله چي د بطنیناتو فشار د ابهر او پلمونري شریانونو فشار څخه زیات شي لومړي پلمونري اوبیا د ابهر دسام خلاص او بطنینات تشیږي . کله چي بطنینات په استرخا (Relax) پیل وکړي د دوي فشارونه د ابهر او پلمونري شریانونو څخه ټیټیږي او د ابهر او پلمونري دسامونه تړل کیږي. ورپسي

د زړه اورگونو ناروغۍ. د زړه دندیزه اناتومي فزیالوژي او پلټنې

Isovolumetric Relaxation پېښې وروسته لږې چې د بطناتو فشار د اذیناتو د فشار څخه ټیټ شي، ترای کسپید او مایترل د سامونه خلاصیږي (۷، ۱۷).

د زړه اورگونو د ناروغیو لابرآتواري پلټنې:

ځینې ساده پلټنې لکه د زړه برېښنايي گراف (ECG) د گوگل رادیوگرافي او ایکو کارډیوگرافي په اساس سره د ناروغ د بستر په خوا کې ترسره کېدای شي.

خو ځینې نور معاینات لکه د زړه catheterisation, computed tomography (CT) او Nuclear Scanning او Magnetic Resonance Imaging (MRI) ځینې ځانگړو اساساتیاو ته اړتیا لري.

I- د زړه برېښنايي گراف (ECG):

د لاندې ستونځو په تشخیص کې مرسته کوي:

۱- د زړه اریتمیا

۲- د میوکارډ هایپر ترافي

۳- د میوکارډ اسیکیمیا او انفارکشن

۴- د الکترولایتونو تشوشت

۵- د پریکارډ التهاب

۶- د ځینې درملو تسمم

د زړه او رگونو ناروغۍ.

د زړه دندیزه اناتومي فزیالوژي او پلټنې

II - د فزیکي تمرین په وخت کې د زړه ګراف (Exercise (Stress) ECG :

د treadmill یا با یسکل سره د تمرین په وخت کې ۱۲ لیږه ECG ثبتیږي. د نهایتو لیږونه د لیچو او ښنګرۍ پرځای په اوږو او د ورنو په پورتنۍ برخه (hip) کې ایښودل کیږي. د تمرین د تست د پاره د Bruce پروتوکول نسبتاً یقیني ده او ډیر استعمالیږي چې په لاندې جدول کې توضیح شوی دی.

د ETT لپاره د Bruce پروتوکول		
پړاو Stage	Speed (mph)	Gradient (%)
۱	۱، ۷	۱۰
۲	۲، ۵	۲۲
۳	۳، ۴	۱۴
۴	۴، ۲	۱۶
۵	۵، ۰	۱۸

د تست په اوږدو کې په منظم ډول د وینې فشار اندازه او د ناروغ ګیلی ارزول کیږي.

د ETT غوره استطببات په لاندې ډول دي:

- د انجنېنا د تشخیص تائید

- د ثابت انجنېنا ارزونه

- د زړه د احتشا څخه وروسته د انزارو ارزونه

- د Revascularization څخه وروسته ارزونه

د زړه او رگونو ناروغۍ. د زړه دندیزه اناتومي فزیالوژي او پلټنې

- د هغه اریتمیا ووتشخیص او درملنې ارزونه چي د تمرین له کبله پیدا کیږي.

په لاندی حالاتو کی تست مثبت گنل کیږی.

- که چیري د تست په اوږدو کي ناروغ ته د انجنېا دردونه پیداشي
- د ST په سگمنت کی د یو ملي متر څخه زیات بدلون را شي
- د وینی فشار د جگېدو پرځای ټیټ شي

د ETT نتیجه تل باوري نه وي ځیني کورونري ناروغان کیداي شي منفي نتیجه ونيي (دروغجن منفي) همدارنگه ځیني ناروغان چي کورونري ناروغې نه لري د تست نتیجه ئي مثبت وي (دروغجن مثبت) *

د ETT ډیر خطری (High risk) موندنی په لاندی ډول دي:

- د اسکیمیا لپاره د قدمی ټیټوالی. (د Bruce د پروتوکول په لومړي یا دوهم پړاو کي)

- د تمرین په وخت کي د فشار ټیټوالی.

- په ECG کي د اسکیمیا څرگند ، پراخه او دوامداره بدلونونه

- د تمرین په وخت کي اریتمیا

ETT په بي ثباته انجینا ، د زړه غیر معا و ضوي پاتي والی ، شدید هایپر تنشن او د کین بطن د خروجي برخي شدید بندوالي (دابهر د دسام تنگوالي) کي مضاد استطباب دی *

III- گړ ځنده ECG (Holter monitoring)

د ECG یو یا څو لیږدونه په دوامداره توگه د ثبت لپاره د کوچني ا و لیږدولو وړ ټیټ سره نښلول کیږي * دا تخنیک د اریتمیا او اسکیمیا د تیریدونکي حملو د ثبت او معلومولو

د زړه اورگونو ناروغۍ. د زړه دندیزه اناتومي فزیالوژي او پلټنې

لپاره اجرا کیږي. ځکه چې نوموړي حملي د ستندرد ECG په وسیله چې په لنډ وخت کې اخیستل کیږي نادرا تشخیص کیدای شي *

IV- را دیولوژي :

رادیوگرافي د زړه د سایز او شکل د سږو او د سږو د رگونو د حالت د معلومولو لپاره ډیر ارزښت لري *. خلفي قدامي کلیشه چې د ژور شهيق په وخت کې اخیستل شوي وي ډیر ښه معلومات راکولای شي. د زړه د خیال د اټکلي اندازه کولو په موخه د زړه د سا حی پراخوالی. د ټټر د داخلي عرضاني قطر سره پرتله کیږي چې د زړه او ټټر د پراخوالي دا نسبت (Cardio-thoracic ratio) په دودیز ډول د ۰.۵ څخه لږ وي او د زړه عرضانی قطر هم د ۱۵.۵ سانتی متر څخه کم وي *

د زړه د مختلفو برخو پراخوالی. د زړه په خیال کې د ځینې ځا نگوړو بدلونونو له مخې معلومیدای شي :

۱ - د کین ا ذین د پراخوالی په صورت کې د کین ا ذین appendage برجسته کیږي چې له امله ئې د زړه کین سرحد مستقیم کیږي. د سترنوم په ښي خوا کې د زړه دوه سیوري (double shadow) لیدل کیږي او د Carina زاویه (د شزن تشعب) د کین لوي برانکس پورته خواته د تپله کیدلو له امله پراخه کیږي *

۲ - د ښي ا ذین د لویوالي په صورت کې د زړه ښی سرحد د ښي سږي ښکتنې برخې په لور راوتلي وي

۳ - که چیرې کین بطن پراخه شوي وي، د زړه کین ښکتنې سرحد را وتلي او د زړه سیوري لوي ښکاری. له بلي خوا که د کین بطن هایپر تروفي شته وي د زړه سرحد گرد ښکاري.

د زړه اورگونو ناروغۍ. د زړه دندیزه اناتومي فزیالوژي او پلټنې

۴ - که ښی بطن پراخه شوي وي د زړه سایز زیاتېږي، د زړه څوکه (Apex) پورته لوري ته بې ځایه کیږي او د زړه کین سرحد مستقیم کیږي

د ابهر او مایترل دسامونو د کلسیفیکیشن د معلومولو له پاره جنبي او یا Oblique رادیو گرافي ډیره مرسته کوي. ځکه چې په خلفي قدامي کلیشه کې نوموړي بدلونونه د فقراتو پواسطه پټیږي خو ایکوکارډیوگرافي د دسامونو د تلکس د تشخیص لپاره ډیره خاصه معاینه ده. د زړه د عدم کفایي ناروغ د سینې په رادیوگرافي کې کیدای شي احتقان اذیما او یا ایفوزن ولیدل شي *

V - ایکوکارډیوگرافي (Echocardiography)

د زړه د شکمن او تشخیص شویو ناروغیو په ارزونه کې ایکوکارډیوگرافي یوه ستندرنه کلینیکي معاینه ده.

الف - Two-dimensional echocardiography :

ایکوکارډیوگرافي د التراسوند نورو ډولونو ته ورته دی. ددې معاینې په وسیله د زړه جوړښتونه په دوه بعدی توگه د لیدلو وړ گرځي .

دا تهاجمي (Invasive) عملیه نده د سینې په دیوال کې د پروب په ایښودلو سره تصویرونه د ماشین په مونیتور کې ښکاره کیږي. د بطناتو تقلص په اسانۍ سره لیدل کیدی شي چې دا د بطن دندو په ارزونه کې مرسته کوي. د دساماتو تصویر هم په اسانۍ سره اخیستل کیږي چې له مخې یی د دسامونو د دندې او جوړښت اښارملتي کې چیرې شته وي معلومیدی شي. سربیره پردې په اندوکارډایتس کې Vegetation کیدی شي ولیدل شي. همدارنگه ایکوکارډیوگرافي د داخل قلبي کتلو لکه ترمبوز او تومورونو په تشخیص او هم د زړه ولادي ناروغیو د پیچلي جوړښتیز اښارملیتو په تشخیص کې مرسته کوي .

د زړه او رگونو ناروغۍ.

د زړه دندیزه اناتومي فزیالوژي او پلټنې

ب- ډاپلر ایکوکارډیوگرافي Doppler Echo cardiography:

ددې ډول ایکو اساس د یوې متحرکې مادې لکه د وینې د سره کړیواتو څخه د صوتي څپو انعکاس دی. ددې معاینې له مخې په زړه او رگونو کې د وینې د سرو حجرو او پخپله د وینې د حرکت خوا او چټکتیا معلومېدې شي. که په فريکونسي کې ډیر تغیر راشي د وینې په حرکت کې هم زیاتوالي راځي. ډاپلر ایکوکارډیوگرافي د وینې د جریان د غیرنورمال سمت په معلومولو کې ډېره مرسته کوي لکه د ابهر اومايترل دسامونود Ragurgetation او د فشار د Gradient اټکل کول. نورماله Velocity د 1 m/sec په حدودو کې ده، خو د تنګوالي په صورت کې د جریان چټکتیا زیاتېږي د بیلګې په توګه د ابهر دسام په شدید تنګوالي کې د ابهر اعظمي velocity تر 5 m/sec پورې رسېږي. د دسام څخه د فشار د توپیر کچه (Pressure gradient) د Bernoulli د تعدیل شوی مساوات له مخې اټکل کېږي چې په لاندې ډول دی:

$$\text{Pressure gradient (mmHg)} = 4 \times (\text{peak velocity in m/sec})^2$$

د ایکو پرمختللي تخنیکونو څخه په ځینې ځانګړې حالاتو کې کار اخستل کېږي لکه د رگونو دننه التراسوند چې د رگونو د دیوال د افتونو په تشخیص او کورونري شریانونو په مداخلوې درملنه کې ترې ګټه پورته کېږي. همدارنګه Doppler myocardial imaging چې د میوکارډ د سیستولیک او دیاستولیک دندو په معلومولو کې ترې کار اخستل کېږي.

د ایکوکارډیوگرافي غوره استطاباېت په لاندې ډول دي:

۱- د کینې بطن د دندې ارزونه

۲- د دسامي ناروغیو تشخیص او د شدت اندازه کول

۳- په اندوکارډایټس کې د Vegetation تثبیت

د زړه اورگونو ناروغۍ. د زړه دندیزه اناتومي فزیالوژي او پلټنې

۴- په اذیني فبریلیشن کې د زړه د جوړښتیزې ناروغي معلومول

۵- د پریکاردیل ایفیوژن تشخیص

۶- د Wall motion abnormality معلومول

۷- په سیستمیک امبولیزم کې د زړه د جوړښتیزې ناروغي پیژندنه

ج- د مری د لاری ایکوکارډیوگرافي Trans oesophageal echocardiography :

پدې تخنیک کې د التراسوند پروب چې د اندوسکوپ بڼه لري په مري کې دننه او د کینې ا ذین شاته ځای په ځای کیږي چې له امله یې ډیر پاک تصویر لاسته راځي. د بیلګې په ډول په اندوکارډایتس کې ډیر کوچني وختیشن هم چې د ګوګل د لاري ایکوسره د لیدلو وړ نه وي لیدل کیږي. همدارنګه د مصنوعي دسام (په ځانګړي ډول مایترل) د دندې د خرابوالي د معلومولو، د زړه ولادي ناروغيو لکه (ASD) او د سیستمیک امبولیزم په پېښه کې چې د زړه د ناروغي شک موجود وي خو د ګوګل د لاري ایکوکارډیوگرافي سره تشخیص نه شي ناروغ ته د مري د لاري ایکو توصیه کیږي. (۱۲، ۱۷، ۲۲)

VI - Computed tomographic (CT) Imaging :

د زړه د جوفونو، لویو رګونو، پریکارډ اود شا وخوا جوړښتونو د معاینې لپاره اجرا کیږي په عملي ډګر کې په شکمن aortic dissection پېښه کې د ابهر د تصویري معاینې لپاره ډیر ګټور دي.

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه دندیزه اناتومي فزیالوژي او پلټنې

Cardiovascular Magnetic Resonance (CMR) - VII

پدې تخنیک کې ایونایز شوي وړانګه نه کارول کېږي لدې امله بې ضرره ده غوره استطباً بات ئې په لاندې ډول دي:

۱- د زړه ولادي ناروغۍ ، د ایکو کارډیو گرافي په تعقیب د ولادي نقصان د اناتوميک ارزونې اود عملیات څخه وروسته ارزونې لپاره .

۲- کارډیو میو پاتي ، د پریکارد ناروغي او په زړه کې انفلټریشن

۳- د ابهر ناروغي لکه د Dissection، انیوریزم او Coarctation

۴- د زړه دسامي ناروغۍ ، د دسام د تنګوالي او عدم کفائي د شدت ارزونې لپاره

۵- د اکلیلي شریا نونو ناروغي پدې حالت کې CMR د لاندې موخو لپاره اجرا کېږي:

▪ د Dobutamine stress په وخت کې د بطن د دیوال د خوځښت ارزونه

▪ د adenosine Stress په وخت کې د میو کارډ پرفیوژن

▪ د اکلیلي شریان اود CABG تصویرونه

▪ د میو کارډ د احتشا شوي برخې تصویرونه

۶- د Pulmonary Vessel ارزونه

VIII- د زړه کتیترایزیشن Cardiac Catheterisation

پدې تخنیک کې یو ځانګړی کتیتر د ورید یا شریان له لاري د رادیو گرافیک فلوروسکوپي تر لارښوونې لاندې زړه ته رسول کېږي. ددې معاینې په مټ د زړه دننه فشار اندازه کېږي، د زړه د جوړښت څخه سمپل اخیستل کېږي اود کثیفه مادی له زرق کولو وروسته انجیوگرام هم اجرا کېدلای شي.

د زړه اورگونو ناروغۍ. د زړه دندیزه اناتومي فزیالوژي او پلټنې

- د کین زړه کتیترایزیشن د کورونري شریانونو ناروغۍ د ارزونې لپاره ترسره کیږي خو د مایټرل او ابهر د سامونو او د ابهر د ناروغیو د ارزونې لپاره هم ترې ګټه پورته کیږي.
- د کین بطن انجیوګرافي د کین بطن د سایز او دندې د معلومولو لپاره ترسره کیږي.
- کورونري انجیوګرافي د شریان د تنګوالي د معلومولو او هم د Revascularisation عملیو لکه Stenting او balloon angioplasty د لارښوونې لپاره کارول کیږي.

د کین زړه د کتیترایزیشن په عملیه کې کتیتر د Radial یا brachial, Femoral شریانونو له لیاري دننه کیږي. دا یوه محفوظه (Safe) عملیه ده، شدید اختلاطات د ۱/۱۰۰۰ څخه په لږو پیښو کې رامنځته کیږي. د ښي زړه کتیترایزیشن د پلمونري شریان د فشار اندازه کولو لپاره ترسره کیږي. سربیره پردې د زړه په مختلفو جوفونو کې د Oxygen Saturation معلومولو له مخې د زړه دننه شتون په معلومولو کې مرسته کوي. د بیلګې په توګه که په ښي اډین کې د اکسیجن مشبوعیت %۲۵ وي او په پلمونري شریان کې %۸۰ وي د چپ څخه ښي خواته په لوي Shunt دلالت کوي چې دا شنت کیدای شي د VSD له امله وي. د dye dilution او Thermodilution تخنیکو په وسیله د زړه Aut put هم اندازه کیدلې شي. د کین اډین فشار کیدای شي په مستقیمه توګه د ځا نګرې کتیتر په وسیله د ښي اډین له لیاري د اډینی سپستم د وځدي پواسطه اندازه شي. د Swan Ganz کتیتر څخه په ډیر وځیمو ناروغانو کې د Pulmonary wedge Pressure د څارنې لپاره چې د کین زړه د filling pressure یو لارښود دی استفاده کیږي

IX- Radionuclide Imaging :

د داسي رادیونوکلاید موادو شتون چې د gamma وړانګې خپروي او لنډ half – life لري ددې شونتیا رامنځته کړېده چې رادیونوکلاید توکي د زړه د دندې د څېړنې لپاره وکارول شي. د ګاما وړانګې د ځا نګرې کمري په وسیله تثبیت او د زړه تصویر اخیستل کیږي.

د زړه اورگونو ناروغۍ.

د زړه دندیزه اناتومي فزیالوژي او پلټنې

دوه تخنیکونه ئي شته دي :

۱- د بطين د دندې معلومولو د پاره Blood pool Imaging

Isotope توکي په وریدکي زرق کیږي ترڅو د دوراني ویني سره گډه شي. د گډا ما کمره د زړه د سایکل په مختلفو پړاونو کي د ایزوتوپ خپرونکي ویني اندازه معلوموي سربیره پردې د زړه د جوفونو سایز او بڼه هم څرگندولای شي. د ECG سره د گډا ما کمرې د تړلو په وسیله کولای شو چي د زړه د سایکل د سیستولیک او دیا ستولیک مرحلو په باره کي معلومات ترلاسه کړو چي وروسته بیا د بڼي او کین بطين ejection fraction (EF) تري محاسبه کیږي.

۲- Myocardial Perfusion Imaging :

پدې تخنیک کي د رادیو اکتیف ایزوتوپ موادو د وریدي زرق څخه وروسته د دمي او Stress په وخت کي د میوکارډ Scintiscan اخیستل کیږي.

درملیزې عملیې (Therapeutic Procedure)

د رادیوگرافیک کنترول لاندې کتیتر د فیمورل یا برخیل شریان له لیاري زړه ته وړل کیږي او لدې لیاري بیا د ناروغه کرونري شریان balloon dilatation او Stenting اجرا کیږي. د همدې لاري د میترل تنگ شوي دسام او نور تنگ شوي دسامونه پراخه کیدای شي. د ابهر په Coarctation کي تنگ شوي برخه د لوي بالون پواسطه پراخه کوي همدارنگه د زړه په ولادي ناروغیو لکه ASD او PDA کي د کتیتر له لیاري ولادي نقصان تړل کیږي، له همدې لاري د بردي کارډیا او د زړه بلاکونو د اصلاح لپاره Pacemaker ایښودل کیږي. ایښودل شوي defibrillator د پیسمیکر پر خواصو سربیره په خبیثه اریتمیا وولکه (بطیني فبریلیشن) کي د شوک ورکولو او defibrillation وړتیا هم لري *

د زړه اورگونو ناروغۍ.

د زړه دندیزه اناتومي فزیالوژي او پلټنې

له Transcatheter radiofrequency ablation څخه د تکراري اریتمیاوو په درملنه کې کار اخیستل کیږي. پدې عملیه کې کتیتري د هغه ساحې تر څنګ ایښودل کیږي چې غیر نورمال الکتریکي جریان لري او داسې کره تنبه وړاندې کوي چې د زړه پدې برخه کې غیر نورمال جریان بندوي. (۱۶، ۱۷)

د زړه او رگونو ناروغۍ.

اتېروسکلروزس

دوهم فصل

اتېروسکلروزس (Atherosclerosis)

تعريف :

د شريانونو د ديوال پندېدو، د الاستيكيټ له منځه تلو، او د فيبريني شحمي Plaque جوړېدو ته چي د شريانونو د ديوال په داخلي برخه كي منځته راځي اتېروسکلروزس ويل كېږي. نوموړي ناروغي په لويديزه نړۍ كي د مړېني او معيويټ لومړي درجه لامل دي .

اتېروسکلروز د دوراني سيستم مختلفي برخي اخته كوي چي د هري برخي د اخته كېدو څخه بېلي كلينيكي بني رامنځته كېږي. د بېلگي په توگه د اكليلي شريانونو د اخته كېدو له امله د زړه بېړني احتشا او انجنېنا، د دماغي رگونو د اخته كېدو له امله ستروك او د دماغ تېرېدونكي اسكليما ، په محيطي رگونو كي Intermittent Claudication او گانگرن، د Splanchnic رگونو د اخته كېدو له امله ميزا تريك اسكليما او نور .

اتېروسکلروز په زياتره شريانونو كي په ځايي (Focal) ډول منځته راځي . د بېلگي په توگه په اكليلي شريانو كي زياتره د قدامي نازله اكليلي شريان نږدې برخه اخته كوي . همدارنگه نوموړي افت زياتره د شريانونو دوپش برخه اخته كوي . د اتېروسکلروز پروسه د ماشومتوب او نوي ځواني د دورې څخه پيل او په څو كلونو حتي لسيزو كي مخ پر وړاندې ځي. (۱۹)

د خطر فكتورونه Risk factors

I- ثابت فكتورونه: Fixed factors:

۱- عمر او جنس : عمر د اتېروسکلروز غوره نه بدلېدونكي فكتور دي ښځي د مينپوز څخه مخكي مرحله كي د هم عمره نارينه په پرتله چي يوشان خطري فكتورونه ولري، ددي ناروغي د ډير لږ خطر سره مخامخ كېږي . خو د جنسيت دا توپير د مينپوز څخه وروسته ډير ژر له منځه

د زړه او رگونو ناروغۍ. اتیروسکلروزس

ځي يعنې نارینه او ښځینه دواړوکی خطر یوشانته کیږي. د وروستیو څیړنو پایلی هم د مینیپوز څخه وروسته د Hormone replacement درملنې اغېزې قانع کوونکې نه بولي.

۲- کورنۍ تاریخچه: (Family history) د رگونو اتیروسکلروتیک ناروغۍ زیاتره په کورنۍ ډول شتون لري. چی دا کیدای شی د یو شانته جنټیک خواصو، د ژوند څرنگوالی (Life style)، او ورته محیطی فکتورونو پوری اړه ولري.

II - د بدلون وړ فکتورونه Modifiable factors:

۱- تنباکو کارونه Smoking:

د رگونو د اتیروسکلروتیک ناروغۍ یوه غوره د خطر فکتور دی چی د مخنیوي وړ دی. د سکرټ څکونی او IHD تر منیخ غښتلی ثابت او Dose related تړاو شتون لري.

دا چی تنباکو څنگه د اتیروسکلروزس خطر زیاتوی پوره څرگنده نده. خو د سگرت د پریښودلو څخه وروسته په چټکه توگه د زړه د حملو د خطر کموالی، دا را په گوته کوی چی تنباکو کیدای شي ددی ناروغۍ په پیدایښت کی رول ولری.

۲- د ویني لوړ فشار:

د اتیروسکلروز پېښی د ویني فشار په لوړیدو سره زیاتېږي. د پېښو زیاتوالی هم سیستمیک او هم د یاستولیک فشار پوری اړه لري. د فشار ضد درملنی پواسطه د زړه د اسکیمیک ناروغۍ له کبله مړینه، ستروک او د زړه د عدم کفایي پېښی کمیږي.

۳ - هاپرکولسترولیمیا Hypercholesterolemia

ثابته شویده چی د IHD او د رگونو د نورو اتیروسکلروتیک ناروغیو خطر د پلازما کولسترول په زیاتېدو سره زیاتېږي، په تیره بیا د مجموعی کولسترول او HDL نسبت. سریره پردی د پلازما تراپگلسرید (TG) د کچی او اتیروسکلروز تر منخ هم یوه کمزوری اړیکه شته. د پلازما کولسترول او Low Density Lipoprotein (LDL) د کچی کمول، د زړه او رگونو د ناروغیو لکه د زړه احتشا، ستروک، او ناڅاپي مړېنی خطر کموی.

اتیروسکلروزس

د زړه اورگونو ناروغۍ.

۴- دیابت :

د رگونو د اتیروسکلروتیک ناروغیو د خطر ډېر مهم فکتور دی. د انسولین په وړاندې ټینګار هم چې د چاغوالی او فزیکي فعالیت د کموالی سره یو ځای وي د IHD د خطر یو غوره فکتور دی

۵- تحثري فکتورونه Haemostatic factors :

د Platelet فعالېدنه او د فایبرینوژن د کچې زیاتوالی د میوکارډ د احتشا خطر زیاتوی. نور تحثري فکتورونه لکه C پروتین، S پروتین او د پنځم فکتور د کچې کموالی د وریدې او شریاني ترمبوزس د خطر د زیاتوالی سره یو ځای وي.

۶- فزیکي فعالیت :

د فزیکي فعالیت نګول (Physical inactivity) د IHD د خطر دوه چنده کوي او د ستروک د پاره هم د خطر غوره فکتور دی. منظم فزیکي تمرین (چټک قدم وهل، باسیکل زغاسته او لامبو وهل په اونی کی دوه یا درې ځلې د ۲۰ دقیقولپاره) ساتونکی تاثیر لری. چې د تمرین دا تاثیر کیدای شی د لاتدی عواملو له امله وي :

- HDL زیاتوالی
- د فشار ټیټوالی
- د دوراني ترمبوز کموالی
- کولیترال رگونو جوړیدنه

۷- چاغوالی (obesity) :

چاغوالی په تیره بیا مرکزی چاغوالی (Apple shape) د اتیروسکلروز د خطر یو مهم فکتور دی او زیاتره د خطر نورو فکتورونو لکه د فزیکي فعالیت د کموالی، ها پیرتنشن او دیابت سره یو ځای وي.

د زړه اورگونو ناروغۍ.

اتېروسکلروزس

۸ - الکول: د الکول زیات مصرف د هایپر تېشن او د زړه د حملو سره یوځای وي.

۹ - نور غذای فکتورونه:

په هغه غذای رژیم کې چې د تازه میوو او سبزو polyunsaturated شحمی اسیدونو کچه یې لږه وي د وعای افاتو د خطر د زیاتیدو سره یوځای وي. همدارنګه د ویتامین C, ویتامین E او نور انتی اکسیدانت موادو کموالی د oxidized LDL د تولید د زیاتیدو سبب کېږي. په وینه کې د هوموسیستین د کچې زیاتوالی هم د پرمختللي اتېروسکلروز سره مل وي. د ویتامین B_{۱۲}, B_{۱۲} او فولیت د کچې کموالی د هوموسیستین د کچې د زیاتیدو لامل ګرځي. (۱۹، ۱۸، ۱۷)

پتوجېنس Pathogenesis

د اتېروسکلروز پېل:

د Fatty streak جوړېدنه: دا د اتېروسکلروز د پېل لومړنۍ لیژن دی. د نوموړې لیژن د جوړېدو څخه مخکې د شریان په انتیما کې لیپوپروتینونه راټولېږي. داسې انډرېل کېږي چې لومړی د شریان په جدار کې injury پېدا کېږي، چې دا انجری لاندې ډولونه لري:

- میخانیکي (هایپر تېشن)

- میتابولیک (ځنډنۍ هایپر کولسترولیمیا او Homocysteinemia)


- امیونولوژیک (د زړه او پښتورګی پیوند)

د انجری له کبله د اندوتلیوم نفوذیه قابلیت زیاتېږي چې له کبله یې لیپوپروتینونه د اندوتلیوم په اړونده برخه کې په موضعي ډول راټولېږي. سربېره پردې لیپوپروتینونه د خارج حجروي Matrix د Protioglycan سره هم نښلي.

د انتیما په خارج حجروي برخه کې راټول شویو لیپوپروتینونو کې لاندې کیمیاوي بدلونونه را پېدا کېږي:

د زړه او رگونو ناروغۍ.

اتیروسکلروزس



۱-۱ شکل: د اتیروما د پرمختګ پړاونه ښيي. (۱۹)

۱- Lipoprotein oxidation: هغه لیپوپروتینونه چې په انتیما کې ټول شوی د پلازما د انتی اکسیدانت موادو څخه لری پاته کیږی او اوکسیدایز کیږی. هم پروتیني او هم لیپیدی برخه دواړه په اوکسیداتیف بدلونونو کې برخه اخلی.

د اوکسیدیشن په نتیجه کې oxysterol , hydroperoxid او نور لاسته راځی .

۲- Non enzymatic glycation : په دیابتیک ناروغانو کې چې دوامداره هاپیر گلاسیمیا لری نوموړی حالت پېښیږی .

د لوکوسایټونو نښلېدل Leukocyte Adhesion:

کله چې لیپیدی مواد په انتیما کې راټول شول، په دوهم پړاو کې د fatty streak د جوړیدو د پاره لوکوسیت گومارل کیږی . یو شمیر نښلونکي مالیکولونه د رسپټورونو د اندوتیل په جدار کې فعالیت لری او د مونوسایت او لیمفوسایت د نښلیدو (Adhesion) سبب کیږی او د نښلیدو څخه وروسته انتیما طبقی ته نفوذ کوي . سربېره پردی اوکسیدایز شوی LDL د سپینو کرویاتو Chemotaxis زیاتوي .

د زړه اورگونو ناروغۍ.

اتیروسکلروزس

د شحمي حجرو جوړېدنه Foam cell formation:

کله چې مونوسایټ حجرې اټیما ته ورسېږي ، هلته په مکروفاژ بدلیږي . نوموړې حجرې اوکسیدایز شوی LDL بلع کوي او په foam cell بدلیږي . ځینی لیبید لرونکی مکروفاژونه د شریان د دیوال څخه وځي او شحم څخه د شریان د پاکولو دنده ترسره کوي . یعنی کله چې د شریان دیوال ته د ننوتونکي شحم مقدار د وتونکي کچې څخه زیاته شي اتیروما ته میلان پیدا کیږي ، او مکروفاژ پدې برخه کې اساسی رول لري . ځینی foam cell حجرې چې زیات مقدار لیبید لري مري ، ددې حجرو له منځه تلل پدې ځای کې د شحم د ټولېدو او د اتیرو سکلوټیک پلک د جوړېدو لامل کیږي .

لیبید لرونکی مکروفاژ حجرې cytokine او د ودې فکتور (Growth factor) افرازوي چې دغه مواد د ملسا عضلاتو د ډېرنیت ، لېږدېدنې او د خارج حجروي Matrix د جوړېدو لامل کیږي . همدارنگه Transforming Growth factor د ملسا عضلاتو پواسطه د کولاجن جوړېدنه هڅوي . چې په پایله کې fatty streak په فبروزي شحمي لیژن بدلیږي (۱۳، ۱۹).

د اتیروما پرمختګ او اختلالات :


د اتیروسکلروز په پرمختګ سره کوچنۍ رگونه د vasavatorom تر څنګ جوړېږي چې دا شریانونه په اتیروسکلروټیکه برخه کې د هیموژراو ترمبوزس د پاره لاره سموي .

په اتیروسکلروټیک پلک کې زیاتره هېموزدرین او فبرین شته وي ، چې دا د پلک پخوانی هیمورژ را په گوته کوي . د اټ په پرمختګ سره کلسیم په پلک کې راټولېږي . د اتیروسکلرو ټیک پلک د فبروزي پردې شکېدنه (رېچر) په شریان کې د ترمبوزس سبب کیږي یانې د رېچر ساحه د ترمبوز د پاره هسته جوړوي . ناخوندي پلک (Vulnerable plaque) چې اختلاط ته ډیر میلان لري د شحمو څخه بډایه وي او د نازکه فبروزي پوښ او زیات شمیر التهابی حجرو درلودونکی وي . د پورتنۍ پر ضد په خوندي او ثابت پلک (Safe and stable) کې د شحمو مقدار کم ، د فبروزي پوښ پټوالی یې زیات (thick) او د زیات شمېر کولاجن درلودونکی دی . په وینه کې د غوړو کمونکۍ درملنه د vulnerable پلک په stable کولو کې مرسته کولای شي .

د زړه او رگونو ناروغۍ.

ايتروسکلروزس

د شريانونو په انتيما طبقې برسیره ايتروسکلروزس په ميديا طبقه کې هم ځينې بدلونونه پيدا کوي چې شرياني Remodeling رامنځته کوي، يانې د شريانونو ځينې برخې ورو ورو تنگيږي (negative remodeling) او ځينې نورې برخې يې ورو ورو غټيږي (Positive remodeling).



۱-۲ شکل: د پلک شکېدنه، ترمبوزس او بيا رغيدنه نښې (۱۹)

د ايتروسکلروزس کلينيکي سندرومونه :

ايتروسکلروزس په لويديزه ټولنه کې ډير عموميت لري خو سره لدې زياتره پېښو کې ايتروما بې گيلو وي چې حتی هيڅکله کلينيکي څرگندونې منځ ته نه راوړي . د ايتروما د جوړېدو په لومړي پړاو کې پلک معمولا د باندې خواته غټيږي. د ايتروسکلروزي شريان قطر په معاوضي ډول د Vascular remodeling په بڼه زياتيږي . د پلک په ځای کې جريان محدودونکي تنگوالي وروسته منځ ته راځي . نوموړي پلکونه ثابت اعراض لکه د تمرين په وخت کې صدری انجينا اود نهيياتو متناوب Claudication منځ ته راوړي.

په اکليلي دوران يا د بدن په نورو برخو کې کله کله د ايتروما په واسطه د شريان مکمل بنديدل هم د انفارکشن لامل نه گرځي، ځکه چې د اسکيميا او هايپوکسيا تکراري حملې په ميو کارډ کې د کولایترال شريانونو جوړيدل هڅوي، سره لدې زياتره بېړنۍ ايتروسکلروتيک سندرومونه د هغه

د زړه او رگونو ناروغۍ.

اتیروسکلروزس

اتیروسکلروتیک پلکونو له کبله پیدا کیږي چې جریان نه محدودوي، او په انجیوگرافي کې یواځې د شریان لومن غیر منظم ښکاري. کله چې په اتیروسکلروتیک پلک کې درز یا رېچر رامنځته شي، د رېچر شوی برخې په برخین ایزوژن کې ترمبوز رامنځته او د بې ثباته انجینا او یا د میوکارد د بیرني احتشا لامل کیږي.

د کاروتید اتیروما په پینه کې نسبتاً ژور تپ کې د ترمبوز هسته جوړه او کیدای شي د دماغی تیریدونکې اسکیمیا حمله رامنځته کړي. د پلک د فبروزي پوښ رېچر، د وینې د تحری فکتورونو او د رېچر شوی برخې د ترمبوجنیک نسج ترمنځ د تماس د پاره لاره هواروي. که جوړ شوی ترمبوز تیریدونکې وي او یا د شریان لومن بند نه کړي نو پدې حالت کې به ناروغ بې گیلو وي او یا د دمې د حالت انجینا به رامنځته شي انسدادی ترمبوز په تیره بیا چې کولایترل شریانونه هم نه وي جوړ شوی د میوکارد بیرني احتشا منځ ته راوړي.

وقایه او درملنه:

۱- لومړنۍ وقایه (Primary prevention): په هغه وگړو کې چې روغ ښکاري خو د اتیرسکلروز د خطر سره مخ دي د وقایې دوه عمده تگلاری شته دي:

A - د نفوس اړونده ستراتیژي: (Population strategy) چې موخه یې په ټول نفوس کې د غذای رژیم او د ژوند د څرنګوالي د بدلون د لاری د خطر د فکتورونو اصلاح ده.

د اتیروسکلروزس د مخنیوي د پاره د ټولنې اوسیدونکو ته لاندې لارښوونې کیږي:

۱- د تنباکو کارونې پرېښودل.

۲- منظم تمرین (لږ تر لږه ۲۰ دقیقې په اونۍ کې درې ځلې).

۳- د بدن د مناسب وزن ساتل.

۴- د داسې خوړو کارول چې د تازه میوې او سبزو څخه بدلایه وي.

۵- د ۳۰% څخه زیاته انرژي باید د مشبوع شحم څخه وا نه خیستل شي. د ویتامین B۲ او فولیک اسید د کچې کموالی د Homocystein د کچې د زیاتیدو لامل گرځي.

د زړه او رگونو ناروغۍ. اتیروسکلروزس

B - موخه وړه ستراتیژي Targeted strategy: د دې څخه موخه د High risk ناروغانو پېژندنه او درملنه ده. معمولا ناروغان د یو څخه زیات ریسک فکتورونه لري.

II - دوهمي یا ثانوي وقایوي تدابیر: په دې حالت کې ناروغ لا د مخه د رگونو په اتیروسکلروتيک افت لکه د محیطي رگونو ناروغۍ او یا د زړه په احتشا اخته وي. پدې ناروغانو کې د خطر فکتورنو اصلاح پوره اړینه ده.

د اتیروسکلروز د درملنې بنسټیزه موخه د بدلون وړ خطري فکتورونو کنټرول او درملنه ده چې په اړونده برخه کې به ترې یادونه کېږي. (۱۴، ۱۹)

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

درېم فصل

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

Ischemic Heart Disease (IHD)

تعریف:

د زړه د عضلې د یوې برخې د پرفیوژن د کمیدو له کبله د اکسیجن کموالی ته اسکیمیا وايي. د زړه د اسکیمیا ډیر مهم او دودیز لامل د اکلیلې شریانونو انسدادی اتیروسکلروټیکه ناروغۍ ده. IHD په ټوله نړۍ کې د انسانانو د مړینې لومړۍ درجه لامل دی. په هره دقیقه کې یو امریکایي د IHD له کبله مري. په اخته کسانو کې د لومړۍ کال مړینه ۴۰% ده.

لاملونې:

د زړه اسکیمیک ناروغۍ معمولا د اکلیلې شریانونو د اتیروسکلروز له کبله پیداکېږي. خو په کمو پېښو کې کیدای شي د لاندې لاملونو له کبله رامنځته شي:

- ۱- د اکلیلې شریان سپزم: چې زیاتره د اتیروسکلروټیک لیژن په ساحه کې پیداکېږي، خو کیدای شي په نارمل شریان کې هم راپیداشي.
- ۲- د اکلیلې شریان ولادی انومالی.
- ۳- امبولۍ.
- ۴- د شریان التهاب او Dissection
- ۵- د میوکارډ شديده هایپرتروفي.
- ۶- د ابهر د دسام شديده تنگوالی یا عدم کفایه.
- ۷- هایپرتایرویدیزم او شديده انیما.
- ۸- حملوی تکی کاردیا چې بطېني چټکتیا په کې زیاته وي.

د زړه او رگونو ناروغۍ.

د زړه اسکیمیک ناروغۍ.

نادرآ AP په یو وگړي کې چې د انجیوگرافي له نظره نارمل شریان لري او بل لامل هم شتون و نه لري ، منځته راځي چې دغه حالت د syndrome-x په نامه یادېږي او غالباً د micro vasculature د افت له کبله پیداکيږي .

پتوفزیولوژي:

د میوکارد د اسکیمیا د پتوفزیولوژي د پوهیدنې مرکزي ټکي د میوکارد د اړتیا (demand) او سمبالولو (supply) مفکوره ده. په نورمال حالت کې د اړتیا سره سم د اکسیجن څخه بډایه وینه میوکارد ته رسیږي ترڅو د میوسایټونو د پرفیوژن د کموالي ، اسکیمیا او انفارکشن مخه ونیول شي.

د میوکارد د اکسیجن په اړتیا باندې لاندې دری ټکي غوره اغېزه لري:

۱- د زړه چټکتیا

۲- د میوکارد تقلصیت

۳- د میوکارد د دیوال Tension (stress)

ددې لپاره چې میوکارد ته په مناسبه توگه اکسیجن ورسیږي اود میوکارد اړتیا پوره کړي په اکلیلې شریان کې باید د وینې بسندویه جریان موجود وي، او وینه باید د اکسیجن د لیږدولو ښه وړتیا ولري. نوموړی وړتیا لاندې حالاتو پورې اړه لري:

- د شهيقي اکسیجن کچه

- د سږو دندې

- د هیموگلوبین غلظت او دنده

کله چې د اتیرو سکروزس له کبله د کرونري شریانونو لومن تنگ شي ، د تمرین او سترس په وخت کې چې د وینې زیات جریان ته اړتیا پېښیږي، اخته شریان د میوکارد مناسب پرفیوژن نشي برابرولای. د اکلیلې وینې جریان د سپزم (Variant anginal یا Prinzmetals) ، شریاني ترمبوز او نادرا د اکلیلې شریان امبولی او Aortitis له کبله هم کمیږي. په ولادی انومالي کې چې چپ نازله اکلیلې شریان د پلمونري شریان څخه سرچینه اخیستی وي په کوچنیوالي کې د میوکارد د

د زړه او رگونو ناروغۍ.

د زړه اسکیمیک ناروغۍ.

اسکیمیا او انفارکشن سبب کېږي. د میوکارد اسکیمیا هغه وخت هم منځته راځي چې د میوکارد د اکسیجن اړتیا ډیره زیاته شي او کورونري وینې جریان محدود وي لکه د کین بطن په شدید هایدروتروفي کی چې د اورتيک سټینوزس له کبله منځته راغلی وي. د اکسیجن د لیږدونې په ظرفیت کی کموالی (شديده انیمیا او د Carboxy هیموگلوبین موجودیت) نادرا په یواځې توگه د میوکارد اسکیمیا پیدا کوي. خو د کورونري شریانونو منځنی کچه تنگوالی د اسکیمیا د پیدا کیدو قدمه راتیږي. کله کله د اسکیمیا دوه یا زیات لاملونه یوځای شته وي لکه د هایدرتشن له امله د کین بطن هایدروتروفي (د Demand زیاتوالی) او د اتیرو سکروزس یا انیمیا (Supply کموالی) یوځای شتون.

د اسکیمیا اغیزی (Effects of Ischemia)

د اکلیلې شریان د اتیرو سکروز له کبله په حملوي ډول پرفیوژن کم او د میوکارد د اکسیجن د فشار د کموالی لامل کېږي چې له امله یې په تېرېدونکی ډول د میوکارد میخانیکي، بیوشیمیک او الکتریکي دندې خرابېږي. که چیرې شديده اسکیمیا په ناڅاپي ډول د اکلیلې شریان د پوره یا قسمي بندیدو له کبله منځته راشي په سملاسي توگه د زړه د عضلي د تقلص او استرخا د عدم کفایي لامل گرځي. د بطن پراخه اسکیمیا د کین بطن د تېرېدونکي پاتې والي لامل کېږي او که حلېموي (Papillary) عضلات اخته شي د مایترل عدم کفایه د اختلاط په ډول پیدا کېږي. که اسکیمیا تېرېدونکي وي، کیدای شي د گوگل د انجینا او که اسکیمیا دوامداره شي کیدای شي د میوکارد نکروز او سکار رامنځته کړي، چې د نوموړي حالت سره د زړه د احتشا کلینیکي څرگندونې موجود وي یا نه وي. د بطني عضلاتو د تقلصیت ځایي خرابوالي د زړه د عضلي د یوې برخې بی حرکتی (Segmental akensis) او په شدیدو حالاتو کې د Dyskinesia سبب کېږي چې د میوکارد د پمپ کولو دنده نوره هم کمېږي.

د اسکیمیا په وخت کې د حجري په میتابولیزم، دنده او جوړښت کی پراخه گډوډي رامنځته کېږي. نورمال میوکارد شحمي اسیدونه او گلوکوز په اوبه او کاربن ډای اکساید میتابولایز کوي

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

د اکسیجن د شدید کموالي په صورت کې شحمي اسیدونه نه اوکسیدایز کېږي او گلوکوز په لکتیت بدلیږي چې له امله یې د حجري دننه PH ټیټ او هم د میوکارډ د لوړ انرژي لرونکو فاسفیتونو لکه ATP او Creatin Phosphate ذېرمه کمیږي. چې په پایله کې د حجروي دیوال د دندو خرابوالی د پوتاسیم د لیکاز او د عضلي حجري یواسطه د سودیم د اخستني سبب کېږي. دا چې افت د بیرته راگرځیدني وړ دي او که نه ، د اسکیمیا دوام او شدت پورې اړه لري. که د شریان د پوره بندیدو دوام ۲۰ دقیقې یا لږ وي (کولترال موجود نه وي) ، افت د بیرته راگرځیدني وړ (Reversible) ده. خو که د بندیدو دوام د ۲۰ دقیقو څخه زیات وي ، نکروز او د زړه احتشا

پېښېږي

د ټټر ثابت انجینا Stable angina pectoris

تعریف :

یو حملوی کلینیکي سندروم دی چې د زړه عضلې د موقتي اسکیمیا له کبله پیدا کېږي.

پتوفزیولوژي:

اتېروسکلروزس د انجېنا تر ټولو غوره لامل دی ، خو انجېنا کېدای شي د اتېروسکلروزس په نه شتون کې هم رامنځته شي. اسکیمیا هغه وخت منځته راځي چې ثابت بندوالی دومره شدید وي چې د اکلیلې شریان د وینې جریان محدود کړي ، او یا منځنی کچه بندش باندې سپرم یا علقه (Clot) ور زیات شي. یو شمېر حالات لکه روحي فشارونه، انیمیا او Hyperthyroidism د انجېنا د پیدا کېدو قدمه نوره هم ټیټوي. د فزیکي تمرین سره د انجېنا حمله زیاتره هغه وخت پیدا کېږي چې د اکلیلې شریان قطر ۵۰% یا زیات تنگ شوی وي.

کلینیکي بڼه :

تشخیص اساساً د کره تاریخچې پورې اړه لري. په تاریخچه کې باید لاندې ټکو ته په ځانگړې

ډول پاملرنه وشي:

د زړه او رگونو ناروغۍ.

د زړه اسکیمیک ناروغۍ.

۱- د حملې آراموونکې او تشدیدونکې حالات :

د انجینا حمله زیاتره د فزیکي فعالیت سره پیدا او د دمې سره له منځه ځي . د حملې په وخت کې ناروغان زیاتره ناستي حالت ته د ملاستې په پرتله لومړیتوب ورکوي ، ځکه چې د ملاستې په حال کې Preloud لوړ او د زړه کار زیات وي .

د فزیکي مشق اندازه چې د انجینا لامل کېږي کیدای شي ثابت وي، او یا د ورځې په اوږدو کې او هم د یوې نه بلې ورځې ته توپیر وکړي . خو د انجینا د پیل کیدو قدمه وروسته له خوراک څخه ، په هیاجانۍ حالت کې او د سړې هوا سره د مخامخ کیدو په صورت کې ټیټیږي . همدارنګه د انجینا قدمه (threshold) د سهار لخوا او وروسته د شدیدو هیاجاناتو څخه (روحي فشارونه) ټیټیږي . د انجینا حمله کیدای شي د دمې په حالت کې پیدا شي (Unstable Angina) ، او یا د شپې لخوا چې ناروغ د ملاستې حالت لري (Angina Decubetus) په ځینو ناروغانو کې د قدم وهلو په پیل کیدو سره درد پیدا ، خو وروسته بیا د نسبتاً شدید فزیکي فعالیت سره هم حمله نه پیدا کېږي .

۲- د درد اوصاف:

ناروغان زیاتره د انجینا حمله د درد په ډول نه تشریح کوي، بلکه د تنګوالي (Tightness) ، فشاري (Pressing)، سوي (Burning)، زندی (Choking) چاودیدو (Bursting) ، بد هضمي (Gas indigestion) او یا ناڅرګندی نارامۍ په ډول حکایه کوي . کله چې ناروغ د درد اوصاف تشریح کوي ، خپل موټی شوی لاس د سینې په منځنۍ برخه کې ږدي (Levine's sign). د ګوګل تیز سیخ وهونکې درد ، او یا دوامداره دروند درد چې د چپې سینې لاندې برخه کې په ځایي ډول شته وي د انجینا د پاره وصفی ندی . د انجینا د درد څخه پرته د قلبی عضلې د اسکیمیا یو شمیر نور اعراض چې د Anginal Equivalent په نامه یادېږي عبارت دي له : ستړیا، سالنډي، او ضعیفی څخه . نوموړي گیلې په دیابتیک او زړه خلکو کې معمول دي .

دزړه او رگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمېک ناروغۍ

۳- موقعیت او خپرېدنه Location & Radiation

په زیاتره ناروغانو کې د انجینا د نارامۍ موقعیت د ستر نوم د هډوکي شاته او یا لږ څه کینی خوا ته وي. سره له دې چې انجینا د اتمې رقبې فقري څخه تر څلورمې ظهري فقري پوري هري برخې ته خپرېدای شي، خو زیاتره چې اودې او لاس ته تر څنگلی، لېچې او د لاس څلورم او پنځمې گوتې ته خپرېږي. ښې اوږې ته په کمو پیښو کې انتشار کوي. کله کله درد ښکتنی، ژامی، غاښونو، ورمېږ، د دوه سکپولا تر منځ او ایپیگاسټریک ناحیې ته خپرېږي.

۴- د حملې دوام


د انجینا د حملې دوام لنډ وي او په پوره ډول له منځه ځي. که چېرې حمله د فزیکي فعالیت له امله پېدا شوی وي او ناروغ سمدلاسه فعالیت بند او دمه وکړي، پدې صورت کې حمله معمولاً د درې دقیقو څخه لږ دوام کوي. هغه حمله چې د زیات خوراک او یا قهر څخه وروسته پېدا شوی وي اکثراً ۱۵-۲۰ دقیقې دوام کوي. که چېرې حمله د ۳۰ دقیقو څخه ډېره اوږده شي، د ثابت انجینا د پاره غیر معمول دی. پدې صورت کې UA او MI ته باید فکر وشي.

۵- د نایټروگلسرین اغېزې

که چېرې د ژبې لاندې نایټروگلسرین د انجینا حمله لنډه کړه او یا وقایوی ورکړه يي د انجینا حمله وقایه کړه د انجینا تشخیص تائید یږي. د انجینا د حملې پراو صافو سر بیره نوموړی ناروغان باید د محیطي وعایي ناروغی، Intermetant cloudication، ستروک او T I A په باره کې وپوښتل شي. همدارنګه د IHD د کورنۍ تاریخچې، دیابت، هاپرلېډیمیا، د وینې لوړ فشار، سګریت څکونه او د اتیرسکلروز د نورو خطري فکتورونو په باره کې معلومات ترلاسه شي. (۱، ۱۹)

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

د زړه او رگونو ناروغۍ



۳-۱ دیاگرام: د سینې د قلبی او غیر قلبی دردونو ترمنځ توپیر (۱۴)

فزیکي کتنې:

د ثابت انجنېنا په زیاتره ناروغانو کې فزیکي کتنې نورمال وي، خو د اتیروسکلروز بېلګې د بدن په نورو برخو کې لکه د بطني ابهر انیوریزم، د کاروتید شریان Bruet او د اتیروسکلروز د خطري فکتورونو بېلګې لکه Xanthelasma او زانتوما کېدای شي شتون ولري. که ناروغ هاپیرتمشن ولري، د سترګو د فنډس په معاینه کې Arterio venous Nicking لیدل کېږي. همدارنګه د انیمیا، تایراید ناروغۍ او د سګرت څکوونکو په ګوتو کې د نیکوتین د رنګ نښې کېدای شي موجود وي. په اعضا سره کېدای شي شریاني بړوت، د زړه دریم او څلورم غږونه واورېدل شي. که

د زړه اورگونو ناروغۍ.

د زړه اسکیمیک ناروغۍ.

چېری حاده اسکیمیا او یا پخوانی انفارکشن د حلیموي عضلاتو د دندې د خرابوالی سبب شوی وي ، د زړه په زړه کی به د مایترل د سام د عدم کفایي سیستولیک مرمر واوریدل شی (۱۹).

لږاتواري پلټنې Investigation

سره لدی چی د IHD تشخیص د یوی نښی تاریخچی له مخی اینودل کیدای شی خو د یو شمیر ساده لږاتواری معایناتو اجرا ډیر گټور دي . یو شمیر معاینات د اتیروسکلروز د خطر او IHD د تشدید ونکو فکتورونو د تشخیص د پاره تر سره کیږی .

رنی متیازی د دیابت او پښتورگی د ناروغیو د پاره معاینه کیږي . ځکه چی یادی ناروغۍ اتیروسکلروز تشدیدوی . په وینه کی لیپیدونه (HDL , LDL , کولسترول او تسرایگلیسراید) گلوکوز ، کریاتنین ، هیماتوکریت او که اړتیا وی د تایراید د غدی د ندیز تستونه باید تر سره شي . د سینی رادیو گرافی هم مهمه ده ځکه ددی له مخی د زړه غټوالی او بطیني انیوریزم په باره کی معلومات تر لاسه کیدای شی .

د انجینا مهم تشخیصه معاینات په لاندی ډول دي :

۱- ECG :

ECG نږدی نیمای ناروغانو کی نورمال وی خو د پخوانی احتشا اړونده ST-T بدلونونه

Atrio ventricular conduction defect او د چپ بطین د هایپرتروفي شواهد موجود وي . روتین


د انجینا د حملی په وخت کی وصفی ECG بدلون افقی او یا ST Down slopping

depression دی چی د اسکیمیا د ښه کیدو څخه وروسته له منځه ځی . د T د خبی flattening)

هموار کیدل ، او Inversion ، هم ممکن موجود وي .

د زړه اورگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ



۱-۳ انځور : A : Planar ST depression ښيي چې د اسکیمیا د پاره وصفی دی

B : Down-sloping depression ښيي چې د اسکیمیا د پاره وصفی دی

C : Up-sloping depression ښيي چې د اسکیمیا د پاره وصفی نه دی (۱۲)

۲- تمرین په وخت کې بریښنايي گراف Exercise ECG

د IHD د تشخیص او انزارو معلومولو د پاره یوه مهمه ازموینه ده چې ډیره کارول کېږي . په نوموړې معاینه کې چې د Treadmill پواسطه تر سره کېږي . د فزیکي فعالیت څخه مخکې ، د فزیکي فعالیت په جریان کې او وروسته ، ۱۲ لیډه ECG اخیستل کېږي . د تست په جریان کې په تدریجي ډول فزیکي فعالیت زیاتېږي . همدارنګه د تست د اجرا په وخت کې د ناروغ اعراض ، ECG بدلونونه او د وینې فشار په دوامداره توګه ارزښت کېږي . که چېرې ناروغ ته د سینې درد ، شدیدې سالتېږې ، ګڼسیت او شدیدې سستی پېدا شي ، $ST\ depression < 2\text{mm}$ ، سیستولیک فشار د ۱۰۰ ملی متر سیماب څخه کم شي او یا بطني اریتمیا پیداشي ، عملیه باید ژر ودرول شي . که چېرې اسکیمیا شته وي له ۱ mm زیات flat ST depression به ولیدل شي .

نوموړې تست په لاندې حالاتو کې دروغجن (Fals) مثبت وي :

۱ . د Digoxin او Clonidin درملنې په جریان کې .

۲ . د بطن هاپېرټروفی

۳ . د بطن دننه د سیالی د لېږدېدنې نیمګړتیا

۴ . د دمې په حال کې د ST او T څپو اېنارملي

د زړه اورگونو ناروغۍ.

د زړه اسکیمیک ناروغۍ.

۵. د سیروم پوتاسیم غبر دودیزه کچه

که چیرې د شریان انسدادی افت سرکومفلکس اکلیلی شریان پوری تړاو ولري، سترس تست به دروغجن منفي وي. ځکه د زړه خلفی برخه چی ددی شریان پواسطه اروا کیږی د روتین ۱۲ لیډه ECG پواسطه په ښه ډول نشی څرگندیدلای.

په لاندی حالاتو کی د تمرین تست مضاد استطباب دی:

۱. پدی وروستی ۴۸ ساعتو کی د دمی د حالت انجېنا.

۲. بی ثباته ریتم Unstable rhythm

۳. د ابهر د دسام شدید تنگوالی Sever aortic stenosis

۴. حاد میوکارډایټس

۵. د زړه ناکنترول له عدم کفایه

۶. فعاله اتناتی اندوکارډایټس

۳- Myocardial perfusion scintigraphy

پدی معاینه کی د میوکارډ تصویر د رادیونوکلاید موادو (Thallium 201 او Technetium 99) Tetra fosmin () د زرق څخه وروسته د دمی او فزیکي فعالیت په وخت کی اخیستل کیږی. د میوکارډ په هغه برخه کی چی د نوموړی مادی اخیستنه لږه وي د همدغی برخی په Hypo perfusion دلالت کوی. که چیرې د سترس په وخت کی د میوکارډ پرفیوژن خراب او د دمی په وخت کی ښه وی د میوکارډ په رجعی اسکیمیا دلالت کوي. او که د استراحت په وخت کی هم د میوکارډ پرفیوژن ښه نه وی د میوکارډ په احتشا (تازه، پخوانی) دلالت کوي. استطبابات:

۱. که چیرې د استراحت د حالت ECG کی د تمرین ECG د ارزیابی مشکوک کوونکی

ټکی لکه LBBB او ST – T change او یا Low voltage موجود وی.

۲. که چیرې د Exercise ECG پایلی د کلینکی څرگندونو خلاف وی (په یو بی عرضه

ناروغ کی مثبت تست).

دزړه او رگونو ناروغۍ.

د زړه اسکیمیک ناروغۍ.

۳. د اسکیمیا د ناحیې معلومول.

۴. د اسکیمیا او انفارکت شوی برخې د توپیر لپاره.

۵. د bypass جراحی عملیې او کورونری انجیوپلاستی څخه وروسته د Vascularization د ارزونې لپاره.

۶. په تشخیص شوی IHD ناروغ کی د انترارو د معلومولو لپاره.

۴- Radionuclid Angiography :

ددی ازموینې په مټ د چپ بطن Ejection fraction او د دېوال خوزنیت ارزول کیږی. په IHD ناروغانو کی که د دمی په حالت کی گډوډی شته وی په انفارکشن ، او که یواځی د تمرین په وخت کی گډوډی موجود وی په اسکیمیا دلالت کوي. استطببات یی د $^{201}\text{Thulium}$ سنتی گرافي په شان دی.

۵- ایکوکارډیوگرافي

ددی ازموینې په مټ کپن بطن Image او د دېوال د خوزنیت گډوډی چی د پخوانی MI یا اسکیمیا له کبله وی معلومیدای شی. د بطن د دندو د معلومولو د پاره هم ښه ازموینه ده. چی دا وروستی بیا د ناروغی د انترارو معلومولو د پاره ښه معیار دی.

۶- اکلیلی انجیوگرافي Coronary Angiography :

د اکلیلی شریانونو د ناروغېو د تشخیص د پاره غوڅه تشخیصه ازموینه ده. او د شریان د تنگ والی شدت او موقعیت ښیی. په لاتدی حالاتو کی استطببات لري :

۱. : Stable Angina هغه ناروغان چی د پوره طبی درملنی سره هم ځواب و نه وایی او

Coronary revascularization ته کاندیدوي.

۲. : هغه ناروغانو کی چی د بي ثباته انجینا او له احتشا وروسته انجینا له کبله Coronary

revascularization ته کاندید وی.

۳. : د ابهره دسام تنگوالی ناروغان چی انجینا هم ولری. همدارنگه په هغه زاړه بی عرضه

وگړی کې، چی د دسام جراحی عملیات ته کاندید دی ، انجیوگرافي پدی موخه ترسره

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

کیږي چی که چیری CAD تثبیت شي د دسام د جراحی په وخت کی bypass هم اجرا شي

- ۴: که چیری د اکلیلې شریان د revascularization څخه وروسته بیرته گېلی پیدا شي .
- ۵: د زړه د عدم کفایې په هغه ناروغانو کی چی د جراحی وړ افاتو لکه د چپ بطین اینوریزم ، د مایترل عدم کفایه او د اصلاح وړ Ischemic dysfunction شک موجود وی .
- ۶: د ناڅاپی مړینې د حملې او یا ژوند تحدیدونکی اریتمیاوو څخه ژوندی پاته کسانو کی د سببی لامل د موندلو لپاره .
- ۷: د سینې درد چی سبب یې معلوم نه وي .

توپیری تشخیص :

- ۱ - Anterior chest wall syndrome :- پدی حالت کی د بین الضلعی عضلاتو ځایي درد او حساسیت موجود وی
- ۲ - Costochondritis (Tietze syndrome) :- پدی ناروغۍ کی کوستوکاندریل جنکشن پرسیدلی ، گرم ، سور او د سینې درد سره ملگری وي چی د فشار سره زیاتېږي .
- ۳ - Intercostal Neuritis (Herpes zoster) او دیا بت له کبله
- ۴ - د رقبې او صدری فقراتو ناروغۍ هم د سینې درد پیدا کوی چی شدید وي .د موقعیت او خپریدنی له پلوه انجینا ته ورته والی لری خو د غاړې او ملا د حرکاتو سره اړیکه لری . سربیره پردی د فقراتو درد زیاتره د لاس غټی گوتی ته او برعکس د اسکیمیا دردونه څلورم او پنځمی گوتی ته خپرېږي .
- ۵ - پیپتیک زخمونه ، ځنډني Cholecystitis ، د مري سپزم او Reflux esophagitis
- ۶ - د کیني اوږي التهابي حالات او Thoracic outlet syndrome .
- ۷ - بنفسه نومو تورکس ، نمونیا او د سږو امبولي .

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

۸- د صدري ابهر Dissecting انیوریزم

۹- د مایترل دسام پرولیس ، هایپرتروفیک کارډیو میوپاتی ، میوکارډایټس ، پریکارډایټس ، د ښی بطن هایپرتروفی او د ابهر دسام ناروغی . (۱۲)

درملنه :

۱- د حملي تداوي :

د ژبي لاندې Nitroglycerine انتخابي درمل دی چي په ۱-۲ دقیقو کي اغېزه کوي . نوموړي درمل شرياني او وريدي تون کم او هم پری لوږ ، افتړلو او د قلبي عضلي د اکسیجن اړتیا کموي . سربيره پردې نایتریت دکولتیرل شریانونو د پراخه کیدو له کبله زړه ته د ویني جریان ښه کوي . د حملي د پیل سره ژر یو تابلیت (۳-۰ ، ۴-۰ ، ۲-۰) ، ملي گرام ژبي لاندې ایښودل کیږي او داړتیا په صورت کي د ۳-۵ دقیقې وروسته تکرارېږي . د نایترو گلیسرین buccal spray هم شته چي په همدې موخه کارول کیږي .

نایترو گلیسرین په وقایوي ډول د هغو فعالیتونو څخه مخکي استعمالیږي چي فکر کیږي انجینا به رامنځته کړي . که چیري د انجینا درد تر ۳ تابلیته یا ۲۰ دقیقو پوري غلی نه شو د MI احتمال زیاتیږي او ناروغ باید د نورو طبي مرستو لپاره روغتون ته واستول شي .

۲- د راتلونکو حملو مخنیوی :

الف - تشدیدونکی فکتورونه : انجینا د هایپرټینشن ، د چپ بطن عدم کفایه ، اریتمیا (Tachyarrthmia) ، شدید تمرین ، سړه هوا او روحي فشارونو په واسطه تشدید یږي . نوموړي فکتورونه باید په ناروغ کي ولټول شي ترڅو د شتوالي په صورت کي تداوي شي .

ب - Nitroglycerine : ۳-۰ ، ۴-۰ ، ملي گرامه د ژبي لاندې ۴ ، ۸-۰ ، ملي گرامه د سپري په ډول د هر هغه فزیکي فعالیت څخه ۳ دقیقې مخکي چي گمان کیږي حمله منځ ته راوړي استعمالیږي . د ژبي لاندې Isosorbide dinitrate د نایترو گلیسرین په پرتله لږ څه اوږد تاثیر لري .

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

ج - اوږد اغېز لرونکی نایتریتونه : عبارت دي له Isosorbide dinitrate (د ۱۰ - ۴۰ ملي گرام د خولي د لاري د ورځي دري ځلي . Isosorbide mononitrate ۱۰ - ۴۰ ملي گرام د ورځي دري ځلي د خولي د لاري او ۲۰ - ۱۲۰ ملي گرام د ورځي يو ځل . اوږد تاثير لرونکي نایتروگلیسرین ۲، ۵ - ۱۲ ملي گرامه د ورځي ۲ - ۴ ځلي . نایتروگلیسرین ملحم ۰، ۲ - ۵ ملي گرامه د ورځي ۲ - ۴ ځلي او د نایتروگلیسرین Patch ۵ - ۲۰ ملي گرام . د نایتروگلیسرین د اوږدي مودي درملني غوره نیګړتیا زغم (Tolerance) دي چي په ډېری ناروغانو کي پیدا کیږي د تولرانس د کچي دکمولو لپاره داسي رژیم توصیه کیږي چي په هغه کي په ۲۴ ساعتو کي د ۸ - ۱۰ ساعته بي نایتریته حالت موجود وي .

د نایتریتونو مهمی اړخیزی اغیزی عبارت دي له سردردی ، زړه بدوالي او Hypotension څخه .
د - Beta Blockers : نوموړي درمل د تمرین او Stress په وخت کي د زړه د اکسیجن د اړتیا دکمولو د لاري د انجنیا د حملی څخه مخنیوی کوي . د زړه د اکسیجن اړتیا د زړه د ریټ او تقلص د کمیدو او په لږه اندازه د ویني د فشار د ټیټوالي له امله کمیږي . بیتابلاکر یو اخني انجنیا ضد درمل دي چي د IHD ناروغانو د ژوند هیله زیاتوي . له همدې امله په اکثره مزمن انجنیا ناروغانو کي د لمړي انتخابي درمل په ډول کارول کیږي .

ذ - کلسیم کانال بلاکر : Diltiazem ، Verapamil او Dihydropyridine گروپ درمل د قلبي عضلي د اکسیجن د اړتیا دکمولو او Coronary Vasodilatation د لاري د انجنیا د حمله څخه مخنیوی کوي .

د میو کارد د اکسیجن اړتیا ، د میو کارد تقلصیت او د ویني فشار ، د کمولو او د Verapamil او دیلتیازیم په صورت کي د دمی او مشق په حال کي د زړه د ریټ د نه زیاتیدو له امله کمیږي .
د β بلاکر درمل په خلاف کلسیم اتاګونسټ درمل د MI څخه وروسته مړینه نه کمه وي . برعکس په ځینو پیښو کي د اسکیمیا او مړیني د زیاتیدو سبب کیږي .

دزېه او رگونو ناروغۍ

د زړه اسکېمېک ناروغۍ

د درملو گډه کارونه Combinations and Alternative Therapies :

هغه ناروغان چې د يو ډول درمل سره ځواب ونه وايي معمولاً د بل ډول درمل سره ځواب وايي له دې امله مخکې له دې چې د درملو د گډه استعمال پریکړه وشي ښه به دا وي چې د الترناتيف درمل څخه کار واخيستل شي . خو که چیرې اعراض کنترول نه شول، β بلاکر او يو اوږد تاثیر لرونکی نایتریت او يا بېتابلاکر او کلسیم اتاګونسټ (پرته له Verapamil څخه) د گډې ورکونې د پاره ښه درملنه ده . خو لږ شمیر ناروغان دري واړه درملو ته اړتیا پيدا کوي .

Ranolazine : هم د انجينا د مخنيوي لپاره کارول کېږي، دوز يې ۵۰۰ ملي گرام د ورځې دوه ځلي ده . څرنگه چې نوموړی درمل د QT فاصلې د اوږدېدو لامل گرځي له دې امله په هغو ناروغانو کې چې اوږد QT و لري او يا د اريتميا ضد هغه درمل استعمالوي چې د QT د اوږدېدو سبب کېږي مضاد استېباب دی. همدارنگه د ځيگر او پښتورگو په ناروغيو کې هم نه ورکول کېږي.

Platelet-Inhibiting agents: د اکيليلي شراينو ترمېوز د MI او بې ثباته انجينا د اکثره حملو مسول دي. که چیرې مضاد استېباب نه وي Aspirin د ورځې ۸۱-۳۲۵ ملي گرام د انجينا ناروغانو ته ورکول کېږي . Clopidogrel هم platelet ضد درمل دی . په هغو ناروغانو کې چې اسپرين نه شي زغملاى ښه بديل دی .

خطر کمونه Rick reduction: د IHD د خطر فکتورونه لکه هايپرتېنشن Hyperlipidemia ، تنباکو کارونه ، چاغوالی او نور بايد په دقيق ډول تشخيص او تدابي شي .

تهاجمی درملنه Invasive treatment :

۱- Percutaneous Coronary Intervention (PCI) :

په دې عملیه کې په تنگ شوي اکيليلي شريان کې يو نازک wire د راديو لویک کنترول لاندې تیرېږي نوموړي وایر په څوکه کې بالون لري چې وروسته د پړسولو څخه د شريان تنگ شوي برخې

د زړه او رگونو ناروغۍ.

د زړه اسکیمیک ناروغۍ.


ته پراخوالی ورکوي. Coronary stent هم د اکلیلې شریان د پراخه کولو او په همدې حال کې د ساتلو د پاره کارول کېږي. PCI د ځنډنې یا ثباته انجنېا لپاره اغېزمنه عرضي تداوي ده او زیاتره هغه ناروغانو ته چې یو یا دوه اکلیلې شریانونه یې اخته وي توصیه کېږي. د PCI غوره بهرنۍ اختلاط د ترمېوز په واسطه د اړونده شریان او یا د هغې د یوې ځانګې بندیدنه ده چې په ۲-۵٪ پیښو کې پیدا کېږي او اکثراً د Stent د تطبیق او عاجل CABG په واسطه اصلاح کېږي. مهم مزمن اختلاط یې بیاځلې تنګوالی (re stenosis) دی چې په ۱۳٪ پیښو کې منځ ته راځي. تنګوالي زیاتره د PCI د تطبیق څخه تر درې میاشتو پیدا کېږي. د سنتن تطبیق د شریان د بیا تنګیدو خطر تر ډیره حده کموي.

۲- CABG coronary artery bypass grafting):

bypass لپاره د Internal mammary شریان او یا د Saphenous ورید د یوې ټوټې څخه کار اخیستل کېږي. لویه جراحي عملیه ده چې زیاتره تر Cardio pulmonary bypass لاندې اجرا کېږي. ددې عملي مرینه ۵، ۱٪ (یونیم) ده خو په زړو خلکو او هغه ناروغانو کې چې د کین بطن دندې یې خرابې وي د مړینې کچه یې لوړه ده. ددې عمليې څخه وروسته ۹۰٪ ناروغان تر یو کال او ۲۰٪ څخه لږ ناروغان تر ۵ کالو پورې یې عرضه پاتې کېږي. Aspirin ۷۵-۱۵۰ ملي ګرام دورځي یو ځلي او کلویډوګرل ۷۵ ملي ګرام د ورځي یو ځلي د Graft په خلاص ساتلو کې ډیر اغېزمن دي او د زغملو په صورت کې باید تر اوږدې مودې پورې ناروغانو ته ورکړل شي. (۱۹، ۲۱)

د زړه اورگونو ناروغۍ.

د زړه اسکیمیک ناروغۍ.



۲-۳ انځور: د اکيليلي شريان بای پاس گرافت نښي. (۱۲)

انزار:

عمر، د کین بطن دندیز حالت، د کرونری شریان د تنگوالی ځای او شدت، د میو کارډ د اسکیمیا شدت او فعالیت، د IHD اساسی انزاري معیارات دي. په لاندی حالاتو کی انجینا د وخیم کورونری حوادثو د خطر زیاتوالی نښي:

۱- که پدی وروستیو کی پیل شوی وي

۲- Unstable Angina

۳- د زړه د احتشا څخه ژر وروسته د انجینا منځته راتلل

۴- که چیری د طبی درملنی سره هیڅ ځواب ونه وایي او یا ځواب یی ښه نه وی

۵- که چیری د CHF د څرگندونو سره ملگری وي

۶- د سپو د اذیما حملی

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

۷- د مایترل عدم کفایه

۸- د زړه د غټوالي ایکوکارډیوگرافیک او یا رادیوگرافیک بېلگې

۹- Ejection fraction له % ۴۰ ↓

د غیر تهاجمي (Non Invasive) تستونو په جریان کې د لاندې نښو شتون د کورونری حوادثو د خطر په زیاتوالي دلالت کوي :

- که د تمرین په تست کې ناروغ ونشي کولای چې شپږ دقیقې تمرین وکړي
(Stage II Bruce protocol)

- د تمرین د تست قوي مثبت والی یا د لږ تمرین سره د اسکیمیا پیل کیدنه

- د تمرین له بندولو وروسته د ۵ دقیقو څخه زیاتې مودې پورې د ST depression دوام

- د تمرین د تست په وخت کې سیستولیک فشار ټیټوالی (> ۱۰ mmHg)

- د تمرین په وخت کې بطني اریتمیا

- د سترس ایکوکارډیوگرافي په وخت کې د EF کموالی

ددې په خلاف هغه ناروغان چې د Bruce پروتوکول دریم پړاو پوره کولای شي، نورمال Stress perfusion scan لري او سترس ایکوکارډیوگرافي ئې منفي وي ، د راتلونکي کورونری حوادثو د لږ خطر سره مخ دي .

که د اکلیلی شریان انسدادی ناروغی په هره درجه کې وي د کین بطين د دندې خرابوالی سره د مړینې کچه ډیره زیاتېږي. برخلاف که د کین بطين دندې په هره درجه کې وي انزار بی دی پوری اړه لري چې د میوکارد څومره ساحه د اخته اکلیلی شریان پواسطه اروا کیږي. بالاخره هرڅومره چې د اتیروسکلروز خطري فکتورونه (د عمر زیاتوالی y ۷۵ ، دیابت ، شدید چاغوالی ، مل محیطی یا دماغی وعائی ناروغۍ او پخواني MI) زیات او شدید وي، په همغه اندازه د انجینا انزار خراب دی.

د زړه اورگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ


بېړنۍ اکلیلی سندرومونه (ACS) Acute Coronary Syndromes

ACS د اکلیلی شریانونو د عدم کفایې د ناڅاپي پېل له مخې پیژندل کېږي چې د یو یا څو اکلیلی شریانونو د ترمبوتیک بندش له امله منځته راځي. درې ډوله بېړنۍ اکلیلی سندرومونه پېژنو:

۱- (STEMI) ST Elevation Myocardial Infarction

۲- (NSTEMI) Non ST Elevation Myocardial Infarction

۳- (UN) Unstable Angina



۳-۲ شکل: د بېړنۍ اکلیلی سندروم مختلف ډولونه راښيي (۱۹، ۲۷)

چې لومړنۍ (STEMI) پېښه يې د اکلیلی شریان د پوره او دوامداره بندیدو له امله، خو دوه وروستنۍ (UA/NSTEMI) يې د نوموړي شریان د ناتامه بندش او یا د پوره بندش له امله چې تېرېدونکي وي منځته راځي (۲۰).

د زړه اورگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

بي ثباته انجېنا او د میوکارد احتشا پرته د ST د لوړوالی څخه

Unstable Angina & Non ST elevation Myocardial
Infarction (UA/NSTEMI)

تعریف:

که د ګوګل انجېنا د لاندې دریو ځانګړتیاوو څخه لږترلږه د یو درلودونکی شي UA بلل کېږي:
۱- حمله د دمی په حالت کې او یا د لږ فزیکي فعالیت سره پیدا او د لسو دقیقو څخه زیات دوام وکړي.

۲- د ناروغۍ حمله په دی وروستیو ۴-۶ اونېو کې پیل شوی او شدید وي.
۳- د انجېنا حمله Crescendo وصف پیدا کړي (یانی د پخوا په پرتله د حملو شدت، دوام او فزیکو ینسي زیات شوی وي).
د NSTEMI تشخیص هغه وخت اېښودل کېږي چې په UA ناروغ کې د میوکارد د نکروز نښې څرګندی شي (↑cardiac biomarker).

پتوفزیالوژي

UA/NSTEMI هغه وخت منځ ته راځي چې په اکلیلي شریان کې چې اتیروسکلروټیک پلک لري د اکسیجن سپلاښی کم او یا د میوکارد اکسیجن اړتیا زیاته شي.
لاندې پتوفزیالوژیکي پروسې د UA په منځته راتګ کې رول لري:

۱- د پلک ریچر یا ایروژن چې ورپسې غبرانسدادی ترمبوز منځ ته راځي (دېر عام سبب).
۲- د بنامیک انسداد Dynamic obstruction (لکه کورونري سپزم چې په prenzmetal انجېنا کې پیدا کېږي).

۳- د اکلیلي شریانونو پر مختلونکی میخانیکي بندیدنه (د اکلیلي شریانو چټک، پرمخ تلونکی اتیروسکلروز، یا د PCI څخه وروسته د شریان بېرته تنګېدل).

۴- دوهمي (ثانوي) UA: د زړه د عضلې د اکسیجن د اړتیا د زیاتوالي له امله.
په زیاتره پېښو کې د یو څخه زیات فکتورونه د ناروغۍ په منځته راتګ کې رول لري.

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

کلینیکي بڼه

ددی ناروغانو غوره گیلله د سپنی درد دی چی په ځانکړی ډول د سترنوم شاته ځای لري او کله کله په اپیگاستریک برخه کی شتون لري. زیاتره غاړی، چی اوبړی او چپه لاس ته خپرېږي. سالنډي او د اپیگاستریک ناحیې نارامی هم پیدا کېږي. فزیکي نښی یې ثابت انجینا ته ورته دی. که چېرې اسکیمیا پراخه وي یا پراخه NSTEMI شته وي، په فزیکي معاینه کی به سره خوله، سور خائف پوستکی، سپنوس تاکی کار دیا، د زړه درېم او څلورم غږونه، د سرو دقاعدی رالونه او کله کله هایپوتشن موجود وي.

تشخیص

ECG:

په UA کی د ST تیتوالی، تېرېدونکی لوړوالی او یا د T د څپې منفي کېدل، په ۳۰-۵۰٪ پېښو کی شته وي. د T د څپې بدلونونه د اسکیمیا د پاره حساس دي خو ډېر وصفی ندي. له بل پلوه د نوی، ژور، منفي T څپې ($mv < 3$)، شتون با ارزښته ده.

د زړه بیومارکرونه

د UA هغه ناروغان چی د نکروز د بیومارکر لکه CK-MB او Troponin لوړه کچه لري د تکراري احتشا او مړینی تر ډېر خطر لاندی دي. د بې ثباته انجینا او NSTEMI تر منځ توپیر د نوموړی انزایمونو د لوړوالی. له مخی کیږي یانی په وروستني کی د انزایمونو کچه لوړه وي. همدارنگه د تروپونین د لوړوالی او د مړینی کچه هم سره نېغ په نېغه اړیکه لري.

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

درملنه

A- طبي درملنه

په سر کې د UA/NSTEMI ناروغانو ته د بستر دمه او دوامداره ECG مونیتورنگ توصیه کېږي. که چېرې تر ۱۲-۲۴ ساعتو پورې د اسکیمیا حمله تکراره نشوه او یا د نکروز نښې څرګندې نشوې ناروغ ته د ګرځېدو اجازه ورکول کېږي. په طبي تداوي کې د اسکیمیا ضد او د ترومبوز ضد درملنه چې دواړه په یو وخت کې پېل کېږي ګډون لري:

۱- اسکیمیا ضد درملنه Anti Ischemic treatment

نایتریتونه Nitrates : نایتریت درمل لومړی د ژبې لاندې او یا د خولې د سپرې په ډول (۳، ۲-۰، ۰ ملي ګرامه) ورکول کېږي. که چېرې د درد حمله تر درې دوزو پورې چې هر پنځه دقیقې وروسته ورکول کېږي غلې نشوه، نایتروګلسرین د رګ د لارې ۵-۱۰ مایکروګرامه په هره دقیقه کې پېل او دوز یې هر ۳-۵ دقیقې وروسته د ۱۰ مایکروګرام پر دقیقه په اندازه زیاتېږي تر څو ګېلې کنټرول او یا سیستولیک فشار ۱۰۰ mmHg څخه ښکته شي. بېتا بلاکر B Blocker: په پېل کې وریدي بېتا بلاکر چې وروسته د خولې د لارې تعقیبېږي په هغه اندازه چې د زړه چټکتیا د ۵۰-۶۰ حدودو کې وساتي ورکول کېږي. کلسیم انټاګونسټ Calcium antagonist: په هغه حالاتو کې چې د نایتریت او بېتا بلاکر پوره درملنې سره سره دوامداره ګېلې شته وي او یا بېتا بلاکر مضاد استطباب وي د کلسیم کانال بلاکر درملو لکه Verapamil او Diltiazem څخه کار اخیستل کېږي. د اوږدې مودې ثانوي وقایي د پاره ACE نهې کونکي او Statin درمل هم ورکول کېږي. که چېرې د وریدي نایتروګلسرین او بېتا بلاکر د ورکړې سره سره درد غلې نشو Morphine sulfate ۱-۵ مليګرامه د رګ د لارې ورکول کېږي او که اړتیا وي هر ۵-۳۰ دقیقې وروسته تکرارېږي.

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

۲- ترومبوز ضد درملنه Anti thrombotic therapy

ددی ناروغانو د درملنی بل بنسټیز درمل دی ، درملنه د پلاټلیټ ضد درمل Aspirin او Clopedogril سره پیل کېږي . څېړنو ثابته کړېده چی د اسپرین او کلپدوگرېل ګډه کارونه د یواځی اسپرین په پرتله د زړه او رگونو ناروغېوله کبله د مړینی ، MI او ستروک پیښی په سلو کی ۲۰ کموي. Unfractionated heparin او ټیټ مالیکولي وزن لرونکی هیپارین هم په پورته یادو شویو درملو ورګډیږي .

B- انوسیف پروسیجر: Invasive procedures

په لاندی لوړ خطر (High risk) ناروغانو کی په مقدم ډول انوسیف ستراتیژی ته لومړیتوب ورکول کېږي :

- هغوی چی ګڼ شمېر د خطر کلینیکي فکتورونه لري
- د ST د کرنی انحراف لري
- مثبت بیومارکرونه لري
- پدی ستراتیژی کی د اسکیمیا او ترومبوز ضد درملنی څخه وروسته ، د ۴۸ ساعتو په موده کی انجیوګرافي اجرا او د اکلیلي شریان د اناتومي په پام کی نیولو سره PCI او یا CABG ترسره کېږي . ټیټ خطر (Low risk) ناروغانو کی زیاتره ساتونکی درملنی ته د اتی اسکیمیک او اتی ترومبوتیک درملو په وسیله دوام ورکول کېږي. اکلیلي انجیوګرافي یواځی په لاندی حالاتو کی اجرا کېږي
- د دمی په حال کی درد
- د ST سګمنت بدلونونه
- په Stress test کی د اسکیمیا بدلونونه

د زړه اورگونو ناروغۍ.

د زړه اسکیمیک ناروغۍ.

انزار:

ددی ناروغانو دیرش ورځنی مړینی خطر ۱- ۱۰% او د بیا ځلی انفارکشن خطر ۳- ۱۰% ده

د ناروغۍ ټولیز خطر ارزونه، د خطر د کلینکی درجه بندی سیستم (TIMI) له مخی کیږي چی لاندی ۷ مستقل خطری فکتورونه په کی گډون لری:

۱- ۲۵ کاله یا لدی څخه زیات عمر

۲- د اکلیلی شریانونو د ناروغی دری یا زیات خطری فکتورونه

۳- د زړه په Catheterization کی د اکلیلی شریانونو څرگنده ناروغی

۴- پداسی حال کی چی ناروغ تر اسپرین درملنی لاندی وي، د UA / NSTEMI پیدا کیدل

۵- په تیر ۲۴ ساعتو کی د دوه څخه زیات د انجینا حملی

۶- د ST د قطعه خط ۰.۵mm انحراف او د زړه د مارکرونو لوړوالی.

۷- د دیابت، د کین بطن د دندی خرابوالی او د کریاتینین، Atrial Natriuretic peptide او C-

reactive protein څخه هم د خطری فکتورونو په توگه یادونه کیږي.

C.reactive پروتین چی درگونو د التهاب نښه بلل کیږی او B تایپ تتریوریتیک پیپتاید چی د

میوکارډ د tension د زیاتوالی علامه ده د مړینی د زیاتوالی سره نیغه اړیکه لري. (۱۹، ۲۱)

بي عرضه اسکیمیا (Asymptomatic (Silent Ischemia)

تعریف: د اکلیلی شریانونو انسدادی ناروغی، د زړه بیږني احتشا، او د میوکارډ تیرېدونکی

اسکیمیا زیاتره بی گیلو وي. دری ډوله بی گیلی اسکیمیا پېژنو:

۱ Type: دا ناروغان د اکلیلی شریانونو په انسدادی ناروغی اخته دي خو د اسکیمیا گیلی نه

لري. ددی ډول اسکیمیا پېښی لږی دي. نوموړی ناروغان کېدای شي د انجینا د خبرونکی

سیستم (Anginal warning system) نقصان ولري.

د زړه اورگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

۲ Type: د ډاډول غلې اسکیمیا په هغه وگړو کې لیدل کېږي چې د انفارکشن پخوانی تاریخچه ولري.

۳ Type: د پر عمومیت لري او په ځنډنۍ ثابت انجنېنا، unstable angina او Prentzmetal انجنېنا اخته کسانو کې لیدل کېږي. که دا ناروغان د ECG تر دوامداره څارنې لاندې ونیول شي، د اسکیمیا ځینې عرضې او بې عرضه پېښې نښې پتوفزیولوژي:

دا چې ولی یو شمېر اسکیمیک ناروغانو کې د انجنېنا درد پیدا او یو شمېر نور یې بیا بې گیلو وي، پوره څرگند نه دی، خو کېدای شي د درد د پروسې په محیطي او مرکزي عصبي تحلیل کې د بدلون له امله وي. Autonomic نیورپاتي هم د اسکیمیا په وخت کې د درد د احساس د کموالی لامل کېږي. ځینې څېړونکي بیا د انجنېنا د درد د احساس په کمېدو کې د التهاب ضد سایتوکینونو رول مهم گڼي.

کلینیکي بڼه

د دوامداره ECG ارزونې په جریان کې معلومه شویده چې د ځنډنې ثابت انجنېنا اکثره ناروغان د سینې د درد په وخت کې د اسکیمیا نښې (ST Depression) نښې خو زیاتره دا ناروغان د بې عرضه اسکیمیا ډیري زیاتي حملې تیروي.

سربیره پردې داسې ډیر ناروغان شته دي چې د اکلیلې شریانونو په شدید اتیروسکلروز اخته دي خو هیڅ اعراض نه لري او د تمرین په وخت کې په ECG کې د ST بدلونونه مینځ ته راځي. ددی ناروغانو له ډلې څخه په ځینو کې د الکتریکي درد قدمه لوړه په ځینو نورو کې د Endorphin کچه لوړه او ځینې نور یې بیا دیابتیک ناروغان دي چې په اوتو نو میک تشوشتاواخته دي. په ورځني ژوند کې د اسکیمیا (عرضي او بې عرضه) د حملاتو زیاتوالي د ناوړه اکلیلې حوادثو لکه مړینې او MI سره یو ځای وي. همدارنگه که یو ناروغ د MI د تیروولو

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

وروسته بیا هم بی عرضه اسکیمیا ولري نوموړی ناروغ به د احتشا د بلي حملي تر ډیر خطر لاندې وي.

پلټنې او تشخیص:

گرځنده ECG ارزونه (Ambulatory ECG Monitoring) د بی گېلو اسکیمیا په پېژندنه کې بنسټیز رول لري. نوموړی ازموینه د اسکیمیا په وخت کې ۱، ۰ ملي ولته یا زیات ST depression ښيي. د تمرین ECG او رادیونوکلاید ازموینه هم په تشخیص کې مرسته کولای شي.

درملنه:

هغه درمل چې د عرضی اسکیمیا په مخنیوي کې کارول کېږي (بېتابلاکر، کلسیم اتانگونست، نایتریت) ددی ډول اریتمیا په درملنه کې هم اغېزمن دي. د بی عرضه اسکیمیا درملنه په انفرادي ډول تر سره کېږي په درملنه کې باید لاندې ټکي په پام کې وي:

۱- د سترس تست د مثبت والي درجه، په تیره داچي د تمرین په کومه مرحله کې د اسکیمیا ECG بدلونونه پیداکېږي.

۲- د اسکیمیا او تمرین په وخت کې د ایکوکارډیوگرافي او Radionuclide Ventriculography له مخي د کین بطين د Ejection Fraction بدلون.

۳- که چیري ECG بدلونونه په قدامي پریکارډیل لیډونو کې وي د سفلي لیډونو په پرتله خراب انزار لري.

۴- د ناروغ عمر، دنده او عمومي حالت هم په تداوي کې ډېر اهمیت لري. د بیلگي په توگه د تجارتي هوايي شرکت ۴۵ کلن پیلوټ چې بی گیلو وي خو د خفیف فزیکي تمرین سره ۰.۴mv په اندازه ST دېرشن په V1-V2 لیډونو کې پیدا کړي باید د اکلیلې انجیوگرافي عملیه ورته اجرا شي. خو که یو بی گیلو ۷۰ کلن غیر فعاله متقاعد ناروغ ته د اعظمي فزیکي تمرین سره ۰.۱ mv ST دېرشن په دوهم او دریم لیډونو کې پیداشي انجیوگرافي ته اړتیا نه لري.

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

هغه بي گيلی ناروغان چې د د ري اکليلي شراينو ناروغۍ او د چپ بطين د دندو خرابوالي ولري د CABG د پاره مناسب کانديدان دي . د خطري فکتورونو درملنه په تيره بيا د لپيدو کمونکي درمل ، اسپرين ، کلسيم بلاکر ، اوږد تاثير لرونکي نايتریت او بيتا بلاکر درمل کارونه د بي عرضه او عرضي اسکيميا ناروغانو د حالت او برنيلیک په ښه کولو کې مرسته کوي . (۱۹ ، ۲۷)
انزار:

په IHD اخته کسانو کې که اسکيميا عرضي وي که بي عرضه ، انزاري اهميت لري . که په Type ۱ ناروغانو کې د تمرين په وخت کې ST depression وليدل شي د قلبي مړينې چانس يې د هغه ناروغانو په پرتله چې نوموړی بدلونونه نه لري ، ۴-۵ ځلې زياته ده . (۲۷)

د میوکارد بېړنۍ احتشا د ST د لوړوالي سره

ST Segment Elevation Myocardial Infarction

تعريف . د میوکارد احتشا د زړه د عضلي نکروز دی چې د اسکيميا له کبله منځته راځي . د زړه بېړنۍ احتشا په صنعتي هېوادونو کې د ډېر عام او دوديزو ناروغېو له ډلې څخه دی . د امريکا په متحده ايالاتو کې د بېړني احتشا ۲۵۰۰۰۰ نوی پېښی او ۴۵۰۰۰۰ د تکراري بېړنۍ احتشا ناروغي پېښېږي . د بېړنۍ احتشا لومړنۍ (۳۰ ورځې) مړينه په سلو کې ۳۰ ده چې نيمايي څخه زياته يې روغتون ته له رسېدو مخکې پېښېږي . (۱۴ ، ۱۹)

لاملونه:

بېړنۍ احتشا نږدې تل د اکليلي شريان د اتيروما په شتون کې د plaque rupture او ترومبوز له کبله پېدا کېږي ، خو په نادر ډول د کېن زړه امبولی او د اکليلي شريان هيموديناميکه گډوډي هم د میوکارد د بېړنۍ احتشا لامل گرځي .

که د انفارکشن د پېل څخه شپږ ساعته وروسته میوکارد وکتل شي ، پړسېدلی او خائف ښکاري . د ۲۴ ساعته موده کې نکروتیک نسج د وینه بهيدنی له امله سور رنګ غوره کوي ، او

د زړه او رگونو ناروغۍ.

د زړه اسکیمیک ناروغۍ.

په راتلونکي اونېو کې التهابي غبرگون پرمختګ کوي او نکروزي نسج خاورينه (gray) بڼه نیسي او ورو ورو نازکه فبروزي سکار منع ته راوړي. Remodeling د مړې شوی (infacted) برخې د سايږ ، شکل او پېروالي بدلونونو (نړۍ کېدل او پراخه کېدل) ته ، او د مېوکارډ د نورو برخو معاوضوي هايپېرتروفي ته وېل کېږي. د ريموډلنگ په پايله کې چې بطنيات پراخه کېږي ، د زړه د stroke volume په لوړ ساتلو کې مرسته کوي .

پتو فزيولوژي

د پلک رچر رول Role of plaque Rupture

STEMI هغه وخت منځته راځي چې په ناڅاپي توګه هغه اکيلی شريان چې له پخواڅخه په اتیروسکلروز اخته وي د ترمېوز په وسيله بند شي .

هغه کورونري اتیروسکلروز چې ورو پرمختګ کوي، سره لدی چې شديد هم وي د STEMI لپاره زمينه نه برابروي. ځکه چې د وخت په تیریدو سره د کولتیرل اوعیو بډایه شبکه جوړیږي. له بلی خوا که د شريان د ټپ (Injury) په ساحه کې په چټکۍ سره ترمېوز جوړ شي STEMI رامنځته کوي. یو شمیر فکتورونه لکه سګرت ، هايپېرتشن ، او د لیپېډ راتولیدنه په کورونري شريان کې د ټپ د پیداکیدو د پاره زمينه برابروي. په زیاتره پېښو کې STEMI هغه وخت پیداکېږي چې د اتیروسکلروټیک پلک په سطحه کې ویجاړتیا رامنځته شي د ویجاړتیا له امله د پلک محتویات د وینې او ځینې ترمېو جنیکو توکو سره په تماس کې کېږي او په نوموړې ویجاړه ساحه کې ترومېوز جوړ او شريان بندېږي. هستالوژیکو کتنو ښودلې ده چې rupture ته مساعد کورونري پلکونه له لیپید څخه بډایه وي او نازکه فبروزی پوښ لري. کله چې د تخریب شوی پلک د پاسه د پلاټلیټ یوه طبقه جوړه شوه ځینې Agonist مواد لکه کولاجن ، ADP ، epinephrine او Serotonin د پلاټلیټ فعاله کیدل هڅوي. د پلاټلیټ د هڅونې څخه وروسته Thromboxane A² چې د شریانونو قوی تنګونکی مواد دي آزادېږي. پلاټلیټ نور هم فعاله او د Fibrinolysis په

د زړه او رگونو ناروغۍ.

د زړه اسکیمیک ناروغۍ.

ورپاندۍ يې ټينگار زياتيږي. د پلاټليت فعاله کيدل د ترمبوکسان A_2 په آزاديدو سربيره د Glycoprotein IIb/IIIa آخذي هم لمسوي ، له فعاله کيدو وروسته نوموړی آخذي د Fibrinogen د امينوسيدو سره ډير تمايل پيدا کوي. فبرينوجن په يو وخت کې د دوه پلاټليت سره نښلی چې په نتيجه کې د پلاټليت راټوليدنه (Aggregation) رامنځته کيږي. د وېجاړ شوی پلک په ساحه کې تحثري فکتورونه د نسجی فکتورونو سره د تماس په نتيجه کې فعاله کيږي. VII او X فکتورونه فعاله او Prothrombin په ترومبين بدلوي چې دا بيا فبرينوجن په Fibrin اړوي، په پايله کې اخته اکليلی شريان د ترمبوز پواسطه چې د راټول شوی پلاټليت او فبرين د مزو درلودونکي دی بنديږي. نادرا STEMI د اکليلی شريان د هغه بنديدنې له کبله چې د کرونري امبولۍ ، ولادی انومالی ، کرونري سپزم او يو شمير سيستمیک التهابی ناروغيو له امله منځ ته راځي پيدا کيږي.

د اکليلی شريان د بنديدنې له امله ميوکارد ته د زيان اړونی کچه لاندې شيانو پورې اړه لري:

- ۱- د اخته شريان پواسطه د اروا ساحه
- ۲- ايا شريان په مکمله توگه بنده شوی او که نه ؟
- ۳- د اکليلی شريان د بنديدو دوام
- ۴- د هغه وينی مقدار چې د کوليتل شريان پواسطه د ميوکارد اخته نسج ته رسيږي
- ۵- د ميوکارد د اخته برخي د اکسيجن اړتيا
- ۶- طبعی فکتورونه چې په مقدم ډول انسدادی ترمبوز په بنفسه ډول اوبه کوي
- ۷- ايا په بند شوی کرونري شريان کې د جريان له بيرته اعادي وروسته د ميوکارد پرفيوزن بسنه کوي او که نه.

هغه ناروغان چې ډير شمير کرونري رسک فکتورونه لري او هغوی چې په UA اخته دي ، د STEMI د پيدا کيدو تر ډير خطر لاندی دي. غېر معمول طبي حالات چې ناروغ STEMI ته برابره وي عبارت دي له: Hypercoagulability يا د رگونو کولاجن ناروغی ، په کوکايين روږديدنه ، او د زړه دننه ترمبوز يا کتله چې کرونري امبولی پيدا کوي.

د زړه اورگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

کلینیکي بڼه


په نیمایي پېښو کې د STEMI څخه مخکې شدیدونکي فکتورونه لکه شدید فزیکي کار، روحي فشارونه او د داخلي او جراحي ناروغۍ موجود وي. سره لدې چې د STEMI حمله د ورځې او شپې په هر وخت کې منع ته راتلای شي خو زیاتره پېښې یې د سهار لخوا د وینښېدو په لومړیو ساعتو کې منع ته راځي. د تېر درد د دې ناروغانو اساسي گېله ده چې په زیاتره ځانگړنو کې د انجېنا درد ته ورته دی، خو د انجېنا په پرتله ډېر شدید وي او کېدای شي څو ساعته دوام وکړي. په عام ډول درد د ضعیفې، سړې خوله، زړه بد والی، کانگی، نارامۍ او د مړینې احساس سره ملگری وي. د انجېنا پر خلاف په احتشا کې درد د دمې په حال کې پیدا کېږي، خو که د فزیکي فعالیت په وخت کې رامنځته شي د دمې (استراحت) سره نه غلې کېږي. د STEMI دردونه کېدای شي د پریکارډاېتس، د سېرو امبولیزم او د ابهر بېړنۍ Costochondritis، Dissection او د هضمي جهاز د ناروغیو سره مغالطه شي چې په توپیري تشخیص کې په پام کې وي. د STEMI په ۲۰٪ پېښو کې درد موجود نه وي (Painless MI) د بې درده احتشا پېښې په لاندې وگړو کې ډېر دي:

دیابتیک ناروغان، زاړه خلک او ښځې. په زړو وگړو کې د MI حمله کېدای شي د ناڅاپه سالنډې په ډول څرگند شي او د سېرو اډیما ته پرمختګ وکړي. د MI نور غېر معمول کلینیکي څرگندونې چې کېدای شي د درد سره ملگری وي یا نه په لاندې ډول دي:

- د شعور ناڅاپي له منځه تګ
- Confusion
- شدید ضعیفتیا
- د محیطي امبولیزم نښې
- د فشار بې لامله ولېدنه

د زړه اورگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ



۳-۴ انځور: د احتشاد درد وصف بنیې (Levine sign). (۱۰)

فزيکي علامې:

د MI د حملې په وخت کې ناروغ ډېر نارامه، عصباني او په خولو کې ډوب او نهايات يې ساړه وي، کوبښن کوي چې د مختلفو وضعیونو په نیولو سره درد غلی کړي. د سینې دوامداره درد (> 30 دقیقې) چې د زیاتي خولي سره یوځای وي د STEMI د پاره ښه لارښود ده. سره لدې چې د STEMI زیاتره ناروغان په لومړیو ساعتو کې نارمل نبض او فشار لري خو د قدامي MI $1/4$ ناروغان د سمپاتيک اعصابو د فعالیت زیاتوالی، تکی کارډیا او لوړ فشار بنیې او د سفلي MI په نیمایي ناروغانو کې د پاراسمپاتيک سیستم د فعالیت زیاتوالی (برډی کارډیا، هایپوتشن) موجود وي.

د زړه غبرونه تېټ (Decrease) او PMI نه جس کيږي د بطین د دندې د خرابوالي له کبله $S4$ او $S3$ او د دوهم آواز معکوس split اوریدل کیږي.

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

د مایترل د دسام د دندې د خرابوالی له امله mid او late سیستولیک مرمر په تیریدونکی ډول اوریدل کیدای شي. که چیرې Transmural STEMI ناروغان په تکراري ډول معاینه شي په زیاتره پېښو کې د ناروغي په جریان کې Pericardial friction rub ممکن واوریدل شي. د ښې بطن د انفارکشن په صورت کې د وداجي یا جگولر ورید پر سوب شتون لري. د MI په لومړي اونی کې د بدن د حرارت درجه تر 38°C پورې لوړیدای شي. شریاني فشار متغیر وي. د ترانسمیورل MI په زیاتره ناروغانو کې سیستولیک فشار د انفارکشن نه مخکې حالت څخه ۱۰-۱۵ ملي مترسیما بېنکته وي

لبراتورې ازموېنې:

MI په مرحلوي توګه په لاندې ډول پرمختګ کوي:

- بېړنۍ Acute (د لومړیو ساعتو څخه تر ۷ ورځو)
- د رغېدو پړاو کې Healing (۷-۲۸ ورځي)
- رغېدلی Healed (< ۲۹ ورځي)

د MI د تشخیصه تستونو د ارزیابي په وخت کې باید پورته پړاوونه په پام کې وي.

د MI تشخیصه لبراتورې معاینات په لاندې څلور ډلو ویشل کېږي:

۱- د زړه برقي ګراف ECG

۲- د زړه بیومارکرونه biomarkers

۳- Cardiac Imaging

۴- د نسجي نکروز او التهاب غیر وصفي معیارات

ECG:

د MI څلور وصفي ECG بدلونونه د لومړیتوب په ترتیب سره په لاندې ډول دي:

۱- ST Segment elevation

۲- Pathologic Q wave


۳- T.Wave inversion

د زړه اورگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

۴- په ځینې پیښو کې د R څپې د جگوالی کمېدنه (۱۹)

د Q څپه وروسته د ښه کیدو څخه د عمر تراخړه په ECG کې پاتې کیدای شي، خو په ۲۵% پیښو کې دا څپه له منځه ځي. که چیرې وروسته له درې میاشتو څخه د ST قطعه خط لوړ پاتې شو له احتشا څخه وروسته په بطني انیوریزم دلالت کوي.



۳-۵ انځور: په احتشاکې د ECG بدلونونو پرمختګ ښیي (۱۶)

A: نورماله ECG B: د ST قطعه خط حاد لوړوالی.

C: د R د څپې تدریجی کمیدنه، د Q څپې پیدا کېدل، د ST قطعی بېرته راګرځېدنه او د T څپې منفی کېدنه.

D: د Q ژوره څپه او د T منفی څپه. E: زړه (old) احتشا را ښیي

د ECG بدلونونو د پرمختګ چټکتیا له یو نه بل ناروغ ته توپیر لري. خو په ټولیزه توګه د B پړاو په دقیقو کې، C پړاو په ساعتونو کې، D پړاو په ورځو او د E پړاو اونۍ او میاشتې وروسته رامنځته کېږي (۴، ۱۶).

لومړی جدول: د موقعیت له نظره د MI، ECG بدلونونه (۲۵)

د احتشا ساحه	هغه لیدونه چې د احتشا بدلونونه ښیي
Anterior(Small)	V۳-V۴
Anterior(Extensive)	V۲-V۵
Anterior septal	V۱-V۳
Lateral	I, II, aVL
Anteriolateral	V۴-V۶, I, aVL
Posterior	V۱-V۲ (reciprocal)
Subendocardial	(Any lead)
Right V. Wall infarction	(V۱, V۳R, V۴R)

د زړه اورگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

د زړه اړونده بیومارکرونه

په MI کې یوشمیر پروتینونه د قلبي عضلي د نکروتیکې برخې څخه د وینې دوران ته داخلېږي. د پروتینو د ازادیدو چټکتیا د دوي داخل حجروي موقعیت، مالیکولي وزن، او د وینې او لمفاتیک جریان پورې اړه لري.

د Creatin Pospo kinase (CK) کچه د ۴-۸ ساعتو موده کې لوړېږي او ۴۸-۷۲ ساعتو کې بیرته نورمالي کچې ته ګرځي. خو نوموړي معاینه د MI دپاره ځانګړې ندی ځکه په یوشمیر نورو حالاتو کې هم کچه یې لوړېږي لکه داخل عضلي زرقیات، د اسکلیتي عضلاتو ناروغي، DC شاک، او ستروک.

CK MB د CK یوايزو انزایم دی چی په زیات مقدار په نورو عضلاتو کې شته نه وي نو ځکه ډیر وصفي دي.

Troponin I او Troponin T د قلبي عضلي د پاره وصفي او ډیر تشخیصه ارزښت لري په وینه کې کچه یې ۲-۴ ساعتو کې لوړ او تر ۷-۱۰ ورځو پورې لوړ پاته کیږي. LDH کچه هم په MI کې لوړېږي خو څرنگه چې غیر وصفي دي اوس د تشخیص دپاره ډیر نه کارول کیږي. LDH سویه وروسته له ۱۲ ساعتونو څخه لوړېږي او تر ۲-۳ ورځو پورې اعظمي حد ته رسیږي او د یوې هفتې او یاد هغې څخه زیاتي مودې پورې لوړ پاتي کیږي.

د زړه تصویري معاینات CARDIC IMAGING

په Tow dimensional ایکوکارډیوګرافي کې د بطن د دیوال انبار ملتي تل موجود وي خو STEMI د میوکارډ دسکار او شدید بېړنۍ اسکیمیا څخه د ایکو پواسطه نه شي توپیر کیدای په عاجله څانګه کې د ایکو پواسطه د بطن د دیوال د حرکاتو د ګډوډي معلومول د تدایي په تصمیم کې چي ایا fibrinolysis او یا PCI توصیه شي مرسته کولای شي.

همدارنګه ایکو کارډیوګرافي د بطن د دندو د معلومولو، د بني بطن انفارکشن، بطني انیوریزم، د پریکارډ انصباب، VSD او د ماتیرل عدم کفایي په تشخیص کې چي د STEMI وخیم اختلالات دي مرسته کوي.

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

یوشمیر رادیونوکلاید تصویری معاینات هم د STEMI شکمنو ناروغانو د ارزیابی د پاره شته دي او نوموړي معاینات د ایکو کارډیوگرافي په پرتله لږ استعمالیږي ځکه نوموړي معاینات ډیر گران او لږ حساس دي.

د نکروز او التهاب غیر وصفی معیارات:

د نکروزي ناحیې په وړاندې د بدن د غیر وصفی غبرگون په نتیجه کې د انفارکشن د پیل څخه تر څو ساعتو د وینې د سپینو حجرو شمېر (۱۲۰۰۰-۱۵۰۰۰) ته رسیږي او ۳-۷ ورځې لوړ پاته کېږي. ESR د WBC په پرتله په بطني ډول لوړېږي په لومړي اوني کې اعظمي حد ته رسیږي او ۱-۲ اوني پوري لوړ پاتي کېږي

توپيري تشخیص

۱- Angina Pectoris

۲- د ابهر طولاني خیري کېدل Dissecting Aneurysm of Aorta

۳- د سږو امبولیزم: په دې ناروغۍ کې د سینې ناڅاپي شدید درد او سالنډي، تبه، سیانوز، تکی کارډیا، هیماپتیزس شته وي او د ګوگل په رادیوگرافي کلیشه کې داسې مثلي خیال لیدل کیږي چه قاعده یې دننه او څوکه یې بهر ته وي.

۴- Spontaneous Pneumothorax: دا ناروغان د سینې شدید درد او سالنډي لري، درد کومي خواته نه خپریږي، او د MI د ECG بدلونونه موجود نه وي.

۵- بېړنۍ پانکراتایټس: د گیلې په منځنۍ برخه کې د کمربند په څیر درد شته وي. او هم په Hemorrhagic Pancreatitis کې Grey turner sign مثبت وي.

۶- د حجاب حاجز فتق یا چوره: په چاغو خلکو او ښځو کې ډېر پېښېږي، او قدام ته په تپیدو سره یې درد زیاتېږي.

۷- د معدې د تپ سوري کېدل

۸- Intercostals Neuralgia

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

۹- Pericarditis: درد يې د ملاستۍ سره ډیر پری، یانی د وضعیت په بدلون سره شدت يې تغیر کوي. د زړه په اصغا کي Fraction rub اوریدل کیږي.

درملنه

روغتون ته له رسیدو مخکې څارنه : Pre hospital care

د STEMI د روغتون څخه د باندې د مړینې زیاتره پېښې د ناڅاپي بطني فبريلشن (VF) له کبله دي. د VF له کبله د مړینې زیاته برخه د اعراضو د پیل په لومړیو ۲۴ ساعتو کي وي چي ددې جملې څخه د نیمایي نه زیات يې په لومړي ساعت کي پېښیږي. نو لدې امله د STEMI د شکمن ناروغ د روغتون څخه مخکي مراقبت کی لاندې اهمات ارزښت لري.

۱- د ناروغ لخوا د اعراضو پیژندنه او ژر تر ژره د طبي مرستې غوښتنه.

۲- د داسې طبي ټیم چټک استخدام چي بیا رغونه او Defibrillation ته لاسرسی ولري.

۳- مجهز روغتون ته د ناروغ ژر لېږدونه

۴- Reperfusion Therapy

تر ټولو زیات څنډ روغتون ته د ناروغ په لېږدېدو کي نه بلکه د درد د پیل او د طبي مرستې د غوښتنې ترمنځ وي چه دغه وقفه د وگړو د پوهاوي د لازمي لندېدای شي.

په بېرني څانگه (Emergency department) کي درملنه:

په بېرني څانگه کي د STEMI د شکمنو ناروغانو د درملنې بنسټيزی موخی :

- د درد ارامول
- د عاجل Reperfusion درملنې ته کاندید ناروغانو پیژندنه
- د روغتون په اړونده وار دو کي د لږ خطري ناروغانو ځای په ځای کول
- د STEMI ناروغانو د روغتون څخه د بې وخته خارجیدو مخنیوي.

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

- Aspirin د STEMI هر شکمن ناروغ ته اړین دی. چي لومړي دوز يې ۳۲۵-۱۲۰ ملي گرام Chewable اسپرين ورکول کيږي او وروسته د ورځي ۷۵-۱۲۲ ملي گرام په دوام داره توگه ورکول کيږي. که د شرياني اکسيجن اشباع (saturation) نورمال وي ناروغ ته د اکسيجن ورکړه گټور ندي، خو که هايپوکسيما موجود وي په لومړيو ۲-۱۲ ساعتو کي اکسيجن د Nasal prong يا د مخ د ماسک د لاري ۲-۴ ليتره په هره دقيقه کي ورکول کيږي. وروسته د اکسيجن د اړتيا د پاره ناروغ بيا ارزول کيږي. (۱۹)

د درد آرامول:

نايتروگليسرين د ژبي لاندې ۰.۵ ملي گرامه هر ۵ دقيقې وروسته د دري څلو لپاره ورکول کيږي. د درد په کمولو يا غلي کولو سربيره د ميوکارد د اکسيجن اړتيا کموي (د pre load د کموالي د لاري) او ميوکارد ته د اکسيجن ليرديدنه زياتوي (د احتشا د ناحيي د اکليلي شريان او collateral شريانونو د توسع له کبله، که چيري ناروغ لومړي د ژبي لاندې نايتروگليسرين سره ښه ځواب ووايي خو وروسته بيرته درد پيدا او ST-T بدلونونه نور هم زيات شي پدي حالت کي وريدي Nitroglycerin کارول کيږي.

Morphine د STEMI د درد د غلي کولو لپاره ډير اغېزمن انلجزيک دی. مورفين په کمو ۱-۲ ملي گرامه تکراري دوزونو هر ۵ دقيقې وروسته د وريد د لاري ورکول کيږي دغه درمل د درد په ارامولو برسېره د وريدي ويني رکودت زياتوي، شرياني فشار ټيټوي، د زړه دهانه کموي او کله کله د مورفين د واگوتونیک اغېزوله کبله بردي کار ديا او بلاکونه هم پيدا کيږي چي د اتروپين سره چي نيم ملي گرامه د رگ د لاري ورکول کيږي ځواب وائي. (۲۰)

Beta Blocker دواگانې هم د STEMI د درد په کنترول کي ډير اغېزمن دي نوموړي درمل د ميوکارد د اکسيجن اړتيا کموي چي ورسره اسکيميا او درد کميږي.

همدارنگه داسي بيلگي شته چه بيتا بلاکر درمل په روغتون کي ددي ناروغانو د مړيني کچه کموي خصوصاً په ډېر خطري ناروغانو کي. معمولاً metoprolol د وريد د لاري ۵ ملي گرامه هر ۲-۵ دقيقې وروسته تر دري زرقه پوري ورکول کيږي داسي چي:

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

- سیستولیک فشار د ۱۰۰ ملي متره سیماب څخه لوړ وي.
 - د زړه چکتیا د ۲۰ څخه زیات وي.
 - PR interval < 0,24 second
 - او د سږو د قاعدې رالونه باید د حجاب حاجز څخه د لس ساتی متر په اندازه لوړ وانه وریدل شي.
- د وروستي وریدي دوز څخه ۱۵ دقیقې وروسته نوموړي درمل ۵۰ ملي گرامه هر شپږ ساعته وروسته د خولي د لاري تر ۴۸ ساعتو پوري او وروسته ۱۰۰ ملي گرامه هر ۱۲ ساعته وروسته ورکول کېږي.

Primary Percutaneous Coronary Intervention

که چېرې PCI د STEMI په لومړیو ساعتونو کې ترسره شي د پرفیوژن په بېرته راگرځېدنه کې ډیر اغېزمن دی. PCI د Fibrinolysis په پرتله د بند شوي شریان په خلاصولو کې ډیر اغېزمن دی. په لاندې حالاتو کې د فبرینولایزس په پرتله PCI ته لومړیتوب ورکول کېږي.

۱- کله چې تشخیص شکمن وي

۳- د وینې بهیدني خطر زیات وي

۴- اعراض د ۲-۳ ساعتو راهیسې موجود وي یعنې علقه نسبتاً پخه شوی وي او د Fibrinolysis درمل سره په اسانې تخریب نشي. خو باید په پام کې وي چې PCI گران بیه عملیه ده او هر چیرته د اجرا کولو امکان یې نشته.

فبرینولایزس (Fibrinolysis):

که چېرې مضاد استطباب نه وي فبرینولایتيک درملنه باید تر ۳۰ دقیقو پوري پیل شي. (Door to needle time < ۳۰ min) د فبرینولایزس اساسي موخه د بند شوي اکلیلې شریان مکمل خلاصیدل دی.

دزړه اورگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمېک ناروغۍ

مروجہ فبرینولایک درملونه streptokinase او reteplase دي . نوموړی درمل پلازمینوجن په plasmin بدلولي چي داد ترمبوز فبرین تخریبوي . که چیري فبرینولایک درملنه د اعراضو د پیل څخه تر یو ساعته پوري ورکړل شي په روغتون کي د مړیني کچه ۵۰٪ پوري کموي او تر لسو کالو پوري د مړیني په کمولو کی اغېزه لري . که چیري فبرینولایک درمل په مناسبه توگه ورکړل شي د احتشا ساحه او د کین بطن وظيفوي گډوډي کموي او هم د شدیدو اختلاطاتو لکه سپټم ریچر، کارډیوجینیک شاک او خیشو بطني اریتمیاوو پېښي کموي . د فبرینولایک درمل په پیل کولو کي هره دقیقه ارزښت لري که چیري د اعراضو د پیل څخه ۱-۳ ساعته پوري تطبیق شي ډیر گټور دی . حتی په ځیني ناروغانو کي تر ۱۲ ساعته پوري هم گټه رسولاي شي . په ځانگړی ډول هغه ناروغانو کي چي دوام داره درد ولري او په ECG کي د ST څپي لوړوالی موجود خو پتالوژیک Q منځته نه وي راغلي . ۱۵ ملي گرامه ، tpa لمړي ځل چي وروسته ۵۰ ملي گرامه د ورید د لاري د لومړیو دیرشو دقیقو په موده کي او بیا ۳۵ ملي گرامه د ۲۰ دقیقو په موده کي تطبیق کیږي . streptokinase ۱،۵ ملیون یوتیه د ورید د لاري د یو ساعته په موده کي ورکول کیږي . rPA لس ملیون یوتیه د ۲-۳ دقیقو په موده کي او دوهم دوز یی هم ۱۰ ملیون یوتیه دیرش دقیقو وروسته ورکول کیږي .

مضاد استطبابات

- ۱- د دماغی رگونو د وینه بهېدنې تاریخچه:
- ۲- non hemorrhagic stroke د یو کال راهسي
- ۳- Bp > ۱۸۰/۱۱۰
- ۴- د ابهر د dissection احتمال
- ۵- فعاله داخلي خونریزي (له menses څخه پرته)

د زړه اورگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

نسبي مضاد استطببات:

۱- د اتی کواگولانت درمل استعمال

۲- پډي وروستيو دوه اونيو کي جراحي عملیه او يا اوږده ($> 10 \text{ min}$) قلبي وعایي بیارغونه

۳- Known bleeding diathesis

۴- امیدواری

۵- هیمورژیک دیابتیک رتینوباتی

۲- د معدی فعال تپ

۷- د شدید هایپرشن تاریخچه چه اوس کنترول شوي وي .

د الرژیک غبرگون د مخنيوي په خاطر سترپتوکاینیز باید دوهم ځل د ۵ ورځو او ۲ کالو ترمنځ

موده کي ورنه کړل شي.

د فبرینولیزس غوره اختلاطات الرژی (Streptokinase) او وینه بهیدنه ده.

په روغتون کی درملنه: Hospital phase management

د اکلیلی شراينو د څارنی څانگه (CCU):

ناروغ تر هغه په CCU کي پاته کیږي چه ټینګي څارني ته اړتیا ولري که په حاد کورونری سندروم ناروغ کي STEMI د ۸-۱۲ ساعتو موده کی رد شو او اعراض یي د خولي له لاري درملني سره کنترول شول، ناروغ د CCU څخه وارد ته لېږدول کېږي. همدارنگه د STEMI تشخیص شوي ناروغ چه low risk وي (د MI د پخواني تاریخچي، دوامدار درد، CHF، هایپرشن او د زړه د اریتمیا نشتوالي) په محفوظ ډول د CCU څخه ولېږدول شي.

د ناروغ فعالیتونه:

هغه فکتورونه چه د زړه کار زیاتوي د MI د پیل په لومړیو ساعتو کی د Infarct size د زیاتوالي سبب کیږي. نو لدی امله د STEMI ناروغان په بستر کی د دمی په حال کی ساتل کیږي. که

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمبیک ناروغۍ

چیري اختلالات موجود نه وي وروسته د ۲۴ ساعتو څخه ناروغ ناستي وضعیت ته چه پښي د بستر په څنډه کي ځوړندی وي، او یا په چوکي ناستي ته هڅول کېږي. که چیري هایپر تنشن او یا نور اختلالات موجود نه وي په دوهم او دریمه ورځ ناروغ ته په کوټه کي د گرځیدو اجازه ورکول کېږي او ورو ورو فعالیت دوام يي زیاتېږي. همدارنگه د ځان وینځلو او شاور اجازه ورکول کېږي. له دریمي ورځي وروسته ورو ورو حرکات زیات او ۱۸۵ متر (۶۰۰ ft) د ورځي دري ځلي پوري د گرځیدو اجازه ورکول کېږي.

خواره Diet :

څرنگه چه د MI څخه سمدلاسه وروسته د کانګي او Aspiration خطر موجود وي ناروغ باید په لومړیو ۴-۱۲ ساعتو کي هیڅ خواره ونه خوري او یا هم یواځي مایع د خولي له لاري واخلي. د CCU غذائي رژیم کي د شحمو کچه ۳۰% او کولسترول ۳۰۰ ملي گرامو څخه په ورځ کي لږ وي. د پروتین مقدار هم باید ډیر زیات نه وي. او هغو خوړو ته هڅه وشي چه د پوتاشیم، مگنیزیم او فایبر اندازه يي زیاته او د سودیم اندازه يي لږه وي. د بستر استراحت او نرکوتیک درمل چه د درد ارامولو لپاره ورکول کېږي د قبضیت سبب کېږي. د بستر ترڅنگ کمود څخه استفاده او زیات فایبر لرونکی غذايي رژیم او د غایطه موادو نرمونکی د قبضیت په مخنیوي کي موثر دي او که قبضیت دوام وکړي laxative درملو څخه څه اخیستل کېږي.

Sedation :

په روغتون کي د بستر په وخت کي د MI زیاتره ناروغان ارام ته اړتیا لري. چه پدي موخه ۵ ملي گرامه diazepam، ۱۵-۳۰ ملي گرامه oxazepam، یا ۵، ۲۰-۰ ملي گرامه bromazepam د ورځي دري نه څلور ځلو پوري ورکول کېږي. د پوره خوب لپاره د پورته ذکر شوو درملو یو بل دوز هم د شپي له خوا ورکول کېږي.

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

ترومبوز ضد درمل Anti thrombotic agent :

د پلاټلیټ او ترومبین ضد درملو لومړنۍ موخه د MI اړونده شریان خلاص ساتل دي او دوهمه موخه یی د میورل ترومبوزس او ژورو وریدونو د ترومبوزس مخنیوي دی. اسپرین ستندرد پلاټلیټ ضد درمل دی چه نژدی ۲۷% مړینه کموي. سربیره پردی په STEMI ناروغانو کی د اسپرین سره د Clopidogrel گډ ورکول د مړینې ، بیا ځلی انفارکشن او ستروک پېښی کموی. Glycoprotein IIb/IIIa رسپتور نهی کوونکی درمل په هغه انفارکشن ناروغانو کی چی PCI پری اجرا شوی وي، د ترومبوتیک اختلاطاتو د مخنیوی د پاره گټور دی.

Unfractionated heparin (UFH) ستندرد انتی ترومبین درمل دی چه په کلنیکي پرکټس کی استعمالیږي. هیپارین په هغه ناروغانو کی چه (streptokinase) non fibrin specific ترمبولایک درمل اخلي دومره اغېزمن نه دی.

په هغه ناروغانو کی چه فبرین ته ځانگړی ترمبولایک او اسپرین اخلي په دوي کی هیپارین ترمبولایزس اسانه کوي او د انفارکت شوي برخې د شریان په خلاصولو او خلاص ساتلو کی مرسته کوي. د UFH مروجہ دوز ۶۰ u/kg چه اعظمي اندازه یی ۴۰۰۰ یوتیه کیږی په bolus ډول ورکول کیږی. وروسته بیا ۱۲ یوتیه د بدن په هر کیلو گرام وزن پر ساعت چه اعظمي اندازه یی ۱۰۰۰ یوتیه پر ساعت کیږی کارول کیږی. (APTT) پدي ناروغانو کی د تداوي په جریان کی ۱،۵-۲ control value وي. لاندی ناروغان د سیستمیک او د سپرو د امبولیزم ترزیات خطر لاندی دي:

- د زړه قدامي احتشا

- د بطن د دندو شدید خرابوالی

CHF-

- د امبولیزم تاریخچه

- په ایکو کی د mural ترومبوز بېلگی

- اذیني فبریلیشن

دزړه او رگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمېک ناروغۍ

نوموړي ناروغان باید په روغتون کې د UFH لوړ دوز واخلي او کله چه رخصت شول نو Warfarin د خولي له لاري تر دریو میاشتو پوري ورکول کیږي.

: β -Blocker

په MI ناروغانو کې ۱۵% مړینه کموي د میوکارډ د اکسیجن اړتیا، درد او د infarct size کموي. او د شدیدو بطني اریتمیاو د منځ ته راتګ څخه مخنیوی کوي. په لومړۍ مرحله کې داخل وړیدي او وروسته د خولي د لاري تعقیبېږي. په هغه پیښو کې چه مضاد استطبات نه وي موثره دوا ده.

ACE نهی کوونکی:

دا ډله درمل د مړینې په کمولو کې د Aspirin او بیټا بلاکر سره د پرتلی وړ دي. تر ډېر خطر لاندی ناروغانو کې ډیر گټور دی (زاړه خلک، قدامی احتشا، د MI پخواني تاریخچه، او د چپ بطين د دندو خرابوالی). همدارنگه نوموړی درمل د بطين remodeling کموي او پدې ترتیب د CHF د پیدا کیدو خطر کمیږي. سربېره پردی د احتشا د تکراری پیښو په کمولو کې هم مرسته کوي. ACE نهی کوونکی باید د MI په ټولو هغه ناروغانو کې چه څرگند CHF ولري او یا د هیمودینا میک له پلوه ثابت وي، خو په ECG کې ST-elevation یا LBBB ولري، په لومړیو ۲۴ ساعتو کې پیل کیږي. (۲۱، ۱۹)

د MI اختلاطات او د هغوی درملنه :

I - اریتمیا:

الف- بطني اریتمیا :

Ventricular Premature Beat (VPB): د MI په لومړیو ساعتو کې ډیر عمومیت لري. په بطني پریمچور بیت کی اوس د بطني تکی کارډیا (VT) او بطني فبریلیشن د وقایې لپاره

د زړه اورگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

وقایوی انتی اریتمیک درمل نه کارول کېږي. په STEMI کې چې بیتابلاکر په دودیز ډول استعمالېږي د VBP د درملنې او د بطني فبريليشن د وقایې لپاره هم گټور دي. بطني تکی کار دیا: که چیرې ناروغ ښه (stable) وي، VT د Amiodarone (۱۵۰ ملي گرامه په ۱۰ دقیقو کې چې په ۱ mg/min د ۶ ساعتو لپاره تعقیبېږي وروسته بیا ۵ mg/min، دوام مومي). او یا procainamide په مټ تداوی کېږي. که ریتم ژر اصلاح نه شو برقي کارډیوورژن کارول کېږي.

بطني فبريليشن: ناروغان د DC شاک (۳۰۰J-۴۰۰J) په مټ تداوی کېږي. د تعند په صورت کې امیودارون او بیا ځلې کارډیوورژن ترسره کېږي.

Accelerated Idioventricular Rhythm: چې د ورو بطني تکی کار دیا په نوم هم یادېږي بطني ریتم په دقیقه کې ۶۰-۱۰۰ وي. د احتشا په ۲۵٪ ناروغانو کې او زیاتره د Reperfusion نه وروسته پیدا کېږي او کومي ځانگړې درملنې ته اړتیا نلري.

ب: فوق بطني تکی کار دیا Supra Ventricular tachycardia:

سینوس تکی کار دیا عام دی چه لامل یې زیاتره د ادرینرجیک اعصابو تنبه، هیمودینا میکه گډوډۍ، هایپوولیمیا او Pump failure دی. اذینې پریمچور بیت هم معمول دی او د اذینې فبريليشن (Af) د پاره زمینه برابره وي. اذینې فبريليشن باید په عاجل ډول کنترول شي. که چیرې کوم مضاد استطباب موجود نه وي وریدي بیتا بلاکر لکه Propranolol ۱-۲ ملي گرامه Metoprolol ۵-۲،۵ ملي گرامه او Esmolol ۲۰-۵۰ ملي گرامه انتخابي درمل دي. که چیرې بیتا بلاکر مضاد استطباب او یا اغېزمن نه وي د داخل وریدي Verapamil ۵-۲،۵ ملي گرام یا Diltiazem ۵-۱۵ ملي گرام في ساعت څخه گټه اخیستل کېږي. که چیرې د اذینې فبريليشن سره د زړه عدم کفایه هم شته وي بیا Digoxin توصیه کېږي (په پېل کې نیم ملی گرام وروسته ۰.۲۵ ملي گرام هر ۹۰-۱۲۰ دقیقې وروسته ترڅو چې ټولیز مقدار یې ۱.۲۵-۱ ملي گرام ته ورسېږي ورکول کېږي وروسته بیا ۰.۲۵ ملي گرامه د ورځې یو ځل ورکول کېږي).

د زړه او رگونو ناروغۍ.

د زړه اسکیمیک ناروغۍ.

که چېرې د Af له کبله هایپوتشن، د زړه عدم کفایه او اسکیمیا پیدا شوي وي برقی cardioversion (۱۰۰j) توصیه کیږي.

ج- سینوس بردي کار دیا

پېښی یې په سفلی احتشا کې ډېر دی او د درملو پواسطه تشدید کېدای شي چه د دوا په بندولو سره ښه کیږي. که چېرې د زړه دهاني د کموالي د علائمو سره یوځای وي. ۱-۵ ملي گرامه Atropine د ورید د لاري معمولاً کفایت کوي. موقتي Pacemaker ته نادرا اړتیا پېښیږي.

د- د انتقالیه سیستم گډوډی:

د MI په سیر کې د AV بلاک ټولې درجې پیدا کېدای شي. لومړی درجه بلاک ډیر عام دی خو تداوي ته اړتیا نلري.

دوهمه درجه AV بلاک معمولاً د Mobitz type-۱ له ډوله وي اکثره تېرېدونکی وي او یواځې هغه وخت تداوي کیږي چې اعراض ولري.

دریمه درجه یا مکمل بلاک (Complete AV Block) د سفلی احتشا په ۵۰٪ پېښو کې پیدا کیږي. معمولاً پخپله دمنځه ځي اما کېدای شي چه څو ساعتو څخه تر څو اونیو پوري دوام وکړي. که چېرې دریمه درجه بلاک د قدامی احتشا په سیر کې پیداشوی وي د مړینې کچه یې د سفلی احتشا په سیر کې د پیداشوی بلاک په پرتله ډېره زیاته ده.

که چېرې AV بلاک د بردي کار دیا لامل شوی وي، موقتي بطېنی pacing توصیه کیږي.

د نوي پیدا شوي دوه طرفه BBB، هغه BBB، چه د پرمختلونکي لومړی درجه AV بلاک سره یوځای وي او د Bifascicular block د شتون په صورت کې موقتي بطېنی pacing توصیه کیږي.

II: د بطېن د دندو خرابوالی Ventricular dysfunction

د STEMI څخه وروسته د کین بطین په انفرکت شوی او غیر انفرکت شوی سگمنت کې د شکل، سایز، او پېروالی له نظره بدلونونه رامنځته کیږي دغی پروسې ته د کین بطین Remodeling وائی چی د CHF د پیداکیدو څخه میاشتی او کلونه مخکې منځته راځي. د احتشا څخه ژر وروسته کین بطین په پراخیدو پیل کوي، په سرکې د انفرکت د ساحې د عضلې بدلونو خویدنه

د زړه او رگونو ناروغۍ.

د زړه اسکېمېک ناروغۍ.

Slippage) د میوکارډ د نورمالو حجرو تخریب اود نکروتیکي ساحی د انساجو له منځه تگ ، دانفرکت شوی برخی د نری کیدو او اوږدیدو لامل کیږي چی په پایله کی ئی انفرکت شوی ساحه پراخیږی وروسته بیا د میوکارډ هغه برخه چی انفرکت شوی نده هم اوږدیږي او توسع کوی. د بطنین غټوالی په عمومی ډول د احتشا د ساینز او ځای پوری اړه لری داسی چی په قدامی احتشا او د کینې بطنین د زرویی په احتشا کی د بطنین پراخوالی نسبتا زیات او د ډیری هیمو دینامیک گډوډی ، د زړه د عدم کفایی د پینو زیاتوالی او خرابو انزارو سره مل وي. د بطنین پرمخ تلونکی پراخوالی اود هغه کلنیکي پایلی (CHF) د ACE نهی کوونکو اونورو وازو دایلتور درملو په مټ د بدلون اومخنیوی وړدی.

که چیری EF >40% وی د زړه د پاتی والی په پام کی نیولو پرته باید ACE نهی کوونکی یا ARB درمل پیل شي.

د CHF درملنه :

په STEMI کی د CHF درملنه د زړه د حادی عدم کفائی د نورو ډولونو پشان دی. د هایپوکسیمیا مخنیوی ، Diuretic، د افتیرلو ډ کموالی ، انوتروپیک تقویه، خو د ډیجوکسین ورکړه پدی ناروغانو کی بی گټی ده. برخلاف دیورتیک درمل بی حده اغیزمن او گټور دي ځکه چی نوموړی درمل د زړه د سیستولیک او دیا ستولیک پاتی والی په صورت کی د سږو کانسجشن کموی. د فروسماید او یا بل دیورتیک وریدی زرق څخه وروسته د کینې بطنین د ډکیدو فشار ټیټ اورتوپینا او سالنډی کمیږي سره لدی نوموړی درمل باید په احتیا ط سره ورکړل شی ځکه چی کیدای شی د دورانی حجم ، قلبی دهانی ، وینی فشار او کورونری پرفیوژن د کمیدو سبب شي.

د زړه او رگونو ناروغۍ.

د زړه اسکیمیک ناروغۍ.

د نایتريت مختلف مستحضرات د پری لوړ او احتقانی اعراضو د کمولو لپاره ورکول کیږي. لکه چی مخکی یادونه وشوه ACE نهی کوونکی له احتشا وروسته د بطینی دندی د خرابوالی په درملنه کی گټور درمل دي. (۶، ۱۹)

III- کارډیوجینیک شاک Cardiogenic Shock :

هغه وخت منخته راځي چه د چپ بطین ۴۰٪ څخه زیاته برخه په MI اخته شوي وي. د MI په ۱۰٪ ناروغانو کی منخته راځي او که چیري دوامداره شي په ۵۰-۸۰٪ پیښو کی د مرگ لامل گرځي.

د اسندروم متصف دی په :

- ۱- د ویني سیستولیک فشار د 90 mm Hg څخه ښکته وي
- ۲- د محیطي دوراني عدم کفایي نښی لکه د نهایتو یخوالي، مرطوب پوستکي او سیانوزس

۳- ناروغ Dull یا مشوش حواس لري

- ۴- Oligurea یعنی د ناروغ د میتیازو جریان په یوه ساعت کی 20 cc نه کم وي
- ۵- که چیري پورتنی علامي د مایعاتو د ورکړی سره ښه نه شول ویل، کیږي چي ناروغ په کارډیوجینیک شاک اخته دی. او بهرنی کتیترایزیشن او Revascularization د ابهر دننه balloon pump support او د کتیتر په واسطه هیمودینامیک مونیتورنگ اهمات په پام کی ونیول شي.

۲۰٪ ناروغان د داخل وعایي حجم کموالی (د کانګي، زیاتی خولی، د خولي د لاري د مایعاتو کم اخستل او د دواگانو د استعمال له کبله، لري. د هایپو ولیمیا ناروغانو ته 100 cc نارمل سلاین ورکول کیږي ترڅو چه PCWP د $15-18$ ملي متره سیماب ته ورسېږي، وروسته بیا د زړه دهانی او ویني فشار لوړیدل ارزول کیږي. د پریکارد تامپوناد، د بطن چاودیدنه rupture او د ښی بطن انفارکشن هم د هایپوتنشن سبب کیږي چه باید په پام کی وي.

د زړه او رگونو ناروغۍ.

د زړه اسکیمیک ناروغۍ.

که چیرې هایپوتنشن په منځنۍ کچه (90 mmHg > سیستولیک فشار) وي او PCWP لوړ وي دیورتيک او nitroprusside ورکول کېږي.

که هایپوتنشن شدید وي ناروغ د انوتروپیک درمل او Intra aortic balloon counter pulsation (IABCP) په مټ تداوي کېږي.

Dopamine د کارډیوجینیک شاک د تداوي لپاره تر ټولو مناسب درمل دی. دا درمل د زړه په عضلي باندې مثبت انوتروپیک او Chronotropic تاثیر لري. 2 mcg/kg/min پیل او هر 5 mcg/kg/min وروسته دوز یې زیاتېږي، اعظمي مقدار یې $40\text{--}50\text{ mcg/kg/min}$ دي. 5 mcg/kg/min دوز سره پښتورگو ته د وینې جریان ښه کوي. $10\text{--}20\text{ mcg/kg/min}$ دوز سره د میوکارډ تقلصیت زیاتوي او د 8 mcg/kg/min > دوز یې قوي الفا یو اډرینرجیک اغېزه لري. همدارنګه د شاک د تداوي په منظور د ډوبوتامین، Norepinephrine او Amrinone څخه هم ګټه اخیستل کېږي. Isoproterenol او اپینفرین د پورتنی دواګانو په نسبت د رگونو لږ تقبض منځ ته راوړي د کورونری شراينو د پرفیوژن فشار نه زیاتوي. خو د میوکارډ د اکسیجن مصرف زیاتوي لدې امله د شاک په تداوي کې نادرا استعمالېږي.

که چیرې د کارډیوجینیک شاک ناروغ د پورتنی تداوي سره ژر ځواب ورنکړي IABCP توصیه کېږي. دا یو ډول بالون دی چه د زړه د پمپ په دنده کې مرسته کوي. د کټیتر په نوک کې تشیت او د فخذی شریان د لاري ابهر ته تنه ایستل کېږي. نوموړي بالون د دیاستول په پیل کې په اتوماتیک ډول د هوا څخه ډکېږي چه ددې په نتیجه د اکلیلی وینې جریان او محیطي پرفیوژن ښه کېږي. د سیستول په پیل کې بالون بیرته د هوا څخه تشېږي چه له امله یې افتېرلوډ کمېږي.

IV-د میوکارډ او د بطېناتو تر منځ د پردی رېچر:

د احتشا خطرناک او وژونکي اختلالات دي چي د زړه د تامپوناډ او په خو دقیقو کې د مرګ سبب ګرځي.

د زړه اورگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

V- د حلبموي (papillary) عضلاتو د دندې خرابوالی او رېچر

پدې حالت کې د مایترل د دسام د ناڅاپه او شدید عدم کفایي له امله کېدای شي په ناروغ کې د سږو اذیم او یا شک حالت پیدا شي.

د زړه په فزیکي معاینه کې لوړ اواز سیستولیک مرمر او د زړه دریم غږ اوریدل کېږي قطعي تشخیص د ډاپلر ایکو پواسطه ایښودل کېږي.

د حلبموي عضلاتو د رېچر او د بطنیانو تر منځ د پردې رېچر په صورت کې Nitroprusside او IABCP توصیه کېږي چه ددې عمل په پايله کې شنت او عدم کفایه کمیږي خو بنسټیزه درملنه یې جراحي ده.

VI- پریکارډایټس Pericarditis:

د ناروغۍ په هر پړاو کې پیدا کېدای شي خو پېښې یې د ناروغۍ په دوهمه او دریمه ورځ کې زیات وي. ناروغ داسې وایي چې د مخکني درد ترڅنګ بېل درد پیدا شوي چې د سا اېستلو اود وضعیت د بدلون سره اړیکه لري. په اعضا کې کېدای شي پریکارډیل friction rub واوریدل شي. زیاتره درملنې ته اړتیا نلري. که چیرې اړتیا وي اسپرین ۲۵۰ ملي گرام هر ۴-۲ ساعته وروسته یا اندومیتاسین ۲۵mg/۲-۸ hr د درد د غلې کولو لپاره ورکول کېږي. پدې ناروغانو کې باید د انتی کواګولانت درمل د کارولو څخه ډډه وشي ځکه چې د هیموراژیک پریکارډایټس لامل کېږي.

VII- ترمبوامبولیزم:

داخل قلبي ترمبوز او ترمبوفلیباټس په نتیجه کې منځ ته راځي. که چیرې امبولي د بني بطين او محيطي وريدونو څخه سرچینه واخلي سږو ته راځي اود سږو د انفارکشن لامل گرځي. که امبولي د چپ بطين څخه سرچینه واخلي په دماغ ، پښتورگو او نهایتو کې د امبولي لامل گرځي. Mural ترومبوز په پراخه قدامی احتشا کې ډېر عمومیت لری. د هیپارین سره انتی

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

کواگلیشن چی د لنډې مودې (۳ میاشتې) Warfarin سره تعقیبېږي د امبولی ډېری پېښې را کمه کړي. او د پراخه قدامی احتشا په ټولو پېښو کی باید ورکړ شي.

VIII - د احتشا خځه وروسته انجنېنا (Post Infarction Angina)

د STEMI په نږدې ۲۵% ناروغانو کې د اسکیمیا تکراری حملې پیدا کېږي. په زیاتره ناروغانو کې د ترمبولایتیک درمل د کارولو سره سره په شریان کې تنګوالی پاتې کېږي چه دا وروسته د انجنېنا لامل ګرځي. څرنګه چی د اسکیمیا تکراری او ټینګاريزی حملې د احتشا د پراخه کېدو یا بیا ځلې احتشا خبرداری ورکوي او له STEMI وروسته د مړینې پېښې نژدې دری چنده زیاتوالی سره یوځای وي. نو له دی امله نوموړې ناروغان باید کورونری انجیوګرافي او میخانیکي revascularization ته واستول شي. (۱۹، ۲۱)

XI - هایپو ولیمیا Hypovolemia :

دا په اسانۍ سره د درملنې وړ اختلاط دی. د لاندې لاملونو له کبله پیدا کېږي :

- له پخوا خځه د دیورتیک کارونه

- د ناروغۍ په لومړیو پړاونو کې د مایعاتو لږه اخیستنه

- د درد یا درمل له کبله کانګی

په STEMI ناروغ کی له پرمختللي درملنې مخکی باید هایپو ولیمیا تشخیص او تداوی شي

X : د بنې بطين انفارکشن :

د سفلی احتشا ۳/۱ ناروغان لږ تر لږه د بنې بطين کمه کچه نکروز لري. د کینې بطين د سفلی خلفی برخې د احتشا په ځینې ناروغانو کی هم د بنې بطين پراخه احتشا شته وي. نادراً د زړه احتشا په ابتدائی ډول بنې بطين پوری محدودوي. د بنې بطين د څرګند انفارکشن کلنیکي څرګندونې عبارت دی له : د غاړې د وریدونو توسع ، Kussmauls Sign ، هیپاتو میګالی او هایپوتنشن .

د زړه اورگونو ناروغۍ.

د زړه اسکیمېک ناروغۍ.

په ECG کې په ښې پریکارډیډل لیدونو په تیره V_{mR} کې د ST سگمنت لوړوالی زیاتره په لومړیو ۲۴ ساعتو کې لیدل کېږي ۲D ایکوکارډیوگرافي او د زړه د ښې خوا کټیترایزیشن ناروغ ته د ښې بطن د کافی پری لوی د ساتلو د پاره مایعات ورکول کېږي. همدارنګه د کین بطن د کار د ښه کولو ترڅنګ د PCWP او پلمونری شریان د فشار ټیټولو ته هڅه وشي. (۲۱، ۱۹)

ب- موخراختلاطات

۱- د احتشا څخه وروسته سندروم یا Dressler syndrome: د MI د پېل څخه ۱-۲ اونۍ وروسته منع ته راځي او په تبه، Pleuritis او Pericarditis متصف ده، د ناروغي د علت په اړوند اتوآمونیټي ته فکر کېږي چې د اسپرین او کورټیکو سټیروید سره ښه ځواب واي. Dressler's syndrome هم د pericarditis د نورو ډولونو په شان تداوي کېږي خو که چیري NSAID اغېزمن نه وو، کورټیکو سټیروید د لنډې مودې لپاره ورکول کېږي.

۲- بطنې انیوریزم: د وځیم او پرمختللي هیموډېنامیک ګډوډیو، د زړه د عدم کفایي، ترمبو-امبولیزم او بطنې اریتمیاوو لامل ګرځي. په ECG کې د دوامداره S T elevation پواسطه پیژندل کېږي او یواځني تداوي یې جراحي عملیات دي.

انترارPrognosis:

د MI نژدی څلورمه برخه ناروغان د احتشا د پېل په څو لومړیو دقیقو کې مري. د مړینې نیمایي پېښې د اعراضو د پېل په لومړیو ۲۴ ساعتو کې پېښېږي. ۴۰٪ اخته وګړي په لومړي میاشت کې مري. لومړنۍ مړینه معمولا د اریتمیا له کبله وي مګر وروسته انترار د میوکارډ د تخریباتو پورې اړه نيسي. د کین بطن د دندو خرابوالي، د زړه بلاکونه او د ټینګاريزی بطني اریتمیا شتوالی د MI خراب انترار ښي. د قدامی احتشا انترار د سفلی احتشا په پرتله خرابه ده. BBB او د انترایمونو د کچې لوړوالی د میوکارډ د خپل شوي برخې پراخوالی ښيي. د عمر زیاتوالی، ټولنیز ګوښه توب او روحی فشارونه هم د میوکارډیل انفارکشن له کبله د مړینې پېښې زیاتوي.

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمېک ناروغۍ

د هغه ناروغانو څخه چه د حادي حملي څخه روغ وتلی وي ، له ۸۰% څخه زیات یی د یو راتلونکي کال، ۷۵% یی د ۵ کالو پوري، ۵۰% یی د ۱۰ کالو پوري او ۲۵% یی تر ۲۰ کالو پوري ژوندی پاته کیدای شي.

د Killip د ویش په اساس د زړه د تقلصی دندی او انزارو له مخي د MI ناروغان په لاندې څلورو ډلو باندي ویشل کیږي:

۱. په لومړی کلاس کي هغه کسان گډون لری چه په هغوي کي د سږو او وريدي احتقان علایم موجود نه وي.

۲. ددې کلاس ناروغان د زړه منځنۍ کچه عدم کفایه لري چه د سږو په قاعده کي رال اوپه زړه کي ۳ گلوپ ، Tachypnea ، اود بنی زړه د عدم کفائي علامی (لکه وريدي او د ځیگر کانجسشن) په مت پیژندل کیږي.

۳. پدې کلاس کي هغه ناروغان گډون لری چه د زړه په شدید عدم کفایه اوپلمونری اډیما اخته دي.

۴. دا ناروغان په شک کي وي. سیستولیک فشار د ۹۰ څخه کم د محیطي رگونو تقیض، سیانوز او Oligourea شته وي.

د Killip د ویشنی د اختراع په وخت کي په روغتون کي د مړینی کچه د نوموړي ویش مطابق په لاندې ډول وه : په لومړي کلاس کي ۵% په دوهم کي ۱۰-۲۰% په دریم کي ۳۵-۴۵% او په څلورم کي ۸۵-۹۵% . خو اوس د درملنی د نوي میتودو څخه په گټه اخیستلو سره مړینه په هر کلاس کي له دریمی برخې څخه تر نیمايي پوري لږه شوي ده.

له احتشا وروسته د خطر ارزونه او اهتمامات

Post Infarction Risk Stratification and Management

یو شمیر کلینکي فکتورونه د STEMI د لومړنۍ رغیدني څخه وروسته د زړه او رگونو د ناروغۍ د خطر د زیاتوالي ښکارندوي دي. د ځیني ډیر مهمو فکتورونو څخه یی په لاندې ډول یادونه کېږي:

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

- ۱- ټینګاریزه (persistent) اسکیمیا
 - ۲- د کېنې بطن ایجیکشن فرکشن $> 40\%$
 - ۳- په فزیکي معاینه کې د سږو د قاعدې څخه پورته رالونه او یا د ګوګل په راډیوګرافي کې د کانجسشن شتون .
 - ۴- عرضي بطني اريتمیا
نور فکتورونه چې د خطر د زیاتوالي سره یو ځای وي په لاندې ډول دي :
 - ۱- د MI پخواني تاریخچه
 - ۲- عمر د > 75
 - ۳- دیابت
 - ۴- اوږد مهاله (Prolong) سینوس تکی کار دیا
 - ۵- هایپوټنشن
 - ۶- د دمۍ په حال کې د ST د سګمنت بدلونونه پرته له انجینا څخه (Silent Ischemia)
 - ۷- د انفارکت اړونده اکلیلې شریان نه خلاصیدنه (که چېرې انجیوګرافي اجرا شوي وي)
 - ۸- په ایکو کې د زړه ټینګاریزه او پرمختللي بلاک او یا نوي داخل بطني بلاک .
- د خطري فکتورونو درملنه د خطري فکتور د نسبي ارزښت په پام کې نیولو سره ترسره کېږي . د STEMI د رغیدنې وروسته د بیا ځلې انفارکشن او مړینې د مخنیوي لپاره ځینې ارزونې ترسره کېږي . د بیلګې په توګه په سټېبل ناروغانو کې د روغتون څخه له خارجیدو مخکې Exercise Stress Submaximal تست د پاتې اسکیمیا او د پټ بطني اريتمیا د احتمالي شتون لپاره ترسره کېږي . همدارنګه اعظمي تمریني سترس تست هم د MI څخه ۴-۶ اونی وروسته توصیه کېږي . ایکوکارډیوګرافي او راډیو نوکلایډ وینټریکولوګرافي د کین بطن د دندو د ارزونې لپاره ترسره کېږي .
- لاندې ناروغانو ته چې د بیا ځلې احتشا او مړینې تر لورې خطر لاندې دي د زړه کټیترایزیشن او یا پرمختللي الکټرو فزیا لوژیک ارزونه توصیه کېږي :

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

۱- هغه ناروغان چې د نسبتاً لږ فعالیت سره انجینا پیدا کوي .

۲- په Perfusion Imaging کې لوي ډیفیکټ ولري .

۳- EF بې ټیټ وي .

۴- هغه چې د فزیکي تمرین سره عرضي بطني اریتمیا پیدا کوي.

په زیاتره روغتونونو کې دی ناروغانو ته د زړه د بیا رغوني پروگرام جوړېږي. چې له مخې یې فزیکي تمرین په روغتون کې پیل او د روغتون څخه له خارجیدو وروسته دوام مومي. نوموړي پروگرام پوهنیزه برخه هم لري چې پکې ناروغ ته د ناروغۍ د خطري فکتورونو په هکله اړین معلومات ورکول کېږي. په غیر اختلاطي STEMI کې په روغتون کې د بستریکو دودیزه اندازه پنځه ورځې ده او د رغیدو (Convolcent) پاتې موده په کور کې تیروي .

دوهمي یا ثانوي وقایه (Secondary Prevention)

د یو Antiplatelete درمل (معمولاً اسپرین) سره اوږد مهاله درملنه تکراري انفارکشن ، ستروک او کارډیو واسکولر مړینه ۲۵% کموي. سربیره پردې هغه ناروغان چې اسپرین کاروي پدوي کې STEMI نسبتاً کوچني او ډیر امکان لري چې No Q Wave وي .که چیرې اسپرین مضاد استطباب وي ښه بدیل یې کلوییدوگرل دی چې ۷۵ ملی گرامه د خولې له لارې ورکول کېږي. څیړنو ښودلې ده چې Warfarin د احتشا څخه وروسته د بیا ځلي انفارکشن او مړینې پیښې کموي . همدارنګه د ټیټ دوز اسپرین (۷۵-۸۱ ملی گرامه) او وارفیرین ګډ کارول (چې $INR > 2$ وساتل شي) د یواځې اسپرین په پرتله د تکراري انفارکشن او امبولیک CVA په مخنیوي کې ډیر اغیزمن دي. خو د ګډې درملنې سره د وینه بهیدنی خطر زیاتېږي . د اسپرین او کلوییدوگرل ګډ کارول په NSTEMI او بې ثباته انجینا ناروغانو کې د تکراري MI او مړینې د خطر د کمولو د ستراتیژي مهمه برخه ده. لاندې ناروغانو ته تر ناڅرګندی مودی پورې ACE منع کوونکی ورکول کېږي :

۱- د زړه عدم کفایه

د زړه اورگونو ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ

۲-د EF منځني کچه ټیټوالی .

۳- Regional Wall Motion Abnormality .

بېتا بلاکر: لږ تر لږه تر دوه کالو پوري د بېتا بلاکر کارونه د STEMI ناروغانو ټولیزه مړینه ، ناڅاپي مړینه او په ځینو پیښو کې د بیا ځلې انفارکشن پېښی کموي. خو کلسیم اتاګونیست درمل د دوهمې وقایې لپاره نه ورکول کیږي. د اتیروسکلروز رسک فکتورونه باید د ناروغ سره مطرح او که شونې وي تداوي شي. د تنباکو پرېښودنی ، همدارنګه د هایپر تنشن او هایپر لیپډیما ($\text{Targe LDL} < 100 \text{ mg/dl}$) کنترول ته باید هڅه وشي. سربېره پر دې ناروغ باید د فزیکي تمرین زیاتوالی او د روحي فشارونو کمولو ته وهڅول شي. (۱۹)

د زړه او رگونو ناروغۍ

درگونو د لوړ فشار ناروغۍ

خلورم فصل

درگونو د لوړ فشار ناروغي

Hypertensive Vascular Disease

يوه دود پزه روغتيايي ستونزه ده چې زياتره بي گيلو وي. اسانه تشخيص او اکثراً په اسانۍ د درملنې وړ وي. خو که چيرې درملنه ئې ونه شي په ډېرو پېښو کې د ځينې وژونکي اختلاط تلامل کېږي.

تعريف – د شرياني وينې د فشار هغه اندازه لوړوالي چې د Target organ damage د خطر د زياتيدو لامل شي. يا په بل عبارت د وينې د فشار هغه اندازه لوړوالي چې د شبکې، دماغ، زړه او پښتورگو د رگونو د افاتو خطريات کړي هايپر تېشن بلل کېږي. (۱۱)

نوموړې کچه $140/90 \text{ mmHg}$ منل شويده. يعنې که د يو کاهل شخص د وينې فشار $140/90 \text{ mmHg}$ يا د دې څخه لوړ شي، پدې شرط چې نوموړي څوځلي معينه او د معياني په وخت کې په پوره استراحت کې وي، نو ويل کېږي چې نوموړي کس په هايپر تېشن اخته دی.

د لوړ فشار د زړه او رگونو د ناروغيو د خطر په زياتيدو کې نه يواځې د ياستوليک فشار بلکه سيستوليک فشار، عمر، جنس، توکم او د نورو ناروغيو شتون هم رول لري. د بيلگې په توگه که د يو شمير ناروغانو د ياستوليک فشار 90 mmHg څخه لوړ وي او د نوموړو ناروغانو درملنه په سمه توگه وشي د دوی په مړينه او معيوبيت کې به څرگند کموالی راشي. نو پدې بنسټ نوموړي ناروغان په هايپر تېشن اخته او د درملنې وړ گڼل کېږي. د سيستوليک فشار کچه هم مهمه ده. حتي د ځينو څېړنو پايلې سيستوليک فشار د ياستوليک فشار د لوړوالي په پرتله د C.V.S خطر په زياتيدو کې ډير مهم گڼي. (۱۹)

د بيلگې په توگه يونارينه چې د ياستوليک فشار نړي نورمال او سيستوليک فشار نړي لوړ (150 mmHg) وي د زړه او رگونو د ناروغيو له کبله د مړينې کچه ئې د هغه چاپه پرتله چې د ياستوليک او سيستوليک فشارونه ئې نورمال وي دوه نيم ځله زياته ده.

دزړه اورگونو ناروغۍ.

درگونو دلوې فشار ناروغۍ.

د عمر، جنس او نژاد له پلوه هايپرتينشن په يوځوان، تور پوستي، نارينه ناروغ کي خراب انزال لري. د يوشکمن هايپرتينشن ناروغ د ويني فشار بايد لږ تر لږه دوه ځلي په جلا وختونو کي وکتل شي (۱۹).

پېښۍ:

د هايپرتينشن پېښي (Prevalence) نظرد ټولني توکميز جوړښت اود لوړ فشار تشخيصه معيارونو ته توپير لري. د نړۍ د کاهل نفوس څلورمه برخه (د امريکا په متحده ايالاتو کي ۶۰ ميلونه او په ټوله نړۍ کي يو بليون) وگړي په هايپرتينشن اخته دي. د هايپرتينشن پېښي د عمر په زياتيدو سره زياتيږي. په پنځو کي د شرياني لوړ فشار پېښي د عمر سره نږدې اړيکه لري اود لوړ فشار پېښي د ۵۰ کلني څخه وروسته زياتيږي. د دوهمي يا ثانوي لوړ فشار د پېښو دقيقه سلنه نه ده معلومه خو په منځني عمر کي ئي پېښي ۷% سلنه ښودل شوي ده. او په پرمختللي مراکزو کي چي د پراخه لابراتواري ازموينو شونتيا لري دغه سلنه ۳۵ ته لوړيږي.

د هايپرتينشن وېش:

I- سيستوليک هايپرتينشن چي د پراخه Pulse pressure سره مل وي.

۱- اتيروسکليروزيس

۲- د ستروک واليم زياتوالي (د ابهر عدم کفايه، تايروتوکسيکوزيس، تبه، شرياني وريدي فستول او PDA).

II- سيستوليک اودياستوليک لوړ فشار (د محيطي رگونو مقاومت زياتوالي)

الف: د پښتورگو د ناروغيو له کبله د فشار زياتوالي (Renal hypertension):

۱- ځنډني Pyelonephritis

۲- Glumerolonephritis

۳- د پښتورگو پولي سيستیکه ناروغي.

درگونو دلوې فشار ناروغۍ.

دزړه اورگونو ناروغۍ.

۴- د پښتورگو درگونو تنګوالۍ اود پښتورګي انفارکشن

۵- ډايبيټيک نفروپټي

۶- رينين توليدونکي تومورونه

ب: اندوکراين:

الف- د خولي د لاري د حمل ضد درمل اخيسته

ب- Adrencortical Hyperfunction

دکوشنگ ناروغي اوسندروم ، Priming Hyperaldosteronism ، فيوکروموسايټوما.

ميگژوډيما ، اکروميگالي

ج- نيوروجينیک :

سايکوجينیک ، Polyneuritis ، Diencephalic Syndrome ، د داخل قهفي فشار بېرني

زياتوالي ، د نخاع غوڅېدل.

د- متفرقه لاملونه:

د ابهر کواريټشن ، د داخل وعاني د حجم زياتوالي (Polycythemia) پولی ارترايټس نودوزا ،

هايپرکلسيميا او دواګاني لکه ګلوکوکورتيکويډ او Cyclosporine

ه- ناپيژندل شوي لاملونه

۱. پرايمری هايپرتينشن

۲. د حاملګي توکسيميا

۳. Acute intermittent porphyria

غير ثابته لوړ فشار Labile Hypertension : پدی حالت کې د وينې فشار اکثراً نورمال خو

کله کله د لوړ فشار سرحد ته رسيږي.

دوامداره لوړ فشار Sustained Hypertension : پدی حالت کې د وينې فشار په دوامداره

توګه لوړوي. که چيرې نوموړي ناروغان تداوي نه شي د وينې فشار کيدای شي Accelerated

يا خبيث پړاوت ته پرمختګ وکړي .

دزړه اورگونو ناروغۍ.

درگونو د لوړ فشار ناروغۍ.

خبیث هایدروتنشن: پدې حالت کې فشار معمولاً د ۲۰۰/۱۴۰ ملي متر سیماب څخه لوړ او د شبکې وینه بهیدنه , Pupil edema او اغزودات سره یوځای وي .

تشديد شوی لوړ فشار Accelerated Hypertension : که چیرې د وینې فشار د پخواني لوړې اندازې څخه ناڅاپه نور هم لوړ شي او په فندوسکوپي معاینه کې د شبکې درگونو بدلونونه پرته د حقيقي د اذیمه څخه منځته راشي د اکسلریتد هایدروتنشن پنوم یادېږي.

بحرانی لوړ فشار Hypertensive Crisis: پدې حالت کې اکسلریتد هایدروتنشن د زړه او رگونو د ستونځو (Sequel) سره یوځای وي

د سپینې چینې لوړ فشار White Coat Hypertension: پدې حالت کې د وینې فشار ډاکتر ته د مراجعې په وخت کې د سترس له کبله لوړېږي.

۱-۳ جدول : د شدت له مخې د لوړ فشار وېشنه (۱۴، ۲۱)،

ډله	سیستولیک فشار (mmHg)	ډیاستولیک فشار (mmHg)
برابر (Optimal)	<۱۲۰	<۸۰
نورمال	<۱۳۰	<۸۵
لوړ نورمال	۱۳۰-۱۳۹	۸۵-۸۹
لومړنۍ پړاو (خفیف) هایدروتنشن	۱۴۰-۱۵۹	۹۰-۹۹
دویم پړاو (منځنۍ) هایدروتنشن	۱۶۰-۱۷۹	۱۰۰-۱۰۹
دریم پړاو (شدید) هایدروتنشن	>۱۸۰	>۱۱۰
ایزولیتید سیستولیک هایدروتنشن	>۱۴۰	<۹۰

یادونه: د وینې د فشار پورتنی ویش دهغه وگړو د پاره دی چی عمر ونه بې د ۱۸ کالو څخه زیات ، د فشار ضد درمل ئې نه وي اخیستی او کومه حاده ناروغي هم ونه لري . که په پورتنی

دزپه اورگونو ناروغی.

درگونو دلوپ فشار ناروغی.

ویش کي دناروغ سیستمولیک او یا دیاستولیک فشار په دوه جلا ډلوکي راشي لوړ ډله ئي په پام کي نیول کیږي.

پتوجنیزیس:

I: ابتدايي هایپر تینشن: Primary Hypertension

لکه د نوم څخه ئي څرگند دی په پرایمري (Idiopathic, Essential) هایپر تینشن کي کوم مسول لامل شتون نلري. د لوړ فشار ۹۵٪ پيښي تشکيلوي. د اساسي هایپر تینشن پیل معمولاً د ۲۵-۵۵ کلني ترمنځ وی. او د ۲۰ کلني څخه مخکي عمر کي غیر معمول دی. د اساسي هایپر تینشن په پتوجنیزیس کي بیلابیل فکتورونه رول لري چي په لاندی ډول ورڅخه یادونه کېږي:

۱: ارثیت: ارثیت د اساسي لوړ فشار په منځته راتگ کي مهم رول لري. هغه وگړي چي په لوړ فشار اخته والد پښوڅخه زیږیدلي وي د هغه وگړو په پرتله چي مېندی او پلارونه ئي لوړ فشار لری، په هایپر تینشن د اخته کیدو ډېر چانس لري.

۲: محیطي فکتورونه: یوشمیر محیطي فکتورونه لکه د مالگي زیات کارول، چاغوالی، دنده، الکولیزم اونور د اساسي لوړ فشار په پتوجنیزیس کي رول لري. د اساسي لوړ فشار ۲۰ سلنه ناروغان د مالگي په وړاندی حساس دی یعني په خورا کي توکو کي د مالگي په کمولو سره ځواب وائی.

د مالگي زیاته کارونه په یواځي توگه نشي کولي چي د لوړ فشار لامل شي. د مالگي زیات لگښت په هغه کسانو کي چي د ارثیت له پلوه مساعد دی د لوړ فشار لامل کیږي.

۳: سمپاتییک اعصابو د فعالیت زیاتوالی: په ځوان لوړ فشار لرونکو ناروغانو کي ډیر څرگند وي. او زیاتره د غېر ثابت لوړ فشار لامل کیږي. پدی ناروغانو کي د پلازما د کتیکولامینو کچه هم لوړه وي. گمان کېږي چي د Baroreflex د حساسیت کموالی. د ادرینرژیک فعالیت د زیاتوالي اولوړ فشار مسول وي.

۴: رینین انجیوتینسین سیستم: رینین یو پروتئولایتیک انزایم دی چي د J.G- Apparatus څخه د یوشمیر هڅونو په وړاندی افرازیږي چی عبارت دي له:

دزړه او رگونو ناروغۍ.

درگونو دلوې فشار ناروغۍ.

۱: د پښتورگود پرفيژن د فشار کموالي.

۲: د رگونو دننه د حجم کموالي.

۳: په دوران کي د کتيکولامينونو شتون.

۴: د سمپاتيک اعصابو د فعاليت زياتوالي.

۵: هايپو کليميا.

رينين په Angiotensinogen باندې اغيزه کوي او هغه په انجيوتنسين I بدلوي او دا د Angiotensine Converting انزايم په شتون کي په انجيوتنسين II بدليږي چي وروستي بيا قوي Vasoconstrictor اغيزه لري او د دوستيرون افرازهځي.

سره لدې چي نوموړي سيستم د فشار په تنظيم کي مهم رول لري خو په زياتره پيښو کي د اساسي لوړ فشار په پتوجنيزيس کي کيداي شي بنسټيز رول ونه لوبوي.

په لوړ فشار لرونکو تور توکمو ناروغانو او زړو خلکو کي د پلازما د رينين فعاليت کم وي. د لوړ فشار ۱۰ سلنه ناروغانو د پلازما رينين کچه لوړه ، ۲۰ سلنه نارمل او ۳۰ سلنه ناروغانو د پلازما د رينين کچه ټيټه وي.

۵: د حجري دننه کلسيم اوسودېم: په اساسي لوړ فشار کي د وينې او نورو انساجو په حجرو کي د کلسيم کچه لوړه وي چي دا کيداي شي د $Na^{+}-K^{+}$ Exchange او د سودېم د لېږدوني نورو ميخانيکيتونو د خرابوالي له کبله وي.

په حجره کي د سودېم زياتوالي، د حجروي کلسيم د زياتوالي لامل کيږي چي دا وروستي حالت د رگونو د ملسا عضلاتو د تون د زياتوالي لامل کيږي.

۶: د انسولين په وړاندې ټينگار: په وينه کي د انسولين د کچي لوړوالي په لاندې څلورو ميخانيکيتونو د فشار د لوړوالي لامل کيږي:

۱: Renal sodium retention زياتوالي.

۲: د سمپاتيک فعاليت زياتوالي.

۳: د رگونو د ملسا عضلاتو هايپرتروفي د انسولين د Mitogenic اغيزو له امله.

۴: د حجروي ديوال د لاري د آيونو په لېږد پدنه کي بدلون پيداکيږي (۱۴، ۱۹).

دزېه اورگونو ناروغۍ.

درگونو دلوې فشار ناروغۍ.

تشديدونکي فکتورونه:

لاندې فکتورونه لوړ فشار ته مساعدو وگړو کې د فشار د زیاتیدو لامل کیږي:

۱: چاغوالي: په چاغو خلکو کې د رگو دننه حجم او د زړه دهانه (Out put) زیات وي اوشاید د وینې د فشار په لوړیدو کې مرسته وکړي. پدې خلکو کې د وزن کمیدل د وینې د فشار په کنترول کې مرسته کوي.

۲: د سودېم اخیستل: د لوړ فشار ۲۰٪ سلنه ناروغان د مالګې په وړاندې حساس دی او په غذا کې د مالګې کمول (۲ ګرامه) د فشار په کنترول کې مرسته کوي.

۳: الکول: الکولو زیات ځکل هم د فشار د لوړیدو لامل کیږي. چې کیدای شي د کتیکولامينونو د کچې د زیاتوالي له امله وي. هغه خلک چې د ۴۰ ګرامه څخه زیات ایتانول ځکی په دوي کې د فشار کنترول ستونزمن وي.

۴: د سگریټو ځکول: د سگریټ ځکول د وینې فشار په چټک ډول د نارایيې نیفرین د افراز د هڅولو له کبله لوړه وي.

۵: تمرین: په غیر فعاله وگړو کې ایروبیک تمرین د فشار په کنترول کې مرسته کوي.

۶: پولی سایټیمیا Polycytemia: د وینې د غلظت د زیاتوالي له کبله کیدای شي فشار لوړ کړي.

۷: د التهاب ضد غیر سټیرویدی درمل NSAIDs: د ۵mmHg په اندازه د وینې فشار لوړه وي او په لوړ فشار کې د کوښښ وشي چې ونه کارول شي.

II: دوهمې یا ثانوي هايپرټنشن Secondary Hypertension

الف: د پښتورګي د ناروغیو له کبله هايپرټنشن:

A: Renal Parenchymal Hypertension: د پښتورګو ټول پړانشیمي افتونه د لوړ فشار لامل کیږي. پدې ناروغانو کې د وینې د فشار په لوړیدو کې بیلابیل فکتورونه ونډه لري. چې مهم ئي د رگونو داخلي حجم زیاتوالي او د R.A.A سیستم د فعالیت زیاتوالي دی نور ممکنه لاملونه یې عبارت دی له:

۱: په پښتورګو کې د ناپیژندل شوي وازو پریسور موادو تولید.

دزړه او رگونو ناروغۍ.

درگونو د لوړ فشار ناروغۍ.

۲: د وازودايليتور موادو لکه پروستاگلاندين او Bradykinin د توليد کميدل.

۳: د پښتورگو په واسطه د دورانې Vasopressor موادو نه غیر فعاله کيدل.

B: د پښتورگي د وعایې ناروغيو له کبله هايپر تېشن Renal vascular hypertension:

په ځوانانو کې د پښتورگي د رگونو د تنگیدو مهم لامل Fibromuscular Hyperplasia دی، او په زړو خلکو کې د پښتورگو اتيروسکلېروزيس يې غوره لامل گڼل کېږي. په دې ډول لوړ فشار کې د رگونو د تنگوالي له کبله د پښتورگو د وينې جريان کمېږي او د RAA د سيستم د فعاليت له کبله فشار لوړېږي. په لاندې حالاتو کې بايد د رينل واسکولر هايپر تېشن لپاره لږ اتواري پلټنې وشي:

۱: که چېرې لوړ فشار د ۲۰ کلنې څخه مخکې او يا د ۵۰ کلنې څخه وروسته عمر کې پيدا شوي وي.

۲: که چېرې د بطن په اصغاکي د پښورگو د شريان Bruit واوريدل شي.

۳: که چېرې د ابهر او يا نورو محيطي شراينو د اتيروسکلېروزيس بيلگې شته وي.

۴: که چېرې د ACE-I د کارولو څخه وروسته د پښتورگي دندې ناڅاپه خرابې شي.

ب: اندوکرايني لوړ فشار Endocrine hypertension

۱: ادرينال هايپر تېشن:

الف: لومړنۍ هايپرالدوستېرونېزم (Primary Hyperaldosteronism): د الدوستېرون د زيات افراز له کبله سوډيم په بدن کې راټولېږي او دا بيا د هايپر تېشن لامل کېږي. پدې ناروغانو کې هايپوکلېميا او د پلازما رينين کچه کمه وي. نوموړې ناروغي د تومور او يا دوه طرفه ادرينال هايپر پلازما له کبله منځته راځي.

ب: کوشنگ سندروم: پدې ناروغي کې د گلوکوکورتيکويډونو د زيات افراز له کبله د سوډيم تراکم او د فشار لوړوالی پيدا کېږي. له بلي خوا داسې هم ويل کېږي چې گلوکوکورتيکويډ د رينين سبستريت (Angiotensinogen) افراز هڅوي.

ج: Pheochromocytoma: پدې ناروغي کې د کتيکولامينونو د ډېر افراز له کبله د محيطي رگونو تقبض او هايپر تېشن پيدا کېږي.

دزېه اورگونو ناروغۍ.

درگونو دلوې فشار ناروغۍ.

۲: Hypocalcemia د هايپرپاراتايرويډيزم په ۱/۳ ناروغانو کي هايپرتينشن شتون لري چي لامل يي زياتره د پښتورگو ډبرې ، نفروکلکسينوزس، او Hypercalciurea دی. په هايپرپاراتايرويډيزم کي کله چي هايپرکلکسيميا اصلاح شي د وينې لوړ فشار هم اصلاح کيږي. په هايپرپاراتايرويډيزم کي د وينې د کلکسيم لوړوالي د فشار د لوړيدو لامل کيږي او په خوږه کي د کلکسيم زيات کارول د وينې فشار ټيټوي. له بلي خوا کلکسيم کانال بلاکډ د فشار ضد اغيزمن درمل دی. پدې نسبت نورو څيړنو ته اړتيا ده چي ترڅو د کلکسيم رول په هايپرتينشن کي پوره څرگند شي. (۱۹، ۲۱)

۳: د خولې له ليارې د حمل د مخنيوی درمل Oral contraceptive هغه ښځي چي د خولې د لاري د حاملگي ضد درمل اخلي، د دوی په ۵٪ کي د وينې فشار ۱۴۰/۹۰ mmHg څخه لوړيږي. پدې ناروغانو کي د RAAS د فعاليدو له کبله د دوراني حجم زياتوالی، د رگونو تقبض او هايپرتينشن پيداکيږي. د حاملگي ضد درمل په خپل جوړښت کي ايسټروجن لري چي دغه ماده په ځيگر کي د انجيوټنسينوجن جوړيدل هڅوي، چي په پايله کي د انجيوټنسين II جوړيدل زيات او د وينې فشار لوړيږي. داچي ولي ځيني ښځي چي د حاملگي ضد درمل اخلي په هايپرتينشن اخته کيږي او ځيني نه اخته کيږي، پوره روښانه نده څو کيداي شي د لاندې لاملونو پوري اړه ولري:

۱: Angiotensin-II په وړاندې د رگونو د حساسيت زياتوالی.

۲: پښتورگو کمه ناروغي (Mild Renal Disease)

۳: د وينې د لوړ فشار کورنی تاريخچه.

۴: له ۳۵ کالو څخه د عمر زياتوالی.

۵: چاغوالي.

دزړه اورگونو ناروغۍ.

درگونو دلوې فشار ناروغۍ.

د هايپر تېشن اغېزې (Effects of Hypertension)

هايپر تېشن د اتيروسکلېروزيس د خطريو مهم فکتور دی. همدارنگه د زړه د پاتي والي ، د اکليلی شريانونو ناروغۍ ، ستروک ، پښتورگو ناروغۍ او د محيطی شريانونو ناروغۍ د منځته راتگ لپاره لار هواروي.

زړه

هايپر تېشن په لومړيوکي دلوې فشار له کبله د زړه دکارزياتوالي د کيڼ بطن Concentric هايپر تروفي پوسيله معاوضه کيږي. چي د بطن د ديوال د پيروالي د زياتيدو پواسطه ځانگړي کيږي. بالاخره دلوې فشار د دوام له کبله د بطن دندې خراب او بطن پراخه کيږي او د زړه د عدم کفائي اعراض او علايم څرگندېږي. د چپ بطن هايپر تروفي د هايپر تېشن داکثره زړه اړونده اختلاطاتو لکه CHF، بطني اريتميا، مايوکارډيال اسکيميا او ناڅاپي مړيني لامل گرځي او يا ورته زمينه برابروي.

دهايپر تېشن له کبله دکيڼ بطن هايپر تروفي ددرملنې سره بيره دگرځيدو وړې او دسيسټولېک فشار د کميدو سره نږدې اړيکه لري.

ديوريتيک درمل دنوروفشار ددرملو په پرتله دچپ بطني دحجم په کميدوکي ډيره مرسته کوي.

دکيڼ بطن دهايپر تروفي له کبله دزړه دعضلي داکسيجن اړتيا زياتيږي اوله بلي خواهايپر تېشن د اتيروسکلېروزيس پروسه گړندۍ کوي نو پدې بنسټ پدې ناروغانو کي IHD پيدا کيږي.

په فزيکي معاينه کي زړه غټ شوي وي او کيڼ بطن Impulse بارز وي. دابهر دسام د تړل کيدو غږ لوړ او دابهر دعدم کفائي له امله يو خفيف مرمر اوريدل کيږي. Presystolic او يا Proto diastolic Gallop رېتم کيداي شي واوريدل شي. اذيني فبريليشن هم دوديز دی.

د زړه په برقي گراف کي به دکيڼ بطن دهايپر تروفي، اسکيميا او انفارکشن بېلگې کيداي شي وليدل شي. د هايپر تېشن د مړيني اکثره پيښي دCHF او MI له کبله وي.

دزپه اورگونو ناروغی.

درگونو دلوپ فشار ناروغی.

دماغ

ددوامداره هايپرتینشن نیورولوژیک اغېزې په دوه برخو ویشل کېږي:

الف: د شبکې بدلونونه (Retinal change): څرنگه چې شبکېه یواځني نسج دی چې شراین ئې نیغ په نیغه د لیدو وړدی نولدی امله د تکراري Ophthalmoscope معایناتو پوسیله د هايپرتینشن د رگونو افاتو پر مخ تګ ارزيايي کولاي شو. Keith-weigner ویش ددی ناروغانو د شبکې د بدلونونو د معلومولو د پاره ساده او ترټولو ښه ازموینه ده چې لاندې توضیح شوي ده. د هايپرتینشن په سیرکي د شبکې د بدلونونو له کبله په ناروغ کې د لید خړپړتیا Scotomata, او حتي پوندوالی د Papilledema او د شبکې Macula برخې وینه توپیر لري له کبله، پیدا کېږي د هايپرتینشن له کبله د شبکې بدلونونه کیدای شي په حادثه ډول پیدا شي او د درملني او فشار کنترول سره ژر له منځه ځي. برخلاف د شبکې اتیروسکلیروزیس چې د اندتیل او عضلاتي تکرر له کبله پیدا کېږي سکلو تیک بدلونونه ئې ژر نه پیدا کېږي او د درملني سره قناعت وړ ښه والي هم نه مومي.

د مرکزي عصبي سیستم بدلونونه:

۱: سټروک (Stroke):

د ویني لوړ فشار د سټروک یو مهم لامل دی چې کیدای شي د وینه بهیدنی او یا د ماغي انفارکشن له کبله منځته راشي. د ماغي انفارکشن د شدید اتیروسکلیروزیس له کبله او په دماغ کې وینه بهیدنه هم د رگونو Microaneurism (Charcot Bouchrad aneurism) له کبله پیدا کېږي.

۲: Hypertensive encephalopathy:

په دې حالت کې ناروغ د ویني لوړ فشار، د شعور تشوشات، د داخلي قحفي فشار زیاتوالي، د حدقي اذیما او اختلاجات لري. پتوجینيژي څرګندندی خوشایدد Arteriole Spasm او د ماغي اذیما پورې چې په خوا فکر کیده اړه ونه لري. محراقي عصبي ښې پدې ناروغانو کې غیر معمول دی او که چیرې شتون ولري انفارکشن، هیموراژ او TIA ته باید فکر وشي.

دزېه اورگونو ناروغی.

درگونو دلوې فشار ناروغی.

پښتورگی

Afferent او Efferent اړتريولونو او د گلو مېرولر کپيلريو اتیروسکلرېک بدلون د پښتورگو درگونو اړوند د وینې د لوې فشار د پرمعمول افات دي چې د GFR د کمیدو او Tubular برخې دندو د خرابوالي لامل کېږي. د گلو مېرولي لیژن له کبله پروتین یوریا او مایکروالبومین یوریا پیدا کېږي. د پښتورگي عدم کفایه د هایپر تینشن د ناروغانو ۱۰ سلنه مړینه جوړه وي. سربيره پردی د پښتورگو د نورو افاتو د تشدید کیدو لامل هم کېږي لکه ډایابېټیک نیوروپټي چې د ACE-I ددې اختلاطاتو د مخنیوي دپاره اغېزمن درمل دي (۱۴، ۱۹، ۲۱).

له ناروغ سره چلند (Approach to the Patient)

گیلي:

د شریاني لوې فشار زیاتره ناروغان د داسې ځانگړي اعراضو څخه چې د لوې فشار پورې اړه ولري گيله من نه وي. د دوي لوې فشار زیاتره د دویزو فزیکي کتنو په ترڅ کې څرگندېږي. هغه گيلي چې طیب ته د ناروغ د راتگ لامل گرځي، په دریو گروپو ویشل کېږي:

۱: د لوې فشار اړونده گيلي.

۲: د لوې فشار درگونو د افاتو گيلي.

۳: دوه می هایپر تینشن په صورت کې د لاملی عامل نښي.

د لوې فشار اړونده اعراضو کې د سردرد چې د شدید هایپر تینشن ځانگړتیا ده، زیاتره د قفوي (Occipital) برخه کې وي او سهار د وینیدو وخت کې موجود او وروسته د څو ساعتو څخه له منځه ځي. نوري گيلي چې د لوې فشار سره کیدی شي تر ټولو ولري عبارت دی له: گنگسیت، د زړه ټکان، ژړستري کیدل او جنسی کمزورتیا.

د لوې فشار درگونو د افاتو اړونده گيلي عبارت دی له: Hematuria، د پوزی څخه د وینې راتگ، د شبکیې د بدلونونو له کبله د لیدلو کمزوری، د دماغ د تیریدونکي اسکیمیا له کبله

د زړه اورگونو ناروغۍ.

درگونو د لوړ فشار ناروغۍ.

د ضعیفې او ګڼګښتې حملې، د تیرانجینا، او د زړه د عدم کفایې له کبله سالنډې. د لوړ فشار د لامل د اړونده ګیلود بیلګې په توګه د Polyurea، Polydepsia او د عضلاتو د ضعیفې څخه یادونه کوو چې د هایپوکلیمیا له کبله په لومړنۍ هایپرالډوسټرونیزم کې پیدا کېږي. د فیکروموسایټوما ناروغان په حملوي ډول د سردرد، د زړه ټکان، زیاته خوله او Postural Dizziness څخه ګیله من وي.

تاریخچه

د ځواکمنې کورني تاریخچې شتوالۍ او په متناوب ډول د لوړ فشار شتون د هایپرتینشن تشخیص غښتلي کوي. شانوي لوړ فشار زیاتره د ۳۵ کلنې څخه مخکې او ۵۵ کلنې څخه وروسته عمرونو کې لیدل کېږي.

په ناروغ کې د UTI د تکراری حملو تاریخچه د ځنډنې Pyelonephritis وړاندیز کوي. که د هایپرتینشن ناروغ د Nucturia او بولي ډسپیا څخه ګیله من وي، د پښتورګواو یا اندوکراین ناروغیو ته باید فکروشي.

په کوشنګ سندروم ناروغانو کې د بدن د وزن زیاتیدلو او ددی پر خلاف په فیکروموسایټوما کې د وزن د بایللو تاریخچه موجوده وي.

د تاریخچې له مخې پوهیدلای شو چې آیا د رګونو د لوړ فشار ناروغۍ خپل خطرناک پړاو ته رسیدلي دي او که نه؟ د بیلګې په توګه آیاد تیرانجینا، د دماغې عدم کفایې ګیلي، CHF او د محیطي رګونو پاتې والي موجود دي.

نور د خطر فکتورونه چې په تاریخچه کې د هغه په باره کې پوښتنه وشي عبارت دي له: سګرټ څکول، د شکرې ناروغۍ، د شحمیاتو تشوش او د زړه اورګونو د ناروغیو له کبله لمړني مړینه. او بالاخره د ناروغ د ژوند څرنګوالي یا Life Style (غذای رژیم، فزیکي فعالیت، کورني حالت، دنده او د تعلیم کچه) په باره کې باید اړین معلومات ترلاسه شي.

دزپه اورگونو ناروغی.

درگونو دلوپ فشار ناروغی.

فزيکي کتنې

د ناروغ فزيکي معاینه د عمومي منظري څخه پیلېږي. د بیلګې په توګه آیا په ناروغ کې ګرمځ او مرکزي چاغوالی چې دکوشنګ سندروم د پاره لارښودنه کوي شته؟ آیا د پورته نهایاتو وده د سفلي نهایاتو د ودی څخه زیاته ده؟ چې شتون يې دابهر د Coarctation لارښودنه کوي.

دوینې د فشار اندازه کول:

د وینې د فشار ښی اندازه کونی لپاره د معاینې تخنیک ته باید ډیره پاملرنه وشي. داتوماتیک فشار الی د کارولو په صورت کې روغوالی ئی باید چک او ارزایی شي. د فشار له معاینې مخکې باید ناروغ د پنځه دقیقو دپاره په یو آرام ځای کې چی مناسب حرارت ولری ځای پرځای شي. دآلی کف (cuff) باید د زړه د سطحی سره برابره وي، د فشارالی د هواکڅوړه یا کف پراخوالی باید لږترلږه د مټ د پراخوالی (% ۴۰) سره برابر وی همدارنګه د کف اوږدوالی باید د مټ د (% ۸۰) برخې څخه تاوه شي، سربیره پردی د مناسب کف اوستاسکوپ ایښودنی اود هوا د پریخودنی درجی (۲ mmHg/s) ته باید پاملرنه وشي د فشار وروستی منظم غږ دیاستولیک فشار دی

د معاینې په بل پل کې د دواړه لاسونو فشار اوبض د ولاړې اوملاستي په حالت کې معاینه اوپرته شي. د دیاستولیک فشار زیاتوالي په هغه وخت کې چې ناروغ د ملاستي څخه دولاړې وضعیت غوره کوي زیاتره په Essential Hypertension دلالت کوي.

اوکه چیرې ناروغ د فشار ضد درمل نه وي اخیستي اود ولاړې په وضعیت کې فشار ټیټ شي زیاتره دویمې لوپ فشار ته فکر کېږي. د ناروغ وزن او قد باید یادداشت شي. فنډوسکوپي معاینات باید په تفصیل او غور سره اجرا شي ځکه چې نوموړي معاینه د ناروغي د دوام او انزارو په باره کې ښه معلومات راکولاي شي.

د کاروتید شریان جس اواصغا د نوموړي شریان د تنګوالي اوبندښت د معلومولو د پاره اړین ده. د کاروتید شریان تنګوالي د HVD د شتوالي یوه علامه ده. همدارنګه د پښتورګود شریان د تنګوالي د پاره هم یو لارښود دی ځکه دادواړه افتونه کیداي شي یو ځای موجود وي. دزړه او

د زړه اورگونو ناروغۍ.

درگونو د لوړ فشار ناروغۍ.

سږو په فزیکي کتنه کې باید د کین بطن د هایپرتروفی اود زړه عدم کفایي بیلګې ولټول شي. په غیر اختلاطي هایپرتینشن کې د زړه دریم غړاود سږو رالونه غیر معمول دی. د دوي شتوالي د بطن د دندې په خرابوالي دلالت کوي. د تېر په فزیکي معاینه کې باید د زړه څخه د باندي Murmur اود جس ور Collateral پلټنه هم وشي.

د ګیلي د فزیکي کتنې مهمه برخه د پښتورګي د شریان د تنګوالي د Bruit د پاره د بطن اضغاکول دی. Bruit د منځني کرني په بڼې اوچه خوا د نامه څخه لږ پورته او په Flank ناحیه کې ښه اوریدل کیږي.

سربیره پردې ګیله باید د بطني انویریزم او د ښتورګو د پولې سیسټیک ناروغي د پاره جس شي.

Femoral نبض باید جس شي که چیرې د کعبري نبض (Radial pulse) په پرتله وروسته جس شي پدې صورت کې د ویني فشار باید په ښکتنې اطرافو کې هم معاینه شي. حتی که چیرې فخذې نبض وروسته هم نه ووپه هغه ناروغانو کې چې عمرونه یې د ۳۰ کالو څخه کم وي لږترلږه یوځل د ښکتنې اطرافو د فشار لیدل اړین ده. بالاخره ښکتنې اطراف، داډیما د شتوالي لپاره معاینه شي او هم د CVA پخواني بیلګې وکتل شي.

فندوسکوپیک معاینات:

د فندوس معاینه د لوړ فشار د دوام او شدت په باره کې پوره معلومات راکولای شي.

د Keith wagner berker د ویش له مخې د شبکې فندوسکوپیک بدلونونه په څلورو درجو وېشل شوي چې په لاندې ډول دي:

- په لمړني درجه کې یواځې د شبکې دارتیر یو لونیو قطر د وریدي قطر څخه د ۵۰ سلنه په اندازه کمیږي (Narrowing).
- په دوهمه درجه کې سربیره د قطر په کمیږدو د شریان او ورید د اتصال ساحه تشه ښکاري (Nipping) او شریان د Copper wire په ډول ښکاري.

دزږه اورگونو ناروغۍ.

درگونو دلوږ فشار ناروغۍ.

- په دريمه درجه کې د دوهمې درجې د بدلونونو سربيره وينه بهيدنه او اگزودات په شبکه کې شتون لري چې د شريانونو د بندښت او په فنډس کې د احتشاله کبله منځته راځي او اترتريولونه د Silver wire په ډول ښکاري .
- په څلورمه درجه کې papiledeما ليدل کېږي.

لږ اتواري کتنې :

د هايپرتينشن لږ اتواري معاينات په دوه برخو ویشل کېږي: يوهغه چې د لمړني پلټنوي په ډول ټول ناروغانو کې تر سره کېږي او بل ئې ځانگړي لږ اتواري معاينات دي چې دويمې لوږ فشار د پيښو د پيژندنې لپاره تر سره کېږي او په لاندې ډول دي.

I: د لومړني ارزوني لپاره اساسي معاينات:

الف: هغه کتنې چې په هر ناروغ کې بايد تر سره شي:

۱: درنومي تيازو معاينه د پروتين، گلوکوز او د وينې د پارې.

۲: درنومي تيازو مایکروسکوپیکه معاينه .

۳: هيماتوکریت Hematocret

۴: د سيروم پوتاشيم .

۵: د سيروم کرياتينين او BUN، FBS او مجموعي کولسترول .

۶: د زړه برقي گراف (ECG).

ب: هغه لږ اتواري کتنې چې زياتره دلگښت او نور وکتورونو په پام کې نيولو سره اجرا کېږي.

۱: د تيرائيد هخوني هورمون (TSH)

۲: د وينې د سپينو کروياتو شمير .

۳: HDL او LDL کولسترول او ترايگلسرايد

۵: د سينې راډيوگرافي او ايکو کارډيوگرافي.

II: د دويمې لوږ فشار د پارې ځانگړي لږ اتواري پلټنې:

۱: د پښتورگي درگونو ناروغۍ: لاندې ځانگړي معاينات تر سره کېږي ACE-Inhibitor,

Angiography, duplex flow studies, MRI, Radionuclid-renal-scan

د زړه او رگونو ناروغۍ.

درگونو د لوړ فشار ناروغۍ.

۲: فیکروموسایټوما: د ۲۴ ساعته رېنوميټیا زومعاينه د کرایاتین، میتانفرین او کتیکولامین لپاره.

۳: کوشنگ سندروم: د شپې له خوا د Dexametason منع کونکي ازموینه یا د ۲۴ ساعته رېنوميټیا زود کورتیزول او کرایاتین کچه.

۴: لومړني Aldosteronism: د پلازما د دوستیرون او رینین د فعالیت نسبت.

درملنه

د درملني استنباطات:

د هایپرټینشن ټول هغه ناروغان چې د یاسټولیک فشارونه یې د 90 mmHg څخه لوړوي او هغوی چې عمر ونه ئي د 35 کالو څخه زیات وي او سیستولیک فشار ئي د 160 mmHg څخه لوړوي د درملني لپاره نوماند دی. که چیرې انجیناپیکتوريس او یا د زړه او رگونو نور رسک فکتورونه شته باید لوړ نارمل فشار د درملنه هم وشي. مثلاً هغه ناروغان چې انجیناپیکتوريس او یا د یا بیټ ولري او د یاسټولیک فشار ئي د $80-90$ ملي مترستون سیماب ترمنځ وي د فشار ضد درملني لپاره کاندیدان دي.

د عملیات وړ دویمي هایپرټینشن په صورت کې د جراحي عملیات پر پکړه نظر عمر، د ناروغ عمومي حالت او نور Debelated ناروغیو شتون ته اود طبي درملني سره د ویني د لوړ فشار ځواب ته نیول کیږي. مثلاً د هایپرالدوستیرونیزم په پېښو کې که چیرې هایپوکلیمیا د Spironolacton او فشار د فشار ضد درملني سره اصلاح شي جراحي درملني ته اړتیا نه پېښېږي.

د ژوند څرنګوالی بدلول Life style modifications

۱: د وزن کمول: د ناروغ BMI باید 25 kg/m^2 کې وساتل شي. په چاغ وګړو کې د هر 10 کیلوګرام وزن په کمولو سره $5-20\text{ mm Hg}$ سیستولیک فشار ټیټیږي.

۲: غذايي رژیم: د ناروغ د خوړو رژیم باید له تازه میوې او سبزو څخه بډایه وي. بر خلاف د مشبوع غوړیو او هم د غوړیو تولید مقدار باید کم وي. په غذا کې کمه مالګه (2 gm) واخلي.

دزېه او رگونو ناروغۍ.

درگونو دلوې فشار ناروغۍ.

۳: منظم تمرينات: لکه هره ورځ ۳۰ دقيقې تيز پلې تگ د وينې فشار په ټيټولوکي مرسته کوي

دواي درملنه

د لوې فشار په درملنه کي لاندې درمل بنسټيز ځاي لري

- ديورتیک (Diuretics)
- بتا بلاکر (B-Blockers)
- رنين منع کوونکي (Rennin Inhibitors)
- ACE Inhibitors
- Calcium channel blockers
- د انجيو تنسين اخذو بندونکي ARB

۱- ديورتیکونه Diuretics

Thiazide ديورتیکونه د فشار ضد ډير اغيزمن درمل دي نوموړي درمل د پښتورگو په توپيولونو کي د سودېم د بيرته جذبېدو مخه نيسي په پايله کي ئي اوبه او سودېم ضايع د پلازما حجم او د زړه دهانه کمه او د وينې فشار ورسره ټيټيږي خو د اوږدې مودې کارول ئي سربيره په پورتنيو اغيزو د محيطي رگونو د مقاومت د کمښت د لاري هم د فشار په ټيټېدو کي مرسته کوي.

Loop ديورتیکونه لکه Furosemide د تيازايد په پرتله د الکتروليتو او د وينې د حجم ډير کموالي منځ ته راوړي او د اغيزي دوام ئي لنډ دی. د پښتورگي د دندې د خرابوالي (د سيروم کريا تينن 5mg/dl ، >2) څخه پرته د لوې فشار په نورو حالاتو کي نه کارول کيږي. د بيتا بلاکر او ACE منع کوونکو په پرتله ديورتیکونه په تور توکمو، زړو او چاغو خلکو کي همدارنگه هغو کي چي د پلازما حجم ئي زيات اويا د پلازما رنين فعاليت ئي لږ وي ښه اغيزمن دی. په زړه پوري خبره خو داده چي په تنباکو کارکوونکو کي د تنباکو نه کارکوونکو په پرتله زيا ته اغيزه لري. په زړو ښځو کي چي د Osteoporosis د خطر سره مخ دی د تيازايد داوږدې مودې

دزېه او رگونو ناروغۍ

درگونو دلوې فشار ناروغۍ

کارونه د هډوکو د منرالونو د ضایع کېدو مخه نیسي په څلورم جدول کې د ځینې دیورتیکونو نومونه د خولې د لیاري د پیل دوز ، مقداری حدود او اپخیزی اغیزی ذکر شويدي

۴- ۲ جدول: د دیورتیکونو نومونه د خولې د لیاري د پیل دوز ، مقداری حدود او اپخیزی اغیزی (۲۱)

د درمل نوم	د پیل دوز د ورځي یوځلي mg	مقداري حدود mg	اپخیزی اغیزی
Hydrochlorothiazide	۲۵-۵۰، ۱۲	۵۰-۵۰، ۱۲	$\downarrow \text{Mg}^{2+}$ ، $\downarrow \text{K}^{+}$
Chlorthalidone	۲۵-۵۰، ۱۲	۵۰-۵۰، ۱۲	$\downarrow \text{Na}^{+}$ ، $\uparrow \text{Ca}^{++}$
Metalazone	۵، ۲۵، ۱	۵، ۲۵، ۱	$\uparrow$ Glucose ، $\uparrow$ Uric acid $\uparrow$ Triglyceride $\uparrow$ LDL Impotence ، rash
Furosemide	۲۰	۳۲۰-۴۰	دتیا زاید په شان دی خود
Ethacrynic acid	۵۰	۱۰۰-۵۰	دیوریزس او الکترولایتونو د
Bumetanide	۰، ۲۵	۱۰-۰، ۵	عدم موازنې خطر پکې زیات دی
Spironolactone	۲۵-۱۲، ۵	۱۰۰-۱۲، ۵	Hyper glycaemia میتا بولیک
Amiloride	۵	۱۰-۵	، اسیدوزس
Eplerenone	۲۵	۱۰۰-۲۵	Gynecomastia

د زړه او رگونو ناروغۍ.

درگونو د لوړ فشار ناروغۍ.

۲- بیتا بلاکرونه (Beta Blockers)

دغه درمل د زړه چټکتیا او د زړه out put کموي لدی امله په ها پیر تنشن کي اغیزمن دی همدارنگه د رنین آزادیدل هم کموي نوځکه په هغو وگړو کي چي د پلازما رنین فعالیت ئي زیات وي (ځوان سپین توکم ناروغان) ډیر اغیزمن دی. نوموړي درمل هغه رفلکس تکی کار دیا چي د وازو دایلتور درملو له امله پیدا کيږي خشي کوي سربیره پردی په هغه وگړو کي چي د هایپر تنشن ترڅنگ لاندی ناروغي هم لري ډیر گټور دی :

د گوگل انجینا

د میوکارډ پخواني احتشا

ستیل یا ثا بت CHF

نیم سري (Migraine)

د اضطراب جسمي څرگندوني

د بیتا بلاکر درملو اړخيزي اغیزه په لاندی ډول دی :

په مسا عدو وگړو (د استما ناروغ او د COPD ځيني ناروغانو) کي د برانکو سپزم شدید کیدل د سینوس نوډ د دندی خرابوالی. اود اذیني بطینی لیږد یډني ورو والي چي د بردی کار دیا او AV بلاک لامل گرځي، د پوزي کا نجسشن، Raynaud Phenomenon ، د مرکزي عصبي سیستم گیلې لکه هیبا جاني حالت ، د خرابو خوبونو لیدل (Night mares) Depression او کا نفیوژن ، سستي ، بي حالي او د جنسي میلان کموالي ، د پلازما تراي گلسراید زیاتوالی او د HDL کموالی.

پخوا به بیتا بلاکر په CHF ناروغانو کي مضا د استطباب گڼل کیده خو اوس ویل کیږي چي نوموړی درمل د زړه په ثابته مزمنه عدم کفایه کي چي د تیټ EF سره ملگري وي گټوري اغیزي لري. بیتا بلاکر په تایپ I دیابت کي په احتیاط سره کارول کیږي ځکه چي نوموړي درمل د هیپوگلا یسیمیا گیلې پټوي اوهم Gluconeogenesis منع کوي. بیتا بلاکر درمل په تایپ II دیابت کي د ویني د گلوکوز کچه لوړه وي. همدا رنگه نوموړي درمل د محیطي رگونو په پرمختللی ناروغۍ کي په احتیاط سره په کار وړل کیږي. بیتا بلاکر باید د هغه لوړ فشار

دزېه اورگونو ناروغۍ.

درگونو دلور فشار ناروغۍ.

په درملنه کي چي د Pheochromocytoma او يا کوکا ين کاروني له امله پيداشوي وي ونه کارول شي .

د نوموړي درمل ناڅاپي قطع کول د کورونري شرائنو د بېرني پيښو او په وخيمه توگه د فشار د لوړيدو لامل گرځيدلي شي چي بايد په پام کي وي .

۳-۴ جدول: د ځينو بيتا بلاکر درملو د پيل دوز او مقداري حدود ذکر شويدي. (۲۱)

د درمل نوم	د پيل دوز	مقداري حدود
Atenolol	۲۵ Mg دورځي يو ځل	۲۵-۲۰۰ ملي گرام دورځي يو ځل
Metoprolol	۵۰ mg په يو يا دوه دوزونو کي	۵۰-۲۰۰ ملي گرام په يو يا دوه دوزونو کي
Carvedilol	۶، ۲۵ ملي گرام	۱۲، ۵-۱۰۰ ملي گرام په دوه دوزونو کي
Propranolol	۲۰ ملي گرام دورځي دوه ځلي	۴۰-۳۲۰ ملي گرام دورځي دوه ځلي

۳- رنين منع کوونکي (Renine inhibitors)

رين ، Angiotensinogen په انجيو تنسين بدلوي چي دغه بدلېدنه د رنين منع کوونکي درملو پواسطه قطع کيږي Aliskiren نوي رواج شوي درمل دي چي په يواځي توگه اوهم د نورو درملو سره په گډه د ها پيرتنشين په درملنه کي کارول کيږي دغه درمل د رنين ، پروتيولايک برخي سره نښلي اود انجيو تنسينو جن د ماتيدو مخه نيسي چي په نتيجه کي د انجيو تنسين I او II کچه ټيټه او د رنين کچه لوړيږي

۴- ACE منع کوونکي درمل:

دادرمل په خفيف او متوسط ها پيرتنشين کي د لومړني درملو په توگه کارول کيږي. ياد درمل د رنين - انجيو تنسين -الدوسترون سيستم نهې کوي، سربيره پردی د BradyKinin ما تيدنه منع کوي د Vasodilating prostaglandins جوړيدنه هڅوي او د سمپا تيک عصبي سيستم فعاليت کموي. ACE-in زياتره په ځوان سپين توکمو وگړو کي اغيزمن دی. نوموړی درمل په سيستوليک هايپرتنشن کي ، په تور توکمو او زړو خلکو کي لږه اغيزه لري که په يواځي توگه وکارول شي په ۵۰-۴۰ پيښو کي فشار په پوره توگه کنترولوي، خو که د ديورتیک اويا کلسيم چينل بلاکرسره يو ځاي وکارول شي اغيزه به ئي پياوړي شي .

دزې او رگونو ناروغۍ.

درگونو دلوې فشار ناروغۍ.

ACE-In په تايپ I ديابت کي چي د پروتين يوريا او د پښتورگو د دندو خرابوالي سره ملگري وي انتخابي درمل دی . ځيني څيړنو د دی درمل د استطبې ب ساحه تايپ II ديابت او مايکروالېومين يوريا لرونکو تايپ I ديابت ناروغانو ته هم پراخه کړيده. د څيړنو څو پايلې بنسې چي Ramipril د قلبي وعايې مړيني ، د ميوکارد نه وژونکي احتشا او Non Fatal ستروک شمير کموي.

۴-۴ جدول: د ځيني ACE-In درمل دوز او اپخيزي اغيزي بنودل شويدي. (۲۱)

درمل نوم	د پيل دوز	مقداري حدود	اپخيزي اغيزي
Captopril	۲۵ mg دورخي دوه ځلي	۵۰-۳۰۰ ملي گرام دوه دري ځلي دورخي	توخي ، هايپو تشن ، گنځيت ، د پښتورگي ، د دندو خرابوالي ، هايپرگلايسيميا ، انجيوادېما ، د ذاتقي
Enalapril	۵ mg يو ځل	۵-۴۰ ملي گرام په يا دوه دوزونو	خړابوالي ، رش ، او نادرا پروتين يوريا. په اميدواري کي مضاد استطباب ده
Lisinopril	۵-۱۰ mg ورخي يو ځل	۵-۴۰ ملي گرام يو ځل	
Ramipril	۲،۵ mg يو ځل	۲،۵-۲۰ ملي گرام په يو يا دوه دوزونو کي	

۵- Angiotensine II Receptor Blockers (ARB)

دغه ډله درمل د بردی کاینین په میتابولیزم باندی کومه اغیزه نه لري لدی امله د انجیوتنسين د اغیزو ډیر انتخابي نهی کونکي گڼل کیږي. اوهم د ACE انهيبيټور په پرتله د انجیوتنسين فعالیت په پوره توگه بندوي. د زړه په پاتي والي او د پښتورگي په ځنډنی ناروغیو کي د ARB او ACEI گټوري اغيزي سره ورته دی. همداشان اپخيزي اغيزي بی هم د ACEI په شان دی په ناروغانو کي توخي او انجيو ا ډيما پيدا کيداي شي خو په ARB کارونکو کي د ACEI کارونکو په پرتله لږ ليدل کیږي. (۱۷)

دزېه او رگونو ناروغۍ

درگونو د لوې فشار ناروغۍ

۶- الدوسترون انتاګونیست

Spironolactone او eplerenone د زړه په پاتې والي او سپروزس کي چي په بدن کي سودیم ډې شوي وي د پښتورگو د لاري سودیم خارجونکي تاثیر لري خو په ها پیرتنشن کي ئي دا اغیزه ډیره ضعیفه ده سره لدی په ټینګاريز ها پیرتنشن کي د نورو درملو سره په ګډه توګه کارول کیږي .

الدوسترون د بطنینا تو او رگونو د ها پیرتروفي او د پښتورګي د فیروز په ګډون د Target Organ damage په منځته راتګ کي مرکزي رول لري. د الدوسترون انتاګونیست درمل د فشار په کنترول سربیره د لوې فشار د پورته ذکرشویو ناوړه اغیزو څخه هم مخنیوي کوي .

۷- کلسیم کانال بلاکر Calcium channel Blocker :

دا ډله درمل د محیطي وازودایلشن سبب ګرځي لکن د نورو وازودایلټور درملو په پرتله رفلکس ټکي کار دیا اود مایعاتو راټولیدنه ئي لږه ده. یا د درمل نږدی %۲۰ ناروغانو کي په یواځي ځان د ها پیرتنشن په هر ګروپ او هره درجه باندی اغیزمن دی لدی امله په تورتوکمو او زړو خلکو کي دی درمل ته د بیتا بلاکر او ACEI په پرتله لومړیتوب ورکول کیږي.

۴-۵ جدول: د ځینی کلسیم انتاګونیست درملو مقدار او اړخیزی اغیزی ښودل شوی دی. (۲۱)

ددمل نوم	ابتدائي دوز mg	مقداري حدود	اړخیزی اغیزی
Diltiazem	BID ۹۰	۳۲۰-۱۸۰ mg په دوه دوزونو کي	پرسوب، سردردی، بردی کار دیا ، قبضیت ، ګنسیټ ، AV بلاک، CHF ، د تشو متیازو فزیکونسي
Verapamil	OD ۱۸۰	۴۸۰-۱۸۰ mg په یو یا دوه دوزونو کي	
Amlodipine	OD ۲،۵	۱۰ mg-۲،۵/d	پرسوب ، ګنسیټ ، د زړه ټکان، Flushing سردردی ، ها پیرتنشن ټکي کار دیا فزیکونسي د CHF ناروغ د حالت لخوا راییدنه.
Nifedipine	OD ۳۰	۱۲۰-۳۰ mg یوخل	

دزړه او رگونو ناروغۍ درگونو دلوې فشار ناروغۍ

۸- الفابلاکر α Adrenoreceptor Antagonist :
Terazosin, prazosin او Doxazosin درمل post synaptic الفاخذي بندوي د ملسا عضلاتو د استرخا له کبله د محيطي رگونو مقاومت ښکته او فشار ټيټوي. دا درمل په يواځي ځان اغيزمن دی خو دا وړېدی مودی کارونه ئي د Tachyphylaxis لامل گرځي

۶-۴ جدول: د ځينی الفا بلاکر درملو دوز او اپخیزی اغیزی ښيي (۲۱)

د درمل نوم	د پيل دوز mg	مقداري حدود mg	اپخيزي اغيزي
Prazosin	۱	۲-۲۰ په دوه دري دوزونو	د لومړي دوز سره سينکوپ ، وخيم هايپوتشن ، گنسيت ، دزړه ټکان ، سردردی
Terazosin	۱	۱-۲۰ په يو يا دوه دوزونو	کسالت ، جنسي کمزورتيا
Doxazosin	۱	۱-۱۶ په يو يا دوه دوزونو	Urine incontinence

۷-۴ جدول: مرکزي سمپاتولايک:

Clonidine	BID ۰،۱	۲، ۰،۶- په دوه دوزونو کي	د خولي وچولي ، جنسي کمزورتيا ، سردردی ، بردی ارتيميا . سربيره پردی ميتا يل دويا هيپا تائيس ، هيمولايک انيميا او تبه پيدا کوال
Methyldoa	BID ۲۵۰	۵۰۰-۲۰۰۰ په دوه دوزونو کي	

۸-۴ جدول: محيطي نيوروني انتا گونسټ :

Reserpine	OD ۰،۰۵	OD ۰،۲۵-۰،۰۵	ډپرشن ، د پوزي بندش ، خوبوړي حالت پيپټک ناروغي، بردی کارديا
-----------	---------	--------------	---

دزېه او رگونو ناروغۍ درگونو دلوې فشار ناروغۍ

۹-۴ جدول : مستقيم Vasodilator :

Hydralazine	۲۵ BID	۳۰۰-۵۰۰ په ۲-۴ دوزونو	د GI ناروغي ، تكي كارديا ، سردردى د پوزي احتقان ، رش
Minoxidil	۵ OD	۴۰-۵۰ QD	تكي كارديا ، د مايعاتو راټوليدنه ، سردردى Pericardial effusion, hirsutism ترمبو سايتوپنيا

۹- هغه درمل چې مركزي sympatholytic اغيزه لري :
دا ډله درمل د الفا ادرينرجيک آخذي په مركزي عصبي سيستم كې هڅوي. چې له امله ئي محيطي سمپا تېك جريان كم او فشار ټيټيږي. په ځيني ناروغانو كې په يواځي ډول هم اغېزمن دى خو زياتره د بڼه نه زغم له امله د دوهم يا دريم كرنبي درمل په توگه كارول كيږي .
۴-۱۰ جدول: د ديموگرافيك ملاحظاتو له مخى د فشار ضد درملو ټاكنه (۲۱)

	۵۵ > عمر او ټول نور كسان	تور توكم، هر عمر	۵۵ < عمر او ټول نور كسان
لومړى كرنبه First-line	ACE or ARB ^v or diuretic or CCB	Diuretic or CCB	Diuretic or CCB
دوهمه كرنبه Second-line	β-blocker	ACE or ARB ^v or β-blocker	ACE or ARB or β-blocker
Alternatives	α-Agonist or α-antagonist	α-Agonist or α-antagonist ^v	Alpha-Agonist or -Alpha antagonist ^v
ټينگاريز هاپير تنشن Resistant hypertension	Spironolactone	Spironolactone	Spironolactone

دزې او رگونو ناروغۍ.


درگونو دلور فشار ناروغۍ.

۱۰. Arteriolar Dilator :

هايدرلاژين او مينو كسيديل درگونو ملسا عضلاتو ته استرخا وركوي چي له امله ئي وازودايلشن منځته راځي . كه يواځي وركړل شي رفلكس تكى كارد يا پيداكوي. د زړه د عضلي تقلصيت زياتوي د زړه ټكان او سردردى منځ ته راوړي. په ټينگاريزو پيښو كى زياتره د بيتا بلاكر او ديورتيك سره په گډه كارول كيږي.

۱۱. Peripheral sympathetic inhibitors :

دا ډله درمل زياتره په ټينگاريز هاپيرتنشن كى كارول كيږي په نورو حالاتو كى د زياتو اړخيزو اغيزو له امله ئي استعمال كم دى.



۴- ۱ چارټ: كي د فشار ضد درملنى په هكله د برتانيي د هاپيرتنشن د ټولني (BHS) لارښود بنودل شوي دي، چي A د ACE Inhibitor يا ARB، B بيتا بلاكر، C د كلسيم چينل بلاكر او D د ديورتيك لنډيز دى. (۲۱)

دزېه اورگونو ناروغۍ.

درگونو دلوې فشار ناروغۍ.

د درملنې موخې:

د دوايي درملنې بنسټيزه موخه داده چې د يو يا څو درملو پوسيله د لږو اړخيزو اغېزو سره د ناروغ فشار کنترول اونور مال شي.

د وينې د لوړ فشار په درملنه کې د داسې درمل ټاکنو ته هڅه وشي چې د هايپرشن سببي عامل اصلاح کړي. د بيلګې په توګه که سببي عامل هايپرالدوستيرونيزم وي Spironolactone پوسيله د لږو اړخيزو اغېزو سره فشار کنترولېږي.

که چيرې د وينې د لوړ فشار لامل معلوم نه وي د Empirical درملنې څخه کار اخيستل کېږي. په درملنه کې بايد داسې درمل انتخاب ته هڅه وشي چې اړخيزې اغېزې نې لږې وي، مېنه اومعيوبيت کم کړي. د ورځې يو ځل وکارول شي، د درمل دوز ورو ورو زيات يا کم نه شي اونرخ نې مناسب وي.

پرتې د ډير شديد لوړ فشار ($DBP > 130 \text{ mmHg}$) څخه په نورو حالاتو کې بايد درملنه د يو درمل سره پيل شي، که چيرې Combination ته اړتيا وي دداسې درملو څخه کار واخيستل شي چې د اغېزو ځايونه نې بيلابيل وي.

د وينې د لوړ فشار د درملنې لپاره بيلابيل ريژيمونه شته: د نړيوالې روغتيايي ټولنې وروستيو لارښوونو له مخې د وينې د لوړ فشار د شپږ ډلې درملو څخه هريوې د لمړني درملنې په ډول کارېدای شي، خو په درملنه کې لاندې بنسټونه بايد په پام کې وي:

۱: درملنه بايد د درمل دکم دوز سره پيل شي که فشار کنترول نه شو د درمل دوز بايد منځني کچې ته لوړ شي.

۲: درملنه بايد د داسې درمل سره پيل شي چې د وينې د لوړ فشار سره ملګري ناروغي درملنه هم وشي. او يا لږترلږه مل ناروغي ته تاوان ونه رسوي.

۳: که چيرې د وينې لوړ فشار د لومړي درمل د منځني مقدار سره کنترول نه شو دويم درمل د له بلي ډلې څخه وټاکل شي.

۴: په درملنه کې د داسې درمل څخه پيل وشي چې ناروغ نې ښه زغملای شي.

دزېه او رگونو ناروغۍ.

درگونو دلوې فشار ناروغۍ.

۵: نږدې په ټولوپېښو کي که چيري د فشار د کنترول د پاره دوه درملونه اړتيا پېښېږي دويم درمل دی Diuretic وټاکل شي.

۶: که چيري گډې (Combination) درملني ته اړتيا وي دوا بايد په کم دوز توصیه شي د بيلگي په توگه يو ديوريتيک د يوبيټا بلاکر، ACE-inhibitor يا ARB سره. همدارنگه کلسيم بلاکر د ACE-inhibitor يا بېټا بلاکر سره يوځای.

۷: د ۹۰ سلنه ناروغانو فشار د يو يا دوه درملو پوسيله کنټرولېږي. که چيري ددوه درملو پوسيله فشار کنترول نه شو لومړني درمل په لوړ دوز ورکول کېږي. د بيلگي په توگه کاپټوپرېل او اټينولول ۱۰۰ ملي گرامه، Enalapril ۲۰ mg او يا Diltiazem ۳۶۰ mg ورکول کېږي، که سره لدې هم فشار کنترول نه شو. د ويني د لوړ فشار دويمي لاملونه بايد ولټول شي. که چيري د ويني د لوړ فشار لامل بيا هم ونه موندل شو پدې صورت کي به د ناروغ په خوړوکې د مالگي اندازه زياته وي، اود مالگي په کمولو سره اکثرأ فشار کنټرولېږي. که بيا هم فشار کنترول نه شولومړني درمل بدل او په ځاي يې بل درمل پيل کېږي.

که چيري پورتنې ټول اهتمامات پايله ورنکړه اوفشار کنترول نه شو د کلسيم کانال بلاکرو ACE منع کوونکي د يوځاي کولو څخه او يا د Diuretic، ACEI-Triple therapy او هايډرالازين څخه کار اخيستل کېږي. که فشار کنترول شو د درملو دوز په تدريجي ډول کم حتي ځيني يې د درملني د پلان څخه ايستل کېږي.

په ۵ سلنه ناروغانو کي د پورتنې اهتماماتو سره سره فشار لوړ پاتي کېږي چي پدې صورت کي د درملني د عدم کفايي لاملونه بايد ولټول شي. که چيري لامل پيدانشو يو د نورو درملو څخه (Vasodilator، Anti adrenergic) د درملني په پلان کي ورزياتيږي که فشار کنترول شو، مخکني درمل تدريجاً قطع کېږي (۱۹، ۲۱، ۲۷).

دزړه او رگونو ناروغۍ

درگونو دلوې فشار ناروغۍ

۴-۱۱ جدول: د هايپرتينشن د درملنې د پاتې راتلو لاملونه او د خراب انزار بنودونکي بڼې (۱۹)

د هايپرتينشن د درملنې د پاتې راتلو لاملونه	هغه فکتورونه چې د هايپرتينشن په خرابو انزارو دلالت کوي
۱: د ناروغ نه همکارۍ	۱: تورنژاد
۲: د حجم زیاتوالي	۲: ځوانانو کې
الف: د سودېم زیات اخیستل	۳: نارینه
ب: غیر دیورتیک درمل	۴: له ۱۱۵mmHg څخه د
۳: د وزن زیاتوالي	د یاستولیک فشار دوامداره
۴: د درملو د دوز کموالی	لوړوالی
۵: د درمل اتیاګونست	۵: سګرټ څکول
Symphathomemetic	۶: د بایټ ناروغي
د خولې د لږي دامید اواړي ضد	۷: د وینې دکولسترول لوړوالي
درمل اخیستل	۸: چاغوالي
ادرینال سټیروئیدونه	۹: دکولواخیستل
۲: ثانوي هايپرتشن	۱۰: end Organ Damage
	الف: زړه
	۱: کارډیومیګالي

خبیث هايپرتينشن Malignant hypertension

که چېرې د لوړ فشار له کبله د شبکي وينه بهیدنه ، اکزودات او papilledema رامنځته شی ، خبیث هايپرتينشن بلل کېږي. په پورتنیو بدلونونو سربیره په پرمختللي بڼه کې ئې د هايپرتنسیف انسفالوپاتی گیلې اوښي لکه د سرشددرد ، کانګي ، د لیدلو تشوش ، موقتي فلجونه ، اختلاجات ، Stupor او کوما پیدا کېږي. د زړه د نظم خرابوالي او د پښتورگو دندو خرابوالي هم د خبیث هايپرتينشن په سیر کې منځته راتلای شي چې ځینې وخت د اولیګو یوریا سره یوځای وي. د پتالوژی له نظره په دی سندروم کې خپور Necrotizing Vasculitis ، د ارتریولونو ترمبوزس او د ارتریولونو په دیوال کې د فبرین راتولېدنه موجود وي. په زیاتره

دزپه اورگونو ناروغی.

درگونو دلوپ فشار ناروغی.

ناروغانو کي د Microangiopathic hemolytic anemia نښی هم شتون لري چي نوموړي دویمي افت کېدای شي د پښتورگو د دندو د خرابوالي مسول وي .

درملنه:

ددرملنی لومړنۍ موخه داده چی د ناروغ منځنی شریانی فشار (Mean arterial pressure) دوه ساعتو موده کی د ۲۵٪ څخه ډېر ټیټ نه شی. او یا فشار د ۱۰۰-۱۱۰/۱۶۰ میلیمتر سیماب حدودو ته راوستل شی. چی دا کار د وریدی nitroprusside سره چی هره دقیقه یي دوز کنټرولېدای شی ، شونی دی. د هایپر تنسیف انسفالوپاتی د درملنی دپاره زرقی labetalol او nicardipine هم اغېزمن دی. که چېرې د خبیث هایپر تنشن ناروغ انسفالوپاتی یا کوم بل شدید حالت ونه لری، پدی صورت کی فشار د دقیقو پر ځای په ساعتونو کی باید ټیټ شی. دغه موخه د یو شمېر لنډ تاثیر لرونکو درملو لکه Captopril, clonidine, labetalol او پواسطه تر لاسه کېدای شي. (۱۹، ۲۱، ۲۷).

په لویانو کې د زړه ولادي

د زړه او رگونو ناروغي
ناروغی.

پنځم فصل

په لویانو کې د زړه ولادي ناروغی.

Congenital heart disease in the Adult

د زړه ولادي ناروغیو پېښې په ژوندی زیرېدلو ماشومانو کې ۱ % او دهغه ښځو په ماشومانو کې چې ولادي ناروغی لري پېښې يې ۴% دی. د زړه او رگونو د فزیالوژیک بدلونونو ښه زغمل او یا په لویديځه نړۍ کې د مناسبې طبي او جراحي درملنې له امله ډیرې اخته ماشومان د کھولت دوری ته رسیږي.

لاملونه

د زړه د ولادي ناروغیو لامل په زیاتره پېښو کې څرګند نه وي، خو په عام ډول د زړه ځینی ولادي ناروغي د امېدواري په لومړیو کې د رشېم (Embryo) د نورمالۍ ودې د خرابیدو له کبله منځ ته راځي چې خرابوالی د یو شمیر پیچلي جنتیک او محیطي فکتورونو پورې اړه لري. پیژندل شوی کروموزومي تشوشات او د یوجین میو تیشن د CHD ۱۰% < پېښې جوړوي.

CHD زیاتره د لاندي حالاتو سره یوځای وي:

۱- د امېدواري مور Rubella انتان چې زیاتره د PDA او د ریوی د سام او شریان د تنګوالي سره یوځای وي.

۲- په الکولو د امید واره مور روږدېدنه.

۳- د امید واری په دوران کې د دوا او شعاع کارول.

۴- جنتیک تشوشات لکه کورني ASD او د زړه ولادي بلاکونه.

۵- کروموزومي ابناړملي لکه septal defect او د مایترل او ترای کسپید د دسامونو ناروغی چې په Down's syndrome (۲۱ Trisomy) کې منځته راځي او یا د ابهر د دسام ناروغی چې په Turner's syndrome کې پیدا کیږي.

د زړه او رگونو ناروغي
ناروغی.

په لویانو کې د زړه ولادي

پتوفزیالوژي

د زړه او دورانې سیستم هغه اناتوميک او فزیالوژیک بدلونونه چې د زړه د ولادې ناروغی له کبله پیدا کېږي، له زیږیدنې مخکې مرحلې څخه تر کهلته پورې پرمختګ کوي. لدی امله کوچنی او سلیم آفتونه چې په کوچنیوالي کې نه وی تشخیص شوي په لویوالي (کهلته) کې کلینکي نښې نښانې یې برسيره کېږي، د بیلګې په توګه د ابهر ولادې Bicuspid د سام چې نورماله دنده تر سره کوي د وخت په تیریدو سره سختیږي او کلسیفیکشن پکې منځته راځي او په څرګند ډول د ابهر د دسام تنګوالي منځته راوړي.

پلمونري هایپرشن (Pulmonary Hypertension)

د سږي د شریان د فشار زیاتوالي، سږو ته د وینې د جریان زیاتوالي او یا د سږو د رګونو د مقاومت د زیاتوالي له امله منځته راځي. چې دا وروستی کله کله د واسکولر تون د زیاتوالي له امله پیدا کېږي خو زیاتره د سږو په وعایې بسترګی د انسدادی ساختماني بدلونونو له امله منځته راځي. څرنګه چې د سږو د رګونو انسدادی ناروغی د جراحی عملیې د استطباب د ایښودلو د پاره یو لارښود فکتور دی نو لدی امله مهمه ده چې په شدید پلمونري هایپرشن اخته ناروغ کې د ریوی او سیسټمیک وینې جریان اندازه او پرتله شي.

د سږو د رګونو انسدادی ناروغی لامل پوره څرګند ندی خو سره لدی، سږو ته د وینې جریان د زیاتوالي، د سږو د شریان د فشار زیاتوالي، د سږو د ورید د فشار زیاتوالي، ایریترو سائتوزس، سیسټمیک هایپوکسیا او اسیدوزس مسئول ګڼل کېږي.

Eisenmenger syndrome هغه حالت ته ویل کېږي چې د دوو دورانو تر منځ لوی ارتباط یا Aorto pulmonary shunt، بطیني او یا اذیني برخو کې موجود وی چې په نوموړي شنت کې جریان د ښی څخه چپ لوري او یا دواړه خواوي.

ایریتروسائتوزس Erythrocytosis

د ایریتروپویتین د تولید زیاتوالی د Erythrocytosis لامل ګرځي. ایریتروسائتوزس کیدای شي معاوضوي یا غیر معاوضوي وي، په معاوضوي ډول کې یې نادرا د وینې د

د زړه اورگونو ناروغي
ناروغي.

په لویانو کې د زړه ولادي

غلظت د زیاتېدو اعراض پیدا کېږي. درملیز فصد (phlebotomy) ته هم نادراً اړتیا پېښېږي. ددی پر خلاف غیر معاوضوی ایریتروسایټوزس کی د وینې د غلظت د زیاتوالی اعراض موجود وی او فلیبوتومی هم په موقتی ډول اعراض کنټرولوی خو که په تکراری ډول اجرا شی د بدن د اوسپنی د زیرمو د کموالی لامل کېږي. د اوسپنی کموالی بیا د هایپوکرومیک مایکروسایټیک حجرو د تولید لامل کېږي. چی په نوموړو حجرو کی د اکسیجن د انتقال قابلیت لږدی او د شمیر د زیاتوالی له امله د وینې د غلظت د زیاتیدو سبب کېږي چی اعراض نور هم شدید کېږي.

امیدواری

هغه امیدواره مور چی د زړه اورگونو ناروغي او ورسره مل د سپرو د رگونو ناروغي او پلمونري هایپرټنشن ولری (د مایترل دسام تنگوالی)، یا د کینې بطین د خروجی برخی بندش (د ابهر د دسام تنگوالی) همدارنگه د زړه هغه ناروغي چی د زړه د عدم کفائی او د همیودنیا میک له نظره د مهمو اړتیا و و سبب شی ولری، د امیدواری د ډیر خطر سره به مخ وی. که چیري امیدواره مور سیانوز، د زړه عدم کفایه او یا پلمونري هایپرټنشن ولری ماشوم به یې د خطر سره مخ وي.

هغه ښځی چی د ابهر کوارکتیشن او Marfan syndrome ولری د امیدواری په وخت کی د ابهر د Dissection د خطر سره مخامخ دي. هغه ناروغان چی د زړه سیانوتیکه ناروغي، پلمونري هایپرټنشن، او یا مارفان سندروم لری باید حمل وانخلي.

انتانی اندوکاردایتس:

د زړه د ولادی ناروغي زیاتره ناروغانو ته که عملیات شوی وی یا نه په رواجی ډول وقایوی اتی بیوتیک ورکول کېږي. سره لدی چی د وقایوی اتی بیوتیکونو اغیزی یو شان ندی خو د غاښونو، هضمی او بولی تناسلی جهازونو په جراحی او تشخیصه عملیو کی لکه Cystoscopy او proctosigmoidoscopy کی توصیه کېږي

د زړه اورگونو ناروغي
ناروغي.

په لویانو کې د زړه ولادي


د زړه ځانګړې ولادې نیمګړتیاوې Specific cardiac Defects :

۱- د زړه غیرسیانوتیکي ولادې ناروغي چې د کین څخه ښی لوری ته د شت سره ملګری وي:

د دهلیزونو ترمنځ د دیوال نقصان Atrial septal defect

ASD په لویانو کې د زړه د ولادې ناروغيو د نورو ډولونو په پرتله ډېر لیدل کېږي. د اناتوميک موقعیت له مخې په دریو ډولونو ویشل شویده :

ostium secundum یې ډیر مروج دی چې ۸۰ سلنه پېښی جوړوي او د Fossa ovalis په منځنۍ برخه کې شتون لري. Ostium primum ډول یې د سپټم په برخه کې وي او زیاتره د مایټرل او تسرای کسپید د Cleft سره یو ځای وي. د ASD دریم ډول د Sinus venosus defect دی چې پدې کې د دواړه اذیناتو ترمنځ سوري د سپټم په پورتنۍ برخه کې شته وي. د ASD په ټولو پېښو کې اکسیجن لرونکې وینه د کین اذین د لوړ فشار څخه د ښی اذین ټیټ فشار ته تیرېږي او د ښی بطن د Output او د ریوی شریان د جریان د زیاتیدو لامل ګرځي. د ASD په زیاتره ناروغانو کې پلمونري فشار په منځنۍ کچه لوړ وي او شدید لوړوالی یې یواځې په ۱۵ سلنه ناروغانو کې لیدل کېږي. ASD د ښی اذین د لویوالي له امله د ازېنې فبریلیشن د پاره لاره هواروي. او هم په معکوس ډول د ښی څخه چپ ته د امبولی لامل ګرځي.



۵- ۱: انځور د ASD بېلابېل ډولونه ښيي. (۱۶)

کلینکي بڼه :

د زړه او رگونو ناروغي
ناروغي.

په لویانو کې د زړه ولادي

د ASD او PFO کوچني او متوسط ډولونه ترڅو چې اختلاطي نه شي بې عرضه وي. خو که سایز یی لوی وي، زیاتره د عمر په څلورمه لسیزه کې د زړه د پاتې والي گیلې او نښې څرگندېږي. په فزیکي کتنه کې د ښې بطين او د سپړو د شریان نبضان د لیدو او جس وړې. په ریوی شریان کې د وینې د جریان د زیاتوالي له امله په دوهم او دریم بین الضلعي مسافه د سترنوم چپه خوا کې شدید ejection سیستولیک مرمر اوریدل کېږي. د زړه د دوهم غږ تضاعف شته وي چې د تنفس سره تغیر نه کوي.

ECG او د سینې رادیو گرافي:

د ښې بطين د وینې د جریان د زیاتیدو له امله د زړه برقي محور ښی لوری ته بې ځایه شوی وي او د ښې بطين د غټوالي نښې لیدل کېږي د ASD په نږدې ټولو پېښو کې ناتام یا تام RBBB شته وي. د Av Canal کانال د دفکت په صورت کې Superior axis deviation او هم د زړه دریمه درجه یا مکمل بلاک شته وي. د سینې په رادیو گرافي کې ریوی شریانونه لوی د سپړو Vascularity زیاته او ښې اذین او ښې بطين لوی ښکاري. تشخیصه پلټنې:

په ایکوکارډیوگرافي کې د اذیناتو ترمنځ د پردې نقيصه د ۲D، رنګه او PW ډاپلر پواسطه معلومیدای شي د شکمن تشخیص په صورت کې د مری له لیاری ایکوکارډیوگرافي مرسته کوي Radionuclide پلټنې د کین څخه ښی لوری ته د جریان د اندازې، CT او MRI د سپټم د اناتومي په باره کې معلومات راکولای شي. د زړه کتیترايزشن د شنت د اندازې، ځای، د ریوی شریان د فشار او د سپړو د رگونو د ټینګار په باره کې کافي معلومات راکوي.

د زړه او رگونو ناروغي
ناروغي.

په لویانو کې د زړه ولادي


انزار او درملنه :

کوچني ASD لرونکی ناروغان کولای شي په نورماله توګه ژوند وکړي او جراحی درملنی ته اړتیا نه لري. د لوي شنت په صورت کې جراحی تداوی توصیه کېږي .
طبی تداوی:

د اذیني فبریلیشن او PSVT لپاره د اریتمیا ضد درملنه او د زړه احتقاني عدم کفائي په صورت کې د عدم کفائي درملنه وشي.

د بطناتو تر منځ پردی نقصان (VSD) Ventricular Septal Defect .

پدی آفت کې د بطناتو تر منځ د پردی یوه برخه په دوامداره توګه خلاصه پاته وي . او په نتیجه کې وینه د لوړ فشار لرونکی چپ بطن څخه و تپیت فشار لرونکی ښی بطن ته تیرېږي . VSD کیدای شي د کوچنیوالي په دوران کې چی سپتم تکامل او هایپرتوفی کوی پخپله بند شي . هر څو مړه چی سوري کوچنی وي په همغه کچه د چپ او ښی بطناتو تر منځ د فشار توپیر زیات او مرمريي شدید وي . ولادي VSD ، د بطناتو تر منځ د پردی په مختلفو برخو کې منځته راتلای شي خو په کاهلانو کې زیاتره د سپتم په غشای برخه کې وي .



۵-۲ انځور: VSD ښی (۸)

کلینیکي بڼه

د ناروغی کلینیکي بڼه د دفکت د جسامت او د سږو د رگونو د مقاومت د لوړوالی په شتون او نه شتون پورې اړه لري . که شنت کوچنی وي یو لوړ ، خشن هولوسیستولیک مرمرد سترنوم کینی خوا ته په دریمه یا څلورمه بین الضلعی مسافه کې اوریدل کېږي . غټ شنتونه

د زړه اورگونو ناروغي
ناروغی.

په لویانو کې د زړه ولادي

د ښی بطن د حجم او فشار د زیاتوالي لامل ګرځي. سیستولیک تریل زیاتره پېښو کې شته وی. د زړه عدم کفایه پیدا، او کله چې د ښی او کیڼ بطن فشارونه سره برابر شی شنت سرچیه کیږي یعنې د ښی بطن څخه وینه کیڼ بطن ته تیرېږي. اوله کبله یې سیانوزس پیدا کیږي. که شنت لوړ واقع شوی وی د ابهر د دسام کسپونو د پرولپس له کبله شنت کوچنی کیږي خو د ابهر د دسام د عدم کفایې لامل ګرځي.

تشخیص:

ECG کیدای شي نارمل وی او یا د ښی، کېڼ او یا د دواړو بطناتو د هایپرتروفی ښی ولیدل شي، که چیرې شنت غټ وی، د سینې په رادیو ګرافي کې د ښی بطن، چې بطن چې اذین او د ریوی شریانونو خیال لوی ښکاري او د سږو vascularity زیاته وي. ایکو کارډیو ګرافي د اذیناتو او بطناتو سایز او د ډفکت ځای ښیي او هم د ښی بطن سیستولیک فشار او د ساماتو د پاتی والی په باره کې معلومات راکوي.

MRI او CT هم د ډفکت په معلومولو او هم که بل اناتوميک ابناړملي موجود وی مرسته کوي. د زړه کنتیرایزیشن د VSD موقعیت، د سږو د اوعیو تینګار او د نورو انومالیو شتون چې پټی پاته شوی وی راښیي.

انزار او درملنه:

که چیرې ناروغ یواځې مرمر ولری او نور تشوشات ورسره ملګری نه وی، د اندوکاردایتس د خطر څخه پرته نور نورمال ژوند به لري. د اندوکاردایتس پېښې په کوچنیو شنتونو کې زیات وي. د اندوکاردایتس د مخنیوی د پاره وقایوی اتی بیوتیک ته اړتیا ده. که شنت لوی وی CHF د ژوند په لومړیو وختو کې پیدا کیږي. کوچنی شنتونه جراحی عملیې ته اړتیا نه لري. خو لوی شنتونه باید ترمیم شي ځکه چې وروسته د سږی د شریان هایپرټنشن او د زړه عدم کفایه منځته راوړي.

Patent Ductus Arteriosus

په داخل رحمی دور کې Ductus arteriosus د سږو شریان څخه ابهر ته د وینې جریان ته اجازه ورکوي. په نورمال حالت کې نوموړی قنات یا نل د زیږیدنی څخه وروسته سمدستی

د زړه او رگونو ناروغي
ناروغی.

په لویانو کې د زړه ولادي

بندېږي. د نوموړې قنات نه بندیدل د کین سپری شریان او ابهر دوامداره شنت منځته راوړي. له زیږېدنې دمخه نوموړې قنات د دورانې پروستاگلانډین پواسطه خلاص ساتل کېږي، په نوی زیږېدلی ماشوم کې خلاص پاتې شوی قنات د پروستاگلانډین د نهې کوونکې درمل لکه Indomethacin پواسطه بندیدلای شي. لوی شنت د ریوی شریان د فشار زیاتوالي او Eisenmenger سندروم پیداکوي پداسې حال کې چې کوچنی شنت تر کهولته پورې ښه زغمل کېږي.

کلینکي څرگندونې:


تر هغه پورې چې د کین بطن عدم کفایه او ریوی هایپرشن منځته نه وي راغلی کوم اعراض نه لري. د زړه جسامت نورمال وي او یا لږ غټ شوی وي او یو قوی د زړوې ضربه شته وي. نبضاني فشار (pulse pressure) پراخه، او د یاسټولیک فشار ښکته وي. یو دوامداره ځښ Machinery مرمړچي د سیستول په اخر کې شدید وي د قص د هډوکي په چپه خوا کې پر لومړي او دوهمه بین الضلعي مسافه کې په ښه ډول اوریدل کېږي. تریل هم د جس وړوي. که چیرې ریوی هایپرشن منځته راغلی وي شنت معکوس کېږي چې په نتیجه کې د بدن ښکتنی برخو ته غیر مشبوع او پورتنی برخو ته د اکسیجن څخه مشبوع وینه رسیږي لدې امله لاسونه نورمال خود پښو په گوتو کې سیانوز او clubbing شته وي.

تشخیصه معاینات:

ECG کیدای شي نورمال وي او یا د کین بطن هایپرتروفي ولیدل شي. د سینې په رادیو گرافي کې د زړه جسامت او شکل نورمال وي او یا د کین اذین او بطن غټوالی شته وي. همدارنګه ریوی شریان، ابهر او کین اذین بارز وي. ایکوکارډیوگرافي کې د کین بطن، ښی بطن او اذیناتو اندازه، او رنګه داپلرایکوکارډیوگرافي کې شنت هم معلومیدای شي. د زړه د MRI او CT په وسیله هم افت پیژندل کېږي. د زړه کیتیرایزن د شنت د جریان سمت او جسامت او دا چې ریوی هایپرشن شته او که نه معلومات راکولای شي. کیتیرایزن د تداوی په موخه هم کارول کېږي.

د زړه او رگونو ناروغي
ناروغي

په لويانو كي د زړه ولادي



۳-۵ انځور: كي PDA په شيماتيک ډول ښودل شويدي (۱۶)

درملنه :

که اختلاطات منځته نه وي راغلي د خلاص قنات تړل د جراحي په وسيله ډيره ښه نتيجه ورکوي په کوچنيانو او لويانو كي چي اعراض ولري او يا شنت يي غټ وي استطباب لري . پدي وروستيو كي د کتيتر د لاري د قنات د تړلو څخه ښي پايلي لاس ته راغلي دي . که خلاص قنات د ريوي هايپرشن سره يوځای وي د تړلو په هکله يي استطباب ترڅپړني لاندی دی، او ترجيحا هغه وخت د جراحي په وسيله قنات وتړل شی چي د سپرو د رگونو مقاومت ښکته وي او په قنات کی جريان د کين څخه ښي خوا ته وي . د اندو کاردايتس د مخنيوي لپاره انتی بیوتیک ورکول کيږي .

۲ — د زړه غیر سيانوتيکي ولادي ناروغي پرته له شنت څخه

A cyanotic congenital heart disease with out a shunt

د ابهر د دسام ولادي تنگوالي :

۱ — د ابهر دسامي تنگوالي Valvular aortic stenosis :

دا ولادي ناروغي په ترانو کی د ښځو په پرتله دری ، څلور ځلي ډيره ليدل کيږي . د ابهر بای کسپيد دسام د زړه ډيره عامه ولادي ناروغي ده چي کيدای شي تنگ وي يا نه څرنگه چي

د زړه او رگونو ناروغي
ناروغۍ

په لویانو کې د زړه ولادي

د ابهر بای کسپید دسام د وخت په تیریدو سره تنگیږي، لدی امله په پاڅه عمر لرونکو کی د روماتیک او degenerative calcific aortic stenosis څخه یې توپیر گران دی. (کلینکی څرگندونې یې د زړه د دسامی ناروغیو تر عنوان لاندی مطالعه شویده)
درملنه:

د ابهر د دسام د ولادی تنگوالی طبی درملنه، د اتتانی اندوکارد ایتس په وړاندی وقایه او که اړتیا وي، په هغه ناروغانو کی چی جراحی ته انتظار باسی د یجیتال، دیورتیک ورکړه، او د مالگی بندیز ده. که د ابهر د دسام تنگوالی شدید وی، ناروغ باید شدید فزیکي فعالیت ونکړی. د ابهر د دسام بدللول هغه وخت استطباب لري چی ناروغ کی د ابهر دسام شدید تنگوالی (د ابهر د دسام پراخوالی $[0,5 \text{ cm}^2/\text{m}^2]$ وی، د کین بطن د دندو خرابوالی او د میوکارد اسکیمیا شته وي. په بې عرضه ماشومانو، تنگی ځوانانو او ځوان کاهلانو کی چی د دسام ډیر شدید تنگوالی ولری او دسام په کلسیفکېشن اخته نه وي د ابهر دسام balloon valvuloplasty گټور دی. همدارنگه په هغه زړو خلکو کی چی د نورو پر مختللی ناروغیو لکه سرطان او د پښتورگو او ځیگر عدم کفایي له کبله جراحی استطباب ونه لری نوموړی عملیه د لنډی مودی لپاره گټور دی.

۲- سب اورتیک تنگوالی: - Sub aortic stenosis

ددی آفت ډیر معمول ډول Hypertrophic Cardiomyopathy ده چي په ۱۱۳ ناروغانو کی د زیربیدنی په وخت کی شته وي. د کلینیک او فزیالوژی له نظره د ابهر د تنگوالی سب اورتیک ډول د د ابهر دسامی تنگوالی سره ورته والی لری. تنگوالی د یوی پردی او یا فیروزی حلقی په ډول کښ بطن په خروجی برخه کی د ابهر د دسام د قاعدی شاته شته وی. تشخیص یې د ایکوکاردیو گرافی په وسیله کیږی او درملنه یې د پردی او فیروزی حلقی ایستل دی چی تنگوالی یې منخته راوړی دی.

۳- Supra Valvular aortic stenosis

پدی انومالی کی د صاعده ابهر ځایي یا خپور تنگوالی د اکللی شریان د سرچینی څخه پورته برخه کی شته وي. په ځینی ناروغانو کی یوه جنتیکه گډوډي په اوم کروموزوم کی شته وي.

د زړه او رگونو ناروغي
ناروغي.

په لویانو کې د زړه ولادي

د ابهر کوارکتیشن Coarctation of the aorta :

د ابهر د لومن تنگوالی د نوموړی شریان په هره برخه کې پیدا کیدای شي خو زیاتره د کینې خوا تحت ترقوی شریان د سرچینې څخه وروسته برخه کې شته وي. نوموړی ناروغي د زړه د ولادی ناروغيو ۷% پېښی جوړوي. پېښی یې په نرانو کې د ښځو په پرتله دوه ځلې زیاته ده. زیاتره اخته ماشومان او ځوان کاهلان چې یواځې کوارکتیشن لري بی عرضه وی سردردی د پوزی څخه ویسنه بهیدنه، د نهایتو یخوالی او د فزیکي فعالیت سره Claudication پیدا کیدای شي. د زړه او رگونو سیستم ته هغه وخت پاملرنه زیاتېږي چې په فزیکي معاینه کې د زړه مرمړ، په پورتنی نهایتو کې د فشار زیاتوالی او د فحزی شریان د نبضان نشتوالی، کموالی او یا وروسته والی تثبیت شي. په بین الضلعي مسافه کې لوی نبضاني کولتیرال رگونه د جس وړوي. د پورتنی اطرافو او گوگل وده ښکتنی اطرافو په پرتله ډیره وي.


تشخیص :

په ECG کې په معموله توګه د کین بطین هایپرتروفی لیدل کیږي. د گوگل په رادیوګرافي کې د بین الضلعي شریانونو د وینې د جریان د زیاتوالی له امله د پښتو ښکتنی څنډې د اری دندانی (rib notching) په شان لیدل کیږي. همدارنګه د کین تحت ترقوی شریان پرخوالی، د تنګوالی نه وروسته پراخوالی او د کین بطین هایپرتروفی هم لیدل کیږي. ډا پلرایکو کارډیوګرافي سربیره پر دی چې په تشخیص کې مرسته کوي د ورسره مل آفاتو په باره کې هم معلومات را کولای شي.

CT او MRI د کوارکتیشن د ناحیې ډیر ښه تصویر ښیي د زړه کتیترایزیشن د آفت په دواړو خواو کې د فشار توپیر اندازه رابښي او هم که چیرې د درملنی په خاطر پوستکی د لاری د stent تطبیق په پام کې وي، د زړه کتیترایزیشن اړینه معاینه ده

د زړه اورگونو ناروغي
ناروغي.

په لویانو کې د زړه ولادي



۴-۵ انځور: کې د CMR انځیوگرافي معاینه، د ابهر کوارکتیشن نښې. (۱۸)

درملنه:

درملنه يې د جراحي عمليې په وسيله د تنگۍ برخې پری کول او د دوو څنډو انسټموزس يا Subclavian flap angioplasty ده. د جراحي عملياتو څخه وروسته د هايپرتنشن دوام د عملياتو څخه مخکې د هايپرتنشن دوام پورې اړه لري. که د جراحي عمليې څخه وروسته کوارکتیشن بيا پيدا شي، balloon dilatation او د ستنت تطبيق گټور دی.

د پلمونري دسام تنگوالی:

د ښې بطين د خروجي برخې بندش کيدای شي په ځايي توگه د دسام څخه پورته (Supra Valvular) دسام کې (Valvular) او دسام څخه ښکته (Sub valvular) برخو کې شته وي، يا په خپور ډول په يادو شويو برخو کې وي. د پلمونري دسام ولولر تنگوالی د ښې بطين د خروجي برخې د بندش معمول سبب دی. د کلينک له نظره د بندش شدت ډیر ارزښت لري نه د تنگوالی موقعيت. که چيرې د زړه د هانه نورماله وي، که د يو دسام دواړو خواوو ته د سيستوليک فشار توپير ۸۰ - ۵۰ mm hg وي نو منځينی کچه تنگوالی، او که چيرې د فشار توپير لدی څخه زیات يا کم شي په ترتيب سره په شديد يا خفيف تنگوالی دلالت کوي. که چيرې د دسام تنگوالی خفيف وي ناروغان معمولاً بی عرضه وي او د عمر په زیاتیدو سره لږ او يا هيڅ پرمختگ نه کوي خو که تنگوالی بارز وي، شدت يې د وخت په تیریدو سره زیاتېږي. د

د زړه اورگونو ناروغي
ناروغي.

په لويانو كي د زړه ولادي

ناروغي اعراض د دسام د تنگوالي شدت پوري اړه لري كسالت ، سالنډي ، سينكوپ او د بڼي زړه عدم كفايه د ناروغانو ورځني ژوند محدود وي . د شديد بندش په صورت كي د بڼي بطين فشار د كيني بطين د فشار څخه زياتيږي . په فزيكي معاينه كي تريل او Ejection سيستوليک مرمرد قص د هډوكي د كيني خوا په پورتنی برخه كي جس او اوریدل كيږي . د پلمونري دسام په شديد تنگوالي كي د ترای كسپيد د عدم كفاي له امله يو Decrescendo هلو سيستوليک مرمرو اوریدل كيږي .

د سيانوزس شتون د بڼي څخه وچپ زړه ته شت را په گوته كوي چي د ازيناتو تر منځ پردی د نقصان يا د Patent foramen oval له كبله منځته راځي . په هغه ناروغانو كي چي له دسام څخه پورته تنگوالي او يا د سږو د شريان په محيطي برخو كي تنگوالي ولري ، سيستوليک مرمري د تنگي برخي د پاسه اوریدل كيږي . ECG د بڼي بطين د بندش د درجي د معلومولو د پاره بڼه ازموينه ده . په خفيف حالاتو كي ECG نورمال وي . په شديد اومتوسط تنگوالي كي د زړه برقي محور بڼي طرف ته بي ځايه شوی وي . د P څپي د ارتفاع زياتوالي په II او V₁ ليډونو كي د بڼي اډين په لويوالي دلالت كوي چي د شديد تنگوالي سره يو ځای وي .

د سيني راديوگرافي په خفيف او منځني كچه تنگوالي كي نورمال وي خو كه د شديد تنگوالي له امله د بڼي بطين عدم كفايه رامنځته شوی وي د بڼي اډين او بڼي بطين جسامت غټ بڼسكاري او vascularity يي لږ وي . ايكونوگرافي د ناروغي په تشخيص او شدت په معلومولو كي مرسته كوي .

درملنه :

د زړه كنيترد لاري Balloon valvuplasty زياتره پيښوكي اغيزمن دي . همدارنگه د جراحي عمليي په وسيله د منځني كچه او شديد تنگوالي له منځه وړل هم د لږ خطر سره اجرا كيدای شي . د سږو د شريان د محيطي برخو متعددې تنگي برخي د جراحي وړندي . خو كه تنگه برخه يوه وي . هم د جراحي او هم د بالون والوبلاستي پواسطه د درملني وړدي .

د زړه او رگونو ناروغي
ناروغي.

په لويانو كي د زړه ولادي

۳- د زړه ولادی سیانوتیکي ناروغي چی سرو ته د وینی د جریان د کموالي سره یو ځای وي:

ترای کسپید اتریزيا Tricuspid Artesia :

دا انومالی متصف دی پر: ترای کسپید اتریزيا ، ASD او زیاتره د بنی بطن او د سپړود شریان Hypoplasia د کلینک له نظره په ناروغ کی شدید سیانوزس د سیستمیک او ریوی وریدی وینی د گډیدو له کبله شته وی. په ECG كي د کین اذین لویوالي لیدل کیږی. د زړه برقی محور کینی خوا ته بي ځایه شوی وی او د چپ بطن هایپرتروفي لیدل کیږی . Atrial septostomy او د سیستمک شریان یا ورید انستوموزس د سپړود شریان سره ، د سپړو شریان د وینی د جریان د زیاتیدو په موخه تر سره کیږی . او د ژوند د وهمی او دریمی لسیزی ته د ناروغانو د ژوندی پاته کیدو چانس زیاتوی .

د فلوت تترالوژی Tetralogy of fallot :


دا ناروغان VSD ، د بنی بطن هایپرتروفي، د بنی بطن د خروجی برخی بندش او د ابهر بنی خوا ځای نیونه (aortic override) لري . د پلمونری دسام تنگوالی کیدای شی وي یا نه وي . ابهر کیدای شی ډیر پراخه او د ابهر د بیرته راگرځیدنې (ریگورجیشن) لامل شی د رگونو دوه اېنارملتی ډیره لیدل کیږی: د ابهر د قوس بنی خوا واقع کیدل او د کین قدمی نازله. اکلیلی شریان (LAD) د سرچینی انومالی کیدای شی موجود وي.

کلینک :

زیاتره ناروغان په نسبی توگه بی گیلووی ترڅوچی ، د بنی زړه عدم کفایه یا اریتمیا رامنځته شي. په ECG كي د بنی بطن هایپرتروفي، او د بنی ازیڼ پراخوالی لیدل کیږی. په ترمیم شوی تترالوژی كي RBBB موجود وی. که د QRS پراخوالی د msec ۱۸۰ څخه

د زړه اورگونو ناروغي
ناروغي

په لویانو کې د زړه ولادي



۵-۴ انځور: د فلوط تترالوژی رابڼې (۱۲)

زیات وی دا ناروغان ناڅاپي مړینې ته مساعد دی نو لدی امله د QRS پراخوالی باید هرکال معاینه شي.

ایکوکارډیوگرافي ښه تشخیصه معاینه ده، پدی کی د ښی بطن د خروجی برخی بندش ، VSD او د ابهر لوی والی لیدل کیږی . ایکوکارډیوگرافي په ترمیم شوی تترالوژی کی د پلمونری دسام عدم کفایه ، د ښی بطن او چپ بطن دنده او د ابهر د عدم کفایې په باره کی معلومات را کولای شي. د زړه MRI او CT ډیر تشخیصه ارزښت لری ځکه چی د پلمونری دسام د عدم کفایې کچه اود ښی بطن حجم معلومولای شي. د زړه کتیرایزیشن هم د پلمونری دسام د عدم کفایې د درجی په معلومولو کی مرسته کوي.

درملنه :

هغه فکتورونه چی د درملنی د پیچلتیا لامل گرځی عبارت دی له : اتسانی اندوکاردایتیس paradoxical embolism شدید ایریتروسایتوزس ، د وینی د پرڼ کیدو (Coagulation) خرابوالی او دماغی انفرکشن یا اېسی. د تترالوژی د ترمیم د استطباب د پاره ښه معیار د سپرو د شریان جسامت دی نه د ناروغ عمر او جسامت . که چیری د سپرو د شریان شدید هایپوپلازی شته وی په مقدم ډول ترمیمی جراحی عملیه په نسبی ډول مضاد استطباب ده ، پدی حالت کی لومړی سیسټمیک شریان اود سپرو د شریان ترمنځ شنت جوړ او څه موده وروسته د تترالوژی ترمیمی جراحی عملیه ترسره کیږی .

د زړه اورگونو ناروغي
ناروغي.

په لویانو کې د زړه ولادي

د زړه غېر نورمال موقعیتونه (Mal positions of the heart):

د زړه د موقعیت انومالی هغه حالاتو ته ویل کېږي چې د زړه خوکه (Apex) د سینې ښی خوا (Dextrocardia) په منځنۍ کرښه (mesocardia) او یا زړه په خپل نورمال موقعیت کې یعنې چپه خوا کې وی خو د بطني احشاوو ځایونه غیر دودیز وي (Isolated levocardia) که چېرې dextrocardia پرته له Situs inversus څخه وی او یا که چېرې Isolated levocardia شته وی، د زړه گڼ شمیر مغلق انومالی گانې ور سره ملګری وي.

۴ - د زړه هغه ولادی سیانو تیکې ناروغي چې سږو ته د وینې د جریان د زیاتوالي سره

یسو ځای وي:

د لویو شریانونو د موقعیت مکمل بدلون

پدی حالت کې ابهر د ښی بطن څخه سرچینه اخلي او د سږو د شریان ښی مخکنی برخه کې ځای نیسي او پلمونری شریان (PA) د کین بطن څخه سرچینه اخلي پدی ترتیب دوه جلا دورانی سیستمونه منځته راځي. د ژوند دوام د پاره د نوموړي دوه سیستمونو ترمنځ په یوه برخه کې اړیکه شته وی، زیاتره ناروغان ASD، ۲۱۳ ناروغان PDA او ۱۱۳ ناروغان VSD لري. ترانسپوزیشن په نارینه جنس کې زیات او د زړه د سیانوتیک ناروغيو ۱۰% جوړه وي.

درملنه:

په نوي زیږیدلي ماشومانو کې د بالون او یا جراحی عمليي په وسیله د ASD تولید او یا لویول تر ټولو ساده عملیه ده. ددی عمليي په وسیله د سیستمیک او د سږو د دوران وینه سره گډېږي Mustard او sennino په عملیه کې سیستمک وړیدي وینه، دمایترل د سام ته اړول کېږي ترڅو د کین بطن د لازی د سږو شریان کې وبهیري. او د سږو د وړید وینه ترای کسپید د سام ته اړول کېږي ترڅو د ښی بطن د لازی ابهر ته دننه شی د ژوندی پاته کیدو چانس په عملیات کې ډیر دی د ناڅاپه مړینې کچه یی هم لوړه ده.

د زړه او رگونو ناروغي
ناروغی.

په لویانو کې د زړه ولادي

یو بطين (single ventricle)

پدی انومالی کې دواړه اذینې بطيني د سامات او یا یو عمومي اذینې بطيني دسام په یو بطين کې خلاصیږي یو شمیر نور انومالی گانې لکه د لویو شریانونو غیر نورمال موقعیت د پلمونری دسام sub Valvular تنگوالی او sub aortic stenosis هم ورسره ملگری وی . تر کهولته د ناروغانو د ژوندی پاته کیدو چانس د سپو د شریان نورمال جریان ، د سپو د رگونو نورمال مقاومت ، او د بطين د دندو ښه والی پوری اړه لري . (۱۹ ، ۲۱)

د زړه او رگونو ناروغۍ.

د زړه درېتم او انتقال گډوډي


شپږم فصل د زړه درېتم او انتقال گډوډي

Disorder of Heart Rhythm and conduction

د زړه د لېږدونکې سیستم اناتومی:

په دودیز ډول د زړه د پیسمیکر دنده د SA-node په غاړه ده. نوموړي غوټه د ښې اذین په پورتنۍ برخه کې چېرته چې ښی اډن او Superior vena cava یوځای کېږي ځای لري. یونیم ساتی متره اوږدوالې او ۲-۳ ملې متره سور لري. وینه ورته د سینوس د غوټې اړونده شریان په وسیله رسېږي. د سینوس غوټې شریان په ۲۰٪ پیښو کې د ښې اکلیلې شریان او په پاته ۴۰٪ پیښو کې د کین Circumflex اکلیلې شریان څخه سرچینه اخلي.

انگېزه (Impuls) د سینوس نوډ څخه پیل د اذین څخه تیرېږي او AV-node ته ځان رسوي نوموړي غوټه د ښې اذین په قاعده کې د ترای کسپید د دهاني د پاسه د کورونري سینوس مخي ته د غشا لاتدي غځیدلي ده او په ۹۰٪ پیښو کې وینه ورته د خلفي نازله اکلیلې شریان په وسیله رسېږي. د اذینې بطېني غوټې الکتروفزیالوژیک ځانگړتیا داده چې د سیالي لېږدونه وروکوي، د همدې ځنډ له امله په نورماله توگه په ECG کې د PR واټن منځته راځي.



۱-۲ انځور: د زړه د لېږدونکې سیستم اناتومی ښيي. (۱۵)

د زړه اورگونو ناروغۍ.

د زړه درېتم او انتقال گډوډي

His بندل د اذیني بطیني غوتي څخه راوځي او د بطیناتو ترمنځ د پردی په فیروزي جوړښت کې تر یوه واټنه پرمخ ځي. نوموړي بندل د AV نوډ شریان او د قدامي نازله اکلیلي شریان د یوې څانگې په وسیله اروا کیږي.

د هیس بندل څخه د بطیناتو ترمنځ پردی بنې لوری ته Right Bundle branch او کین لوري ته Left Bundle branch د یو فیروزي لیف په ډول جلا کیږي. RBB او LBB دواړه په بطیناتو کې د پرکنج په سیستم بدلیږي او بیا د بنې او کین خوا اندوکارډ لاندې خپرېږي. SA نوډ، اذینات او AV نوډ د نباتي سیستم تر اغیزې لاندې فعالیت کوي. د واگس عصب د فعالیت په وسیله د SA نوډ اتوماتیسیټي اوډ لیږدونې چټکتیا کمېږي او په AV نوډ کې د لیږدونې چټکتیا کمه او Refractoriness اوږدېږي. برخلاف د سمپاتیک اعصابو د تنه له کبله متضادي اغیزې پېښېږي.

برې اریتمیا The Brady arrhythmia

د سینوس د غوتي د دندو خرابوالی Sinus node dysfunction

په دودیز ډول سینوس غوطه د زړه د ناظم (Pacemaker) دنده سرته رسوي. ځکه چې په سینوس غوطه کې د سیالود جوړیدنی کچه د زړه د نورو برخو څخه زیاته ده. په SA نوډ کې د سیالود جوړیدو چټکتیا د نباتي یا اتونوميک عصبي سیستم په وسیله کنټرولېږي. د تمرین په وخت کې د زړه چټکتیا زیاته اوډ خوب اوډ دمې په وخت کې برعکس د زړه چټکتیا کمه وي. سمپاتیک اعصاب د β ادرینرجیک اخذود لاري د نوموړي غوتي چټکتیا زیاتوي، او پاراسیمپاتیک اعصاب د موسکرینیک اخذوله لاري د سینوس غوتي چټکتیا کموي.

د سینوس نوډ په دندیزو نیمگړتیاو کې لاندې ناروغي گډون لري:

١) Inappropriate sinus Bradycardia:

په غټانو کې د زړه نورماله چټکتیا په یوه دقیقه کې ۲۰-۱۰۰ ضریبي ده. که دغه سینوس ریټ د ۲۰ څخه کم شي د سینوس بردي کارډیا په نوم یادېږي.

دزړه او رگونو ناروغۍ.

دزړه درېتم او انتقال گډوډي

سینوس برډیکارډیا هغه وخت نامناسب (Inappropriate) بلل کیږي چې د زړه ریټ د تمرین سره سره په مناسبه کچه لوړه نه شي. دغه اریتمیا باید د هغه بې عرضه سینوس برډیکارډیا څخه چې په لوبغاړو کې د دمې په حال کې او په نورمالو وگړو کې د خوب په وخت کې شته وي، توپیرې تشخیص شي.

۲: Sinus arrest یا Sinoatrial Arrest:

پدې حالت کې په SA نوډ کې سیاله نه جوړیږي هغه ځنډ چې د سینوس تم له امله رامنځته کیږي د نارمل p-p یا R-R د واټن خوراځه نه وي. په نورمالو وگړو کې درې ثانیو څخه زیاته وقفه نادر دی.

۳: سینوسی خروجی بلاک Sinoatrial Exit Block:

د سینوسی دریدنې په شان پدې نیمگړتیا کې هم یو سیستول پرته د P څپې څخه رامنځته کیږي. د Escape beat له پیداکیدو پرته سینوس بلاک د یو بل سینوس بیت د رامنځته کیدو سره له منځه ځي. هغه وقفه چې دلته رامنځته کیږي زیاتره د نورمال P-P یا R-R څو برابره وي.

اکسټ بلاک هم د AV-block په شان په دریو درجو ویشل شویده:

- په لومړي درجه سینواتریل Exit block کې د سینوس نوډ څخه د شاوخوا اذیني نسج ته د سیالي د لیریدو وخت اوږدیږي. چې دا د ستندرد ECG په وسیله نه تشخیص کیږي، اود تشخیص د پاره یې د زړه دننه ECG ته اړتیا ده.
- په دوهمه درجه خروجی بلاک کې په نوبتي ډول د SA-node څخه شاوخوا اذیني نسج ته د سیالي لیریدل بندیږي. په ECG کې په نوبتي ډول د P څپه له منځه ځي.
- دریمه درجه سینوس اکسټ بلاک د اذیني فعالیت د نه شتون او یا د یو پټ اذیني ناظم د شتون له مخې پیژندل کیږي. د ستندرد ECG له مخې د سینوس اریسټ څخه یې توپیرگران دی. تشخیص یې د زړه دننه نیغ په نیغه د سینوسونو د فعالیت ثبوتولو له مخې کیږي. (۱۹)

دزړه اورگونو ناروغۍ.

دزړه درېتم او انتقال کېدونکي

۴: تکی کارډیا برډیکارډیا سندروم: Tachycardia-Bradycardia syndrome:

د Sick sinus syndrome په نوم هم یادېږي ، په دی اریتمیا کی نوبتي سینوس او یا نوډل برډي کارډیا او اتریل تکی کارډیا شته وي.

څرنگه چې د تکی کارډیا په وسیله د SA نوډ automaticity نهی کیږي نو د تکی اریتمیا خڅه وروسته حالت کې سینکوپ او پري سینکوپ حالتونه پیدا کیږي.

د سینوس غوټی د دندی د خرابیدو غوره لاملونه:

۱: SA-node د اروا خرابوالی. ۲: اذیني میوکارډیل انفارکشن ۳: Senile amyloidosis

څرگندوني :

سره لدی چې شدید برډیکارډیا (د زړه ضربان په دقیقه کی ≤ 50) کیدای شي د ستړیا او د زړه د دهاني د کموالي نورو نښو د منځته راتلو لامل شي خو د سینوس نوډ د دندو خرابوالي زیاتره د حملوي گنګسیت ، Pre-syncope اوسینکوپ په ډول څرگندېږي . نوموړي گیلې زیاتره د ناڅاپي او دوامداره سینوس تم (Sinus pause) له امله وي چې د سینوس اریست اوسینوسی خروجي بلاک له کبله منځته راځي .

د زړه په گراف کې به د اذیني اسیستول اوږده مرحله (دري ثانیې) شته وي . ځینې وخت د سینوس ابنارملتي سره اذیني بطیني لېږدېدنه هم د گډوډی سره مخ وي چې د اذیني فعالیت په نشتوالي سربیره بنکتنی پیسمیکرونه هم نشي کولی چې سیاله جوړه کړي او په پایله کې بطیني اسیستول اوسینکوپ منځته راځي . کله کله د SA نوډ ابنارملتي یواځي په ستریس حالاتو لکه تبه او تمرین کې د سینوسي چټکتیا د ناکافي زیاتوالي په ډول څرگندېږي .

په ځیني ناروغانو کې د SA نوډ د دندو خرابوالي د ځیني قلبی دواگانولکه گلایکوسایډونو ، بیتابلاکرونو ، کلسیم چینل بلاکر ، Amiodarone او نور اریتمیا ضد درملو د کارولو سره ښکاره کیږي .

د ناروغه سینوسی سندروم رنځوران د ستړیا ، گنګسیت ، دماغی خړپړتیا ، سینکوپ او CHF د اعراضوڅخه گیله من وي . چې د SA نوډ د دندو د خرابوالی له امله منځته راځي او د سینوس برډیکارډیا ، سینواتریل بلاک اوسینوس اریست په ډول څرگندېږي .

دزړه او رگونو ناروغۍ.

دزړه درېتم او انتقال کېدو دي

څرنگه چې گيلې بي غېروصفي وي او د سينوس ډيسفېنکشن، ECG بدلونونه زياتره وقفوي وي نولدي امله گرانه به وي چې ثابت شي، چې يادي شوي گيلې په رېنېتيا سره د سينوس نوډ د دندو د خرابوالي له امله منځته راغلي دي. اذيني تکی اريتميا لکه اذيني فيبريليشن، اذيني فلتر او اذيني تکی کارډيا کيداي شي د SA نوډ د دندې د خرابوالي سره يوځاي وي. درملنه :

په عرضي ناروغانو کې اساسي درملنه د دايمي پېسمېکراينودنه ده. هغه ناروغان چې د برېکارد يا نوبتي حملې، سينوس اريست او Hypersensitive carotid syndrome لري بڼه درملنه يې Demand ventricular pacemaker دی.

AV-conduction disturbance د AV نوډ د انتقال بې نظمي

هغه تنبه چې د اذین څخه سرچينه اخلي د زړه د ځانگړې لېږدونکي سيستم په واسطه بطین ته رسېږي. خو کله چې بطین ته د تنبه په لېږدونه کې اېنارملي راشي د د زړه بلاکونه پېدا کېږي، چې په پایله کې به ورڅخه سینکوپ او د زړه د رېدنه را منځته شي. د Av Block غوره لاملونه عبارت دي له :

۱- IHD (اسکیمیا، احتشا)

۲- اتاني ناروغۍ (Lyme ناروغی، Chagas ناروغی، سفلیس)

۳- معافیتي او Infeltrative ناروغۍ لکه روماتويد اترتیس، SLE، سکرودرما، امایلویدوزس، سارکویډوزس او هیمو کروماتوزس

۴- سرطاني ناروغی لکه میزوتیلوما

۵- عصبي عضلي ناروغی

۶- ولادي

۷- په کاهلانو کې دوه ديجینراتيف ناروغی Leves disease (چې د زړه عضلې د سکلیروزیس، فايبروزیس او کلسيفیکیشن له کبله اورتيک او مایترال دسامونه زیات


دزپه اورگونو ناروغی.

دزپه درېتم او انتقال کېدو دي

ورباندي اخته وي، او Lenegeres disease چې یواځې انتقالی سیستم اخته کوي او سکلیرو دیجنیراتیف ناروغي ده، هم د AV-node بلاک پیرعمده لاملونه ګڼل کېږي. هیپرتشن، اورټیک اومايترل دسامونو تنګوالی ځانګړی ناروغي دي چې په لېږدونکي سیستم کې دکلسیفیکیشن اوفایبروزیس په منځته راتلو کې نیغ په نیغه برخه اخلي او د انتقالی سیستم د دیجنیریشن سبب ګرځي. (۱۹)

لومړۍ درجه ازیڼی بطني بلاک First degree AV-Block :

د اوږد AV کانډکشن اصطلاح هم ورته کارول کېږي. PR انټروال د 0,2 ثانیو څخه زیات وي څرنگه چې PR انټروال د اذین، AV نوډ او هیس پرکنج فعالیت پوري اړه لري، که په هر یو ددی جوړښتونو کې د سیالی لېږدېدنه وځنډېږي د PR واټن اوږدېږي. که $PR > 0,24$ وي او د QRS کامپلکس دوام نورماله وي، د PR د اوږدېدو علت به په AV نوډ کې د سبالي ځنډ وي. که په هیس پارکنج سیستم کې سباله وځنډېږي، د PR واټن به نورماله وي خو د QRS کامپلکس دوام به اوږد وي.



۲-۲ انځور: لومړۍ درجه ازیڼی بطني بلاک ښيي. (۲۰)

دوهمه درجه ازیڼی بطني بلاک: Second degree AV-Block :

دغه ډول بلاک هغه وخت منځته راځي چې ځینې اذېنې سیالی ونشي کولی چې بطن ته ننوځي.

I: Mobitz Type I second degree AV block (Wenckebach)

دزپه اورگونو ناروغۍ.

دزپه درېتم او انتقال ګډوډي

پدې حالت کې د PR واټن په تدریجي توګه اوږدېږي چې په درېم یا څلورم سپکل کې د P پسې د QRS کامپلکس منځ ته نه راځي. اوهغه تم چې لدینه وروسته واقع کېږي د دوه نارمل سینوس اتروال څخه کم وي دغه ډول بلاک په AV نوډ کې ځای نیولي وي او QRS کامپلکس یې نارمل دوام لري، کیدلي شي چې BBB هم ورسره ملګري شي. دغه ډول بلاک په تیریدونکي ډول د میوکارد سفلي احتشا او د درملو د تسمم لکه دیجیتالیس، بیتا بلاکر او کلسیم چینیل بلاکر) سره لیدل کېږي.

دغه ډول بلاک په نورمال وګړو کې د واکل تون د زیاتیدلو له کبله هم منځته راتلاى شي. د بشپړ بلاک په لور پرمختګ نه کوي، که په سفلی انفارکشن کې دا ډول بلاک رامنځته شي په ښه توګه به وزغمل شي ځکه د هیس بندل په قریبه برخه کې سکېپ پېسمیکر فعاله او ثابت ریتم ته دوام ورکوي. په پایله کې ویلي شو چې Mobitz type-I بلاک نادراً پرمختللي درملني ته اړتیا پېداکوي. د درملني پریکړه یې د بطیناتو په غبرګون او د ناروغانو په اعراضو پورې اړه لري که د بطیناتو رېټ مناسب او ناروغ غیرعرضي وي یواځې د رنځور څارنه بس دی.



۳-۲ انځور: Mobitz type I second-degree AV block ښيي. (۱۹)

Mobitz-Type-II دوهمه درجه AV بلاک:

پدې حالت کې د سیالۍ لېږد یډنه په ناڅاپي توګه له منځه ځي بې لډي چې د PR په اتروال کې کوم مخکیني بدلون راغلي وي. دا زیاتره د هیس پرکنج سیستم د ناروغیو له کبله منځته راځي او اکثره ورسره اوږد QRS کامپلکس ملګري وي.


په ناروغ کې ددې بلاک پېژندنه ځکه ارزښت لري چې د بشپړ بلاک پلور پرمختګ کوي او ددی سره چې کوم اذیني پیسمیکر منځته راځي هغه بې ثباته او ورو وي. پدې حالت کې د پیسمیکر ایښودنه ضروري ګڼل کېږي.

دزپه اورگونو ناروغۍ.

دزپه درېتم او انتقال گډوډي

درېمه درجه ازينی بطنی بلاک Third degree AV-block :

۱. درېمه درجه بلاک هغه وخت منځته راځي چې هيڅ سياله د ادين څخه بطين ته لاړه نه شي.
۲. که سکېپرېتم په AV نوډ کې وي د QRS دوام به نورمال او چټکتيا به يې په دقيقه کې ۴۰-۵۵ وي، او هم د اتروپين او يا تمرين سره به يې په ريت کې زياتوالي راشي.
۳. که بلاک په هيس بندل او يا د هيس څخه لري وي د QRS کامپلکس به پراخه وي، ريت به يې په دقيقه کې د ۴۰ څخه کم وي.



۲-۴ شکل: درېمه درجه AV بلاک نښې، د P او QRS ترمنځ اړيکه نشته (۱۲)

درملنه:

فارمکولوژيک درملنه په حادو حالاتو کې توصيه کېږي. اتروپين د ۵، ۰ څخه تر ۲ ملي گرامه داخل وريد او Isoproterenol د ۴-۱ مليگرامه په دقيقه کې د اعراضو د کمولو او د زړه د ريت د جگولو په خاطر په هغه ناروغانو کې چې سينوس برديکارد يا او هغه AV-block باندې چې په AV نوډ کې يې ځاي نيولي وي کارول کېږي. په نښکتنی پېسميکرونو باندې ښکاره اغيزه نلري. د نيورو کاردياک سنکوپ په ناروغانو کې β بلاک او Dysepyramide د کين بطين د نندۍ د کمولو او د ميخانيکي رسپتورونو د عکساتو د کمولو په خاطر ورکول کېږي. داسي راپورونه شته چې په ځينو ناروغانو کې د مينرالو کورتيکويډ، Midodrine، ايفيدرين او تيوفيلين ورکول گټور تمامېږي.

همدارنگه د Serotonin reuptake inhibitor ورکول هم په ځينو ناروغانو کې اغيزمن دی. د بردي اريتميا د اوږدې مودې درملنې لپاره ښه کړنلاره د پېسميکرتطبيق دی. (۶، ۷، ۱۹)

د زړه اورگونو ناروغۍ.

د زړه درېتم او انتقال گډوډي

تکي اريتميا The Tachyarrhythmias

د تکي اريتميا په منځته راتلوکې لاندې دوه ميکانيزمونه برخه اخلي:

۱: د سيالي په خپریدلوکې گډوډي (Disorder of impulse Propagation)

۲: د سيالي په جوړېدو کې ويجاړتيا (Disorder of impulse formation)

Premature complex

ازېني پريمچور کامپلکس (APCS) Atrial premature complexes:

په څلورويشت ساعته Holter مونيټورنگ کې د ۲۰٪ څخه په زياتو کاهلوکې APCS شتون لري. APCS په زياتره حالاتو کې بي عرضه او سليم وي. ځيني وخت ورسره د زړه ټکان يو ځاي وي. اوپه يو شمېر ناروغانو کې د APCS څخه کيدای شي حملوي فوق بطني تکي کارډيا پيل شي. APCS د ازيناتو د هرې برخې څخه سرچينه نيولي شي اوپه الکتروکارډيوگرام کې د Early P wave چې نورمالی سينوسي P څپې څخه توپير لري شته وي.

که APCS د زړه سپکل په وروستې وخت کې منځته راغلي وي زياتره بطين ته ننوځي خو مقدم APCS تر AV انتقالي برخې پورې پداسې حالت کې رسېږي چې دا برخه په نسبي ټينگاريز صفحه کې وي. او د لېږديدنې د ځنډ له امله به د پريمچور P څپې وروسته د PR يوه اوږده صفحه راشي. هغه APC چې ډير وختي منځته راغلي وي په AV نوډ کې به چې په ټينگاريز حالت کې وي بلاک شي. د هر APC څخه وروسته لنډ ځنډ پيدا کېږي چې د اکسترا سيستول څخه مخکې او وروسته PP انتروال اندازه به د دوه سينوس PP انتروال د جمعې له حاصل څخه کمه وي. له APCS وروسته د QRS کمپليکس زياتره پېښو کې نورمال وي.

زياتره APCS غير عرضي وي او درملني ته يې اړتيا نه پېښېږي که د زړه ټکان اوډ PSVT لا مل شي بيا تداوي کېږي. هغه فکټورونه چې APCS ته زمينه برابروي او هغه راپاره وي لکه الکول، تنباکو او ادرينرجيک هڅوونکي بايد معلوم ولري کړاي شي او که شتون ونلري، خفيف Sedition او بيتا بلاکر کارول کېږي.

دزړه او رگونو ناروغۍ.

دزړه درېتم او انتقال گډوډي

AV-Junctional complex:

فکر کېږي چې د دې کامپلیکس ډیپل ځای به دهیس په بڼل کې وي او د نورمال AV-نود څخه اضافي اتوماتیستي نشي ورباندې راتللي. دغه ډول اریتمیا د اذینې او بطنې پریمچور کامپلیکس په پرتله لږ عمومیت لري او زیاتره د زړه د ناروغیو او یا د دیجتالیز د تسمم سره یوځای وي.

نوموړی کامپلیکس په الکتروکارډیوگرام کې د نورمال QRS په لرلوسره چې مخکې یې د P څپه موجوده نه وي پیژندل کېږي خوکه چیرې د اذینې بطنې جنکشن څخه سیالي پورته د اذین پلور (Retrograde) حرکت وکړي پدې صورت کې به له QRS وروسته په II, III او aVF کې منفې P څپه منځته راشي.

زیاتره وخت نوموړی کامپلیکس بی گیلو وي او کیدای شي چې د زړه ټکان او Canon a wave سبب وگرځي. که عرضي وي د APCS په ډول یې درملنه کېږي.

بطنې پریمچور کامپلکس Ventricular premature complex

دایوه دودیزه اریتمیا ده چی پېښی یی د زړه په رنځ اخته او نه اخته وگړو کی لیدل کیږي. د کاهلونارینه وو په څلورویشت ساعته هولتر مونیټورنگ کې د ۶۰٪ $\geq$ پېښو کې VPCS لیدل شویږي. په ۸۰٪ حالاتو کې VPCS په هغوناروغانو کې چې پخوا یې د مایوکارډیل انفارکشن حمله تیره کړې وي لیدل کیږي. پدې ناروغانو کې د ناڅاپي مړینې غوره علتونه بطنې تاکی کارډیا او بطنې فیبریلیشن دي. د مړینې پېښې د میوکارډیل انفارکشن په ناروغانو او هغورنځورانو کې چې VPC پکې په جوړه (Couplet) ډول وي او یا VPC پکې په ساعت کې د لسو څخه زیات وي ډیري دي.

د VPC هغه ناروغان چې اوږد QT او یا حاده اسکیمیا ولري د VT او VF (بطنې فیبریلیشن او بطنې ټکي کارډیا) د پاره زمینه برابریږي همدارنګه په ډېر مقدم VPC (R-on-T) کې د ناڅاپي مړینې پېښې زیاتې وي.

دزپه اورگونو ناروغۍ.

دزپه درېتم او انتقال گډوډي

VPC په ECG کې د پراخه QRS کامپلېکس په لېدلوسره چې مخکې ورڅخه P موج موجود نه وي تشخیص کېږي. خوکه په ځینو ځانگړو انتقالی الیافوکې (Fascicles) منځته راشي پدې ډول VPC کې به د QRS وخت د ۱۲، ۰ ثانیو څخه کم وي او مخکینی سینوس کامپلکس سره به اړیکه ولري که چیرې په جوړه ډول VPC رامنځته شوي نه وي نو بطنی parasystol را په گوته کوي او پدې حالاتو کې د VPC د غېر نورمال اتو ماتیسیتی په وړاندې د یوې وقایوې هډې په ډول په بطنیناتو کې منځته راځي چې دا هډه (Focus) د نارمل سینوز نوډ په واسطه منځته نه راځي او په فعالیت کې یې سینوز نوډ برخه نه اخلي. (۱۹)

VPC کېدای شي یودانه وي یا د هر سینوس بیت څخه وروسته تکرارشي (Bigeminy) او یا کېدای شي د هر دوه سینوس بیت څخه وروسته تکرارشي (Trigeminy). په همدې توگه د Quadrigeminy په ډول هم منځته راتللي شي.

که دوه VPC یو په بل پسې راشي د جوړه (Pair) یا Couplets پنوم یادېږي او که درې VPCS یو په بل پسې په پرله پسې ډول واقع شي او چټکتیا یې په دقیقه کې د ۱۰۰ څخه زیات شي د بطني تکی کار د یا په نوم یادېږي.

VPCS د مورفولوژي یا بڼې له نظره په Monomorphic (چې یو ډول منظره لري) او یا polymorphic (چې مختلفې بڼې ولري) منځته راځي.

په عمومي توگه VPC د اړین خواته په شاه تگ نکوي او د سینوس نوډ جریان سره هم مداخله نلري، نو همداعلت دی چې د مکملی معاضوي مسافي د منځته راتلولامل گرځي.

که بطني سیاله شاته داډین پلورلاره شي په II, III او AVF لیدونو کې به د منفي P څپې د جوړید لامل شي. دغه سیاله په شاه تلنه کې د سینوس نوډ د جریان سره مخامخ کېږي او هغه Pause چې له دې کبله منځته راځي د معاضوي صفحي څخه به لږوي.

په زیاتو حالاتو کې VPCS د بطين څخه د اړین په لورنه ځي او AV نوډ کې بلاک کېږي، دا کار په AV نوډ کې د عاصي صفحي د زیاتیدو لامل گرځي او هغه سیالي چې د سینوس نوډ څخه AV نوډ ته راځي د هغې په لېږد بدنه کې د ځنډ سبب گرځي او د PR فاصله اوږدېږي. دغه اوږدوالی چې په PR کې راځي هغه سیالو ته چې د بطين څخه د AV نوډ لوري ته راځي

دزړه اورگونو ناروغۍ.

دزړه درېتم او انتقال کېدو دي

اجازه ورکوي چې نوموړې غوټې ته ورننوي. دغه ډول VPC ته چې له شاه لوري اډین ته انتقال نه شي خو بطن ته د سیالی د راتګ مانع وگرځي VPC Interpolated ویل کېږي.

ګېلې او نښې :

ناروغ کیدای شي د زړه ټکان او یا په غاړه کې د ضربان څخه چې د اکستراسیستول په تعقیب د یو قوی بطني تقلص د راتلوله کېله پېدا کېږي ، ګیله من وي. د VPC له کېله ستروک والیوم او دزړه دهانه کې کموالی راځي نوکه VPC په تکراری ډول رامنځته شي ، په ناروغ کې به د سینکوپ او سرګیچي سبب وگرځي .

درملنه :

که د زړه ناروغي موجوده نه وي غیر عرضي VPC پرته له دې چې شکل او فریکونسي یې په پام کې ونیول شي درملني ته یې اړتیا نه وي خوکه اعراض ولري اعراض باید وپتل شي چې د Anxiety سره ملګري دی اوکه نه ، که پدې باره کې معلومات ښکاره نه شول بیا د اریتمیا ضد درملو په وسیله د VPC فریکونسي کې باید کموالي راوړل شي .

بېتا بلاکر لاندې VPCS اخته ناروغانو کې ډېر ګټور او اغېزمن دي:

- چې VPC په لومړنۍ ډول د ورځې له مخې منځته راغلي وي.
- چې د VPC سره شدید ستړس ملګري وي.
- چې د مایټرل د دسام پرولېس ورسره وي.
- تایروټوکسیکوزیس ورسره وي.

نور اریتمیا ضد درمل دومره اغېزمن ندي. کومه ګټه چې رسوي هغه هم د هغې د خطراتو له کېله به اغېزي کېږي.

که د VPC سره د زړه ناروغي ملګري وي پدې ناروغانو کې د ناڅاپي مړینې د خطر د کمولو د پاره زیاتره طبیبان هڅه کوي چې د VPC فریکونسي کمه کړي.

اوس وخت د هغو ناروغانو په درملنه کې چې د ناڅاپي مړینې د زیات خطر سره مخ وي (بطني ټاکي کارډیا او بطني ایجکشن فرکشن) ۴۰٪ د ICD کېښودنه ارزښت ناکه ګڼل کېږي.

د زړه اورگونو ناروغۍ.

د زړه درېتم او انتقال کېدو دي

ارېتميا ضد درمل مخکې له مخکې د ارېتمیک اغېزو د مخنيوي دپاره ونه کارول شي. ځکه انتي ارېتمیک درمل پخپله د ارېتميا لامل ګرځي. په تېره بيا که د زړه په ځنډنيو ناروغيو کې وکارول شي، د ارېتميا د اکراسرېشن لامل ګرځي. دحاد انفارکشن په ځوانو ناروغانو کې چې اختلاطي وي انتي ارېتمیک درملنه د ليدو کاین اويا پروکاین امايد سره په وقايوي او موقتي توګه صورت نیسي. نورو څېړنو ښودلي ده چې د داخل وريدی بیتا بلاکر ورکړه د لومړنۍ بطني فبريليشن د پېښيدو خطر را کموي.

تکی کار ديا:

سینوس تکی کار ديا Sinus tachycardia

کله چی د زړه ضربان د ۱۰۰ څخه په یوه دقیقه کې لوړه شي د سینوس تکی کار ديا په نوم یادېږي. نادراً په دقیقه کې له ۲۰۰ ضربی څخه زیاتېږي. دا ابتدایي ارېتميا نده بلکه په یو شمېر حالاتو لکه تبه، د دورانی حجم کموالی، تمرین، تایرو توکسیکوزیس، هایپوکسیمیا، هایپوتینشن او CHF کی د یوفزیولوژیک غبرګون په توګه منځته راځي. د سینوس تاکی کار ديا حمله په تدریجي توګه سره پېښېږي او په تدریجي ډول له منځه ځي. په الکتروکارډیوګرام کې د هر QRS کامپلکس څخه مخکې د P خپه شته وي.

د Carotid sinus massage سره په تدریجي توګه پخواني ریټ ته راګرځي چې دا ځانګړتیا یې د PSVT سره توپیر لري چې په فوري ډول پای ته رسیږي.

درملنه:

سینوس تاکی کار ديا د پرایمري ارېتميا په ډول نه تداوي کیږي ځکه چې تل د یو فزیالوژیک غبرګون په توګه چې د زړه اړتیا پوره کړي پیدا کیږي. که اړتیا وي د هماغې لومړني ناروغي علاج باید ترسره شي. د مثال په ډول د CHF په حالت کې د سمپاتيک فعالیت زیاتیدل د میوکار په دندو خرابی اغیزی لري او درملنه یې لاسبری پدې حالت کې بیتا بلاکر نیورو هورمونل فعالیت کموي او CHF د ښه والي په لور بیایي. همدارنګه د ACE منع

د زړه اورگونو ناروغۍ.

د زړه درېتم او انتقال گډوډي

کوونکې او ARB درمل هم د CHF ناروغانو په نیوروهورمونل فعالیت باندې اغیزې لري ، کارول یې د ناروغ برخه لیک بڼه کوي.

اذینې فبریلیشن : (AF) Atrial Fibrillation

یو ډول اریتمیا ده چی د اذیناتو په چټک ، غیر منظم اوبی اغیزی تقلصاتو او د بطیناتو په غیر منظم حرکاتو متصف دی. پېښی ئې د عمر په زیاتیدو سره ډېرېږی. پېښی ئې د ۷۰ کلنی څخه پورته کاهل نفوس کی له ۵٪ څخه زیاته ده. AF کیدای شی په هجموی (Paroxysmal) ، تینگاریز (Persistent) او یا دایمی ډول وي. (۹، ۱۹) لاملونه :

د AF دودیز لاملونه په لاندی ډول دي.

- ۱ د اکلیلی شریانونو ناروغۍ.
- ۲ د زړه د سامی ناروغۍ په تیره بیا د ماتیرل د سام روماتیکه ناروغي
- ۳ هایپرتنشن
- ۴ Sinoatrial ناروغۍ
- ۵ هایپرتایرویدیزم
- ۶ الکول
- ۷ کارډیومیوپاتی
- ۸ د زړه ولادی ناروغۍ
- ۹ د سینی اتانات
- ۱۰ د سړو امبولی
- ۱۱ د پریکارد ناروغۍ
- ۱۲ ایدیوپاتییک (Lone -AF)

کلینکی بڼه :

گېلی : AF کېدای شی بی گیلو وي. په پیل کی اعراض یې د اذینې تکی کارډیا په شان وی یعنی ناروغانو کی د زړه د ټکان ، نارامی ، ستړتیا ، اوکله کله د سینکوپ او د زړه ودريدو

دزړه او رگونو ناروغۍ.

دزړه درېتم او انتقال گډوډي

(Arrest) حملې پېدا کېږي . که چيرې د زړه چټکتيا ډيره زياته وي. شاک او د زړه عدم کفايه هم پېدا کېږي .

په دايمي AF کې اعراض ډير با اړنېته نه وي ځکه د يوې خوا د زړه ريټ ډير نه وي او له بلې خوا ناروغ ورسره عادت شوی وي که چيرې د بطين د حرکاتو چټکتيا زيات نه وي، ناروغ ممکن د زړه د بې نظمي څخه بې خبره وي. او په نورو حالاتو کې چې د زړه سرعت زياتېږي ناروغ نارامی او د زړه ټکان ولري.

نښې : د AF غوره فزيکي نښه د زړه د حرکاتو او نبض مکمله بې نظمی ده (Irregular rhythm) که چيرې د زړه د حرکاتو چټکتيا زياته وي د زړه يو شمير کمزوري تقلصات په نبض کې د جس وړنه وي نو لدې امله د زړه چټکتيا (Heart rate) او د نبض د شمير (Puls rate) ترمنځ څرگند توپير پېدا کېږي، چې دغه توپير د Puls deficite په نامه ياديږي. په ځينې کمزوري بطيني تقلصاتو کې چې د سامونه خلاصېږي د زړه دوم غږ له منځه ځي او د لومړي غږ شدت بدلون مومي. د پورتنیو علایمو تر څنگ د AF د سببي عامل نښې هم موجود وي. ECG بدلونونه:

په ECG کې د P څپه شتون نه لري. کله کله کوچنی او غير منظمی څپې چې د F-wave په نامه ياديږي د ليدلو وړ وي. د QRS بڼه نورمال وي خو په بشپړ ډول غير منظم وي.



۲-۵ - انځور: د اذېنې فبريليشن دوی بېلگې (۱۲)

د زړه اورگونو ناروغۍ.

د زړه درېتم او انتقال گډوډي

درملنه:

د نوی تشخیص شوی AF د بنی ارزونی لپاره مکمله تاریخچه، فزیکي معاینه، E.C.G، echocardiogram او Thyroid function test ته اړتیا ده. د AF د زړه اړونده لاملونو د تشخیص او شدت د معلومولو د پاره نور تستونه لکه د تمرین ازموینه (exercise test) هم ترسره کیږي. که چیرې AF د یوې حادې ناروغۍ لکه chest infection اود سپرو امبولۍ له کبله پیداشوی وي، د لامل اغېزمنه درملنه سینوس ریتم بېرته اعاده کوي. په نورو حالاتو کې د درملنې غوره موخې عبارت دي له:

۱- هرڅومره ژر چی ممکن وی د سینوس ریتم بېرته راگرځونه

۲- د AF د تکراری حملو مخنیوی

۳- د AF د حملې په جریان کې د زړه د مناسب ریتم رامنځته کول

۴- د ترومبوامبولیزم د خطر کمول

۵- د سببی لامل درملنه

حملوي اذېنې فبریلیشن: Paroxysmal atral Fibrillation

د AF هغه حملې چې ښه زغمل کیږي او ډیر ځنډ وروسته پیدا کیږي زیاتره درملنې ته اړتیا نه لری. خو که چیرې اعراض شدید وي بېتا بلاکر او Class Ic اریتمیا ضد درمل لکه propafenone او flecainide لومړی انتخابی درمل دي. په هغه کسانو کې چې د زړه اسکیمیک ناروغۍ، هاپرتنشن یا CHF ولری او یا د فزیکي تمرین او سترس په وخت کې AF پیداکوی. بېتابلاکر ته لومړیتوب ورکول کېږي. Digoxin اغېزمن ندی خو Amiodarone د دوهم لاین درمل په ډول کارېدای ش. که چیرې AF د سینواتریل ناروغۍ په سیر کې پیداشوی وي او د بردی کاردیا سره یوځای وي دایمي اذېنې پېسمیکر اېښودل کیږي. د حملوي AF ځینی ډولونه د radio frequency ablation په مټ تداوی کیږي.

تینګاریز اذېنې فبریلیشن Persistent Atrial fibrillation:

د تینګاریز AF په درملنه کې دوه انتخابه لرو:

دزړه اورگونو ناروغۍ.

دزړه درېتم او انتقال کېدو دي

- ۱- د ریتم کنټرول: د سینوس ریتم اعاده کول هغه وخت مناسب دی چې د اریتمیا ستونزمنی کېږي، او د درملنې وړ لامل شتون ولري. برقی Cardiversion په ۴/۳ پېښو کې سینوز ریتم بېرته راگرځوي خو د Relapse چانس یې زیات دی (۵۰-۲۵٪ په لومړۍ میاشت کې او ۷۰-۹۰٪ په یو کال کې). د سینوس ریتم بېرته راگرځونه او په همدې حال کې د دوام چانس هغه وخت زیات وی چې AF د درې میاشتو څخه لږې مودې راهیسې پېدا شوی وي، ناروغ ځوان وي او د زړه ناروغی ونلري. که چېرې AF د ۴۸ ساعتو څخه لږې مودې راهیسې موجود وي د وریډي Heparin د تطبیق څخه وروسته سم دلته DC کارډیوورژن توصیه کېږي. د تایوټوکسیک AF ناروغ تر څو چې تایوټوکسیک وي، کارډیوورژن د سینوس ریتم په موخه ګټه نه کوي. د ایوټایرویدیزم سره نژدې ۵۶٪ ناروغان په بنفسه ډول د اذیني فبریلیشن څخه سینوس ریتم ته راگرځي، خو د عمر په زیاتوالي سره دغه امکانیت کمېږي او برقی کارډیوورژن کېدای شي د هغه ناروغانو د پاره وشي کوم چې ۴ میاشتې وروسته د هایپرټایرویدیزم د منځه تګ سره سره بیا هم AF شتون ولري.^(۸) که چېرې د زړه عضوي ناروغۍ شتون ونه لري، د flecainide د وریډي انفیوژن څخه هم د دوهم انتخاب په حیث ګټه اخیستل کېږي.
- که چېرې د AF دوام د ۴۸ ساعتو څخه زیات شي د سیستمیک امبولیزم خطر زیاتېږي له دې امله کارډیوورژن باید تر څو چې ناروغ د ۳-۴ اونی Warfarin واخلي او یا اذیني ترمبوز د Transesophageal ایکوکارډیوګرافي په مټ رد شي. انتي کولانت درمل ته د کارډیوورژن څخه وروسته تر ۲ میاشتو پورې دوام ورکول کېږي. که چېرې AF بیا را پېدا شي، دوهم او دریم ځل کارډیوورژن ورکول کېږي. د انتي اریتمیک درملو لکه امیدارون یا بیتابلاکر کارونه د AF د بابېرې خطر کموي.
- ۲- د ریتم کنټرول: که چېرې د اهتماماتو سره سره سینوس ریتم اعاده نه شي (دایمی AF) د زړه مناسب ریتم تامین ته باید پاملرنه وشي. دایجوکسین، بیتا بلاکر او وېراپامیل د اذیني بطیني بلاک د درجې په زیاتولو سره بطیني ریتم کموي. چې دا کار د زړه د دندو په ښه کیدو کې ډیره مرسته کوي.

دزپه اورگونو ناروغۍ.

دزپه درېتم او انتقال گډوډي

د ترمبو امبوليزم وقايه :

د اذیناتو بی اغېزی تقلص او د چپ اذین پراخه کېدل د وینې د دمه کېدو، ترمبوز او سیسټمیک امبولیزم د پاره لار هواروي. د AF ناروغ کې د سیسټمیک امبولیزم کلني خطر ۵% دی. څیړنو ښودلې ده چې د وارفیرین (INR=۲-۳) سره درملنه د ستروک خطر ۳/۲ کموي خو ددې تر څنګ د نوموړي درمل د وینه بهیدنی خطر په کال کې ۱-۱.۵% دي. د Aspirin سره درملنه د Stroke خطر ۵/۱ کموي.

په AF کې د Thrombo embolism د خطر فکتورونه په لاندې ډول دي :

۱- د اسکیمیک ستروک یا Transient ischemic attack (TIA) پخوانی تاریخچه

۲- د مایټرل دسام ناروغۍ

۳- عمر $< 75y$

۴- هایپرټنشن

۵- دیاټ

۶- د زړه عدم کفایه

۷- د کین بطن dysfunction اود کین اذین غټوالی (۱۹، ۲۱)

اذیني فلټر Atrial Flutter :

هغه Macro reentrant اریتمیاو ته چې د اذین په میوکارډیم کې منع ته راځي په مجموعي توګه د اذیني فلټر اصطلاح کارول کیږي. د اذیني فبریلشن په پرتله لږ عمومیت لري. د اذیني فلټر ځانګړی او ډیر عام ډول، په ښی اذین کې د ترای کسپید د سام او د هغی شاوخوا ځای نیسی اود ساعت د عقربې موافق او یا مخالف لوري ته حرکت کوي. په اذیني فلټر کې د اذیناتو چټکتیا په دقیقه کې ۲۵۰-۳۵۰ ضربې وي، که چیرې ټول تنبهاټ بطن ته ورسېږي د اذین د هر تقلص سره بطن هم تقلص کوي چې په نتیجه کې ټکی کارډیا او شدید هیموډینامیک ګډوډی رامنځته کیږي. خو زیاتره د اذین د دوه، درې او یا څلور تقلص سره بطن یو ځل تقلص کوي. په ECG کې اذینات د اری د غاښونو (saw-tooth) په ډول

دزړه او رگونو ناروغۍ

دزړه درېتم او انتقال کېدو دي

فعالیت په II, III او avf کې ښیي. زیاتره په COPD ناروغانو کې پیدا کېږي خو په CHF، د زړه روماتیک او اسکیمیک ناروغۍ، ASD او د زړه د ولادی ناروغیو د جراحی درملنې څخه وروسته هم پیدا کېږي.



۲-۲ انځور: اذیني فلتر ښیي چې اذیني ریټ پکې ۳۰۰ او ۲۰۱ کانډکشن لری (۲۵).

درملنه :

څرنگه چې په اذیني فلتر کې بطنی ریت زیات او د طبی درملنې سره په سختی ځواب وائي لدی امله ناروغان زیاتره د DC کارډیو ورژن (۵۰-۱۰۰ J) پوسیله تداوی کیږی. پدی ناروغانو کې هم د ترمبومبولیزم خطر د اذیني فبرلیشن ناروغانو پشان زیات دی، لدی امله د انتی کواگلانت ورکړه هم د اذیني فبرلیشن ناروغانو پشان تنظیمیږی. باید هڅه وشي چې د بطنی ریټ د درملو پواسطه کنترول یا سینوس ریتم بیرته برحاله شي. خو د کلسیم اتاگونست (Verapamil ،Diltiazem) بیتابلاکر ، او یا Digoxin په وسیله د ریټ کنترول گران دی. د بطنی ریټ د زیاتوالی له امله اذیني فلتر د اذیني فبرلیشن په پرتله ښه نه زغمل کیږي .

په ټاکلی ناروغانو کې چې د انسټیزی د ډیر خطر سره مخ دي د procainamide ، امپودارون یا ibutilide په وسیله فارمکولوژیک کارډیوورژن مناسب عمل دی. همدارنگه اریتمیا ضد

دزړه اورگونو ناروغۍ.

دزړه درېتم او انتقال کېدو دي

درمل د DC کارډیوورژن څخه وروسته د سینوس ریتم په ساتلو کې هم مرسته کوي. د تکراري فلتر ناروغان د Catheter Ablation په وسیله تداوی کېږي (۱۹).

حملوي فوق بطنې تکی کارډیا

(PSVT) Paroxysmal supra ventricular tachycardia

د حملوي تکی کارډیا ډېر معمول او عام ډول دی او زیاتره په هغه وگړو کې چې د زړه کومه جوړښتیزه ناروغي نه لري پېدا کېږي. پخوا به ورته د حملوي اذېني تکی کارډیا اصطلاح کارول کېده. نوموړې اریتمیا زیاتره د ري انتري په میکانیزم چې په ازیاناتو، سینوس نوډ او AV نوډ کې یې ځای نیولي وي او د اذینې یا بطنې پریمچور بیت په وسیله پیل او پای ته رسیږي، منځته راځي. د Reentry سرکت زیاتره په AV نوډ کې ځای نیولي وي چې د AV-nodal reentrant tachycardia په نوم یادېږي. په یو شمېر پېښو کې ري انتري د اذېن او بطن تر منځ د یوې کوچنۍ ارتباطي لارې د شتون له امله منځ ته راځي، چې AV reentrant tachycardia بلل کېږي.

په AV نوډ او یا د AV نوډ بای پاس لاره کې د انتقال او یا عصبي صفحي په دندوکې د بدلون له کبله د PSVT د پرمختګ د پاره زمینه برابریږي.

۱. نوموړې اریتمیا د ري انتري په میکانیزم چې په ازیاناتو، سینوس نوډ او AV نوډ کې یې ځای نیولي وي منځته راځي.

۲. ددې ري انتري جریان په وسیله په AV نوډ کې د Bypass هغه دوره چې په انتی گراد او رتروگراډ توګه سره د سیالي د لېږدونی ځواک لري متاثره کېږي.

۳. که ناروغ په Wolf Parkinson white (WPW) سندروم اخته وي، پدې صورت کې به سیاله په انتی گراد ډول په بای پاس لاره کې انتقالیږي.

۴. څوکه د بای پاس په لاره کې یوازي په رتروگراډ ډول سره انتقال صورت ونیسي دي ډول ته Concealed bypass tract ویل کېږي چې پدې حالت کې QRS نورمال وي. که په ناروغ کې WPW سندروم شتون ونلري نو د PSVT د ۹۰ سلنه څخه زیاتي پېښې به د Concealed bypass له لارې منځته راشي.

د زړه او رگونو ناروغۍ.

د زړه درېتم او انتقال گډوډي

AV نوډل ري انترانت تکی کارډيا (AV-nodal reentrant tachycardia)

ډير مهم لامل يې فوق بطېنی تاکی کارډيا ده. زياتره په ښځو کې ليدل کېږي. QRS کامپلېکس پکې منظم او تنگ وي چې ریت يې په دقیقه کې د ۱۲۰ نه تر ۲۵۰ ضربانو پوري رسېږي.

نوموړی تاکی کارډيا د ازيني بي وخته تنبه (APCS) په وسيله پېل او ختمېږي. که چيرې د APCS څخه وروسته دا ډول اريتميا پېل شي د PR انټروال به پکې اوږد او رتروگراد p څپه به پکې نه وي. QRS کامپلېکس به پکې په Buried ډول وي او يا به QRS-complex په ورستي برخه کې ويجاړتيا راغلی وي،

که په AV نوډ کې د لېږدېدنې چټکتيا او عاصي صفحي ترمنځ په بيلانس کې بدلون راشي د ری انټری لامل به وگرځي. اوجريان به په رتروگراد توگه بيرته ازين اويا په اتی گراد ډول بطیناتو ته ورشي او د تنبه لامل به يې وگرځي، چې په ECG کې به يې د P څپه شتون ونلري. کلينيکي بڼه:


ناروغان کېدای شي بی گیلو وی او یا د زړه ټکان، سینکوپ او د سینی خفیف درد څخه گيله من وي. چې ددې اعراضو منځته راتلل د اريتميا د سرعت، دوام، د زړه د اړونده ناروغیو په شتون او وخامت پوري اړه لري. نورې گيلې لکه نارامی، گنسیت، سستی او د غاړې وريدی نبضان هم کيدای شي شته وي. يو شمير ناروغان د پولی یوريا څخه گيله من وي، چې علت يې د تکی کارډيا په وخت کې د اذیناتو د فشار د زیاتوالی له امله د اذیني تریورتیک پېتايد (ANP) زیات افراز دی. حمله ناڅاپه پېل او پای ته رسېږي. او د څو ثانيو څخه نیولی تر ساعتونو پوري دوام کوی.

الکتروکارډیوگرافي:

د زړه چټکتيا ۲۴۰-۱۴۰ ضربانه په دقیقه کې او منظم وي. د P څېره به سینوسی P څخه توپیر لري او زیاتره په QRS کې مدغم وي.

دزړه او رگونو ناروغۍ

دزړه درېتم او انتقال کېدو دي



۷- ۲ انځور: AV nodal reentrant tachycardia نښې چې ریت پکې ۱۵۰ دی. (۲۵)

درملنه :

الف - میخانیکي مانورۍ: د حملې د پای ته رسولو د پاره د مختلفو مانورو څخه کار اخیستل

کېږي چې په لاندې ډول دي:

- ✓ د Valsalva مانوره
- ✓ د متیانو او نور بدن کیکاځل
- ✓ د زنگنو تر منځ د سر کوزول
- ✓ ټوخیدل
- ✓ پرمخ باندې د سرو او بو اچول
- ✓ سا بندول

کاروتید سینوس مساز زیاتره د ډاکتر له خوا تر سره کېږي. که چېرې ناروغ کاروتید Bruits او یا د دماغې تهریدونکې اسکیمیا پخوانۍ تاریخچه ولری ، د مساز څخه باید ډډه وشي.

چټک او په فشار سره د ۱۰-۱۲ ثانیو د پاره ، لومړۍ بڼې او بیا کین کاروتید سینوس ته مساز ورکول کېږي. په یو وخت کې دواړه خواوو ته مساز نه ورکول کېږي. ناروغ باید په دوامداره توګه د ECG او یا اصغا په وسیله وڅارل شي ، کله چې ریتم قابو شو سمدلاسه مساز پای ته رسول کېږي. کاروتید سینوس مساز په نیمایي پېښو کې حمله قابو کوي ، په تېره بیا چې

دزړه او رگونو ناروغۍ.

دزړه درېتم او انتقال کېدونکي

ناروغ له مخکې څخه دېجوکسین او یا بل داسې درمل چې اذینې بطنې لېږدېدنه ورو کوي اخیستی وي. پورته ذکر شوی مانوری د واگوس عصب هڅوی ، اذینې بطنې لېږدېدنه ورو کوي، ری اتري بند او اریتمیا پای ته رسوي. (۵، ۲۱)

ب - دوايي درملنه: که میخانیکي مانوری پاتې راغلی، دوه لاندې چټک تاثیر لرونکي درمل په ۹۰٪ پېښو کې حمله پای ته رسوي:

۱- Adenosine: د تاثیر دوام یې لنډ او لږ منفي انوتروپیک اغېزه لري ۶ ملي گرامه د ورید د لاري ورکول کېږي. که تر ۲-۱ دقیقو پورې حمله پای ته ونه رسېده، دوهم ځل ۱۲ ملي گرامه او که اړتیا وي دریم ځل هم ورکول کېږي. ادينوزین ډیر ښه زغمل کېږي خو په نږدې ۲۰٪ پېښو کې د مخ سوروالی او ځینې ناروغانو کې د سینې شدید نارامی رامنځته کوي.

۲- کلسیم کانال بلاکر هم په چټک ډول AV بلاک را منځته او ری اتري پای ته رسوي. Verapamil د رگ له لاري په پېل کې ۲،۵ ملي گرامه او وروسته ۵-۲،۵ ملي گرامه هر ۳-۱ دقیقې وروسته تر ۲۰ ملي گرامه پورې که چېرې شریاني فشار او ریتم ثابت وي ورکول کېږي. که ناروغ کې هایپوتینشن شتون ونلري د واگل مانورو په وسیله په تېره بیا د کروتید مساز په وسیله په ۸۰ سلنه حالاتو کې اریتمیا پای ته رسیږي. که دا مانوره ناکامه شوه د ورید د لاري ۱۲ ملي گرامه Adenosine انتخابي درمل دی. دوهم انتخابي درمل یې بیتا بلاکر او کلسیم کانال بلاکر دي.

دېجیتل گلايکوزیدونه چې ورو تاثیرکوي په حاده درملنه کې نه کارول کېږي که ددې درملوسره ټاکي کارېدا ختمه نه شوه او بیا بیا راپیدا شوه، د اریتمیا د پای ته رسولو د پاره د اذینې یا بطنې دایمي یا لنډ مهاله پېسمیکر څخه کار اخیستل کېږي.

که د ټاکي کارېدا له امله هایپوتینشن او یا شديده اسکیمیا منځته راغلي وي د DC کارډیو ورژن کارول کېږي. د څو لسیزو څخه راپدې خوا په عرضي ناروغانو کې چې ځنډني درملني ته اړتیا ولري په AV نوډ کې رادیوفریکونسي کټېتر موډیفیکیشن انتخابي درملنه ده. چې ددې تخنیک په وسیله د AV نوډ ری اتري تر ۹۵ سلنه پوري تداوي کېږي او محفوظه درملنه ده. (۱۹، ۲۱)

دزپه اورگونو ناروغی.

دزپه درېتم او انتقال گډوډي


د اضافي لاري (Accessory pathway) له امله فوق بطني تکی کار دیا (Preexcitation syndromes):

پتوفزیولوژي او کلینیکي موندنې:

د ازیڼ اوبطیناتو ترمنځ د اضافي لاري (Accessory pathway) شتون د Re-entry تکی کار دیا د پاره زمینه برابروي او هم د اتریل فبریلیشن او فلتر لامل ګرځي. دا اضافي الیاف دوه ډوله دي:

۱- Mahaim fiber: چې د PR د لنډ واټن او نورمال QRS د جوړیدلو لامل ګرځي لکه د Lown ganong Levine syndrom.

۲- Kent Bundle: چې نیغ په نیغه ازیڼ د بطن سره نښلوي لکه د Wolff-Parkinson-White syndrome (WPW سندروم) چې په کې د PR واټن لنډ، QRS کمپلکس پراخه او د دلتا خپه شته وي. د دلتا (Δ) دا موجه د بطن د هغې برخې د پرمېني Depolarization له کبله چې د پټوی سره یوځای شوي منځته راځي. د انتقال دغه اضافي لاري د ټولني په ۱، ۲، ۳٪ خلکو کې شته وي.



۲- ۸ انځور: کی د ۲۳ کلن سړي ECG ښودل شوي چې د زړه د ټکان د حملو څخه گيله من، او په WPW سندروم اخته دی. (۱۲)

دزړه او رگونو ناروغۍ.

دزړه درېتم او انتقال کېدو دي

درملنه :

که د ناروغ په ECG کې د دلتا خپه موجوده وي، خو اعراض لکه سینکوپ، د زړه ټکان او ضعفیت شته نه وي دغه ډله ناروغان درملني ته اړتیا نه لري. خو دوي ته دي لارښودنه وشي چې که ذکر شوی گیلې منځته راغلی ډاکټر خبر کړي. که چیرې د ناروغ په روتین ECG کې په ناڅاپي توګه د Delta خپه ولیدل شي او ناروغ د پیلوټي او یا د بس د ډریوري دنده ولري الکتروفزیولوژیک تستونه د ورته اجرا شي. ترڅو چې د وقایوی catheter ablation پواسطه د ناڅاپي مړینې مخه ونیول شي.

په هغه ناروغانو کې چې اعراض ولری رادیوفریکونسی ابلیشن انتخابي درملنه ګڼل کېږي. که د Preexcitation سندروم په ناروغ کې اتریل فبریلیشن یا اتریل فلتر منځته راشي دا ناروغان د ناڅاپي مړینې د زیات خطر سره مخامخ دي او د دوي لپاره وقایوی ابلیشن استطباب لري. چې د کټیتر د ایښودلو د کامیابي چانس پکې ۹۰% دی.

هغه اتریل فبریلیشن چې د اضافي لاري (Accessory Pathway) په میخانیکیت منځته راغلي وي کلسیم چینل بلاکر، بیتا بلاکراو ډایجوکسین چې په AV نوډ کې لیریدینه ورو او په اضافي لار کې یې زیاتوی او د بطیناتو د حرکاتو د زیاتوالي لامل کېږي باید ورنکړل شي.

بطیني ټکی کارډیا (VT) ventricular Tachycardia

یوه وخیمه اریتمیاده، ځکه چې نږدې تل د زړه د شدیدو ناروغیو سره یو ځای وي او کیدای شي بطیني فبریلیشن ته واوړي. ثابت بطیني ټاکي کارډیا (Sustained VT) هغه حالت ته ویل کېږي چې VT د ۳۰ ثانیو څخه زیات وخت دوام مومي او یا د هیمو دینامیک کولیس له کبله عا جلی درملنی ته اړتیا ولری. په عمومي توګه VT د زړه د ځیني جوړښتي (structural) ناروغیو په سیر کې پیدا کېږي دودیز لامل یې د زړه مزمنه اسکیمیکه ناروغی ده چې پخوانی MI سره یو ځای وي. همدارنګه ثابت VT کیدای شي د غیر اسکیمیک کارډیومیوپاتی، میتابولیک تشوشاتو د دواګانو تسمم او د QT انټروال د

دزړه او رگونو ناروغۍ.

دزړه درېتم او انتقال کېدو دي

اوږدوالی له امله رامنځته شي. او هم کله کله د زړه د ناروغیو او برابرونکو فکتورونو په نه شتون کې هم منځ ته راتلای شي.

په غیر ثابت (Non sustained) بطني تاکی کارډیا کې بطني ریتم (VT) د دری beate څخه تر ۳۰ ثانیو پورې دوام کوي. دا ډول ریتم د زړه د ناروغیو په سپر کې پیدا کېږي خو د ثابت VT په پرتله په غیر قلبي ناروغیو کې زیات لیدل کېږي. ناروغان د زړه د ټکان او د زړه د دهانې د کموالی د علایمو لکه گنسیټ، سالنډې او سینکوپ څخه گېله من وي. په ECG کې تکی کارډیا چې د پراخه QRS سره ملگری وي او د زړه چټکتیا په دقیقه کې د ۱۰۰ څخه زیات وي لیدل کېږي. د QRS بڼه د VT د حملې په جریان کې کیدای شي یو شان (monomorphic) او یا د یو څخه بل ته توپیر وکړي (Polymorphic).

Bi-directional Tachycardia هغه حالت دی چې د QRS محور پکې تغیر خوري یانې د RBBB سره په نوبتي ډول محور بڼې او چپ طرف ته بدلون مومي.

توپیري تشخیص: (DDX)

VT باید د BBB او SVT څخه چې د Preexcitation سره یو ځای وي توپیر شي، ځکه چې ددی اریتمیا وو درملنه سره توپیر لري. د لاتندی بېلگو شتوالی د VT د پاره لارښود دي:

۱- د MI تاریخچه

۲- ازینې بطني ځانگړیتوب (Av dissociation) پتوگونومونیکه علامه ده

۳- Capture / fusion beats

۴- L BBB + Extreme left axis deviation او یا R BBB + left axis deviation

۵- ډیره پراخه QRS $> 0.14 \text{ sec}$

۶- د ثباتي جیب (Carotid sinus) د مساز یا وړیدی Adenosine په ورکولو سره د حملې پای ته نه رسیدل

۷- په قرب القلبي لیدونو کې د یوې بڼې QRS شتوالی (ټول مثبت یا منفي موجي)

دزړه او رگونو ناروغۍ

دزړه درېتم او انتقال گډوډي



۶-۸- انځور: د زړه برېښنايي گراف کی پراخه QRS ($> 200\text{ms}$) او Av dissociation او

۶ V کی د S ژوره موجه لیدل کیږي. چی دا ټول د بطني تکی کار دیا تشخیصیه تکی


دی. (۱۹)

درملنه:

څرنگه چی ثابتته پولی مورفیک VT ، بطني فلتر، او بطني تکی کار دیا سمدلاسه د هیمودینامیک کولیس لامل گرځي، نولدی امله په عاجل ډول asynchronous defibrillation (J-۲۰۰) ترسره کېږي. که اریتمیا دوام وکړي ، په اعظمی دوز بیا ځلی شاکونه ورکول کیږي. د مونومورفیک بطني تکی کار دیا ته چی د هیمودینامیک گډوډی لامل شوی وي R wave synchronous shock توصیه کېږي. که چېرې د ناروغ هیمودینامیک حالت اجازه ورکړي ، له عملیې څخه مخکی سیدیشن هم ورکول کېږي. له مونومورفیک VT پرته په نورو کی فارمکالوژیکه درملنه دېر موثریت نه لری خو کېدای شی د procainamide, lidocaine او Amiodarone څخه کار واخیستل شي. که ریتم اصلاح نه شویا هم برقی کار دیوورژن باید ترسره شي. که VT د زړه د جوړښتیزي ناروغی په سېر کی پیدا شي د بیا ځلی VT د مخنیوی لپاره نږدی تل ICD ایښودل کیږي (۱۹)

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه درېتم او انتقال کېدو دي




۲- ۹ - انځور: د VT او VF پای ته رسولو په موخه د defibrillation کارونه بڼې. (۱۵)

(۲۱)

Accelerated Idioventricular rhythm :-

د slow VT په نامه هم یادېږي د زړه چټکتیا د ۶۰-۱۲۰ ځلې په دقیقه کې وي. زیاتره د MI په ناروغانو کې د reperfusion په ترڅ کې پیدا کېږي. او هم کېدای شي د زړه د عملیات څخه وروسته کارډیوپاتي روماتیک فیور، د دیجوکسین تسمم او کله کله د زړه د ناروغیو په نشتون کې را منځته شي. چې تېریدونکی وی او نادرا د هیمو دینامیک تشوشاتو لامل کېږي، درملنې ته نادرا اړتیا پیدا کېږي. د تداوی په منظور Atropine یواځې هغه وخت ورکول کېږي چې هیمو دینامیک کېدو پیداشوی وي *



۲ - ۱۰ - انځور: Accelerated Idioventricular rhythm بڼې. (۱۹)


دزپه اورگونو ناروغۍ.

دزپه درېتم او انتقال گډوډي

بطېنی فلتیر او فبریلیشن Ventricular flutter and Fibrillation :

دغه اریتمیا زیاتره په IHD اخته ناروغانو کې پیدا کیږي. سربیره پردې د اریتمیا ضد درملو د کارولو په تیره هغه چې د QT واټن د اوږدېدو سبب کیږي، همدارنګه هایپوکسیا او د اسکیمیا ناروغانو اوهم د wpw سندروم ناروغانو کې چې په AF اخته وی او د چټک بطیني غبرګون سره یو ځای وي پیدا کېدای شي.

برېښناييونه زیاتره د VF له کبله د زړه د ودريدو (Cardiac arrest) سبب کیږي. غیر اسکیمیک VF معمولا د VT د لنډې حملې په تعقیب پیل کیږي. په حاد MI او اسکیمیا کې د R on T څخه وروسته پیل او په VF اوږي. بطیني Flutter د (Sine wave) په ډول څرګند یږي چې چټکتیا یې په دقیقه کې ۱۵۰-۳۰۰ ځلې وي. بطیني فبریلیشن د غیر منظمو موجو پواسطه چې امپلیتود، شکل او چټکتیا یې سره توپیر لري پېژندل کیږي. (۱۹)



۲- ۱۱- انځور: د ۲۰ کلن سړي ECG ښيي چې د سینې درد څخه دوه ساعته وروسته په بطیني فبریلیشن اخته شوی وو. (۱۲)

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه عدم کفایه

اوم فصل

د زړه عدم کفایه (Heart Failure)

تعریف:


یو پتوفزیالوژیک حالت دی چی زړه د ندی د خرابوالی له امله نه شي کولی د نسجونو د میتابولیک اړتیاوو د پوره کولو لپاره کافي اندازه وینه دوران ته پمپ کړي. په بل عبارت د زړه عدم کفایه یو پېچلی کلینیکي سندروم دی چی په هغه کی زړه د جوړښت یا دندی د ویجاړتیا له کبله نشی کولی چی د یو فزیولوژیک دوران د تامین لپاره د پمپ په ډول کار وکړي. (۸، ۱۳)

د زړه د پاتې والی (HF) پېښي د عمر په زیاتیدوسره زیاتېږي، ۷۵٪ پېښي ئي د ۵۰ کلني څخه وروسته عمر کې منځته راځي. په نړی کی د ۲۰ ملیونو څخه زیات وگړي په HF اخته دي. د کاهل نفوس ۲٪ د زړه د عدم کفایي څخه کړاو گالي. د شدید HF نږدې ۵۰٪ ناروغان تر دوه کالو پوري مري چي زیاتره ئي په ناڅاپي توگه د وځیمو بطني اریتمیاوو او د زړه د حملې (MI) له کبله مړه کیږي. لاملونه:

- ۱- د میوکارد د دندو خرابوالی (Myocardial dysfunction) لکه د زړه اسکیمیک ناروغي، کارډیوماپویتی او میوکاردایټس.
- ۲- په بطين باندی د حجم د بار زیاتوالی (Volume overload) لکه د دسام پاتي والی (د ابهر یا میترال).
- ۳- په بطين باندی د فشار د بار زیاتوالی (Pressure overload) لکه د ابهر د دسام تنگوالی او هایپر تینشن.
- ۴- هغه HF چي د زړه د دهاني د زیاتوالي سره یوځای وي (Obligatory high out put)، لکه وینه لږې (Anemia)، تایر توکسیکوزیس، د Paget ناروغي، Beri Beri، شریاني وریدي شنت او نور.

د زړه او رگونو ناروغۍ د زړه عدم کفایه

- ۵- د بطيناتو د کيدو (Filling) خرابوالی لکه التصافي پريکارد ايتس، د پريکارد تامپوناد او رستريکټيف کارډيوميوپاتي.
- ۶- د زړه د رېتم اېنارملي لکه اذيني فبريليشن.
- د پورته لاملونو څخه د زړه اسکيمیک ناروغۍ (۴۰-۳۵٪)، د ايليتد کارډيومايوپتي (۳۰-۳۴٪) او هايپرتشن (۲۰-۱۵٪) يې ډېر غوره لاملونه دي.



۷- ۱- انځور: په HF کې د نیوروهورمونل سیستم فعاله کیدل نښی. (۱۹، ۲۷)

د زړه عدم کفایه

د زړه او رگونو ناروغۍ

تشديدونکي فکتورونه Precipitating Factors

د HF غوره تشديدونکۍ په لاندې ډول دي: هايپر تينشن ، ميوکارديل انفارکشن، د سږو امبولي ، د فزيکي فعاليت زياتوالی، په خوړو کې د مالګې زياتوالی، د مايعاتو د بار زياتوالي، د محيط د تودوخې د درجې زياتوالی. د Paget ناروغي، روحي فشارونه، Beri اتان، انيميا، تايروتوکسيکوزيس ، اميدواري، اريتميا، ميوکارد ايتيس، اتتاني اندوکارد ايتس او د هغه درملو کارول چي په بدن کې د سوديم د راټولېدو لامل کيږي لکه (NSAID, Steroid) (۱۴، ۱۹)

د زړه د عدم کفائي ډولونه:

۱- د زړه بېړنۍ او ځنډنۍ عدم کفایه

HF کيداي شي په ناڅاپي ډول (بېړنۍ) رامنځته شي لکه د ميوکارد په بېړنۍ احتشا کې، او يا په تدريجي ډول پيداشي لکه د زړه په دسامي ناروغيو کې. که د زړه دندې ورو ورو خرابي شي ځيني معاضوي فکتورونه فعالېږي چي په لومړنيو پړاونو کې د زړه دندې تريوه حده بڼه کوي، خو وروسته د ناروغۍ په پرمختګ سره نوموړي معاضوي ميخانيکيتونه هم په منفي لوري کې نه کوي.

۲: د زړه د بڼې او کيڼې خوا پاتې والی Right and Left HF

د کيڼې خوا په عدم کفایه کې د کيڼ بطين out put کم او د کيڼ اذين يا ريوي وربدونو فشار زياتيږي. که چيري د کيڼ اذين فشار په حاد ډول لوړ شي د سږو د کانجسشن او اذيما لامل کيږي. خو د کيڼ اذين د فشار تدريجي لوړوالی، په رفلکس ډول د سږو رگونه تنګ او ناروغ د سږو اذيما څخه ساتي.

د زړه د بڼې خوا عدم کفایه کې د بڼي بطين دهانه کم او د بڼي اذين فشار زياتيږي مهم لاملونه ئي عبارت دي له: د سږو متعددې امبولۍ (Cor Pulmonale). COPD. او د پلمونري دسام تنګوالی.

د زړه او رگونو ناروغۍ.

د زړه عدم کفایه

۴:—سیستولیک او دیاستولیک عدم کفایه :

که چیرې HF د زړه د عضلې د تقلصیت د کمیدوله کبله پیداشوي وي سیستولیک ،او که چیرې HF د بطین د ډکیدو (Filling) او توسع (Relaxation) د گډوډۍ او یا د Filling Pressure د زیاتوالي له امله پیداشوي وي د دیاستولیک پاتې والی په نامه یادېږي.

۵: High out put and Low out put H.F:

د زړه د پاتې والی په یوشمیر ناروغانو کې د زړه دهانه کمه (Low out put H.F) چی غوره لاملونه یې ډایلټیک کارډیومیوپاتی ، هایپرټنشن I.H.D. اود زړه د دسامي او پریکاردیل ناروغۍ دي. پدې ډول H.F کې قلبی دهانه د دمی په حالت کې نورمال وي خو د فزیکي فعالیت په وخت کې نه زیاتیږي.

High out put د عدم کفایه په هغه حالاتو کې چې د زړه پاتې والی د Hyperthyroidism ، انیمیا ، امیداورې ، شریانی وریډی فستول ، بری بری او Paget ناروغي له کبله منځته راغلي وي پیدا کېږي. (۱۹، ۱۴)

۳:—Forward and Backward H.F:

د زړه د پاتې والی په ځینې ناروغانو کې غټه ستونځه د قلبی دهاني کموالي دی (Forward) . HF د ځینې نور ناروغان نورمال یا نږدې نارمل اوټ پټ لري خو په دوي کې د مالگۍ او اوبو زیاته راټولېدنه او دسږو او سیستمیک وریدونو احتقان شته وي (Backward).

د زړه دهانی بېا وېشنه (Redistribution of cardiac out put):

کله چی د زړه په عدم کفایې اخته ناروغ کی د زړه دهانه ډېره کمه شی په پوستکی ، اسکلیټي عضلاتو او پښتورگوکی Vasoconstriction پیدا کېږي چی نوموړو غړو ته د وینې د جریان د کمېدو لامل ګرځي. ددی پر خلاف حیاتي غړو ته (دماغ ، زړه) د وېنې جریان زیاتېږي. وازوکانسټرکشن After load زیاتوي ، چی په پایله کی د زړه دهانه نوره هم کمېږي.

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه عدم کفایه

د اوبو او مالګې راټولیدنه Salt And Water Retention :

کله چې کین بطن ونشي کولای چې کافي اندازه وینه سیسټمیک دوران ته پمپ کړي ، یو شمیر تطابقي فکتورونه په بدن کې فعالیږي چې له امله یې په غیر دودیز ډول مایعات په بدن کې ټولېږي . د زړه د عدم کفایې ځینې ستونزمنې کلینیکي څرګندونې لکه اډیما او د سږو احتقان د مایعاتو د راټولیدو له امله پیداکېږي . سره لدې د مایعاتو دا غیر دودیزه راټولیدنه او د وینې د حجم زیاتوالی د معاوضوي میکانیزم په ډول عمل کوي او د زړه دهانه او د حیاتي غړو پرفیوژن بڼه کوي . (۱۹ ، ۲۷)

کلینیکي بڼه :

د کین زړه پاتې والی

گیلی :

۱ - : سالنډي: سالنډي د H.F د ناروغانو غوره عرض دی . د ناروغي په لومړیو پړاونو کې سالنډي یواځې د فزیکي فعالیت په وخت کې شته وي خو د H.F په پرمختګ سره د نسبتاً لږ فزیکي تمرین سره سالنډي پیداکېږي او په شدیدو حالاتو کې ددې په حالت کې هم شته وي . په H.F کې د بین الخلالی (Interstitial) اډیما او د سږو د احتقان له کبله د سږو ارتجاعیت کمېږي چې دا بیا د تنفسي عضلاتو د کار د زیاتوالي لامل ګرځي او د Juxta capillary receptor د هڅونې له کبله چټک او برسیرن تنفس چې د زړه د سالنډې ځانګړتیا ده منځته راځي . له بلې خوا د تنفسي عضلاتو د کار د زیاتوالي له کبله د نوموړي عضلاتو د اکسیجن اړتیا زیاته او برعکس د زړه ددهاني د کموالي له کبله د اکسیجن لېږد نوموړي عضلاتو ته کمېږي چې دا کار د تنفسي عضلاتو د ستړیا لامل کېږي .

۲ - : Orthopnea: هغه سالنډي چې په ملاستي کې پیداکېږي او د ناستي سره له منځه لاړه شی د اورټوپنیا پنوم یا ډیرې د ملاستي په حالت کې د اطرافو او بطن د وړیدي وینې راګرځیدنه زیات او د سږو د کپلریو هایډروستاتیک فشار زیاتیږي او هم د ملاستي سره ډیافراګرام پورته ځي او اورټوپنیا منځته راوړي .

د زړه او رگونو ناروغۍ.

د زړه عدم کفایه

۳- د شپې لخوا حملوی سالنډې (Paroxysmal Nocturnal Dyspnea (PND): د سالنډې او ټوخي د شديدي حملې څخه عبارت دی چې د شپې له خوا پيدا او ناروغ له خوبه پاڅوي او ناروغ ازادي هوا ته هڅه کوي د پيدا کيدو ميخانيکيت ئي داسي دی چې:

I: د شپې لخوا د تنفسي مرکز فعالیت لږوي.

II: د خوب په وخت کې Adrenergic فعالیت د کموالي له کبله د کين بطين د فعالیت کموالی.

III: د ملاستي په حالت کې د وريدي فشار زیاتوالي.

۴- Cardiac Asthma: PND او د شپې ټوخی ته نږدې حالت دی چې د Wheezing په واسطه چې د برانکوسپزم له کبله پيدا کيږي ځانگړي کيږي او د شپې له خوا متبازلوي.

۵- د سږو حاده اډيما Acute Pulmonary edema: د قلبی استما یو شدید شکل دی چې د سږو د کپیلریو د فشار د شدید لوړوالي له کبله پيدا او د سنځی اډيما لامل کيږي او د شديدي سالنډې، د سږو خپور رالونو او د گلابی رنگه وینه لرونکی افرازاتو سره ملگري وي. که چيري سمه درملنه ئي ونه شي د ناروغ د مړینې لامل کيدای شي.

۶- Haemoptysis: زنگ وهلې بلغم چې د H.F حجري لرونکي وي (Heamosidrine لرونکي سنځی مکروفان) په شدید ځنډنۍ H.F کې موجود وي.

۷- سټريا او سستی: HF غیروصفي خو عامی گیلې دي چې د اسکليتي عضلاتو د پرفیوژن د کموالي له کبله پيدا کيږي.

۸- بطني اعراض: زړه بدوالی او بي اشتهاي چې د گیلې د درد او Fullness سره یوځای وي د H.F ناروغانو د دودیزو گیلو څخه دي چې د باب وريدي سیستم او ځيگر د احتقان له کبله پيدا کيږي.

۹- دماغی گېلۍ: په شدید HF په تېره په زړو خلکو کې چې په دماغی اتیروسکلیروزیس هم اخته وي دماغی پرفیوژن د کموالي او هایپوکسیمیا له کبله دماغی خړپړتیا، د فکري تمرکز او حافظي خرابوالي، سردرد، بي خوابي او نارامی پيدا کيږي.

فزيکي نښې:

د زړه عدم کفایه

د زړه او رگونو ناروغۍ

فزيکي نښې:

د شدت له نظره په متوسط HF کې د دمی په حالت کې ناروغ کومه نارامی نه حس کوي خو د فزيکي فعاليت په وخت کې سالنډي موجوده وي. په پرمختللي او شديد HF کې د ستروک واليم د کموالي له کبله تفاضلي فشار کم او د عمومي وعایي تقبض له کبله د یاستولیک فشار زیاتېږي. د زړه په بیړنۍ پاتې والی کې کیدای شي شدید هایپوتشن شته وي.

د زړه دریم او څلورم غږونه اکثراً اوریدل کېږي خو د HF دپاره ډیر وصفي ندی. متناوب نبض چې یو قوی او یو ضعیف Beat څخه عبارت دی په شدید HF کې پیدا کېږي.

د سږو قاعده په قرعۍ سره dull او په اصغاسره شهیقي مرطوب رالونه اوریدل کېږي. د سږو د اذیم په صورت کې منتشر مرطوب رالونه او Expiratory wheezing اوریدل کېږي.

Cheyne stokes respiration = پدې ډول تنفس کې هایپروتنیلیشن او اپنیا په متناوب ډول شته وي. علت یې د کاربن ډای اکساید په وړاندې د تنفسي مرکز د حساسیت کموالي دی.

د نښې زړه عدم کفایه

گیلی: د نښې زړه په خالصه عدم کفایه کې سالنډي د چپ زړه د عدم کفایې په پرتله ډیر لږ وي. ځکه چې پدې حالت کې د سږو احتقان موجود نه وي او یواځې هغه وخت سالنډي پیدا کېږي چې قلبي دهانه ډیره کمه شوي وي. د قلبي دهانې د کموالي له کبله سترتیا او گنگسیت پیدا کېږي. همدارنګه د سیستمیک وریدي احتقان له کبله زړه بدوالی او کانګی هم شته وي.

فزيکي نښې: د نښې زړه په پاتې والی کې نښې د گیلوپه پرتله بارزي وي چې په لاندې ډول دي:

۱. د غاړې د وریدونو پراخوالی. Jugular Venous distension


۲. احتقانی هیپاتومیګالی: پدې ناروغانو کې دردناکه هیپاتومیګالی چې د سیستمیک وریدونو د فشار د زیاتوالي سره یوځای وي جس کېږي. د ترایکسپید د سام په ناروغي او Constrictive pericarditis کې سربیره په هیپاتومیګالی، احتقانی Spleenomegaly هم پیدا کېږي.

۳. قلبي اذیم: د HF اذیم معمولاً متناظر او Dependent وي په متحرکو اشخاصو کې اذیم په پنبوکي په ځانګړي ډول په Ankle او Peritibial برخه کې لیدل کېږي چې د ماښام

د زړه او رگونو ناروغۍ د زړه عدم کفایه

لخوا ډېره وي خو په هغه ناروغانو کې چې په بستر محکوم دي پر سوب په سکرل برخه کې پیدا کېږي.

۴- هایدروتوراکس او Ascites: د پلورا د کپلريو د فشار د زیاتوالي له کبله د مایعاتو ترانزودیشن د پلورا جوف ته زیات او Pleural Effusion پیدا کېږي. پلورایی انصباب زیاتره په ښي طرف کې لیدل کېږي. د کبدې ورید د فشار د زیاتوالي له کبله ترانزودیشن پریتوان ته زیات او اسایټس منځته راځي.



۷- ۲ انځور: کی د ښي او کین زړه د پاتی والی څرگندونی ښودل شوی دي. (۱۶)

۵- زیري: HF په وروستیو مراحلو کې د کبدې احتقان او هایپوکسیمیا له کبله چې Central lobular atrophy سره یوځای وی. د ځیگر دندې خرابي او د مستقیم او غیر مستقیم بیلروبین او د ځیگر د انزایمونو کچه په وینه کې لوړېږي.

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه عدم کفایه

Cardiac Cachexia-۶

په شدید مزمن HF کې د لاندې عواملو له کبله د وزن شدید کموالي او Cachexia پیداکېږي.

۱- په دروان کې د TNF د کچې لوړوالی.

۲- د میتابولیک ریټ زیاتوالي د لاندې عواملو له کبله :-

الف:- د تنفسي عضلاتو د فعالیت زیاتوالي.

ب:- د هایپرتروفیک زړه د اکسیجن د اړتیا زیاتوالي. ج:- او د شدید HF له کبله ناراحتی.

۳- زړه بدوالي، کانګې او بې اشتهايي د ډیجوکسین د تسمم او احتقانی هیپاتومیګالی له کبله.

۴- د کولمو د وریدونو احتقان له کبله د غذايي موادو د جذب خرابوالي.

۵- او نادراً Protein losing enteropathy (۱۹).

پلټنې:

الف:- تشخیصیه پلټنې:

۱- د سینې په راډیوګرافي کې د زړه د اخته خوا لویوالي څخه علاوه د سږو دوریدونو

پراخوالی هم د لیدلو وړ وی. همدارنګه پلورايي انصباب هم لیدل کېږي.

۲- E.C.G: د هایپرتروفی، اریتمیا او اسکیمیا د نښو لپاره.

۳- ایکوکارډیوګرافي: د لاندې ګډوډیو په پیژندنه کې مرسته کوي:

الف:- د ښې او کین زړه دیاسټولیک او سیسټولیک دندو خرابوالی.

ب:- د زړه د پاتې والی د لامل تشخیص (د زړه دسامي ناروغي، په IHD کې د جدار حرکاتو

ګډوډي (Wall Motion Abnormality)، کارډیومیوپاتی).

ج:- د زړه دښه ترومبوز

۴:- د ویني معاینات:

- Full Blood count
- د ځیګر بیوشیمیک معاینات.
- یوریا او الکترولایتونه.

د زړه عدم کفایه

د زړه او رگونو ناروغۍ

• په حاد HF کې د MI د تشخیص لپاره د زړه انزایمونه.

• د تایروئید غدې وظيفوي تستونه.

۵- د زړه کټیترایزیشن.

ب- انزاري پلټنې:

۱- Cardio pulmonary Exercise test

۲- د تمرین او دمې په وخت کې رادیونوکلاید انجیوگرافي

۳- Ambulatory E.C.G Monitoring: که چیرې د اریتمیا شک موجود وي

د ۲۴-۴۸ ساعته د پاره ترسره کېږي.

۴- Serum ANP: د کین پټین د سیستولیک دندې په خرابوالي کې کچه یې لوړېږي. (۸،۱۲)

تشخیص:

د H.F تشخیص د Framingham د لاندې کریتیریاوو له مخې ایښودل کېږي:

۱- لوی تشخیصیه کریتیریاوی Major Criteria

• P.N.D

• د غاړې د وریدونو پړسوب

• رالونه (Ralse)

• د زړه د سایز غټوالی (Cardiomegaly)

• د سرو حاده اذیما

• S۳ ګلوپ

• د وریدې فشار زیاتوالی ($>12\text{cmHgO}$)

• مثبت هیپاتوجوګولر reflux

۲- کوچنۍ تشخیصیه کریتیریا Minor Criteria

- د پښو پړسوب

- د شپې توخی

- د فزیکي فعالیت په وخت کې سالنډی

- هیپاتومیګالی

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه عدم کفایه

- پلورای انصباب

- د حیاتی ظرفیت کموالی (Vital capacity reduced $\frac{1}{3}$ from normal)

- تکی کار دیا >120 B/min

۳- لوی یا کوچنی کریتیریا:

- د پنځه ورځی درملنی سره د ۵، ۴ کیلوگرام څخه زیات وزن بایلل

د HF د کلینیکي تشخیص د پاره د پورتنی کریتیریاو څخه لږترلږه د یو Major او یو Minor کریتیریا شتون ته اړتیا ده. (۲)

تفریقي تشخیص:

۱- د سږو د ناروغیو له کبله سالنډی: H.F د ناروغانو په شان COPD ناروغان هم د شپي د سالنډي سره وینښېرې خو په COPD کي بلغم شته او د بلغمو د وتلو سره سالنډي کمیږي. په هغه ناروغانو کي چي د سالنډی علت یی څرگند نه وي د سږو وظیفوي ازموینه او Echo مرسته کوي.

۲- د سږو امبولیزم: پدي حالت کي هیماپیتیزس او د ټیټر پلوریتیک درد شته وي.

۳- اضطراب: پدي حالت کي تنفس معمولاً غیر منظم او که د سيني درد ورسره وي تېره وصف به لري.

۴- Ankle edema کیدي شي د وریکوز او Cyclic edema له کبله هم پیداشي خو پدي ناروغانو کي ددمی په حالت کي د غاړی وریدونه برجسته نه وي او هم HepatoJugular reflux منفي وي.

۵- د پښتورگو د ناروغیو له کبله اذیما- پدي حالت کي د پښتورگو وظیفوي تستونه غیر نورمال وي.

۶- د ځیگر سیروزیس: په سیروز کي د Jugular ورید فشار نورمال او هم Hepatojugular reflux منفي وي. (۱۹)

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه عدم کفایه

اختلالات:

۱- Uremia: د دیورتیک د درملنې او د زړه دهاني د کموالي له کبله د پښتورگو پرفیوژن کم او یوریمیا پیدا کیږي. Vasodilator او Dopamine په مټ درملنه د پښتورگو د پرفیوژن په ښه کیدو کې مرسته کوي.

۲- Hypokalemia: د پوتاشیم ضایع کوونکي دیورتیکو د استعمال اوهایپرالدوستیرونیزم له کبله.

۳- Hyponatremia: د شدید HF ښه ده او دیورتیک درمل او د اوبو د راټولېدو له کبله پیدا کیږي.

۴- د ځیګر د دندو خرابوالي: د کیدي وريد د احتقان او شرياني پرفیوژن د کموالي له کبله خفیف زیږي او د ځیګر د وظیفوي تست ګډوډی پیدا کیږي.

۵- ترومبوامبولیزم: د قلبي دهاني د کموالي او عدم تحرکیت له کبله د ژورو وريدونو ترومبوزس او د سږو امبولي پیدا کیږي. او د اریتمیا (ازینی فبریلیشن) او داخلي قلبي ترومبوزس له کبله سیستمیک امبولي پیدا کیږي.

۶- اریتمیا: اذیني او بطنی اریتمیاوي ډیر معمول دي او د الکترولایتو د ګډوډیو، HF، د سببي لامل او د دوراني کتیکولامینو د کچې د زیاتوالي له کبله پیدا کیږي. H.F په ۵۰ سلنه ناروغانو کې ناڅاپي مړینه منځته راځي. (۱۶)

درملنه:

د زړه د پاتې والی د درملنې د توضیح څخه مخکې ښه به دا وي چې په لاندې جدول کې د امریکا د زړه ټولنې (American Heart association) د لارښود له مخې د HF په پړاونو رڼا واچول شي:

د زړه اورگونو ناروغۍ.

د زړه عدم کفایه

۶-۱ جدول: د امریکا د زړه ټولنې د لارښود له مخې د زړه د عدم کفایې پړاونه.

پړاو	توضیح	درملنه
Stage A	د زړه ناروغۍ او د زړه د عدم کفایې ګېلې نشته خو ناروغ د زړه د عدم کفایې لپاره High risk دی. لکه هایپر تینشن ، اتیرو سکروزس، میتابولیک سندروم ، او د کارډیو میوپاتي کورنۍ تاریخچه	د هایپر تینشن او هایپر لیپیدیما درملنه، په سګریت او الکولو بندیز ، منظم فزیکي تمرین ، د میتابولیک سندروم کنټرول او مناسب وګړو ته ACEI توصیه
Stage B	ناروغ د زړه د عدم کفایې اعراض نه لري خو د زړه په جوړښتیزه ناروغي اخته دی. لکه د زړه پخواني احتشا ، د کین بطن Remodeling ، هایپرتروفي او د EF کموالۍ ، د زړه بې عرضه دسامي ناروغۍ.	Stage A ټول اهتمامات په مناسب ناروغ کي ACEI او بیتا بلاکر
Stage C	د زړه جوړښتیزه (Structural) ناروغۍ د زړه د عدم کفایې د پخواني یا اوسني ګیلو سره.	Stage A ټول اهتمامات دیورتیک ، ACEI ، بیتا بلاکر دیجیتل، او په خوړو کي د مالګي بندیز
Stage D	تینګاریز یا مقاوم HF چي ځانګړي مداخلې (Intervention) ته اړتیا لري. لکه هغه ناروغان چي د اعظمي طبي تدایو سربیره د استراحت په حال کي اعراض ولري.	د A ، B ، C پړاونو ټول اهتمامات ، Mechanical assist device د زړه پیوند ، دوامداره داخل وړیدي انوترو پیک درمل، Hospice care

د زړه د ځنډونۍ عدم کفایې د درملنې مناسبه ستراتیژي :

د زړه د جوړښتیزې ناروغۍ درملنه د NYHA د دندیز ویش له مخې کیږي چی په لاندې ډول دي :

لومړي کلاس : ناروغ د زړه ناروغۍ لري خو د فزیکي فعالیت سره ګیلې لکه سټریا ، د زړه ټکان ، سالنډي او یا انجنیا دردونه نه پیدا کیږي .

د زړه او رگونو ناروغۍ.

د زړه عدم کفایه

دوهم کلاس : ناروغ د زړه ناروغی او د فزیکي فعالیت لږه اندازي محدودیت لري ناروغ د دمی په حال کې آرام وي، خوشدید فزیکي فعالیت د اعراضو سبب کېږي .
دریم کلاس : د زړه ناروغۍ سره د فزیکي فعالیت شدید محدودیت لري ناروغ د دمی په حال کې آرام وي خو منځنۍ کچه فزیکي فعالیت ، سترتیا ، د زړه ټکان ، سالنهي او د انجنیا دردونه منځ ته راوړي .

خلورم کلاس : پدی حالت کې هیڅ ډول فزیکي فعالیت پرته له نارامۍ څخه نه ترسره کېږي. د زړه د عدم کفایي گیلې حتی د دمی په حال کې هم شته وي او د هر ډول فزیکي خوځښت سره د ناروغ گیلې زیاتېږي.

په هغه بې گیلې ناروغانو کې چې د کینین بطنین سیستولیک دنده یې خرابه وي (لمړي کلاس) د درملنې موخه داده چې د نیوروهورمونل سیستم د بلاک کولو له لارې د ناروغۍ پرمختګ او د زړه د Remodeling څخه مخنیوي وشي . په هغو ناروغانو کې چې د زړه د پاتې والي گیلې لري (Class II-IV) د درملنې لومړنۍ موخه داده چې د مایعاتو د ډېر کېدو او عدم کفایي مخه ونیول شي او د ناروغۍ د نور پرمختګ او مېړني خطر کم شي دی موخي ته درسیدو لپاره د یورتيک او نیوروهورمونل بلاک کوونکي درملنه توصیه شي .

د تیټ EF (>40%) په صورت کې د HF درملنه :

عمومي اهتمامات :

د زړه د عدم کفایي سره مل ناروغۍ لکه هایپرټینشن ، د اکلیلي شریانو ناروغۍ ، دیابت او انجنیا باید تشخیص او تداوي شي . ځکه چې نوموړي ناروغۍ HF تشدید وي. ناروغان باید تنباکو کارونه او الکول پرېږدي . همدارنګه د ډیری سږي او تودی هوا او دروند فزیکي کار څخه ځان وساتي . د هغه درملو د کارولو څخه چې د زړه د عدم کفایي شدت زیاتوي (لکه غیر سترېرویدی ضد التهابي درمل) څخه ډډه وشي .

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه عدم کفایه

د تنفسي اشانتاتو د مخنیوي لپاره د انفلوانزا او نوموګوک واکسینونه توصیه شي. د HF د غذایي رژیم او د درملني د ښه تعقیب په هکله د ناروغانو او د هغوي د کورني پوهاوي ضروري ده.

فعالیت:

د HF ناروغ باید د دروند کار څخه ډډه وکړي لکن منځني کچه تمرین په هغه ناروغانو کې چې د NYHA د ویش د I - III کلاس کې دي ګټور دی.

غذایي رژیم (Diet):

د HF ټولو ناروغانو ته په خوړو کې د مالګې د کمو لو (په ورځ کې ۲-۳ ګرامه) وړاندیز کېږي.

په متوسط او شدید HF کې د مالګې لا زیات بندیز (په ورځ کې ۲ ګرامو څخه لږ) ته اړتیا ده د هایپو تریمیا په نه شتون کې د مایعاتو بندیز ته اړتیا نشته.

د مایعاتو بندیز ($<2L/d$) هایپو تریمیک ناروغانو او هغو ته چې د لوړ دوز دیورتیک او د سوډیم د بندیز سره سره اډیما کنټرول نه شي ورکول کېږي.

د پرمخ تللي HF ناروغان چې د عضلاتو سستوالی او Cardiac cachexia ولري په خوړو کې اضافي کالوري ته اړتیا لري.

دیوریتیکونه (Diuretics):

د مایعاتو د پټ کېدنې او اډیما له منځه وړلو لپاره ورکول کېږي.

Thiazide دیوریتیک: د H.F په درملنه کې په پراخ ډول کارول کېږي. په خفیف H.F کې یواځې او په شدیدو حالاتو کې د نورو دیوریتیکوسره یوځای په اغیزمن ډول کارول کېږي.

نوموړي دیوریتیکونه په ډیستال تیوبول او Cortical ascending loop of Henle کې د سوډیم او کلوراید جذب منع کوي. تیازایدهغه وخت اغیزمن دی چې $GFR \geq 30-40 ml/min$ څخه زیات وي. هایډروکلورتیازایډ ۲۵-۱۰۰ ملي ګرامه د ورځې یوځل او کلوروتیازایډ ۵۰۰ ملي ګرامه هر شپږ ساعته وروسته ورکول کېږي.

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه عدم کفایه

Furosemide, Bumetanide, Ethacrynic acid: د لوپ د یوریتیکونه سره ورته فزیالوژیکي اغیزې لري خو کیمیاوي جوړښتونه یې یو د بل څخه توپیر لري. دا د یوریتیکونه د هالنې د لوپ په پېر ساعده برخه کې د سودیم، کلوراید او پوتاشیم د بېرته جذبېدو مخه نیسی. نوموړي د یوریتیکونه د HF په ټولو ډولونو کې اغیزمن دي. په تیره بیا د سږو په اذیمه او مقاوم H.F کی. د زړه د پاتې والې په هغه ناروغانو کې چې ټیټ GFR لري او تیا زاید او الدوستیرون اټاګونسټ په یواځې اویا ګډ ډول سره اغیزمن نه وي دا د یوریتیکونه اغیزمن دي.

فروسماید ۲۰-۳۲۰ ملي ګرامه او Bumetanide ۱-۸ ملي ګرامه ورکول کېږي.

پوتاشیم Sparing د یوریتیکونه: پدې ډله کې Triametrine, Spironolactone ۱۰۰ ملي ګرامه د ورځې او Amiloride ۵ ملي ګرامه د ورځې شامل دي. سپایرونولکتون د جوړښت له پلوه د الدوستیرون سره ورته والي لري او په رقابتي ډول الدوستیرون منع کوي. نوموړي درملونه سودیم د یوریزس پیدا کوي او د لوپ د یوریتیک په خلاف د پوتاشیم د ډېر کېدو (احتباس) لامل کېږي. دا ګروپ درمل زیاتره د لوپ د یوریتیکونو سره یوځای کارول کېږي ترڅو د پوتاشیم د زیات ضایع کېدو څخه مخنیوي وشي.

: A.C.E Inhibitors

د رنین انجیوتنسین الدوستیرون (R.A.A) سیستم د HF په لمړیو مراحلو کې فعاله او د نوموړي ناروغۍ په پرمختګ کې غوره رول لوبوي. لدې امله ACE منع کوونکی د HF د درملنې په لمړني کرښه کې ځای لري. نوموړي درمل د Angiotensine II جوړېدل منع کوي او لاندې اغیزې لري:

۱- Vasodilatation

۲- د الدوسترون افراز منع کوي او د سودیم د ډېر کېدو څخه مخنیوي کوي.

۳- څرنگه چې ACE د BradyKinin کچه زیاتوي، چې دا وروستی بیا د پروستاګلانډین او نایتریک اکساید افراز هڅوی چې وازو ډایلټور اغیزه لري.

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه عدم کفایه

ACE نهی کوونکی درمل د چپ بطنین Filling pressure او د بڼي اذین فشار کموي او قلبی دهانه زیاتوي، همدارنگه HF گېلی کم او د تمرین زغم زیاتوي. سربیره پردې د الکترولیتو گډوډۍ چې په شدید HF کې پیداکېږي لکه هایپوتریمیا او هایپوکلیمیا هم ددې درمل پواسطه اصلاح کېږي.

څرنگه چې ACE نهی کوونکی کله کله د څرگند هایپوټنشن لامل ګرځي، لدې امله درملنه باید په احتیاط سره د کم مقدار څخه پیل شي. هایپوټنشن زیاتره په هغه ناروغانو کې چې هایپو والیمیا، Pre-renal azotemia او هایپوتریمیا ولري لیدل کېږي. په هغه ناروغانو کې چې د هایپوټنشن تر ډېر خطر لاندې دي ۲۵mg Captopril، ۲ هراته ساعته وروسته پیل او ورو ورو مقدار یې زیاتېږي. عام او په دوامداره توګه اغیزمن مقدار یې ۲۵mg هراته ساعته بعد دي. Enalapril ۵، ۲۰ د ورځې دوه ځلې پیل او تدریجاً ۱۰ mg د ورځې دوه ځلو ته رسول کېږي. څرنگه چې ACE نهی کوونکی د سیروم پوتاشیم د زیاتیدو لامل کېږي نو پوتاشیم Sparing دیورتیکونه باید د نوموړي درمل د پیل څخه مخکې قطع شي.

د ACEI درملو اړخیزې اغیزې عبارت دي له:

هایپوټنشن، ازوتیمیا، هایپرکلسمیا، وچ ټوخي (۱۰-۱۵%) او انجیو اډیما (۱%).

Angiotensine-II-Receptor Blocker:

نوموړي درمل د انجیوتنسنین II د اخذو د بلاک کولو د لارې د RAA سیستم منع کوي. په هغه حالتو کې چې ACE نهی کوونکی درمل ونه زغمل شي توصیه کېږي. د نوموړي ګروپ غوره درمل Losartan دی.

بیتا بلاکر (Beta Blockers):

بیتا بلاکر درمل د ادرینرجیک سیستم فعالیت د الفا یو، بیتا یو او بیتا دوه رسپټورونو رقابتی بلاک کولو د لارې منع کوي. که چېرې د ACEI سره په ګډه وکارول شي لاندې ګټې لري:

۱- د کینین بطنین د remodeling پروسه بیرته راګرځوي.

۲- د ناروغ ګیلې کموي.

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه عدم کفایه

۳- روغتون کې د بستر کیدو اړتیا کموي .

۴- عمر اوږدوي .

له دې امله بیتا بلاکر په بې گیلو، عرضی او هغو کې چې $EF < 40\%$ وي استطباب لري. د ACEI په شان بیتا بلاکر هم باید په کم دوز پیل شي که چېرې کم دوز ښه وزغمل شي په تدریجي ډول دوز یې زیاتېږي . خو د دوه اونیو څخه کمه موده کې په دوز کې زیاتوالي رانه وستل شي . ځکه په کمه موده کې د بیتا بلاکر د دوز زیاتوالي د ادرینرجیک تقوي د له منځه تللو له امله د مایعاتو د راتولیدني (retention) سبب کېږي . Carvedilol ، ۳،۱۲۵ ملي گرامه د ورځې دوه ځلي پیل هر دوه اونی وروسته دوز یې زیات او ۲،۲۵ ملي گرامه، ۱۲،۵ ملي گرامه او ۲۵ ملي گرامه د ورځې دوه ځلو ته رسول کېږي. Metoprolol-SR ۱۲،۵ ملي گرامه یا ۲۵ ملي گرامه سره پیل هر دوه اونی وروسته دوز یې دوه چنده کېږي ترڅو ۲۰۰ ملي گرامو ته ورسېږي.

وازودايلتر Vasodilators :

مستقیم وازو دایلیتر درمل د زړه په شدید پاتې والی کې چې د ACE نهی کوونکی درمل د ورکولو سره سره سیستمیک Vasoconstriction ولري اغیزمن درمل دی.

د زړه د حادې عدم کفایې د درملنې لپاره وې وازودايليتور هغه دی چې اغیزې یې ژر پیل شي او د اغیزو دوام ئې لږ وي. چې Sodum nitroprosod (Micro/kg/Min ۰.۱-۳) دا ځانگړتیاوې لري. د خولې د لارې دمزن استعمال د پاره د Hydralizine (تر ۳۰۰ ملی گرامه) او Isosorbide dinitrate تر ۱۲۰ ملي گرامه پورې د ورځې، گڼ کارول اغیزمن دي.

ډیجیټالیس (Digitalis):

یواځنې فمي مثبت انوتروپیک اغیز لرونکي درمل دی زیاتره د HF هغه ناروغانو ته چې د دیوریتیکو او ACE منع کوونکو د استعمال سره سره بیا هم د HF اعراض کنترول نه شي اویا ازینی فبریلیشن ولري ورکول کېږي.

د اغیزو میخانیکیت: ډیجیټالیس د زړه د عضلي حجري په Sarcolemmal غشا کې د Na^{+} د K^{+} ATPase - سره یو ځای کېږي اوسودیم پمپ منع کوي چې لدې امله د حجري دننه د سودیم

د زیره اورگونو ناروغی

د زړه عدم کفایه

غلط زياتيري چي دا $\text{Na}^{++}\text{-Ca}^{+++}\text{-exchange}$ اسانه کوي په پايله کي دننه په حجره کي د کلسيم غلظت زيات او تقلصی قوه زياتيري.

ڊيجيٽائيس يوشمير الڪٽروفزيولوزيڪ اغيزي هم لري چي به ڇيني ناروغانو کي گهٽيوارو په ڄڻو نوروکي مضرواقع ڪيري.

نوموڀري درمل پارسمپاتيڪ ٽيون زياتوي جي داد A.V Conduction وروڪوي اوڊسينوس نوڊ اوتومايسيٽي ڪموي پڊي بنسٽ ۽ اڙيني فبريليشن ناروغانوڪي بطني ريت ڪموي. له بلي خوا ۽ حجره ڪي دننه د ڪلسيم اوسوڊيم زياتوالي، د زړه د پٽ پيسميڪرونو اوتومايسيٽي زياتوي جي د بطين تخشريت دا زياتوالي د Digoxin ۽ تسمم ڪي د بيلابيلو اريٽميا و د منڃڻه، اٽڪ مسؤل دي.

د ورید د لیاري Digoxin اغيزي په ۱۵-۳۰ دقیقو کې پیل او په ۱،۵-۳ ساعته کې اعظمي کچې ته رسیږي. د پیل دوزنې ۰،۵ ملي گرامه په ۱۰-۲۰ دقیقو کې او تعقیبي دوزنې ۰،۲۵-۱،۲۵ ملي گرامه هر درې ساعته وروسته تطبیق کیږي ترڅو چې ټولیز مقدار یې په ۱-۲،۵ ملي گرامو ته ورسېږي. په زړو وگړو او کم وزنه خلکو کې نسبتاً کم دوزنې هم بسنه کوي.

دیجوجکسین سره درملنه د ورځي د ۵۰-۱۲۵ mg سره پیل او دوام ورکول کیږي. هغه ناروغانو ته چې د پښتورگو په عدم کفایه باندې اخته وي د اړتیا په صورت کې د دیجوجکسین نیمایي دوز ورکول کیږي. یوشمیر درمل د دیاجوکسین جذب خرابوي لکه د خولې له لیاړې وسیع الساحه انتی بیوتیک انتی اسید او Kaoline, Pectine.

دهغو ناروغانو درملنه چي د ستندرد درملني سره سره اعراض لري :

په هغه HF ناروغانو کې چې د کپین بټین EF بې ټیټ وي ACEI (ARB) جمع بیټا بلاکر د درملنې سټنډر شالید دی ، که چیرې د یادو درملو سره د ناروغ ګیلې کنټرولۍ نه شۍ او یا پرمختګ وکړي، نورې دوه دواګانې د تداوي په پلان کې علاوه کېږي لکه : ARB ، Spironolactone او هایدرالازین او Isosorbide dinitrate ګډ کارول او Digoxin . د ذکر شوو

د زړه او رگونو ناروغۍ.

د زړه عدم کفایه

درملو څخه د هریو ټاکنه کلینیکي او لابراتواري نښو پوري اړه لري لکه د پښتورگو دندی ، د سیروم پوتاسیم غلظت ، شریاني فشار او تژاد .

د ACEI ، ARB او الدوسترون اتاګونست سره د دري درملیزه درملنی څخه باید ډډه وشي ځکه چې په دي حالت کي د هایپر کلیمیا خطر زیاتېږي .

Digoxin هغو ناروغانو ته چې د کینین بطین د سیستمیک دندی د خرابوالي سره اذیني فبریلیشن هم ولري او هغوي ته چې د HF د سندرد درملني د وام سره بیا هم اعراض لري ورکول کېږي .

آنتي کواګلانت او Anti Platelet :

د HF ناروغان د شریاني او وریدي ترمبومبولیزم تر ډیر خطر لاندې دي . د کینین بطین د دندی خرابوالي په اذیناتو او بطیناتو کي د ویني دمه کیدل زیاتوي چې له دی امله د ترمبوز د جوړیدو خطر زیاتېږي . Warfarin (چې هدف یې د ۲ او ۳ تر منځ د INR ساتل دي) د HF هغه ناروغانو ته چې ځنډني او یا حجموي اذیني فبریلیشن ولري او یاد سیستمیک اوپلیمونري امبولیزم تاریخچه ولري ورکول کېږي .

لاندی ناروغان په لومړی دری میاشتو کي د Warfarin سره تداوي کېږي :

- عرضی او بي عرضه اسکیمیک کارډیو میو پاتي

- پراخه قدامي MI ناروغان

- او د MI هغه ناروغان چې د کینین بطین ترمبوز هم لري .

اسپیرین په کمه اندازه (۷۵-۸۰ mg) د HF هغه ناروغ ته چې IHD ولري ورکول کېږي

د زړه د اریتمیا درملنه :

د زړه د عدم کفایي ۱۵ - ۳۰ % ناروغان اذیني فبریلیشن لري. له Amiodarone او Dofetilide پرته نور د اریتمیا ضد درمل منفی انو تروپیک او پرواریتمیک اغیزی لري. په HF ناروغانو کي د سینوس ریتم د بر حاله کولو او ساتلو د پاره امیودارون ته لومړي توب ورکول کېږي. همدارنگه نوموړی درمل پدی ناروغانو کي د کارډیوورژن د نتیجی په ښه کولو کي هم مرسته کوي. باید په پام کي وی چی امیودارون په وینه کي د Phenytoin

د زړه او رگونو ناروغۍ.

د زړه عدم کفایه

اوديجو کسین کچه لوړوی. همدارنگه په هغه ناروغانو کې چې Warfarin اخلی INR اوږدوی نولدی امله په امیداورن کارونکو کې د یادو درملو دوز باید تر ۵۰٪ پورې کم شي. د ثابتې بطني تکی کاردیا او بطني فیبریلیشن د تکراری حملو د درملنی لپاره ICD ډیر اغیزمن دی. ICD په یواځې ډول او یا د امیدارون یا بیتابلاکر سره په ګډه ورکول کیږي. له ICD پرته په HF کې د اریتمیا ضد درملو سره د بطني اریتمیا درملنه ګټه نه لري.

Device therapy

الف- Cardiac Resynchronization

د تیټ EF او ګیله لرونکو HF ناروغانو نږدې ۱/۴ برخه کې د QRS دوام د ۱۲۰ ملي ثانیې څخه زیات وي چې د دوام دا زیاتوالی د بطني تقلص د نه هم غږې (dyssynchronous) له امله پیدا کیږي. ددی نه هم غږې په پایله کې د بطين ډکیدل او تقلص کم اود میترال د عدم کفایې دوام زیاتېږي. Biventricular pacing چې د زړه هم غږې کوونکی درملنه (Cardiac Resynchronization therapy {CTR}) هم ورته ویل کیږي. په یو وخت کې د دواړو بطيناتو د هڅونې لامل ګرځي چې له امله ئې د بطين تقلص ښه اود مایترل د عدم کفایې شدت کمېږي. په هغه ناروغانو کې چې نورمال سینوس ریتم لري که CRT په طبی تداوی علاوه شي د نوموړو مړینه او په روغتون کې د بستر کیدو کچه به تر ډیره هډه ټیټه، د ژوند کیفیت به ئې ښه اود تمرین ظرفیت به ئې زیات شي. CRT معمولاً لاندې ناروغانو ته توصیه کیږي:

۱- ناروغ سینوس ریتم ولري $EF < 35\%$ او $QRS > 120 \text{ ms}$ وي

۲- هغه ناروغان چې د طبی درملنی سره عرضی پاتی شي (N Y H A III .IV)

ب- Implantable cardiac Defibrillators

په اسکیمیک او غیر اسکیمیک کارډیومیوپاتی ناروغانو کې چې خفیف یا متوسط HF لري د ICD وقایوی ایښودونه د ناڅاپي مړینې پېښې کموي همدارنگه د ICD وړاندیز هغه ناروغانو ته هم کیږي چې NYHA دوهم، دریم کلاس عدم کفایه ولري د $EF < 30-35\%$ او ACEI، بیتا بلاکر او الدوسترون اتا ګونست درملنی لاندې هم وي. د ساتل شوی EF ($40-50\%$) په صورت کې د HF درملنه:

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه عدم کفایه

Management of HF with preserved EF (> ۴۰-۵۰ %)

د تیټ EF لرونکو HF ناروغانو د درملنې په اړه د ډیرو معلوماتو سره سره تراوسه د ساتل شوی EF لرونکو HF ناروغانو د پاره د درملنې کوم حل شوی معیار وجود نه لري. لدی امله زیاتره سببی لامل (لکه د میوکارد اسکیمیا، هایپر تنشن، او تاثیر لرونکی فکتورونه) لکه تکی کار دیا ، اذینی فبریلشن، هر څومره ژر چی ممکن وی تداوی شي.

د ناروغ سالنډی په لاندی ډول تداوی کیږي :

۱- د مالګی د محدودیت اود یوریتک پواسطه د وینی ټولیز حجم کمول .

۲- د وینی مرکزی حجم کمول

الف : نایتیریت

ب: د عصبی هورمونی فعالیت کمول د ACEI , ARB او بیتا بلا کر په مټ

د زړه پیوند Cardiac Transplantation

څرنگه چې د پرمختللي عدم کفایي اترار خراب دي لدی امله اوس د زړه پیوند ډیر کارول کیږي. په ډېری مرکزونو کې اوس د یو کال ژوندي پاتي کیدو هیله % ۸۰-۹۰ او د پنځه کالو ژوند هیله % ۷۰ څخه زیاته ده.

د HF هغه ناروغان چې د درملني د نورو ټولو اهتماماتو سره ځواب ونه وایي د NYHA په څلورم کلاس کې وي او د یو کال ژوندي پاتي کیدو چانس یې لږ وي د زړه پیوند د پاره کاندیدان دي.

د زړه د پیوند غوره اختلاطات په لاندی ډول دي :

۱- اتان

۲- د Cyclosporin کارونی له امله د پښتورگو د دندو خرابوالی او هایپر تنشن

۳- په چټک ډول پرمختلونکي کورونري اتیروسکروز

۴- د معافیت ځپونکي درملني له کبله کانسر

د زړه پر پیوند برسيره یو شمیر نوري جراحي عمليي هم د شدید HF ناروغانو کې تر سره کیږي:

د زړه او رگونو ناروغۍ

د زړه عدم کفایه

- ۱- Cardiomyoplasty یو داسې عمل دی چې پکې د Latissimus Dorsi عضله د زړه شاوخوا راتاو او داسې تنبه کیږي چې د زړه د عضلې سره په یو وخت کې تقلص وکړي.
- ۲- په Ventricular Reduction surgery کې د زړه د دندې د ښه کولو لپاره د قدامي وحشي دیوال یوه لویه برخه غوڅیږي.
- پورته دواړه جراحي عمليې په پرمختللي HF کې د خطر نه ډک دي او هم د انزارو په ښه کولو کې مرسته نه کوي نو لږې امله ډیر نه کارول کیږي.

د زړه بېړنۍ پاتې والی او د سږو اډیما

(Acute Heart Failure and Pulmonary Edema):

د کارډیوجینیک پلمونری اډیما غوره لاملونه په لاندې ډول دي:

د زړه بېړنۍ احتشا یا شدیدې اسکیمیا، د زړه د ځنډنۍ پاتې والی Exacerbation، بېړنۍ د سامې پاتې والی او د مایټرل دسام تنګوالي.

د سږو د اډیما غیرقلبي لاملونه عبارت دي:

وریدي اوپیات، د داخل قحفي فشار زیاتوالی، لوړه ارتفاع، Sepsis، درمل، انشافي توکسینونه، transfusion reaction، شاک او Disseminated intravascular coagulation

کلینیکي ښه:

د سږو د اډیما ناروغانو ځانګړې ګیلي عبارت دي له: شدیدې سالنډي، د ګلابي پوکاني لرونکي خړاسکو خارجیدل، خوله کېدل، او سیانوزس. د سږو په فزیکي کتنه کې رالونه، رانکای او ویزنګ په خپور ډول اوریدل کیږي. هایپرټشن معمولا د داخل المنشا کټیکول امین د افراز له امله پیدا کیږي. د ګوګل په راډیوګرافي کې د Butterfly په شان سنخي اډیما شته وي. د زړه سایز غټ یا نارمل وي. د زړه د دندو د معلومولو لپاره ایکوکارډیوګرافي معاینه ډیر ارزښت لري. یو شمیر ناروغانو کې EF نورمال وي خو د بطن د دیاسټولیک دندو د خرابوالی له امله د ازیڼ فشار لوړوي. PCWP په کارډیوجینیک اډیما کې لوړ او په غیر کارډیوجینیک کې نورمال او یا ټیټ وي.

د زړه او رگونو ناروغۍ.

د زړه عدم کفایه

درملنه :

۱ - په پرمختللي پلمونري اډیما کې ناروغ ته د ناستي وضعیت ورکول کیږي داسي چې پښي یې څوړندی وي چې دا حالت سا اخیستل اسانه کوي او هم د وړیدي ویني بیرته راگرځیدنه کوي.

۲ - اکسیجن د ماسک له لاري ورکول کیږي ترڅو چې PO_2 د ۶۰ ملی متره سیماب څخه لوړ وساتل شي. که چیري لاهم تنفسي ستونځي شدیدې پاتي شي Endotracheal Intubation او میخانیکي ونتیلیشن ته اړتیا پېښیږي.

۳ - مورفین - د پلمونري اډیما په درملنه کې ډیر اغیزمن درمل دی. ۲-۴ ملي گرامه د رگ له لاري ورکول کیږي او که اړتیا وي وروسته د ۲-۴ ساعتو څخه تکرار ورکول کیږي چې لاندې گټې لري:

۱- وړیدي ظرفیت زیاتوي

۲- د کین ازين فشار ټیټوي

۳- د ناروغ اضطراب له مینځه وړي.

مورفین په هغه پلمونري اډیما کې چې د اوپیات له کبله منځ ته راغلي وي اونیوروجنیک پلمونري اډیما کې نه ورکول کیږي.

۴- داخل وړیدي دیورتیک: 40 mg Furosemide , 1 mg Bumetanide (که چیري ناروغ د دیورتیک درملني لاندې وي په لوړ دوز ورکول کیږي) نوموړي درمل د دیوریزس د منځته راتگ څخه مخکې وړیدي پراخوالی منځته راوړي.

۵- نایتريت: د ویني فشار او د کین بطن د ډکېدو فشار کموي لدی امله کلنیکي ښه والی گړندی کوي. د ژبي لاندی نایتروگلسرین، isosorbide dinitrate، ځایي نایتروگلسرین او داخل وړیدي نایتريت د دیوریزس له پیدا کیدو مخکې سالنډي کوي، نوموړي درمل په هغه وگړو کې ډیر گټور دی چې هایپرشن هم ولري.

د زړه او رگونو ناروغۍ.

د زړه عدم کفایه

۲- انوتروپیک درمل : (Inotropic Drugs)

سمپاتومیمېټیک امینونه لکه ډوبوتامین او Dopamine قوي انوتروپیک دي . همدارنگه Amrinone او Milrinone د میوکارډ تقلصیت زیاتوي او سیسټمیک او پلمونري وازو دایلتیشن منځته راوړي . نوموړی درمل د پلمونري اذیما هغه ناروغانو ته چې د کین بطن د دندې شدید خرابوالی ولري ورکول کیږي .

۷- Bronchodilators : برانکوسپزم د سږو د اذیما د غبرگون په ډول پیدا کیږي چې د اکار پخپله د هایپوکسیمیا او سالنډي د ډیریدو لامل کیږي . پدې برخه کې انشافي بیتا ۲ اګونسټ یا وریدي امینوفیلین گټور دي . خویاد درمل د تکی کارډیا او فوق بطني اریتمیا د لمسون سبب کیږي .

په زیاتره پیښو کې د سږو د اذیما ، د درملني سره ډیر ژر ځواب وایي کله چې د ناروغ حالت ښه شو د ناروغي لامل او تشدیدونکي فکتور پیدا او تداوي کیږي .

د زړه او رگونو ناروغۍ.

کارډیومیوپټي

اتم فصل

کارډیومیوپټي Cardiomyopathy

تعريف:

کارډیومیوپټي یوه ډله ناروغۍ دي چې په ابتدایي ډول د زړه عضلات اخته کوي او د هایپرتینشن، د زړه ولادې ناروغیو، کسبي والولر، کروني او پریکارډیال ناروغیو په پایله کې منع ته نه وي راغلي. د میوکارډ خپور فیروز چې د زړه د خوځلی انفارکشن له کبله منځته راځي، د چې بطن دندې خرابوي او زیاتره د Ischemic Cardiomyopathy اصطلاح ورته کارول کېږي. لکن پدې حالت کې د کارډیومیوپټي د اصطلاح څخه باید ډډه وشي. د کارډیومیوپټي نوم کارول هغه وخت پرځای دی چې زړه په ابتدایي ډول اخته شوی وي. د ایټولوژي له نظره کارډیومیوپټي په دوه ډولونو ویشل شوې ده.

۱: Primary Type: پدې ډول میوپټي کې د زړه عضله په ناروغۍ اخته وې خو علت یې معلوم نه وي.

۲: Secondary Type: چې د میوکارډ ناروغۍ د یوڅرګند لامل له کبله منځته راغلې وي او یا د بدن د بلې کومې عضوې یا سیستم ناروغۍ ورسره په ګډه شتون ولري.

د روغتیا د نړیوالې ټولنې لخوا چې کومه د کارډیومیوپټي ویشنه شوې ده په هغې کې Specific Cardiomyopathy هغه حالت ته ویل کېږي چې په هغې کې د زړه د ناروغۍ سره د بل کوم سیستم یا پخپله د زړه بې نظمې ملګري وي لکه هایپرتنسیف او میتابولیک کارډیومیوپټي.

د کارډیومیوپټي سببي ویش

I- پرایمري:

- ایډیو پاتیک
- کورنی (Familial)
- Eosinophilic endomyocardial disease

کارډیو میوپټي

د زړه اورگونو ناروغۍ.

• Endomyocardial Fibrosis

II- دوهمی یا ثانوی

۱- اتناني (D) لکه وایروسی ، باکتریائي ، فنگسي ، پرتوزواني ، سپایروکت او Rickettsial میوکارډایټس

۲- میتابولیک (D) :

۳- ارثي ذخیروی ناروغی لکه د گلايکوجن زیرمه ایزه ناروغی ، Mucopolysaccharidosis هیمو کروماتوزس ، د Fabry ناروغی

۴- کموالی (Deficiency) (D) لکه د الکترولايټواو مغذی مواد کموالی .

۵- کولاجن ناروغی (D) لکه SLE , Polyarteritis Nodosa , رو ماتوید ارترایټس

Dermatomyositis, Progressive systemic sclerosis

۶- انفلټریشن او گرانولوما : لکه امایلویدوزس ، سارکویدوزس سرطاني ناروغی

۷- عصبي عضلي (D) لکه عضلي دستروفي ، مایوتونیک دستروفي Fried Reich Ataxia

۸- حساسیت او ذهری غبرگون (D) لکه الکول ، ردیشن او درمل

۹- Peripartum Heart Disease

یادونه : په پورته متن کی D د H, dilated د R د Restrictive کارډیو میوپاتی اختصاری توری دي .

کلینکی وېش:

په زیاتو حالاتو کې د کارډیو میوپاتی د ځانگړې لامل پېژندنه شونې نه وي. پدی بنسټ د کلینیک او پټوفزیالوژي له نظره کارډیو میوپاتی په لاندې دري ډولونو باندې ویشل شوېده:


۱- Dilated:

۲- Restrictive:

۳- Hypertrophic:

د زړه اورگونو ناروغۍ.

کارډیومیوپټي



۸-۱ - انځور: نورمال زړه او د کارډیومیوپټي مختلف ډولونه ښودل شوي دي (۲۳).

ډایلیتید کارډیومیوپټي

د CHF د دریو څخه یوه برخه ئي د ډایلیتید کارډیومیوپټي له کبله دی. د ډایلیتید کارډیومیوپټي له کبله د ښي اویا چپ بطن د پمپ په دندو کې ګډوډې راځي او په پایله کې ئي په بطنونو کې د پرمختللي پراخیدلو او هایپرټروفی لامل ګرځي. چې دغه پروسه د Remodeling پنوم یادېږي او د CHF ګیلې به په ناروغانو کې د میاشتو او کلونو په تیریدلو سره رامنځته شي.

لاملونه:

په زیاتره حالاتو کې ئي کوم ښکاره لامل شتون نه لري خو دومره ویلې شو چې ډایلیتید کارډیومیوپټي د میوکارډ د زیان له کبله منځته راځي او په میوکارډ کې زیان د ټوکسیک، میتابولیک او اتانې عواملو له کبله پیدا کېږي. همدارنګه د DCM په پیدا کېدو کې حاد ویروسي میوکارډایټس هم رول لري چې پدې کې ایمونولوجیک میخانیکیت برخه اخلي.

د زړه او رگونو ناروغۍ.

کارډیومیویتی

د کارډیومیویتی پورتنې ډول د متوسط عمر نارینه وو ناروغۍ ده چې نسبت سپین پوست کونه په افریقایي امریکایانو کې زیات عمومیت لري.

د ډایلیتید کارډیومیویتی (DCM) بیرته گرځیدونکې ډول د الکول روږدیدنی، امیدواری، د تایرایډ ناروغۍ، کوکاین او ځنډنې ناکترول شوي تاکي کارډیا څخه منځته راځي.

د دریم څخه تر پنځه برخه ناروغانو کې DCM کورنې یا فامیلیل سرچینه لري کوم چې د جنیټیکي او نورو پروټینو د بدلونونو په پایله کې منځته راغلی وي. ډېر عام ډول یې د هغه جېن میوټیشن دی چې سارکومیریک پروټینونه کنټرولوي. دا ناروغۍ د جنیټیکي Heterogenous او یا زیاتره حالاتو کې د اتیوزومال ډومینیانټ په ډول په ارثیت وېل کېږي.

په ښې بطن کې Dysplasia په فامیلې ډول د کارډیومیویتی لامل ګرځي چې د اډیپوز نسجونو د راټولیدو له کبله منځته راځي چې د بطنې اریتمیا او ناڅاپي مړینې لامل کېږي. په درملنه کې یی د کتیتروسیله د اریتمیک Site ایسته کول (Catheter ablation) او Implantable cardioverter defibrillator رول لري.

کلیټېکي موندنې:

په زیاتره ناروغانو کې د زړه د ښې یا چپ لوري احتقاني عدم کفایي ګیلې په تدریجي توګه رانېکاره کېږي. ځینې خلکو کې د کینې بطن بی عرضه پراخوالی د میاشتو او کلونو لپاره موجود وي چې د انجنېنا پکتورس په ډول د IHD درد انځوروي. پدې ناروغانو کې سینکوپ د اریتمیا او یا سیستمیک امبولي (اکثره د بطنې ترمبوز له کبله وي) څخه منځته راځي.

فزیکی ازموینه:

پدې ناروغانو کې د زړه د لویوالي او CHF مختلفې درجې منځته راتلای شي. د ناروغۍ په پرمختللي حالت کې په Pulse pressure کې تنګوالی او د وداجي وریدونو په فشار کې به لوړوالی شتون ولري. پدې ناروغانو کې د زړه دریم او څلورم غړونو او ریډل عمومیت ولري او کیدای شي چې د مایټرال یا ټرای کسپید د سامونو عدم کفایه هم رامنځته شي.

د زړه اورگونو ناروغۍ.

کارډیو میویتی

لایراتواری ازموینی:

د سینې په راډیوگرافیک معاینه کې به د کبې بطن سیوري ډیرلوې وي. خو زیاتره پېښو کی عمومی کارډیومیوگالی لیدل کیږی. د سږو په ساحه کې به د سږو وریډی کانسجشن او بین الخلالې یا الویولراذیما ولیدل شي.

په ECG کی به ئې لاندې بدلونونه شتون ولري:

- سینوس تکی کارډیا یا اتریل فایبریلیشن
- بطینی اریتمیا
- د کین اذین اېنارملتی
- په منتشره توگه د ST-T د خپو اېنارملتی
- Low voltage او ځینې وخت د داخل البیطینې انتقال زیان

په ایکوکارډیوگرافی کې به ئې د چپ بطن پراخیدنه د نارمل او یا لږڅه پېر یا نازکه دیوالونو سره اوسیسټولیک dysfunction ولیدل شي. د زړه کتیرایزیشن او انجیوگرافی د IHD په رد یا تائید کی مرسته کوي. د وریډ د لاری د میوکارډ بیویسی په پرایمری او کورنی کارډیومیویتی کی اړین نه دی خو د کارډیومیویتی د ثانوی لاملونو لکه امایلویدوزس په تشخیص کی مرسته کوي.

درملنه:

زیاتره هغه ناروغان چې عمر ئې د ۵۵ کلونو څخه زیات وي د گیلو د پېل څخه تر څلورو کلونو پوری مړه کیږي. ۴/۱ ناروغان بنفسه بڼه والی. بیا مومي. مړینه پکې د CHF، بطینې تکی کارډیا یا برادې کارډیا له کبله منځته راځي. ناڅاپي مړینه په ثابت ډول د ناروغ ژوند تحدیدوي. همدارنگه ناروغان د سیستمیک امبولایزیشن تر خطر لاندی دي، لدی امله د اتې کواگولانت اوږد مهاله ورکړه لږمېږي.

د زړه اورگونو ناروغۍ.

کارډیو میوپاتی

د زړه د عدم کفائي ستنډرډ درملنه د ناروغانو په گیلوکې بنسټ والې راولی. هغه ناروغان چې ACE نهی کوونکی زغملي نه شی کولی شو په ARB سره ټي عوض کړو. الکل چې په زړه توکسیک اغیزه لري ځان دې ورڅخه وساتي، همدارنگه کلسیم کانال بلاکراو NSAIDs څخه دې هم ډډه وشي. د اتیې اریتمیک کارول د Pro-arrhythmia ویره رامنځته کوي. د څلورو څخه په یوه هغه ناروغ کې چې د بې یاچپ لوري BBB ولري د Biventricular pacing کارول په اعراضو او د روغتون په بسترو لویې کمښت او هم د مړینې په راتیټولو کې به رول ولري. د بطني اریتمیا په صورت کې د ICD څخه کار اخیستل کېږي. د ناروغۍ په پرمختللي حالت کې چې طبي درملنه ناکامه شي د زړه ترانسپلانتیشن ته اړتیا پېدا کېږي. (۱۹، ۲۱)

الکولیک کارډیو میوپاتی Alcoholic Cardiomyopathy

هغه کسان چې زیات الکل ($> 90 \text{ g/d}$) د ډیرو کلونو موده کې څکي، پدوی کې کیدای شي د ایډیوپاتیک یا کورنۍ کارډیو میوپاتی پشان کلینکي بڼه رامنځته شي. د کارډیو میوپاتی پیداکیدل تر یوه بریده جنتیک پورې اړه لري. هغه ناروغان چې په پرمختللي کارډیو میوپاتی اوشدید CHF اخته وي خراب اترار لري. په تیره بیا چې د الکل څکلو ته دوام ورکړي. د یادو ناروغانو د څلورمې برخې څخه لږې درې کاله پورې ژوندی پاته کېږي. د الکولیک Cardiotoxicity یو بل ډول چې د Holiday heart syndrome پنوم یادېږي او د فوق بطني او بطني تکی اریتمیاوو پواسطه ځانگړې کېږي، کیدای شي پرته د زړه له عدم کفائي څخه شتون ولري. دا سندروم په ځانگړې ډول د الکل د زیات څکلو څخه وروسته پیداکېږي. Peripartum کارډیو میوپاتی:

د امیدواری په وروستی ترایمستر او د زیږون څخه وروسته تر ۶ میاشتو پورې کیدای شي د زړه پراخوالی او CHF رامنځته شي چې د پري پارتم کارډیو میوپاتی پنوم یا ډېرې لامل یی څرگند ندی خو التهابی میوکارډایس، د معافیتي سیستم فعالیت او Gestational هایپرټنشن د

د زړه اورگونو ناروغۍ.

کارډیومیوپټي

ناروغۍ په پیداکیدو کې مسؤل ګڼل کیږي. ناروغي زیاتره په هغو ښځو کې چې ډېر ماشومان ئې زېږولي وي، افریقائی وي او له ۳۰ کالو ډیر عمر ولری لیدل کیږي. د ناروغۍ ګیلی، ښی اودرملنه د ایدیوپاتیک دایلتید کارډیومیوپاتی په شان ده، نوموړی ناروغی ۱۰% مړینه لری انزار ئې دی پوری اړه لری چې د CHF د لومړی حملی څخه وروسته د زړه سایز بیرته نورمالی کچی ته راگرځی اوکه نه.

که چیری ناروغه د پری پارتم کارډیومیوپاتی څخه روغه شی په راتلونکی کې باید وهڅول شی چې د بیا ځلی امیدواره کیدو څخه ډډه وکړی.

عصبی عضلی ناروغۍ Neuromuscular Disease:

په زیاتره عضلی دستروفي ناروغیو کې د زړه اخته کیدل عام دی. په Duchcan's progressive muscular dystrophy کې د زړه د جوړښتیز پروتین (Dystrophin) د جین میوټیشن د میوساپټ د مړینی سبب کیږي. پدی ناروغی باندی د میوکارد اخته کیدنه زیاتره د ځانګړی ECG بدلونونو لکه په ښی پریکاردیل لیډونو کې د R اوږدی څپې شتون $R/S > 1$ اود نهایتو او وحشی پریکاردیل لیډونو کې د ژوری Q څپې د شتون له مخی پیژندل کیږي. همدارنګه په لږ شمېر ناروغانو کې د فوق بطېنی او بطېنی اریتمیاوو بیلابیل ډولونه پیداکیږي.

درمل:

یو شمیر فارمکولوژیک مواد په بیړنی ډول میوکارد اخته او میوکارداتیس پیداکوي. یو شمیر نورئی بیا په ځنډنی ډول میوکارد ته زیان رسوي او د ډایلیتد کارډیومیوپاتی لامل ګرځي ځینی ئې یواځی ECG بدلونونه او ځینی نور ئې بیا د CHF او مړینی لپاره زمینه برابروي. د Anthracycline مستحضرات په تیره بیا Doxorubicin (Adriamycin) چې سرطان ضد قوی درمل دی که د 450 mg/m^2 څخه په لوړ دوز ورکړل شی د سیستولیک دندی د خرابوالی او بطیني اریتمیاوو لامل ګرځي.

د زړه اورگونو ناروغۍ.

کارډیومیوپټي

نوموړې درمل د مایټو کانډریا داخلي پرده زیانمنه کوی او د ATP جوړیدنه خرابوي. د دوکسوروبسین تسممی څرگندونې کیدای شي په حاد ډول رامنځته شي خو زیاتره په منځني ډول د تداوی د پیل څخه درې میاشتې وروسته منځ ته راځي. د زړه ځانگړې تروپونین اود بټیناتو د رادیو نکلاید معایناتو او ایکوکارډیو گرافي په وسیله د بټین د دندو د معلومولو له مخی کیدای شي د دوکسوروبسین بی عرضه توکسیستې تشخیص او د درمل دوز د هغی له مخی عیار شي *

Trastuzumab (Herceptin) چی د تیونو د کانسر په درمنله کی کارول کیږي که په یواځي ډول استعمال شي په ۷٪ پیښو کی کارډیومیوپاتی پیداکوي او که Doxorubicin سره گډ وکارول شي د کارډیومیوپاتی د پیداکیدو چانس څلورځلی زیاتیري لوړ دوز Cyclophosphamid هم د CHF سبب کیږي *

emetine , Phenothiazine , Tricyclic antidepressant او Lithium د ځینی ECG بدلونونو او اریتمیا لامل کیږي .

کوکاين د یوشمیر ژوند تحدیدونکی اختلاطاتو لکه ناخاپی مړینه ، میوکارډایټس ، DCM او د زړه بیرنی احتشا لامل کیږي (۱۹).

هایپرتروفیک کارډیومیوپاتی Hypertrophic Cardiomyopathy :

پدې ډول کارډیومیوپاتی کی د چپ بټین د هایپرتروفی سره د بټین په جوف کی پراخوالې شته نه وي اود هایپرتروفی لامل لکه هایپرتینشن او د ابهر د سام تنگوالې هم پکې نه موندل کیږي دا ډول هایپرتروفی په دوه ډولو لیدل کیږي:

۱: د کین بټین نامتناظره (Asymmetric) هایپرتروفی چي په سپټم کی منځته راځي .

۲: د کین بټین د Out-flow لارې په وړاندې د فشار توپیر راتلل چې د Sub-aortic ساحې د تنگوالې څخه پیداکیږي (په منځنی د بټین کی د میترا ل دسام مخکني کسپونه د هایپرتروفی

د زړه اورگونو ناروغۍ.

کارډیو میویتی

شوي سپټم په وړاندې واقع کیږي. ددې په پایله کې انسدادی منظره منځته راځي چې د یتنه د Hypertrophic obstructive او Idiopathic hypertrophic subaortic stenosis Cardiomyopathy اصطلاحات کارول کیږي.

د HCM د نیمسائي څخه زیاتو ناروغانو کې کورنې تاریخچه موجوده وي چې په اتوزومل ډومینانټ ډول په ارثیت وړل کیږي. په ۱۵۰ بېلابېلو جینونو کې د ۱۵۰ څخه زیات بدلونونه چې په ځانگړي ډول په Sarcomeric protein کې منځته راځي، مسول گڼل شوي دي.

هیموډینامیک:

د هغه انسدادی حالت په خلاف چې د ثابت تنگوالی (لکه د ابهر دسام تنگوالی) له کبله پېدا کیږي په HCM کې د فشار تفاضل ثابت نه وي او د یوې معاینې څخه بلې ته توپیر کوي. د سیستول په وخت کې د میترال دسام د هایپرتروفیک سپټم خواته حرکت کوي او د کینې بطن د خروجی برخې د تنگوالی او بندېدو لامل کیږي.

په HCM کې د بطن دننه ډینامیک انسداد د لاندې درې میکانیزمونو له کبله منځته راځي:

۱: د چپ بطن په تقلصیت کې زیاتوالی.

۲: د بطن په حجم کې کموالي (Preload ↓)

۳: د ابهر په پراخیدلو او فشار (After load) کې کموالي.

کلینیکي بڼه:

دا ناروغان زیاتره یا گیلې نلري او یاد خفیفو اعراضو څخه گیله من وي. او یا کېدای شي د تشخیص شوی ناروغانو خپلوان وي. له بده مرغه کېدای شي، ناڅاپي مړینه ددې ډول هایپرتروفی لومړنۍ کلینیکي څرگندونه وي. چې په ماشومانو او ځوانانو کې د فزیکي فعالیت پوخت او یا له فعالیت وروسته منځته راځي. په عرضی ناروغانو کې مهمه گیله سالنډی ده چې د

د زړه اورگونو ناروغۍ.

کارډیو میویتی

کین بطن د دیاستولیک ډیسفونکشن له کبله چې د بطن ډکېدل ورسره خرابېږي او د کین بطن دیاستولیک فشار، د کین اذین فشار او پلمونری کیپلری فشار د لوړېدو لامل کېږي منځته راځي. نورې گیلې ئې دانجینا پیکتوریس، سټریا اوسینکوپ څخه عبارت دي. ډېری ناروغان به د زړه د زړو دوه یا درې نبضانه لری او د زړه څلورم اواز اوریدل کیږي. د انسدادی HCM غټه نښه سیستولیک مرمر دی چې خشن او Diamond shape دی او د لومړي غږ څخه وروسته پیل کیږي. دا مرمر په زړه او یا د سترنوم ښکتنې کین سرحد کې په ښه ډول د اوریدل کېږي او Holo systolic وي.

لاېراتواری ازموینی :

په الکتروکارډیوگرام کې د کین بطن هایپرتروفي او په څپورډول سره په ECG کې د Q پراخه او ژوره څپه چې د زړه د انفارکشن شک ورباندې راځي موجوده وي. ډېر ناروغان د هولتر مونیټورنگ په جریان کې ازیني اریتمیا (لکه فوق بطني تکی کارډیا او اذینی فبریلیشن) او بطني اریتمیا (لکه بطني تکی کارډیا) حملې ښيي. د سینې راډیوگرافي ممکن نورمال او یا په خفیف یا منځنۍ کچه د زړه په خیال کې زیاتوالي وښيي.

په تشخیص کې ایکوکارډیوگرام بنسټیز رول لري چې د چپ بطن د هایپرتروفي سره به ئې septum د ۳، ۱ یا لدینه هم زیات خلې د چپ بطن د خلفی ازاد دیوال څخه زیات پېر شوي وي. او د میوکارډیل فبروزس له امله به پکې د Ground glass په ډول منظره ولیدل شي. د کین بطن جوف به کوچنی وي، د بطن د خلفی دیوال حرکات زیات او د سپټم به لږ وي.

درملنه:

څرنګه چې د فزیکي تمرین پوخت او یاد تمرین څخه وروسته پدې ناروغانو کې اکثره ناڅاپي مړینه پېښیږي. نو د رقابتي سیالیو او جدې فعالیتونو څخه دې مخنیوی وشي. د دیهاید ریشن

د زړه اورگونو ناروغۍ.

کارډیومیوپټي

څخه د ناروغ وساتل شي او ډیوریتیک په احتیاط سره وکارول شي. بیټا ادرینرژیک بلاکر د انجینا او سینکوپ په بڼه کولو کې رول لري. دا څرگنده نه ده چې بیټابلاکر به د ناڅاپي مړینې په مخنیوي کې رول ولري او که نه.

د Amiodarone کارول د فوق بطنی او بطني اریتمیا په مخنیوي کې رول لري او د ناڅاپي مړینې خطر هم کموي. Verapamil او ډیلتیازیم د بطنیاتو سختوالي (Stiffness) کموي، لور د دیاسټولیک فشار ټیټوي او د تمرین کولو زغم زیاتوي.

د Nifedipin، دیجیټل، ډیورتیک، نایتريت، Vasodilator او بیټا اګونسټ څخه باید ډډه وشي. د اذیني فبریلیشن زغم گران دی، نو لدی امله د سینوس ریتم رامنځته کولو او ساتلو ته باید ډېره هڅه وشي.

په هغه وځیمو ناروغانو کې چې د طبي درملنې سره ځواب ورنکړي د جراحي Myotomy، سره په ۴/۳ ناروغانو کې د اوږدې مودې لپاره په اعراضو کې بڼه والې راتللې شي. په هغو ناروغانو کې چې د ناڅاپي مړینې خطر سره مخامخ وي د ICD څخه استفاده کېږي.

انزار:

د ناروغې طبعي تاریخچه ډول ډول وي، ځینې ناروغانو کې هیڅ کلینیکي څرگندونې منځته نه راځي. د ناروغۍ په سیرکې د اتریل فبریلیشن پیدا کېدل عمومیت لري، چې په اعراضو کې د زیاتیدو لامل گرځي. د ۱۰% څخه په کموناروغانو کې استانی اندوکارډایتس منځته راځي. د ۱۰-۵% ناروغانو کې د کین بطن Dilatation منځته راځي. د مړینې مهم لامل ناڅاپي مړینه ده چې کېدای شي په بی گیلو یا گیلو لرونکو ناروغانو کې منځته راشي.

رستریکتیف کارډیومیوپاتی Restrictive Cardiomyopathy :

د دی ناروغۍ غوره نښه د دیاسټولیک دندی اېنارملټي ده چې د بطنیاتو د ډکولو وړتیا پکې ګډوډ وي. په منځته راتګ کې ئي لاندې لاملونه برخه لري:

د زړه اورگونو ناروغۍ.

کارډیومیوپټي

د میوکارډ فیبروزس ، هایپرتروفی ، ځینې ارتشاحې ناروغې چې معمولا د دوهمې یا ثانوي رستریکتیف کارډیومیوپټي لامل ګرځي، همدارنګه Amyloid هم ثانوي کارډیومیوپټي منځته راوړي، هیموکروماتوزس، سارکویډوزس، Esinophilia او سکروډرما هم ددې ډول کارډیومیوپټي لامل ګرځي. کلینیکي بڼه:

د تمرین نه زغمل او سالتې ددې ناروغې د غټو کیلو څخه شمېرل کیږي. پدې ناروغانو کې د وریدې فشار د دوامداره زیاتیدنې له امله ازیما او اسایټس منځته راځي. ناروغان لوي ، دردناکه او نبضاني ځیګرلري. وډاجی یا جګولر وریدی فشار لوړ وي او د شهیق سره نه ټیټیږي (Kusmauls sign).

په زړه کې د دریم اوڅلورم غږونو اوریدل عمومیت لري. پدې ډول کارډیومیوپټي کې د التصاقی پریکارډایتس په خلاف د زروي شوک (Apex impulse) په اسانې سره جس کیږي او د میترال عدم کفایه پیردود دی.

په الکتروکارډیوګرام کې به په Infiltrative کارډیومیوپاتی کی ولټیژ کم او د T-ST په څپو کې به غیروصفې بدلونونه شته وي. په ایکسري کی چې التصاقی پریکارډایتس کې کوم کلسیفیکیشن وي دلته په دی ناروغی کې شتون نه لري.

په ایکوکارډیوګرافې ، CT او MRI کې به ئي په متناظر ډول سره د چپ بطین د دیوالونو پېړوالی او د چپ بطین په حجم اوسیسټولیک فشار کې کموالی لیدل کیږي.

درملنه:

درملنه ئي ناهیلی کوونکې ده. هیموکروماتوزیس په صورت کې د Deferoxamine پواسطه په میوکارډ کې د اوسپنې کچه کمیږي. د Fabrys په ناروغۍ کې د (ګلکټیوز انفیوزن په وسیله د انزایم کمبود پوره کیږي او د زړه دندې بڼه کیږي). د امبولیزم د خطر د کمولو د پاره ناروغانو ته د ځنډنۍ انتی کواګلانت لارښونه کیږي.

د زړه اورگونو ناروغۍ.

کارډیو میویتی

سترس کارډیو میویتی (Tako - Tsubo (stress) Cardiomyopathy

چی د Apical ballooning syndrome په نامه هم یادېږي ناروغ د شدید فزیکي یا روحی سترس څخه وروسته د ګوګل شديده ناراحتۍ پیدا کوي. دا ناروغۍ زیاتره په هغه ښځو کې چې د ۵۰ کالو څخه زیات عمر لري لیدل کېږي. د ECG په پریکارډیل لیدونو کې د ST سیګمنټ لوړوالی او ژوره T څپه لیدل کېږي. په انجیوګرافي کې په اکلیلې شریانونو کې کوم بندوالی شته نه وي د کین بطن دیستل برخه شديده Akinesia لري او EF ټیټ وي. Troponin خفیفه اندازه لوړوالی ښي، په ایکوکارډیوګرافي کې د سیستول په اړه کې د کین بطن په تیره بیا د څوکی (Apex) د برخې Ballooning لیدل کېږي. ټول پورته ذکر شوي بدلونونه چې په ډرامه ئې ډول رامنځته کېږي په ۳-۵ ورځو کې له منځه ځي.

Endomyocardial fibrosis

دا یوه پرمختلونکې ناروغۍ ده چې د RCM په ډول څرګندېږي زیاتره په هغه کوچنیانو او تنګي ځوانانو کې چې په حاره (Tropical) او نیمه حاره سیمو کې (افریقا، امریکا، کی اوسېږي پیدا کېږي. نوموړې ناروغۍ په افریقا کې د CHF غوره لامل دی. داسې چې د زړه د ناروغیو له کبله د مړینې څلورمه برخه جوړوي.

پدې ناروغۍ کې د میوکارډ شديده فایبروزس شته وي د اذینې بطنینې دسامونو د اخته کیدو له امله د دسامونو عدم کفایه پیدا کېږي او هم د بطنیناتو زړه د ترمبوز او فبروزی نسج په وسیله بندېږي. کلینکي ښه ئې دی پوری اړه لري چې د کوم بطن یا دسام اخته کیدل متباز دی. د کیني خوا د اخته کیدو له امله د سږو د احتقان گیلې پیدا کېږي، پداسې حال کې چې د ښي خوا اخته کیدنه د سیسټمیک وړیدي احتقان ښه رامنځته کوي. طبی درملنه ئې ناهیلې کوونکې ده. د جراحی عمل په مټ د فبروتیک اندوکارډ ایستل او د اخته دسام بدلول په ځینو ناروغانو کې عرضي ښه والی پیدا کوي (۱۹، ۲۱).

د زړه او رگونو ناروغۍ.

کارډیومیوپټي

Eosinophilic Endomyocardial Disease

د leoffler اندوکاردایتس په نوم هم یادېږي. دا ناروغۍ په گرموسیموکی لیدل کېږي د ناروغۍ په سیر کې د یو یا دواړه بطنیناتو د اندوکارد پېړوالی زیات او میوکارد هم اخته کوي. د زړه تصویري معاینات د بطنیناتو په تیره بیا د کینې بطن د Posterior basal دیوال د ضخامت زیاتوالی ښیي. په ډاپلرایکوکاردیوگرافي کې زیاتره د مایترل ریگورجټیشن لیدل کېږي. په بطنیناتو کې لوی ترمبوزي کتلې جوړېدای شي، چې د پلمونری او سیسټمیک امبولیزم لپاره زمینه برابروي.

Hepatosplenomegaly او د نورو غړو ځانې انفلټریشن معمولاً شته وي د درملنې په موخه دیورتیکونه، افترلوډ کمونکی درمل او اتی کواگولانت ورکول کېږي. گلوکو کورټیکوئیدونه او Hydroxyurea د ژوند هیله (Survival) ښه کوي. په ځینې ځانگړو ناروغانو کې جراحی عمل د فایبروټیک نسجونو قطع کول او د مایترل دسام ترمیم توصیه کېږي.

د زړه او رگونو ناروغۍ

کورپلمونل

نهم فصل کورپلمونل (Cor-Pulmonal)

تعريف:

د ښې بطن هایدروټروفي او پراخوالی (Dilatation) دی چې د سږو د رگونو او یا پرانښمې ناروغېو په وړاندې د غبرگون په پایله کې مېنځ ته راځي. د یادونې وړ ده چې پدې تعريف کې د زړه ولادي ناروغۍ او د ښې بطن هغه عدم کفایه چې د کینې بطن د دندې د خرابوالي په پایله کې رامنځته کېږي شامل ندي. (۳، ۱۹)

د ریوي دوران دندې:

د سږو شریان د ښې بطن د زړوې څخه د پنځه ساعتي مترو په واټن په دوو لویو برخو چې یوه یې ښې او بله یې کینې سږې ته وینه رسوي وېشل کېږي. په روغو وگړو کې د ښې بطن سیستالیک فشار ۲۵ ملی متر سیماب او دیاستالیک فشار یې د صفر څخه تر یو ملي متر سیماب دی. د سږو د شریان سیستالیک فشار د ښې بطن د سیستالیک فشار سره تقریباً یو شان دی. کله چې د سیستول په اخر کې ریوي دسام تړل کېږي وروسته ددې څخه فشار په ښې بطن کې ډېر ژر ښکته کېږي. خو د سږو په شریان کې فشار ورو ورو ښکته راځي.

په دودیز ډول Mean Pulmonary Capillary Pressure چې په غېر مستقیم ډول اندازه کېږي ۷ ملی متر سیماب ده. د ملاستې په حالت کې د کینې اذین Mean فشار او د لویو ریوي وړیدونو فشار په منځنۍ کچه دوه ملی متر سیماب چې د یو او پنځه ملی متر سیماب تر منځ توپیر کوي دی. د کینې اذین د فشار د معلومولو لپاره زیاتره د pulmonary Capillary Wedge Pressure طریقې څخه کار اخیستل کېږي. پدې میتود کې کتېتر د ورید د لارې ښې اذین، ښې بطن، بیا ریوي شریان او بالاخره د ریوي شریان ورو شعبو ته رسول کېږي. هغه فشار چې ددې وړوکی ریوي شریان څخه لاس ته راځي د Pulmonary Wedge Pressure په نوم یادېږي، چې په نورمال حالت کې ۵ ملی متر سیماب دی. PCWP زیاتره د کینې اذین د فشار څخه دوه یا درې ملی متر سیمابه زیات وي. (۷)

د زړه او رگونو ناروغۍ

کورپلمونل

پتوفزیالوژي:

په نورمال حالت کې د ښي بطن After load نسبتاً لږ دی او د ریوی شریان د فشار سره نږدې اړیکه لري. ټټرته د ویني د راگرځیدو زیاتوالی (فزيکي فعالیت، اضطراب، درد) د ریوی شریان فشار لږه انده زیاتوي په دودیز ډول د ریوی شریان ($15 \text{ cm H}_2\text{O}$) او د کین ازين ($10 \text{ cm H}_2\text{O}$) تر منځ $5 \text{ cm H}_2\text{O}$ په اندازه د فشار توپیر ددې باعث کیږي چې ټوله قلبي دهانه چې د داستراحت په حالت کې نږدې 5 lit/min کیږي د سږو څخه تیر شي او یوا ځي د فشار لږه اندازه لوړوالی ته اړتیا ده ترڅو د شدید فزيکي فعالیت په وخت کې تر 25 لیتره پورې په یو دقیقه کې د سږو د وعایي بستر څخه تیر شي.

په کورپلمونل کې د ښي بطن د غټوالي (Enlargement) شدت د افتیرلو د زیاتوالي پورې اړه لري. کله چې د سږو درگونو ټینګار د سږو د وعایي او یا شدید پراښیمي ناروغیو له کبله په دوامداره ثابت ډول لوړ پاتې شي د فزيکي فعالیت له کبله د زړه د دهاني زیاتوالی، د ریوی شریان د فشار د شدید لوړوالي لامل کیږي. د سږو Hyperinflation د ښي بطن د افتیرلو د زیاتوالي لامل کیږي لکه په COPD کې چې د سنخي کیپلریو د Compression او د سږو د رگونو د کش کیدو له امله د سږو د رگونو ټینګار او افتیرلو د زیاتېږي.

د سږو د ډېری برخې غوڅول (Extensive pulmonary resection) او د سږو restrictive ناروغي چې په هغو کې د سږو رگونه تر فشار لاندې راځي او تخریبېږي د سږو د حجم د کموالي له کبله د ښي بطن د افتیرلو د زیاتوالي لامل کیږي.

د هایپوکسیا او اسیدوزیس له کبله د سږو د رگونو تنګوالي چې د پلمونري هایپرټینشن مهم لامل ګڼل کیږي هم د ښي بطن د افتیرلو د زیاتوالي لامل کیږي. بالاخره د ښي بطن د افتیرلو د زیاتوالي چې د کورپلمونل لامل کیږي په بنسټیزه توګه د سږو درگونو او پراښیمي ناروغیو له کبله پیدا کیږي.

د زړه او رگونو ناروغۍ

کورپلمونل

د سږو د رگونو ناروغۍ (Pulmonary vascular disease)

پدې ناروغۍ کې د ښې بطنې افتړلوېد د سږو په رگونو کې د وینې د جریان د محدودیت (Restriction) له کبله لوړېږي. په هغه کورپلمونل کې چې د سږو د رگونو د ناروغیو له کبله پیداشوي وي، د سږو شریان د فشار لوړوالی د سږو د پرانښمې ناروغیو په پرتله ډیر شدیدوي. د سږو هغه وعایې ناروغۍ چې د کورپلمونل لامل کېږي عبارت دي له:

د سږو متکرر امبولۍ، د سږو Vasculitis، د لوړې ارتفاع له کبله د سږو د رگونو تقبض، د زړه ولادي ناروغۍ چې د کین څخه ښي ته د شنت سره یوځای وي (ASD, VSD, PDA)، او د سږو Venooclusive ناروغۍ. که چېرې د سږو د رگونو د تینګار د زیاتوالي لامل چې کورپلمونل یې منځته راوړي پیداشو، دا حالت د لومړني ریوي لوړ فشار (Primary pulmonary hypertension) په نامه یادېږي (۱۹، ۲۰).

بېړنۍ کورپلمونل:

په اټکلي توګه هرکال په امریکا کې پنځوس زره کسان د سږو د ترمبوامبولیزم له کبله مري. نږدې نیمایي مړینه په لومړي ساعت کې د ښې بطنې د حادي عدم کفایې له امله چې د سږو د کتلوي او تکراري امبولي له کبله پیداکېږي پېښېږي. که چېرې د سږو پخوانی پرانښمې یا وعایې آفت شتون ولري په منځني اندازه امبولي هم د زړه د دهاني د کمیدو لامل کېدای شي.

کله چې د ښې بطنې سیستولیک فشار په حاد ډول د دوه چنده څخه لوړ شي ($> 50 \text{ mmHg}$)، ښې بطنې په عدم کفایه اخته کېږي. په یو وګړي کې چې په وریدي ترمبو زاخته او یا ورته مساعدوي او نوموړي ته ناڅاپه شدیدې سالتېډي او د زړه او رگونو کولپس پیداشي د ښې بطنې حادي عدم کفایې ته چې د سږو د کتلوي امبولي له کبله پیداشوي فکروشي.

کلینیکي بڼه:

د ښې بطنې د عدم کفایې له کبله په ناروغ کې خفاقت، خوله، د وینې د فشار تیتوالي او چټک نبض چې Amplitude ئې کوچني وي شتون لري.

د زړه او رگونو ناروغۍ. کورپلمونل

د غاړې وریدونه پرسیدلي او د V موخه په کې د ترای کسپید د دسام د پاتې والي له کبله بارز وي. ځیگرهم کیدای شي پرسیدلي، نبضاني او درد ناکه وي. د زړه په اصغاکي د ترای کسپید د دسام د عدم کفائي مرمر د سترنوم د هډوکي په چپه څنډه کې اوریدل کېږي چې کیدای شي د S₄-gallop سره یوځای وي.

لبراتورې ازموېنې:

د سږو دامبولی د زیاتره ناروغانو په ECG کې د ST سگمنت او T څپې بدلونونه اود برقي محور انحراف لیدل کېږي. په دریمه برخه ناروغانو کې د حاد کورپلمونل بدلونونه لکه S₁, T₃, Q₃, RBBB او P Pulmonal لیدل کېږي. د سینې رادیوگرافي زیاتره نورمال او وصفي نه وي. MRI, Spiral computed tomography, ventilation perfusion scan, pulmonary arteriography, او ایکوکارډیوگرافي په تشخیص کې ډېره مرسته کوي. د شرياني گازمعاینه د Ventilation-perfusion د عدم تطابق له کبله د P_a O₂ ټیټوالي او Hyperventilation له کبله د P_a CO₂ ټیټوالي ښی. (۱۴)

درملنه:

په بهرنۍ کورپلمونل کې د پلمونري امبولیزم په درملني سربیره د ښي بطن د پري لوړ د زیاتوالي لپاره ناروغانوته په احتیاط سره مایعات ورکول کېږي ترڅو قلبي دهانه وساتل شي. که چیرې د سږو د هایپوکسیک وعائي تقبض (Hypoxic pulmonary vasoconstriction) درېوي فشار د زیاتوالي لامل شوي وي د ۱۰۰٪ اکسیجن انشاق د ښي بطن افتړلو کموي.

د سږو پرانښیمي ناروغۍ:

د سږو دواړه انسدادې او Restrictive ناروغي د ځنډنۍ کورپلمونل لامل کېږي. په تیره بیا انسدادې ډول ئي پدې ناروغيو کې د سږو د شريان فشار منځني کچه لوړه وي. د تنفسي ناروغيو په سیرکي د کورپلمونل پیدا کیدل په خرابواتزارو دلالت کوي.

د زړه او رگونو ناروغۍ

کورپلمونل

ځنډونۍ کورپلمونل

د حاد کتلوي ترمبوا مبوليزم پر خلاف که د سږو د رگونو د ټينگار زياتوالی اود بني بطن هايرتروفي په تدريجي ډول پيداشوي وي ، د سږو او رگونو فشار ډيرلوړ حتي سيستمیک شرياني فشار ته نږدې کېږي.

د مزمن کورپلمونل غوره وعائي لاملونه عبارت دي له: متکرر منځني سايز امبولي ، د داخل وريدی درملو کارول ، پرايټونه اوتوموري نسجی امبولي ، د Primary Pulmonary Hypertension او د سږو Vasculitis.

کلينيکي څرگندونۍ:

سالنډي او Tachypnea ددی ناروغی ځانگړي گيلې دي. چي د لږ فزيکي فعاليت سره زياتيږي اوحتي ددمی په حالت کي هم شتون لري ، او ناستي سره آراميږي. وچ پوڅي يي بل مهم عرض دي. د سينې د مخکي برخي درد، د سږو د شريان د پيل برخي د پراخوالي يا د بني بطن د اسکيميا له کبله پيداکيږي.

د سيستمیک وريدي فشار زياتوالي د هيپاتوميگالي او د پنبود پړسوب لامل کېږي. کله کله شرياني هايپوکسيميا او د زړه دهاني دکموالي له کبله سيانوزيس په ناروغ کي ليدل کېږي، دسترونوم په چپه څنډه او ابي گاستريک ناحيه کي د بني بطن Heave ممکن جس شي. په اصغاسره Pulmonary ejection click چي لوږغرلري د سترنوم کين پورتنې برخه کي ممکن واريډل شي. همدارنگه د زړه د دويم غږ دوهمه برخه (ريوي) شديده وي او د دويم اواز ثابت تضاعف (Split) او د بني بطن S₃ Gallop چي د شهيق په وخت کي شديد کېږي داوريډلو وړ وي ، کله کله د ريوي دسام د پاتي والي مرمرهم اوريډل کېږي. د غاړي په وريدونوکي د a خپه اوکله کله د u خپه بارزه وي. د بني بطن د عدم کفايي په پيداکيدوسره فشار زيات ، د V خپه نسبتاً غټه ، مثبت Hepatojugular reflux او S₃ او S₄ گلوپ اوريډل کېږي.

د زړه او رگونو ناروغۍ

کورپلمونل

لابراتواري پلټنې

په راډیولوژیک معایناتو کې د Pulmonary trunk او سروي رگونه غټ ښکاري. همدارنگه د Ventilation and perfusion lung scan او سیسټمیک Venography د سپرو د امبولي په پیژندنه کې مرسته کوي.

د شدید پلمونري هایپرټینشن ناروغ په ECG کې P-Pulmonale، او د زړه برقي محور ښي خوا ته بې ځایه شوی وي او د ښي بطن هایپرټروفی لیدل کیږي.

ایکوکارډیوگرافي د ښي بطن د ضخامت او جوف غټوالي په باره کې معلومات راکولای شي. همدارنگه MRI د ښي بطن د کتلې، د دیوال پیروالی، د جوف حجم او Ejection fraction په باره کې ګټور معلومات راکولای شي.

د زړه کټیترایزیشن، د سپرو درگونو د فشار او ټینګار په معلومولو کې مرسته کوي، په همدې توګه د زړه د ولادي ناروغیو او د چپ بطن د ناروغیو سره د کورپلمونل په توپیری تشخیص کې مرسته کوي. د سپرو بیوپسي هم د Vasculitis په پیژندنه کې مرسته کولای شي.

درملنه:

حاد تنفسي اتان چې د ښي بطن د عدم کفایتي تشدیدونکي فکتور دی باید بې له ځنډه او په بشپړ ډول تداوي شي. سنخي هایپوکسیا چې د دمې، فعالیت او د خوب په وخت کې شتون لري باید د سنخي تنفس د ښه کولو د لارې چې د هوايي لارو د بندښت د رفع کولو او د شهیقي اکسیجن د غلظت د زیاتوالي پواسطه لاس ته راځي له منځه لاړه شي. د اوږدې مودې اکسیجن درملنه په شدید COPD ناروغانو کې ډیر ګټور دی، ځکه د سپرو د شریان فشار او د سپرو د رگونو ټینګار کموي. Bronchodilator او اتی بیوتیک د هوائی لارو بندش کموي، او دیوریتیک د اذیم په له منځه وړلو کې مرسته کوي. لوپ دیوریتیک باید په احتیاط سره ورکړل شي ځکه چې کیدای شي د میتابولیک Alkalosis لامل شي او تنفسي حرکات پخ کېږي. Digitalis د ښي بطن په عدم کفایه کې په احتیاط ورکول کیږي. کله چې هیماتوکریټ ۵۵-

۶۰ فیصد ته ورسېږي Phlebotomy ته اړتیا پېښېږي. (۱۹)

د زړه او رگونو ناروغۍ.

ميوکارډايتيس

لسم فصل

ميوکارډايتيس Myocarditis

تعريف:

ميوکارډايتيس يوه التهابي پروسه ده چې د ميوکارډ حجری اخته کوي او د اتان، معافيتي گډوډيو او توکسينونو له امله منځ ته راځي. په يوشمير نامعلومو پيښو کې حاد مایوکارډايتيس د Chronic dilated کارډيو ميوپاتي په لور پرمخ ځي. (۱۴)

لاملونه:

هغه ټول انتانات چې د کارډيو ميوپاتي برخه کې ترې يادونه شوېده د ميوکارډايتيس لامل کېدای شي، خو په عمومي توگه په متحده ايالاتو کې حاد مایوکارډايتيس د ويروسو په تېره بيا د adenovirus, hepatitis C، Coxsackie's-virus-B او HIV پواسطه منځته راځي.

د کلينیک د نظره ښه مختلفه وې کېدای شي بې گيلووی، د ناروغ په ECG کې د ST-T ابناړمليتي موجوده وي، اويا په Fulminant ډول مایوکارډايتيس پکې منځته راځي چې د هغې سره به په ناروغ کې اريتميا او د زړه عدم کفايه يوځای وي. په ځينو ناروغانو کې ميوکارډايتيس د ميوکارډ د بېرني احتشا ښه لرې چې د سينې درد، د ECG بدلونونه او د ميوکارډ د انزایمونو کچه ورسره لوړه وي. په هغه ناروغانو کې چې د ميوکارډايتيس سره پکې پلمونري هاپرټنشن شتون ولري د مړينې د ډير خطر سره به مخ وي.

د ناروغ فزيکي معاینه زياتره نارمل وي خو په ډيرو وځيمو حالاتو کې به لومړی اواز تپت وي، د دریم غږ سره به د ميترال د عدم کفايې مرمر واوريدل شي. که پریکارډايتيس ورسره وي نو Friction rub به هم واوريدل شي.

د زړه اورگونو ناروغۍ.

ميوکارډايتس

د وېروسي ميوکارډايتس ناروغانو کې به د پورتنۍ تنفسي لارې د ناروغۍ گيلې اويا د زکام په ډول د اعراضو تاريخچه شته وي. اود کلنيک له نظره به دی ناروغانو کې وېروسي Nasopharyngitis اوتانسيلایټس هم شتون ولري.

په کلنيکي تشخيص کې ئي د غايطه موادو ، Pharyngeal washing او يا د بدن د نورو مايعاتو څخه د وېروس رايبلول بنسټيز رول لري. اود خاص اتې باډې شتون هم په تشخيص کې مرسته کوي. په Endomyocardial biopsy کې به چې تشخيصه ارزښت لري د مایوسايت حجرو سره به يوځای د Round cell ارتشاح اونیکروزيس وليدل شي. ترهغې چې د ناروغ د زړه برقي گراف نورمال شي د شديدو تمريناتو څخه دې ډډه وشي. که په ناروغ کې CHF منځته راغلې وي نو ACE نهی کوونکي، ډيوريتيکونه اود مالگې څخه پرهيز ورکول کېږي. خود Digitalis په وړاندې حساس نه دي. اريتميا پکې عموميت لري خو درملنه ئي ستونزمنه وي. مړينه پکې د CHF، تکی اريتميا او د بلاکونو له کبله منځته راځي. د Fulminant ميوکارډايتس ناروغ د زړه او سږوميخانيکي تقويي ته اړتيا لري او يا د زړه پيوند توصيه کېږي. د HIV د لس فيصد څخه زيات ناروغان په چپ بطين کې د وېروس د راتولېدنې له کبله ميوکارډايتس لري (۱۹).

HIV ميوکارډايتس:

د HIV په زياتو ناروغانو کې زړه په سب کلينېکي ډول سره (Pericardial effusion، د بڼې خوا زړه لوی والی، اريتميا او سرطان) اخته وي. د HIV په ۱۰% ناروغانو کې د زړه ښکاره ناروغۍ پيدا کېږي چې غوره ئې د چپ بطين د دندې گډوډې ده. چې دا په ميوکارډ کې د وېروسونو د خپرېدو څخه منځته راځي. په نورو ناروغانو کې زړه د نورو هغو اتانانتو پواسطه اغيزمن کېږي چې د ايدز سره يوځای عموميت لري لکه Toxoplasmosis او Kaposi's sarcoma کې چې زړه ته ئي ميتاستازيس ورکړې وي پدې ناروغانو کې CHF په تېرېدونکي ډول د HIV ضد درملنې سره ځواب وايي.

د زړه او رگونو ناروغۍ.

ميوکارډايتس

باکټريائي ميوکارډايتيس Bacterial Myocarditis

په باکټريايي اتان باندې د زړه اخته کېدل عمومي نه لري. خوکه چېرې دا ډول پېښې رامنځته شي د اندوکارډايتس د اختلاطونو له امله به راپېدا شوې وي. د ډيفټريا له کبله په ۴/۱ حالاتو کې Diphtheric ميوکارډايتس پېدا کېږي چې دائي يو ډيرجدي اختلاط دی او د مړينې دوديز لامل گڼل کېږي. قلبی افت د توکسين د ازادیدلوله کبله پېدا کېږي چې توکسينونه د پروټين جوړیدنه نهې کوي. په پایله کې به ئي زړه پراخه، شحمی او hypocontractile شي. استقالي سیستم هم اخته کېږي. د ناروغې د يوې اونۍ په تيریدلو سره به په ناروغ کې د زړه لويدل (Cardiomegaly) او پرمختللي CHF راپېدا شي. دانتې توکسين سره ئي درملنه عاجل او اړين دی، د انتې بيوتیک سره درملنه هم ترسره کېږي.

Chagas ناروغۍ:

د Chagas ناروغۍ د Trypanosome cruzi (پروتوزوا) پواسطه منځته راځي او د ځانگړې مياشې د چيچلو له لارې ليرېږي. د چگس ناروغۍ د پېل څخه کلونه وروسته پرمختللي ميوکارډايتيس منځته راځي. دغه ناروغۍ په جنوبي او مرکزي امريکا کې د زړه د ناروغيو غوره لامل جوړوي. په انډيمیک ساحو کې د ټولنې ۲۰-۷۵% خلک ور باندې متن دي. په نادرو حالاتو کې دغه ډول ميوکارډايتيس د وينې د ترانسفيوژن او يا غړو د پيوند له لارې ليرېدلای شي. په يوفيسد متنوخلکو کې په حاد ډول ميوکارډايتيس منځته راځي چې ۲-۳ مياشتو کې رغيږي. خو په يو پر دری ناروغانو کې کلونه وروسته د ميوکارډ ځنډنې ناروغۍ رامنځته کېږي. په ځنډنې ډول کې ئي د زړه په څو چمبرونو کې پراخوالی منځته راځي، د بطيناتو په ديوالونو کې به فايبروزيس اوسختوالي راشي، بطينی انيوريزم او Mural ترومبوزيس پکې جوړېږي. د پرمختللي CHF په صورت کې خراب انزال لري.

د زړه او رگونو ناروغۍ.

ميوکارډايتس

په ECG کې په ځانګړې توګه د ولټيج کموالی ، RBBB او Left anterior hemi block ليدل کېږي چې د بشپړ AV بلاک په لورې پرمختګ کوي. په ايکوکارډيوګرافي کې به د چپ بطين په شاتنې ديوال کې Hypokinesis وليدل شي. د بطينې ټکې اريتميا په درملنه کې د خولې د لارې Amiodarone گټور تماميږي. د مړينې عمده لامل به ئي مقاوم CHF او اريتميا وي اوډير کم ناروغان پکې د ايمبوليک پيښوله کبله مړه کېږي.

درملنه: د CHF او اريتميا درملنې ته ځانګړې پاملرنه وشي. د انتقالي سيستم پرمختللي ناروغي او Heart block په صورت کې Peacemaker ايښودل کېږي.

اتنې کواګوليشن د ترمبوایمبوليزم پيښې راکموې. طبي درملنه ئي زياتره بريالۍ نه وي، خو ښه لاره ئي په انډيمیک ساحو کې د Insecticide کارول دي چې د ناروغي ویکتور را محدود کړي.

Giant cell Myocarditis:

د ميوکارډايتس نادر ډول دی. لامل ئي معلوم ندې خو په ځوانانو او متوسط عمر خلکو کې د چټکې او مرګانې CHF او اريتميا په ښه رامنځته کېږي. ددې ميوکارډايتس لامل لاسکاره شوي نه دی خو د تاييوما ، Systemic lupus erythematosus او تايروټوکسيکوزيس سره يوځای پېښېږي. په نيکروپسي کې د زړه لوي والی ، ventricular thrombi او مايکروسکوپي کې به ئي د خپور او پراخه التهابي ساحې لپاسه Giant cell وليدل شي. په درملنه کې ئي Immuno suppressive درملنه ورکولی شي خو انتخابي درملنه ئي د زړه پېوند ده.

Lyme carditis:

د لایم ناروغي د Tick born سپيروکيت په واسطه منځته راځي ناروغي د متحده ايالاتو په ځينو برخو په تېره شمال ختيځه برخه کې د اوړي په موسم کې ليدل کېږي. د ناروغي په حاده مرحله

د زړه او رگونو ناروغۍ.

ميو کار ډايتس

کې په ۱۰ سلنه ناروغانو کې د زړه د اخته کيدوگيلی منځته راځي. پدې ناروغې کې د انتقالې سيستم اخته کېدنه عموميټ لري او کېدای شي سينکوپ رامنځته کړي. په درملنه کې داخل وريدي Ceftriaxone او يا پينسلين کارول کيږي خو د Lyme carditis په خفيف ډول کې د خولې د لاري Amoxicillin يا ډوکسي سايکلين رول لري ، که په ناروغ کې دويمه يادريمه درجه اټريو وينټريکولر بلاک شتون ولري ناروغ بستر او د ECG مونيتور لاندې نيول کيږي . که د زړه د بلاک سره اعراض موجود وي ، موقتې Pacemaker ايښودل کيږي نادرا دايمي پيسميکرته اړتيا پيدا کيږي. سره لدی چې د گلوکوکورټيکوييدو رول د بلاکونو په بېرته گرځيدلو کې څرگنده نه ده خو زياتره ناروغانو ته ورکول کيږي. (۱۹)

د زړه او رگونو ناروغي

د پریکارد ناروغي

یوولسم فصل

د پریکارد ناروغي Pericardial Disease

د پریکارد نورمالی دندی :

د پریکارد دوه طبقې (حشوی، جداری) د لږ مقدار (۱۵-۵۰) ملي لیتره مایع پواسطه یو له بل څخه جلا شوی دي. د پریکارد دندی په لاندې ډول دي :

۱- د شدید فزیکي فعالیت او د دوراني حجم د زیاتوالي په وخت کې د زړه د ناڅاپي پراخه کیدو څخه مخنیوی کوي.

۲- زړه پخپل اناتوميک ځای کې ساتي .

۳- د زړه او شاوخوا نسجونو د سولیدو څخه مخنیوی کوي.

۴- اود سږو او پلورايي مایع څخه زړه ته د انتاناتو د خپریدو مخنیوی. خو سره لدی د پریکارد پوره نشتوالي د کومی څرگندی کلنیکي ناروغي لامل نه گرځي .

پریکارد ایتس Pericarditis

ویشنه Classification

۱ - کلینیکي ویش :

I- بیړنی (حاد) پریکارد ایتس : a- فیبرینوز effusive-b

II- تحت الحاد پریکارد ایتس : a - constrictive - b Effusive - b Constrictive

III- مزمن (ځنډنی) پریکارد ایتس a - constrictive - b effusive - C - Adhesive.

۲ - سببي ویش :

I - انتاني پریکارد ایتس

الف- وایرال: کوکساکی وایرس A او B ، ایکو وایرس ، Mumps ، ادینو وایرس او HIV

ب- تقیحي انتانات : لکه نومو کوک ، سترپتو کوک ، ستفیلو کوک او Niseria

دزپه اورگونو ناروغي

د پريكارد ناروغي

ج- توبركلوز

د- فنگسي اتانات : لكه هيستوپلازموزس ، Coccidomycosis، كانديدا او mycosisblast

e - نورا اتانات : سفليس ، پروتوزوا او پرازتيك اتانات .

II- غير اتاتې پريكاردايتس :

A - بيړنې MI

B - يوريميا

C - نيوپلازيا

۱ - ابتدايي تومورونه (سليم يا خبيث ميزوتيلوما)

۲ - ميتاستاتيک تومورونه (دسپرو ، تيونو ، لمفوما ، اولوكيميا)

D - ميگروديما

E - كولستروول

F - كايلو پريكارديوم

G - تروما

H - Aortic Disecion (پريكارد جوف ته د ليكاژ سره)

I - له شعاع اخيستني وروسته Post irradiation

J - Familial madetranian fever

K - كورنې پريكاردايتس

M - Wipple ناروغي

N - ساركويدوزس

III - هغه پريكاردايتس چې كيدای شي فرط حساسيت او اوتو اميوتی پوری اړه ولری

۱: درگونو كولاجن ناروغی

۲: روماتيک فيور

۳: دواگانې: لكه INH ، هايډرلازين, Procainamid او نور .

د زړه اورگونو ناروغي

د پریکارد ناروغي

۴: د زړه د تروما، احتشا او Cardiomyopathy څخه وروسته.

بيړنۍ پریکارد ایتس Acute pericarditis

درد، د پریکارد اصطحاک ، ECG بدلونونه ، د پریکارد انصباب او تامپوناد د بیړنۍ پریکارد ایتس د زیاتره ډولونو اساسی څرگندونې دي . د سینې درد د پریکارد ایتس په زیاتره ډولونو کې اساسی عرض دی. درد زیاتره په اتناني ، فرط حساسیت، او اوتوایمیویتی له کبله پیداشوی پریکارد ایتس کی شته وی. او د توپرکلوزیک ، سرطانې او د وړانگه ورکولو څخه وروسته او یوریمیک پریکارد ایتس په زیاتره پیښو کې ناروغان له درد څخه گیله من نه وی . درد په ډیری پیښو کې شدید وی . د سترنوم هلووکی چم اوشا ته خپرېږي . د ورسره مل پلورای التهاب له امله درد زیاتره پلوریتیک وصف لری تیره (Sharp) درد چی د سا اخیستلو توخی او د بدن د وضعیت په بدلون سره شدید کیږي . کله کله درد فشاری وصف لری او یو یا دواړه مټانو ته خپرېږي او د زړه اسکیمیک دردونو ته ورته والی پیدا کوی.

د پریکارد دردونه د ناستی او مخکی خوا ته تیتیدو سره کمیږي او د ستونی ستاخ ملاستی سره زیاتېږي .

Pericardial friction rub د پریکارد ایتس یوه غوره فزیکي نښه ده. زیاتره د سا ایستلو په وخت کی چی ناروغ ناست وی ښه اوریدل کیږي . رب غیر ثابت شدید څرمنیز (Leathery) غږدی چی کیدای شی خوشاعتو کی له منځه لاړشی او بله ورځ بیا پیداشی . په حاد پریکارد ایتس کی چی شدید ایفیوژن سره ملگری نه وی ECG بدلونونه د سب پریکاردیل التهاب له امله منځته راځي . په پراخه توگه ST elevation چی مقعریت یی پورته خواته وی . او په دوه یا دری ستندرد لیدونو او ۷۲ څخه تر ۷۲ پوری لیدل کیږي . معکوس بدلون (ST-depression) په aVR او کله کله په ۷۱ کی لیدل کیږي که چېری لوی پریکاردیل ایفیوژن شتون ولری د QRS ولتاژ کمیږي .

د پریکارد انصباب (Pericardial effusion)

د زړه او رگونو ناروغي

د پریکارد ناروغي

په بهرنۍ پریکارد ایتس کې ایفیوژن د درد او پورته ذکر شویو ECG بدلونونو سره یوځای وي. سربېره پردې په رادیوگرافي کې د زړه خیال غټ ښکاري چې د فزیکي معاینې له مخې د کارډیو میګالی څخه یې تشخیص گران دی، خو په ایفیوژن کې د زړه غرونه ټیټ او د زړه زړه یا څوکه د جس وړ نه وي. فزیکشن رب ممکن وانه وریدل شي. د کپین سپری قاعده د ایفیوژن له امله تر فشار لاندې راځي چې له کبله یې د Ewarts علامه (د کپین سکپولاد زاویې لاندې Dullness، د Fremetus زیاتوالی او Egophony) مثبت کېږي.

ایکوکارډیوگرافي د پریکارد د انصباب د تشخیص د پاره ډیره حساسه وصفی اوساده معاینه ده. CT او MRI په غوڅه توګه په پریکارد کې د مایع شتون ثابتوي او د پریکارد د پیروالی په باره کې هم معلومات راکولای شي.

د زړه تامپوناد Cardiac tamponade

د پریکارد په جوف کې د هغه اندازه مایع تولیدل چې بطیناتوته د وینې د جریان د شدید بندش سبب شي د زړه تامپوناد منځته راوړي. چې که چیرې په سمه توګه تشخیص او تداوی نه شي د مړینې لامل ګرځیدای شي. د تامپوناد درې غوره لاملونه عبارت دي له:

- سرطانې ناروغۍ.

- ایډیوپاتیک پریکارد ایتس

- یوریمیا

همدارنګه د زړه تامپوناد د پریکارد په جوف کې د وینه بهیدنې (د زړه جراحی عملیات، ترضیض، تویرکلوز او هیمو پریکارد) له امله هم رامنځته کیدای شي.

د تامپوناد درې غوره څرګندونې عبارت دي له: د زړه د داخلي فشارونو لوړوالی. د بطیناتو د ډکیدو محدودیت او د زړه Output کموالی. د مایع هغه کچه چې تامپوناد منځته راوړي نظر د مایع د تولیدو چټکتیا ته توپیر کوي، که چیرې مایع په چټک ډول راټول شي حتی ۲۰۰ ml مایع د تامپوناد لامل ګرځي، خو که مایع ورو ورو ټول شي له ۲۰۰ ml څخه زیات مایع ته اړتیا ده ترڅو د تامپوناد لامل شي. سربېره پردې هغه حجم چې تامپوناد منځته

د زړه او رگونو ناروغي

د پریکارد ناروغي

راوړی د بطنی عضلې د پیروالی سره مستقیم او د جداری پریکارد پیروالی سره معکوسه اړیکه لری.

د تامپوناد دود پزی علامی لکه د شریانی فشار ټیټوالی ، دوریدی فشار لوړوالی ، او د زړه د غړونو ټیټوالی. یواځی په حاد شدید تامپوناد کی شته وی. خو که چیری تامپوناد ډیرو ورو پیدا شی کلینکی بڼه یی د زړه پاتي والي ته ورته وی او ناروغ Hepatic engorgement Orthopnea سالنډی او د جگولر ورید د فشار زیاتوالی لري.

په قرع کی دسینی په قدام کی د اصمیت ساحه زیاته ، Paradoxical Pulse ، هایپوتنشن او په اصغا سره سږی پاک وی. په رادیوگرافی کی د زړه خیال غټ ښکاری (په تحت الحاد او خنډنی تامپوناد کی)، ECG کی د QRS د ولټیج کم او د P Q R S او T څپو Electrical alternance شته وي. قطعی تشخیص د ایکو کارډیو گرافي په وسیله ایښودل کیږی.

درملنه :

د بیړنی پریکارد ایتس ناروغان باید د ایفیوژن د پیدا کیدو لپاره وڅارل شی. که چیری غټ انصباب شتون ولری. ناروغ باید په روغتون کی بستر او د تامپوناد د علایمو د پاره د و اروزل شی. که چیری ناروغ ایفیوژن ولری شریانی او وریدی فشارونه او د زړه چټکتیا باید وخت په وخت معاینه شی او هم څارنیز ایکو کارډیو گرافي ترسره شي.

کله چی د تامپوناد ښی څرگندی شوې باید بی له خنډه د پریکارد د جوف څخه مایع وویستل شي ، ځکه چی پدی حالت کی د پریکارد د داخلی فشار کمول ژوند ژغورونکی دی. د مایع د ویستلو څخه وروسته یو کوچنی کتیر د پریکارد په جوف کی ایښودل کیږی چی که چیری مایع دوهم ځلي راټول شي ددی کتیر د لاري وویستل شي.

د پریکارد د جوف څخه د مایع ایستل (Pericardiocentesis)

د پریکارد کڅوړی څخه مایع د تشخیص او درملنی په خاطر ایستل کیږی. د مایع د ایستلو د پاره یو ستنه چی د ECG د یو لید سره تړلی وی د Subxiphoid د لاری که ممکنه وی د ایکو کارډیو گرافي تر کنترول لاندی د پریکارد جوف ته دننه او مایع ایستل کیږی. د مایع

د زړه او رگونو ناروغي

د پریکارډ ناروغي

د ایستلو څخه مخکې د پریکارډ فشار باید اندازه شي. د پریکارډ مایع نږدې تل د ایکزودات ځانگړنې لري. وینه لرونکي مایع زیاتره په توبرکلوز او نیوپلازم کې وی خو کیدای شي چې په روماتیک فیور، د زړه د ترضیضاتو او MI څخه وروسته او یوریمیا کې ولیدل شي. تر انزوداتیف ایفیوژن د زړه په عدم کفایه کې پیدا کېږي.

حاد ویروسي او ایدیوپاتیک پریکارډ ایتس :

Viral or idiopathic form of acute pericarditis

د حاد پریکارډ ایتس په ځینو پېښو کې ځینی ویروسونه لکه کوکساکی A او B وایروس د انفلوانزا وایروس، ایکو وایروس، Chicken pox, Herpes Simplex، Mumps

Adenovirus او Epstein Barr وایروس د پریکارډ مایع څخه جلا کېږي. او یاد نوموړو وایروسونو په وړاندې دانتی بادی کچه لوړه وي. خو په زیاتره ناروغانو کې وایروس نه موندل کېږي، چې پدې حال کې د حاد ایدیوپاتیک پریکارډ ایتس اصطلاح کارول کېږي.

پریکارډیل ایفیوژن د HIV غوره څرگندونه ده. دا زیاتره په دوهمې ډول د انسان (مایکو باکتریا) او سرطان په تیره بیا لمفوما او kaposi sarcoma له کبله وي. په ۸۰% پېښو کې بی عرضه وي. پاتې ناروغان د سالنډې او سینې درد څخه گټله من وي.

بېړنۍ پریکارډ ایتس په هرمنگ کې پېښېدای شي خو په ځوانانو کې ډیر لیدل کېږي او زیاتره د پلورایي انصباپ او Pneumonitis سره ملگری وي.

ناروغان د تبې او د سینې درد څخه چې د ویروسي ناروغۍ څخه ۱۰-۱۲ ورځې وروسته پیدا کېږي. گټله من وي Pericardial friction rub په ډیری ناروغانو کې اوریدل کېږي. ناروغي د څو ورځو څخه تر څلور او نیو پوري دوام موی او په ۲۵% ناروغانو کې یو یا څو ځلې بابېري (Recurrence) پېښېږي. د پریکارډ په جوف کې د یو څه مایع راټولیدل عام دی خو تامپوناد او التصاقی پریکارډ ایتس غیر معمول دی.

د زړه اورگونو ناروغي

د پریکارد ناروغي

په ECG کې د ST سگمنت بدلونونه یو یا څو اونیو کې له منځه ځي خو غیر نورماله T خپه تر کلونو پورې دوام کوي. د وینې په معاینه کې Granulocytosis چټکې وروسته په Lymphocytosis تعقیبېږي شته وي.

درملنه:

خاصه درملنه نه لري خو د بستر استراحت او د اسپرین په وسیله التهابي ضد درملنه ورکول کېږي. که چیرې اغیزمنه نه وه یو غیر ستروئید ضد التهابی درمل لکه Indomethacin ۲۵-۷۵ ملي گرامه د ورځې څلور ځلې او یا یو گلوکو کورتيکويډ Prednisone ۴۰-۶۰ ملي گرامه په ورځ کې یو ځل د ناروغۍ گیلې غلې کوي کله چې ناروغ د یوې اونۍ د پاره بې عرضه پاتې شو د التهاب ضد درمل مقدار ورو ورو کمېږي. د اتسې کواگلانت کارول مضاد استطباب دی. Colchicine د بابېرې څخه مخنیوی کوي خو که چیرې با بېرې څو څو ځلې ژر ژر تکرار شي او د حادې حملې څخه تر دوه کاله وروسته هم ولیدل شي، د ناروغۍ د پای ته رسولو د پاره Pericardiectomy اغیزمنه درملنه ده.

د زړه له تر ضیضاتو وروسته سندروم Post cardiac injury syndrome:

یو شمیر حالات چې د میوکارډ د تر ضیض او د پریکارد په جوف کې د وینې د را تولیدو سبب کېږي حاد پریکارد ایتس منځته راوړای شي لکه د زړه جراحي عملیاتونه، د زړه تر ضیضات او د کتیتر په وسیله د زړه سوري کیدل او د میوکارډ د بیړني احتشا څخه وروسته. کلینیکي بڼه یې ویروسي او ایدیو پاتیک پریکارد ایتس ته ورته دی. د سینې درد د ناروغانو مهمه گيله ده چې معمولا ۱-۴ اونۍ وروسته د تر ضیض څخه پیدا کېږي. خو کله کله نوموړې گيله حتی میاشتي وروسته هم پیدا کېږي.

تر ۴۰ درجي تبه، پریکارد ایتس، پلور ایتس او Pneumonitis سره یو ځای وي د ناروغۍ اعراض په ۱-۲ او نېو کې له منځه ځي. پریکارد ایتس کیدای Fibrinous او یا د

دزپه اورگونو ناروغی

د پریکارد ناروغی

پریکاردیل افیوژن په ډول وی. خو نادرا تامپوناد منځته راوړی. لوکو سابتوزس. د ESR لوړوالی او د پریکارد ایتس ECG بدلونونه شته وي. ددی سندروم د پیدا کیدو میکانیزم په پوره ډول څرگند نه دی خو گمان کیږی چی د فرط حساسیت غبرگون پکی رول ولری. په زیاتره پیښوکی د میوکارد په وړاندی دورانی اتوانتی بادی د تثبیت وړوی. خو د نوموړی انتی بادی رول څرگند ندی. ویروسی انتان هم کیدای شی رول ولری ځکه چی زیاتره د ویروس ضد انتی بادی کچه هم لوړه وی پرته د اسپرین او نور انلجیزیک درملو څخه نور کومی ځانگړی درملنی ته اړتیا نشته خو که د ناروغی حمله په تکراری ډول رامنځته شی د غیرستیروتیدی ضد التهابی درملو په وسیله تداوی کیږی.

توپیری تشخیص:

څرنگه چی د ایدوپاتیک پریکارد ایتس د پاره کومه ځانگړی تشخیصه تست نشته نو لدی امله د نوموړی ناروغی تشخیص د نورو په ردولو سره ایښودل کیږی. ویروسی او ایدوپاتیک پریکارد ایتس زیاتره د AMI سره مغالطه کیږی که چیري MI په سیر کې پریکارد ایتس رامنځته شی، د حملی په لومړیو څلور ورځو کی د تبی، درد او اصطحاک سره یو ځای وی د MI، ECG بدلونونه لکه د Q څپي پیدا کیدل، د ST دقطي لوړوالي، Reciprocal بدلونونه او د T د څپي مقدم بدلونونه په تشخیص کی مرسته کوی. هغه پریکارد ایتس چی د زړه د ترضیضاتو څخه وروسته پیدا کیږی د ایدوپاتیک پریکارد ایتس څخه د وخت له مخی توپیر کیږی یانی که چیری ناروغی د سینی د ترضیض یا MI څخه څو اونۍ وروسته رامنځته شی، پریکارد ایتس به زیاتره د زړه د ترضیض پوری اړه ولری. ایدوپاتیک پریکارد ایتس باید د هغه پریکارد ایتس څخه چی د کولاجن وعایی ناروغی په ترڅ کی پیدا کیږی توپیر شی. یدی کی ډیر مهم بی د SLE او درمل له کبله پیداشوي لویوس، Hydralazin او procainamide دي چي د LE cell تثبیت او د Anti nuclear antibody د کچي لوړوالی په تشخیص کی مرسته کوی.

دزپه او رگونو ناروغي

د پريکارډ ناروغي

بيړنۍ پريکارډ ايتس او د پريکارډ بې عرضه انصباب ځنې وخت د روماتويد ارترايټس Scleroderma او پولې ارترايټس نودوزا په سیر کی د اختلاط په ډول پيدا کيږي. چي د يادو شويو ناروغيو د څرگندو نښو له مخي تشخيص ايښودل کيږي.

مهمه ده چي د حاد پريکارډ ايتس هر ناروغ د پروکامين امايد، هايډرلاژين Isoniazid Cromolyn او Minoxidil د کارولو په هکله وپوښتل شي.

په بېړنۍ روماتيک فيور کی د روماتيک فيور د نورو څرگندونو ترڅنگ د شديد Pancarditis نښي او د زړه مرمرونه شته وي Pyogenic پريکارډ ايتس، زياتره د گوگل د جراحي عملياتو، معافيت ځپونکي درملني، د پريکارډ په جوف کی د مری څيري کيدل او په اتساني اندوکارد ايتس کی د ring abscess رېچر له کبله پيدا کيږي. او په ناروغ کی تبه، لږزه، Septecemia او د بدن په نورو برخو کی د اتان نښي شته وي.

يوريميک پريکارډ ايتس د ځنډنې يوريميا په دريمه برخه ناروغانو کی پيدا کيږي او زياتره په هغو کی ليدل کيږي چي د ځنډنې هيمودياليز درملني لاندی وي. پريکارډ ايتس کيدای شي فبرينوز يا انصبابي يا وينه لرونکی وي Friction rub عام دی خو درد شتون نه لري. د التهاب ضد درمل او هيمودياليز چټک کول په زياتره ناروغانو کی بسنه کوي. که چيري پريکارډ ايتس په تکراري ډول پيدا شي او يا دوامداره شي Pericardectomy ته اړتيا پيښيږي. نيوپلاستيک پريکارډ ايتس زياتره پريکارډ ته د ميتاستاتيک تومور د پرمختگ او د پريکارډ اشغال، نيوپلاستيک پريکارډ ته د ميتاستا تيک تومور (د سـپـرو او تيونوکانسر، خبيثه ميلانوما، Lymphoma او لوکيميا) د پرمختگ او د تومور پواسطه د پريکارډ اشغال له امله منځته راځي. په ناروغانو کی درد، اذيني اريتميا او کله کله تامپوناد پيدا کيږي. د نيوپلازم د درملني په موخه ميدياستين ته شعاع ورکول هم بيړنۍ او ځنډنۍ التصافي پريکارډ ايتس منځته راوړای شي. د بيړنۍ پريکارډ ايتس غير معمول

لاملونه عبارت دي له سفليس، فنگسي اتانات، Aspergillosis, Blastomycosis

histoplasmosis, او کاندیديازس، او پرازتيک اتانات (اميبيازس، Toxoplasmosis

Trichinosis, Echinococcosis) (۱۹)

دزږه اورگونو ناروغي

د پريکارد ناروغي

د پريکارد ځنډنې انصبابونه Chronic pericardial effusions

توبرکلوزس:

د ځنډنې پريکاردیل ایفیوژن یو غوره لامل دی. او په پريکاردیل ایفیوژن ناروغ کې د ځنډنې سیستمیک ناروغۍ په ډول څرگندېږي. ناروغ د تبې، وزن بایللو او ژر ستړتیا څخه گيله من وي. که چېرې د پريکارد د انصباب لامل ناڅرگند پاته شو د پريکارد بیوپسی اخیستل کېږي او د caseation necrosis په صورت کې د توبرکلوز ضد درملنه پیل کېږي. که بیوپسی پېرېشوی پريکارد ونیسي Pericardiectomy اجرا کېږي ترڅو التصاق څخه مخنیوی وشي.

نور لاملونه:

په میگزودیمیا کې پريکاردیل ایفیوژن پیدا کېږي چې کله کله شدید او کتلوی وي. د سینې په رادیوگرافي کې د زړه خیال غټ وي. او ایکو کاریوگرافي ته اړتیا ده ترڅو د کارډیو میگالي او پريکاردیل ایفیوژن تر منځ توپیر وشي. تشخیص یې د کلینیکي ښې او د تایرید د ندیز تستونو په وسیله کېږي. او د تایرید هورمون د ورکړې سره تداوي کېږي. د کولسترول پريکارد ناروغۍ کله کله د پريکارد انصباب سره یو ځای وي چې پريکاردیل ایفیوژن او په مایع کې د کولسترول د لوړې کچې په وسیله پیژندل کېږي. نوموړې آفت د التهابي غبرگون د لارې التصاقی پريکارد ایتس منځته راوړای شي. سرطاني ناروغي د SLE او رو ماتوتید ارترایتس، فنگسي اتانانات، شعاعی تداوي، قیحي اتانانات، شديده ځنډنې انیمیا او Chylopericardium ځنډنې پريکاردیل ایفیوژن منځ ته راوړای شي چې په نوموړو ناروغيو کې باید په پام کې وي. په مزمن پريکاردیل ایفیوژن کې د مایع ایستل (aspiration) او د هغې معاینات د تشخیص د پاره ډیره مرسته کوي. په تیره بیا چې لوی انصباب د غیر ستیروید ضد التهابي درمل سره ځواب ونه وایي.

د زړه او رگونو ناروغي

د پریکارد ناروغي

د انصباب مایع د همتوکریت ، د حجراتو شمیر ، پروتین ، کلچر او سایتولوژی معایناتو د پاره استول کیږی . وینه لرونکی پریکارد مایع په لاندی حالاتو کی لیدل کیږی:

- نیوپلازم

- توبرکلوز

- یوریمیا

-د بهر د انیوریزم ورو لیکار.

د لوی انصباب په صورت کی د مایع ایستل او که افیوژن تکراري وي Pericardectomy ترسره کیږي .

ځنډنی التصاقي پریکاردایتس Chronic Constrictive Pericarditis

تعریف: که د پریکاردایتس په لاندی ډولونو کی که د پریکارد په جوف کی د گرانولیشن نسج وده وکړي ځنډنی التصاقي پریکاردایتس منځته راوړي:

- بېړنی فبروزي پریکاردایتس

- فبروزي مصلي پریکاردایتس

- ځنډنی پریکاردیل ایفیوژن

د گرانولیشن نسج ورو ورو راټول او د زړه شاوخوا نیسي ، او د بطناتو د ډکېدو مخه نیسي .

سره لدی چی توبرکلوز یی غوره لامل دی خو ځنډنی التصاقي پریکاردایتس د لاندی لاملونوله امله هم منځ ته راځي:

- تروما

- د زړه هر ډول جراحي عملیات

- د میډیاستین وړانگه ورکونه

- تقیحي اتانانات

- هستوپلازموزس

د زړه او رگونو ناروغي

د پریکارد ناروغي

- نیوپلاستیک ناروغي (د تیونو او سږو سرطان او لمفوما)
- ځنډنۍ یوریمیا چی د هېمو دیالیز په وسیله تداوي شوی وي .
- بېړنۍ ویروسي او ایډیوپاتییک پریکاردایتس
- روماتوئید ارترایتس

SLE-

په ډېری ناروغانو کی د پریکارد د ناروغي لامل نه پېژندل کېږي ،چی پدی حالت کی داسی فکر کېږي چی غلی (asymptomatic) بېړنۍ ویروسي پریکاردایتس یې لامل وي .په ځنډنۍ التصاقی پریکاردایتس کی اساسي فزیولوژیک انارملیتی داده چی بطینات د سخت او پېر پریکارد د شتون له امله په سمه توگه نه ډکېږي.

کلنیکي څرگندونې

ضعيفي، سستي، د وزن زیاتیدل او پرسوب دناروغانو عامي گیلې دي. د ناروغانو عضلات اوږه شوي او ځنډنۍ ناروغ (chronic ill) ښکاري. د مشق او ملاستی په حالتونو کی سالنډي شته وي. د غاړی وریدونه پراخه شوي وي، او وریدي فشار د سا اخیستلو وخت کی هم نه ټیټیږي (Kussmauls' sign). دا وروستی نښه په ځنډنۍ پریکاردایتس سربېره ،د ترایکسپید دسام په تنگوالی، د ښی بطن انفارکشن، او Restrictive کارډیو میوپاتی کی هم مثبت وي. د ځیگر احتقانی لویوالی او اسایتس هم د ناروغی د موندنو څخه دي ، د زړه د زړوی نبضان کم او په سیستمول کی دننه خواته کش کېږي Pericardial Knock هم اورېدل کېږي.

تشخیصیه پلټنې

د زړه په برېښنایي گراف کی د QRS ولتاژ ټیټ وي او په خپور ډول د T منفي یا هواره څپه ښیي. په درېمه برخه پېښو کی اذېني فبرېلېشن شتون لري . د گوگل په راډیوگرافي کی د زړه جسامت نورمال او یا غټ وي ، او کله کله د پریکارد کلسي فیکېشن هم لیدل کېږي .

دزړه او رگونو ناروغي

د پریکارډ ناروغي

ایکوکارډیوگرافي د پریکارډ پېړوالی، د اذېن غټوالی، د سفلي اجوافو د وړید او د ځیگر د وړیدونو پراخوالی او په دیاستول کی د بطن د ډکېدو ستونځه بنیي. CT او MIR د ایکو په پرتله د ناروغۍ په تشخیص کی ډېره مرسته کولای شي.

توپیري تشخیص

۱- کورپلمونل: پدی ناروغي کی د سیستمیک وړیدي فشار د زیاتوالی ترڅنګ د سږو پرمختللی پراښیمي ناروغي شته وي او Kussmaul نښه منفي وي.

۲- د ترایکسپید دسام تنګوالی: پدی حالت کی د ترایکسپید تنګوالی ځانګړی مرمړ او رېدل کېږي Paradoxical نبض شته نه وي.

۳ Restrictive Cardiomyopathy: پدی ناروغي کی د زړی نبضان ډېر څرګند، د زړه جسامت غټ، د کبن بطن دعدم کفایي حملی، د کبن بطن هاپرتروفي او ګلوپ شته وي. په ECG کې BBB او په ځیني پیښو کې د Q غېر نورماله څپه لیدل کېږي. ایکو CT او MRI په توپیري تشخیص کی ډېره مرسته کوي.

درملنه:

د پریکارډ غوڅول او ایستل یواځنی اساسي درملنه ده، خو د عملیات څخه مخکی پړاوو کی د مالګی بندېز او د دیوریتیکونو کارول ګټور دي. د جراحي عملیې مېړنه ۵-۱۵% ده. هغه ناروغان چی شدید او پرمختللی ناروغي لري د ډېر خطر سره مخ دي.

التصاقي پریکارډاېټس زیاتره تویرکلوزي سرچینه لري، په انصبایي مرحله کی د تویرکلوز ضد درمل ورکړه د التصاقي پریکارډاېټس د پیدا کېدو مخه نیسي. (۱۹، ۲۱)

د زړه او رگونو ناروغۍ

شاک

دولسم فصل شاک Shock

یوکلینکې سندروم دي چې د انساجو د ناکافي پرفیوژن په پایله کې منځته راځي. په شاک کې د اکسیجن او نورو موادو د ورکړې او اړتیا ترمنځ د توازن د خرابیدو له امله حجروي دندې خرابېږي. همدارنګه د هایپوپرفیوژن له کبله پیداشوی حجروي صدمات د التهابي میډیاتوروونو افرازهڅوۍ اونورهم د پروفیوژن دخرابیدو لامل ګرځي د یاد شوی معوییه سایکل دوام بالاخره د غړو عدم کفایه رامنځته کوي اوپه پای کې د مړینې لامل کیږي. دکلینیک له نظره شاک معمولاً د هایپوتیشن سره ملګري وي (په پخواني نورمال فشار لرونکې وګړې کې Mean arterial pressure < ۶۰ mmHg).

پتوجینیزیس اود غړو غبرګون:

Microcirculation:

په نورماله توګه کله چې د زړه دهانه کمه شي د محیطي رګونو ټینګار زیاتېږي ترڅوچې د زړه او دماغ د پرفیوژن د پاره وړسیستمیک فشار رامنځته شي ځکه چې د نوموړو غړو میتابولیکه اړتیا زیاته او د انرژتیک موادو زیرمه ئي کمه ده.

کله چې منځني شریاني فشار د ۶۰ mmHg شې نوموړو غړو ته د وینې جریان کم اودندی ئي خرابېږي.

دکوچنیوشراینوارتریولونو) ملساءعضلات دواړه α او β ادرینرجیکي اخځي لری α اخځي د رګونود تنګیدو(Vasoconstriction) او β اخځي د رګونو د پراخه کیدو(Vasodilatation) لامل کیږي.

د زړه اورگونو ناروغۍ

شاک

غوره Vasoconstrictor مواد چې د شاک په بیلایلو ډولونو کې ئې کچه لوړېږي عبارت دي له ایپي نیفرین، Angiotensine-II، وازوپریسین، endothelin او تر مېوگسان څخه. په شاک کې غوره دوراني وازوډایلیتور توکی عبارت دي له: پروسټاگلانډین ۱۲، نایتریک اکساید (NO) او اډینوزین څخه. په مایکروسرکولیشن کې د یادو شویو رگ تنګونکو او پراخونکو موادو موازنه د ځایی پرفیوژن حالت څرګندوي. په شاک کې د مایکروسرکولیشن خرابوالی د حجروي میتابولیزم د خرابیدو او په پای کې د غړو د عدم کفائي لامل ګرځي.

حجروي غبرګون Cellular response

په بین الخلافي فضا کې دغذاي موادو لیږدیدنه خرابیږي، دا کار د حجری دننه لوړ انژري لرونکی فوسفات د زیرمو دکمیدو لامل کیږي. د مایټوکاندريا د دندو او د Oxidative Phosphorelation خرابوالی د ATP د کمیدو غوره لاملونه دي. په پایله کې د هایدروجن ایونونه لکتیټ او انیروییک میتابولیزم له کبله نورتولیدشوي مواد په حجره کې راټولېږي. د شاک په پرمختګ سره نوموړي وازوډایلیتور توکی، Vasomotor تون کموي او هایپوتینشن او هایپوپرفیوژن لا زیاتوي. همدارنګه د حجروي دیوال دندو د خرابیدو له امله Transmembrane potential کمېږي او د حجری دننه سوډیم او اوبو زیاتوالي د حجري د پړسوب لامل ګرځي چې دا مایکروسکولر پرفیوژن نور هم خرابوي.

عصبي اندوکراینې غبرګون Neuroendocrine response

هایپوتینشن د وازو موټور مرکز د هڅولو د لارې د ادرینرجیک فعالیت د زیاتوالي او د واګوس د فعالیت د کموالي لامل کیږي. ناراپینفرین د محیطي او Splenchnic او عیو تنګوالي منځته راوړي چې دا کار مرکزي غړو ته د وینې د جریان په تامین کې ډیر مهم دی او پداسې حال کې چې د واګس عصب فعالیت کموالی له کبله د زړه چټکتیا او د زړه دهانه زیاتېږي.

د زړه او رگونو ناروغۍ

شاک

هغه Epinephrine چې د ادرینال غدې څخه په شاک ناروغانو کې افزایږي زیاتره میتابولیکي اغیزې لري لکه د گلايکوجینولایزس او گلوکونیوجینیزس زیاتوالې او د انسولین د افراز کموالی . شدید درد او نور شدید فشارونه د هایپوتلاموس څخه د ACTH افراز لامل کیږي چې دا هورمون د کورتیزول افرازهڅوې چې دا وروستني بیا د گلوکوز او امینواسیدونو محیطي اختیسنه زیاتوي.

همدا راز د ستریس په وخت کې د پانکراس څخه د گلوکاگون افراز زیاتیږي او د وینې د گلوکوز د لازياتيدو لامل کیږي.

د ادرینرجیک فعالیت زیاتوالې او د پښتورگو د پرفیوژن کموالی د رنین د افراز د زیاتیدو لامل کیږي د رنین زیاتوالی د Angiotensin-I د زیاتوالی لامل کیږي چې دا بیا په Angiotensin-II بدلیږي. دا وروستی بیا یوقوي Vasoconstrictor دی. د ادرینال غدې د پوښ څخه د الدوستیرون او د نخامیه غدې د خلفې برخې څخه د وازوپریسین افرازهڅوي.

د زړه او رگونو غبرگون Cardiovascular response :

د وینې د حجم کموالی د بطني Preload د کمیدو لامل گرځي چې په پایله کې ستروک والیم کمیږي همدارنگه سپس، اسکیما، مایوکاریل انفارکشن د نسجونو شدید ترضیض، هایپوترمیا، عمومی انسټیزې د فشار د دوامداره ټیټوالی او Acidemia دا ټول د زړه د عضلاتو د تقلصی وړتیا او د ستروک والیوم د کمیدو لامل گرځي .

د سیپتیک شاک د لومړیو پړاونو څخه پرته د شاک په زیاتره ډولونو کې د محیطي رگونو ټینګار زیات وي، چې داهم د زړه د دهانې په کمیدو کی مرسته کوي .

د دورانی وینی ۱۱۲ برخه په وریډې سیستم کی او ډیره برخه ئي په کوچنیو وریدونو کې وې. د شاک په ناروغانو کې د α ادرینرجیک سیستم د فعالیت له امله د وریدونو تنگیدل (Vasoconstriction) ، د وریډې وینې د بیرته راگرځیدنی او د بطن د ډکیدو لپاره یو ښه معاوضوي میخانیکیت دی .

شاک

د زړه او رگونو ناروغۍ

له بلي خوا په نیوروجینیک شاک کې د وریدونو پراخه کیدل د بطنیناتو ډکیدل، ستروک والیم او د زړه د هانه کموي.

د سپروغبرگون Pulmonary response

د شاک په وړاندې د سږو د وعائي بسترغبرگون د سیستمیک وعائي بستر د غبرگون په انډول وي. د شاک له کبله پیدا شوی تکی پڼیا د Tidal volume د کمیدو او د مړې فضا (Dead space) د زیاتیدو لامل ګرځي. همدارنګه نسبي هایپوکسیا او تګې پڼیا تنفسي الکلوژیس منځته راوړي. او هم شاک د سږو د حاد ترضیض او Acute respiratory distress syndrome (ARDS) مهم لامل دی.

د پښتورگو غبرګون:

د پښتورګې د حادثې عدم کفائي پېښې چې د شاک او هایپو پرفیوژن له کبله منځته راځي د مایعاتو د مقدمی ورکړې له امله اوس کم لیدل کېږي. خو د Acute tubular necrosis هغه پېښې چې د شاک ، Sepsis، نیفروتوکسیک درملو او Rabdomyolysis له کبله پیدا کېږي ډیر لیدل کېږي. د پرفیوژن د کموالي په وړاندې د پښتورگو بنسټیز غبرګون د بدن د مالګې او اوبو ساتل دي. په شاک کې د تشومیتیاو اندازه د لاندې دلیلونو له مخې کمیږي:

۱: پښتورګوته د وینې د جریان کموالی.

۲: د Afferent ارتریولوونو د مقاومت زیاتوالی.

۳: د ADH او الدوسترون زیاتوالی.

د ذره اورگونو ناروغۍ

شاک

میتابولیکه گډوډي (Metabolic derangements)

په شاک کې دکاربوهایدريتونو، پروتین اوشحمو دودیز میتابولیزم خرابیږي. د گلوکوز جوړیدل په ځیگر کې زیاتیږي، د اکسیجن د کموالي له امله گلوکوز په Pyrovate او په پای کې په Lactate ماتیږي اونستیا لږه انرژي ورڅخه لاسته راځي. د خارج المنشا ترای گلیسرایدو توتیه کیدنې اوتخریب کموالی او په ځیگر کې د شحمو زیاته جوړیدنه د سیروم ترای گلیسراید د زیاتوالي لامل ګرځي. د پروتین کتابلولیزم زیات او د نایتروجن بلانس منفي وي.

التهابي غبرګون:

د Proinflammatory مدياتور سیستم د پراخې شبکې فعاله کیدل د شاک په پرمختګ او د غړو د عدم کفایي په منځ ته راتګ کې بنسټیز رول لري. د بیلګې په توګه AT_2 Thromboxane چې د رګونو قوې تنګونکې (Vasoconstrictor) دی د ریوي فشار د زیاتوالي اود ATN په منځته راتګ کې رول لري. PGI_2 او PGE_2 د رګونو قوې پراخه کوونکې (Vasodilator) دی. د کوچنیو رګونو نفوذیه وړتیا زیاتوی او اذیما منځته راوړي. $TNF\alpha$ چې د فعاله شوې مکروفاژ په وسیله جوړیږي د هایپوتینشن، لکتیک اسیدوزیس او د تنفسې عدم کفایي په منځته راتګ کې رول لري. سربیره پردې یوشمیر التهابي حجرې لکه تروفیل، مکروفاژ او پلاټلیټ د التهابي ترضیضیاتو په منځته راتګ کې مهم رول لوبوي. (۱۹)

د ناروغ سره چلند Approach to the patient

د شاک ناروغان باید په ICU کې بسترو او څارل شې داخل شریانی فشار، نبض اوتنفسی شمیر باید په پرله پسې توګه مونیتور شې. فولې کتیتر د تشومیتیاژو د اندازې د معلومولو د پاره اچول کیږي، همدارنګه د ناروغ دماغې حالت باید وخت په وخت وارزول شي.

شاک

د زړه او رگونو ناروغۍ

د سپرود شریان کتیتر د تحت ترقوي او وداجي ورید د لاري داخل او د بني زړه د لاري ريوې شریان ته رسول کيږي. ددې کتیتر څخه د زړه د دهني د معلومولو او د بني ادين د فشار، ريوې شریان فشار او د PCWP د معلومولو او د انفيوژن د پاره کاراخیستل کيږي.

دشاک ځانگړې ډولونه:

۱- کارډیوجینیک شاک Cardiogenic shock

هغه وخت منځته راځي چې زړه ونشي کړای چې د یواغیزمن پمپ په توگه کار وکړي. زیاتره د بیړني MI د اختلاط په ډول منځته راځي خو کیدای شي د شدیدې برې کاردیا، ټکي اریتمیا، د زړه د سامې ناروغۍ، د زړه د Contusion او یا د زړه د ځنډني پاتې والی په وروستې پړاو کې منځته راشي.

د کارډیوجینیک شاک ځانگړې نښې عبارت دي له: د زړه د دهاني کموالي د محیطي پرفیوژن کمیدل د سپرواحتقان او د محیطي رگونو د مقاومت زیاتوالی او د سپرود رگونو د فشار زیاتوالی. د بني زړه بیړني پاتې والی کیدای شي د بني بطین د انفارکشن له امله او یا د ARDS اوشدید پلمونري هایپر تینشن له امله منځته راشي. د بني بطین د پاتې والي (عدم کفایي) په پایله کې د چپ بطین پری لوړ کم او د محیطي پرفیوژن د کمیدو لامل گرځي د شاک د نورو ډولونو پر خلاف په کارډیوجینیک شاک کې نسبي یا مطلقه هایپوولیمیا شتون نه لري.

د کارډیوجینیک شاک په تشخیص کې د زړه ناروغۍ یا بیړني احتشا شتون ډیر ارزښت لري. ځینی فزیکي کتنې لکه د محیطي رگونو تنگیدل او د سپرو او یا سیستیمیک وریډونو احتقان، همدارنگه د سببي لامل نښې په تشخیص کې مرسته کوي. د زړه برقي گراف کیدای شي د زړه د بیړني احتشا او یا د زړه اړونده ناروغۍ چې د شاک لامل شوي بدلونونه ونښي. د زړه په راډیوگرافي کې کیدای شي د زړه د سايز غټوالی او د سپرو اذیما ولیدل شي.

د زړه اورگونو ناروغۍ

شاک

همدارنگه ايكوكارډيوگرافي د زړه د جوړښتيزو ناروغيو په تشخيص كې مرسته كوي. په سيروم كې د زړه د انزايمونو كچه د زړه د بېرېنې افاتو په تشخيص او تايد كې مرسته كوي. د سږو شرياني كتيتر ايزيشن هم مرستندويه ده او د زړه د دهانې كموالې او د PCWP لوړوالې ښي.

درملنه:

د كارډيوجينيك شاك په ټولو ډولونو كې بايد پري لوډ، افټرلوډ او د زړه تقلصيت، د سږو شرياني كتيتر د لارښوونې له مخې اصلاح شي.

لومړنې موخه mmHg ۲۰-۱۵ ته د PCWP راوستل دي. كه چېرې PCWP ډير لوړ وي د انوتروپيك درمل په وسيله كمېږي. همدارنگه د زړه تقلصيت بايد پرته د زړه د چټكتيا د زياتيدو څخه زيات كړاې شي، ډوپامين، Norepinephrin او يا وازوپريسسين هم انوتروپيك او هم وازوكانسټركټور اغېزې لري، او د دوام داره هايپوتينشن په حالت كې ډيراغيزمن دي. د سږو احتقان د داخل وريدي Furosemide سره ښه ځواب وائي.

په هغه ناروغانو كې چې د پورته درملو سره د شاك حالت اصلاح نه شي Intra aortic balloon counter pulsation توصيه كيږي. همدارنگه د بېرېنې MI په ناروغانو كې چې په مقاوم شاك اخته وي، په بېرېنې ډول Revascularization ترسره كيږي. او د اناتوميك نقصان لكه د سپټم د رېچر په حالت كې د هغې اصلاح اوحتې د زړه بېرېنې پيوند توصيه كيږي.

Compressive Cardiogenic shock

ټولې هغه ناروغۍ چې د سينې يا پريكارد داخلي فشار د زياتيدو لامل گرځي لكه د زړه تامپوناډ، فشاري Pneumothorax، د حجاب حاجز د فتق د لارې د بطني احشاوو فتق كيدل او نور د دغه ډول شاك لامل كيږي. د ښې زړه حاد پاتي والي او د زړه دهانې كموالې كيداې شي د سږو د امبولۍ له امله رامنځته شي.

د زړه اورگونو ناروغۍ

شاک

ددې ډول شاک تشخیص د کلینیکي څرگندونو، د سینې راډیوگرافي او ایکوکارډیوگرافي له مخې کیږي.

د پریکارد د تامپوناد کلاسیک نښې، هایپوټینشن، د غاړې د وریدونو پړسوب او د زړه د غږونو ټیټوالې دي. تشخیص یې د ایکوکارډیوگرافي په وسیله تائید کیږي او درملنه یې د پریکارد د جوف عاجله تشونه ده.

په فشاري نموتوراکس کې د ګوګل په اخته خوا کې تنفسي غږونه ټیټ، اوشنن مقابل لوري ته بې ځایه شوي او د غاړې وریدونه پرسیدلې وي. د سینې په راډیوگرافي کې د صدر داخلي حجم زیات، د اخته خوا حجاب حاجز ټیټ او میدیاستین مقابل لوري ته بې ځایه شوې وي. د تشخیص څخه سمدلاسه وروسته د داخل صدري فشار د ټیټوالی عملیه اجرا کیږي.

۴ - سپټیک شاک Septic shock

دا ډول شاک د شدید اتان په وړاندې د سیستمیک غبرګون له امله منځته راځي. زیاتره په زړواو معافیت خپلواو هغه وګړو کې چې منتن مجموعي (Invasive) عملي تیروي لیدل کیږي. د سږو، د ګیډې او بولي سیستم انتانات عام دي او نږدې نیمایي ناروغان باکتریمیا لري. ګرام مثبت او ګرام منفي باکتریاوې، ویروس، Fungus، ریکتسیا او پروتوزوا کولای شي چې د سپټیک شاک کلینیکي څرګندونې د هغه میتابولیک او دوراني ګډوډیو له امله چې د سیستمیک اتان او د هغو د توکسینونو (اندوتوکسین، Enterotoxin) له کبله پیداکیږي منځته راوړي. میکروبی توکسینونه د نسجې مکروفاژ څخه د ساینوکینونو لکه Interlukin I او TNF- α د افراز لامل کیږي. د نسجې فکتورونو شتون او د فبرین ځای پر ځای کیدل زیاتیري او کیدای شي DIC رامنځته شي. نایتريک اکساید (NO)، چې د رګونو یوقوې پراخه کونکې (Vasodilator) دي جوړیدل او افراز یې زیاتیري. په سپټیک شاک کې هیموډینامیک بدلونونه په دوو ځانګړو بڼو رامنځته کیږي: مقدم یا هایپرډینامیک او موخړیا هایپوډینامیکه بڼه.

د زړه اورگونو ناروغۍ

شاک

هایپردینامیک غبرگون:

پدې ډول سپتیک شاک کې ناروغ تکی کار ډیا لري، د زړه دهانه نورماله وي د سیستمیک رگونو مقاومت کم او د سږو درگونو مقاومت زیات وي. نهایت تاوده، د Splenchnic رگونو د تقبض له کبله احشوا ته د وېني جریان کمیږي. د وریدونو ظرفیت زیاتېږي چې دا کار د وریدې وینې بیرته راگرځیدنه کوي. په سپتیک شاک کې د زړه د عضلې تقلصیت د نایتریک اکساید، انترلیوکین یو او $TNF\alpha$ د اغیزو له امله کمیږي.

د شاک د نورو ډولونو په خلاف په سپتیک شاک کې د اکسیجن ټولیزه Delivery زیاتېږي خو د مایکروسرکولیشن د خرابوالي له امله د اکسیجن اخیستنه کمیږي. پدې حالت کې د وریدې مخلوطې وېني نورماله اشباع د پرفیوژن په پوره والي دلالت نه کوي اوحټې قلبي دهانه کیدای شي لوړه وي، خو داهم د انساجو میتابولیکه اړتیا نه پوره کوي. ARDS، ترمبوسایټوپینیا او نیوتروپینیا ئي عام اختلالات دي.

هایپودینامیک غبرگون:

Sepsis په پرمختګ رگونه تنګ اود زړه دهانه کمیږي. ناروغ کې تکی کار ډیا، تبه اوخوله پیداکېږي نهایت ساړه، خاپ لرونکی او زیاتره پیښوکې سیانوتیک وې. په ناروغ کې اولیګویوریا، د پښتورګوعدم کفایه اوهایپوترمیا پیدا او د سیروم لکتات ډیرلوړوي.

درملنه:

د کرسټالوئیدمحلول په وسیله د دوراني حجم زیاتول ترڅو PCWP د 15 mmHg حد کې وساتل شي او د اکسیجن ورکړه د درملنې د لومړیتوبونو څخه دی. په هایپودینامیک سپس کې د زړه د دهانې د زیاتوالي د پاره انوتروپیک درمل ورکول کیږي. پدې ترتیب که چیرې فشار ټیټ وي Dopamine یا ناراپی نیفرین اوکه فشارنورمال وي Dobutamine ورکول کېږي. اتې بیوتیک په امپریک ډول اود کلچر د پایلې له مخې ورکول کیږي. د اتان د قابو کولو د پاره د اړتیا په صورت کې جراحي تخلیه او پانسما هم اړین دي (۱۹، ۲۱).

د زړه اورگونو ناروغۍ

شاک

۴: هغه شاک چې د وینې د حجم د کموالي له امله منځته راځي (Hypovolemic):

د شاک د پیرعام ډول دی چې یا د وینې بهیدنې له کبله او یا د پلازما د حجم د کموالي له امله چې د هضمې او بولي لارو څخه د مایعاتو د ضایع کیدو یا درگونو څخه د باندې د مایعاتو د ځای په ځای کیدو له امله منځته راځي. خفیفه هایپوولیمیا (د وینې حجم د ۲۰٪ څخه لږه) یواځې خفیفه تکی کار دیا منځته راوړی. متوسطه هایپوولیمیا (د وینې حجم د ۲۰-۴۰٪ ضایع کېدنه) کې ناروغ نارامه وي او تکی کار دیا لری د وینې فشار د ملاستې حالت کی کیدای شی نورمال وي خو د ولاړې په حال کې فشار ټیټیږي. که هایپوولیمیا شدید وي (ضایعات د وینې د حجم د ۴۰٪ څخه زیات وي) د شاک کلاسیکی نښې څرگندیږي. د وینې فشار حتی د ملاستې په حالت کې ټیټ وي. ناروغ شديده تکی کار دیا، او Oligurea او گنگسیت لري.

که چیرې شدید شاک په چټکه توګه کنترول نه شي په تیره بیا په زړو او هغه وګړو کې چې نورې ناروغې هم ولري ډیر ژر د مړینې لامل کیږي.

تشخیص:

که چیرې د هایپوولیمیا نښې په ناروغ کې شتون ولري او د دوراني حجم د کمیدو سرچینه ښکاره وي د هایپوولیمیک شاک په تشخیص کې ستونزه نه وي، خو که چیرې د وینه بهیدنې سرچینه اوځای معلوم نه وي، تشخیص به یې تر یوه بریده ګران وي.

د هایپوولیمیک او کارډیوجنیک شاک ترمنځ توپیر هم ډیر اړین دی، ځکه چې د دواړو شاکونو درملنه بشپړ توپیر لري. په دواړو شاکونو کې د زړه دهانه کمه وي او د سمپاتيک اعصابو د فعالیت د زیاتوالي له امله د محیطي رګونو ټینګار زیات او تکی کار دیا هم شتون لري خو په کارډیوجنیک شاک کې د غاړې وریدونو پراخه کیدل، رالونه او S۳ ګلوپ هم شتون لري چې د هایپوولیمیک شاک څخه ئې په توپیر کې مرسته کوي.

درملنه:

د زړه اورگونو ناروغۍ

شاک

د درملنې لومړنۍ او بنسټیزه برخه د مایعاتو د ورکړې په وسیله د دورانۍ حجم اعاده کول او د ضایعاتو مخنیوي دي. نارمل سالین یا د Ringer lactate محلول د ورید د لارې چې په چټک ډول (۲-۳ لیتره په ۲۰-۳۰ دقیقو کې) ورکول کیږي، نارمل هیموډینامیک معیارات پوره کوي. د هیموډینامیک بې ثباتې دوام پدې دلالت کوي چې یا شاک رفع شوې ندی او یا د وینې یا مایعاتو ضایعات دوام لري. که چیرې وینه بهیدنه دوام ومومي او د هیموگلوبین کچه ۱۰ ګرامه په یو ډیسي لیتر ته راښکته شي ناروغ ته وینه ورکول کیږي. (Blood transfusion). د دوامداره او یا شدید هایپوولمیا په صورت کې د وینې د حجم د پوره کولو څخه وروسته د کافي بطني پرفیوژن د ساتلو د پاره کیدای شي چې Dopamine، Vasopressin یا Dobutamine ته اړتیا پېښ شي. په بیا ر غونه کې باید د تنفسی دندو تقوی ته هم پاملرنه وشي. اکسیجن ناروغ ته ورکول کیږي او که اړتیاوې داخل شرنی انټیوبیشن د شریانی اکسیجن د نورمال ساتلو د پاره اجرا کیږي.

د زړه او رگونو ناروغۍ

سینکوپ، کولپس، د زړه درېدنه او ناڅاپي قلبي مړینه

دیارلسم فصل

سینکوپ، د زړه او رگونو کولپس، د زړه درېدنه او ناڅاپي قلبي مړینه

Syncope, Cardiovascular collapse, Cardiac arrest and Cardiac sudden Death

سینکوپ Syncope :

تعریف: په تیریدونکي ډول د شعور له منځه تللو څخه عبارت دی چی دماغ ته د ویني د ناکافي جریان له امله منځته راځي او له اهتماماتو پرته پخپله رغیږي .

لاملونه :

۱- وعائي (Vascular)

Vascular attack د سینکوپ ډیر مهم او دودیز لامل دی چی د ساده ضعفیت په بڼه څرگندیږي . حمله د محیطي رگونو د پراخه کیدو (Vasodilatation) سره پیل کیږي، چی د وړیدی ویني د ښکته‌یدو په نتیجه کی د ویني راتگ زړه ته کمیږي. ددی عمل په وړاندی نږدی تش زړه د ډیرقوی تقلص په مټ ځواب وائی . دا پخپل وار سره میخانیکي آخدی چی د کین بطن په سفلی خلفی دیوال کی ځای لری هڅوی. دغه تنبه بیا د مرکزی عصبی سیستم څخه د عکساتو د لېږدېدو د رگونو لپراخوالی او کله کله ژوره بردیکار دیا) لامل کیږي په پایله کی فشار ټیټ او سینکوپ رامنځته کیږي .

د حملی غوره خبرونکی گیلی عبارت دي له گنسیټ ، زړه بدوالی ، خوله کیدل ، د غوږونو برنگس ، د فاژي ویستل او د ولیدلو احساس .

۲- وضعیتي (Orthostatic) هایپوتنشن :

د ویني سیستولیک فشار چی د ملاستی یا ناستی څخه د ولاړی وضعیت ته ۲۰ ملی مترستون سیماب او یا لدی څخه زیات ټیټ شی وضعیتي هایپوتنشن بلل کیږي. اکثر Reflex

د زړه اورگونو ناروغۍ. سینکوپ، کولپس، د زړه دریدنه او ناڅاپي قلبي مړینه

Vasoconstriction د وینې د فشار د ټیټېدو څخه مخنیوی کوي. که چیرې دا شتون ونلري، د ناروغ دورانې حجم کم وي Vasodilator یا دیورتیک درملنې لاندې وي هاپو تنشن پیدا کېږي. ۳- له غذا خوړلو څخه وروسته د فشار ټیټېدل (Post prandial Hypotension) د غذا د خوړلو څخه تر دوه ساعتو پورې که د وینې سیستولیک فشار mmHg ۲۰ یا ډیر ټیټ شي او یا د ۱۰۰ mmHg څخه د لوړې کچې نه ۹۰ mmHg څخه ټیټې کچې ته راشي، پدې ډول هاپو تنشن دلالت کوي. میخانیک ټي څرگند نه دی خو کیدای شي په Splanchnic رگونو کې د وینې د راټولیدنې له کبله وي. په نورمالو وگړو کې د فشار آخذي تنبه او د زړه دهانه زیاتېږي لدې امله فشار نه ټیټېږي.

۴- Micturation Syncope: پدې حالت کې ناروغ د ادرار کولو په وخت کې شعور له لاسه ورکوي

۵- کاروتید سینوس سینکوپ:

پدې حالت کې د کاروتید سینوس د تنبه په وړاندې د واگس عصب شدید غبرگون رامنځته کېږي لکه د یخن کلک تړل پورته کتلو او د سر تاوولو په وخت کې.

II- انسدادی Obstructive:

پدې سینکوپ کې د زړه څخه دورانې سیستم ته او یا د زړه د مختلفو جوفونو ترمینځ د وینې د جریان په وړاندې مانعه شته وي. لاملونه ئې په لاندې ډول دي.

۱- د ابهر د سام تنگوالی

۲- هایپر تروفیک کارډیومیوپاتی

۳- د پلمونري د سام تنگوالی

۴- Fallot tetralogy

۵- پلمونري هایپر تنشن او ترومبو امبولیزم

۶- اذیني میکروما او ترمبوز

د زړه اورگونو ناروغۍ. سینکوپ، کولپس، د زړه دریدنه او ناڅاپي قلبي مړینه

۷- د مصنوعي دسام خرابوالی

III- د ریتم گډوډی:

په Stokes Adams سندروم کې په ناڅاپي ډول سره شعور له منځه ځي .
لاملونه ئي: په متناوب ډول پرمختللی AV بلاک ، ژوره برډی کارډیا او یا بطیني Stand still دي .
ناروغ پرته له خبردارۍ پرځمکه پریوځي خاسف وی او په ژوره توگه خپل شعور له لاسه ورکوي ،
نبض ډیر وړو یا هیڅ نه وي . یوڅو ثانیه وروسته ناروغ روښانه سور کیږي او شعور ئي بیرته ښه
کیږي ، نبض هم تیزېږي .
زیاتره کومه ستونزه نه پاته کیږي بی لدی چی ناروغ د غورځیدو په وخت کی ټپي شي . که چیري د
دماغي هایپوکسیمیا موده اوږده شی عمومی اختلاجات منځته راتلای شي چی په غلطه د مرگی
تشخیص پری ایښودل کیږي. هغه غوره اریتمیاوی چی د سینکوپ لامل کیږي په لاندی ډول دي :

۱- چټکه تکی کارډیا

۲- ژوره برډی کارډیا (Stokes Adams)

۳- Significant Pauses (په ریتم کی)

۴- د مصنوعي پسیمیکر عدم کفایه

درملنه :

ناروغان د هغه حالاتواو وضعیتونو څخه ځان وساتی چی د سینکوپ د پاره لازه هواروي.
بیټابلاکر هغه ناروغانو ته چی د اتونومیک دند و خرابوالی ولری ورکول کیږي خو ډیر اغېزمن
ندی. که چیری عرضی برډی اریتمیا اوفوق بطیني تکی اریتمیا تثبیت شي بی لدی چی نور
پرمختللی معاینات توصیه شی درملنه پیل کیږي.

Volume expander درمل لکه Fludrocortisone یا وازوکانسټرکتور درمل لکه midodrine

هم کارول کیږي خو ډیر اغیزمن ندی (۱۴، ۱۲، ۱۹)

د زړه او رگونو ناروغۍ سینکوپ، کولپس، د زړه دریدنه او ناڅاپي قلبي مړینه

د زړه او رگونو کولپس، د زړه دریدنه او ناڅاپي قلبي مړینه

تعریف:

۱- د زړه او د رگونو کولپس: د وینې د موثر جریان ناڅاپي له مینځه تللو ته وایي چې د زړه او یا محیطي رگونو اړونده ناروغیو له کبله منځته راځي او کیدای شي پخپله (نیوروکارډیوجنیک سینکوپ، Vasovagal syncope) او یا د مداخلې سره بیرته ښه شي. غوره لاملونه یې عبارت دي له: Vasodepressor سینکوپ، شدید تېریدونکی برېکاردیا او د زړه دریدنه.

۲- د زړه دریدنه: د زړه د پمپ ناڅاپي ودریدنې ته وایي، چې کیدای شي د چټکې مداخلې (Intervention) سره بیرته وگرځي خو د اهتماماتوپه نه شتون کې یې پایله مړینه ده.

د زړه د درېدني ۲۵-۸۰% پېښې د بطني فبريليشن له امله وي او پاتي ۲۰-۳۰% يې د شديدې ټينگاريزې بردي اريتميا، اسيسټول او Electromechanical dissociation له کبله منځ ته راځي.

۳- قلبي مړینه: د بدن د ټولو بيالوجيک فعاليتونو نه ګرځېدونکې له منځه تللو ته وایي. په بله وينا ناڅاپي طبعي، غیر ترضيضي مړینه ده چې د ګيلو د پيدا کېدو څخه تر يو ساعته پوري رامنځته کېږي.

اېپيډيمولوژي او لاملونه:

د طبعي ناڅاپي مړينو ډيرې پېښې د زړه د ناروغيو له امله وي. د امريکې په متحده ايالاتو کې د ناڅاپي قلبي مړينې کلنۍ پېښې ۴۰۰۰۰۰ تنو ته رسېږي چې د قلبي مړينې ۵۰% پېښې جوړوي.

د کلينیک له نظره په يو ښه ثابت کس کې د زړه اړونده ناڅاپي مړينې لامل په ډيرې پېښو کې بطني فبريليشن دی چې د بطني ټکي کارډيا پسي رامنځته کېږي. خو د زړه د احتشا او اسکيميا په حالت کې نېغ په نېغه بطني فبريليشن منځ ته راځي.

د زړه اورگونو ناروغۍ سپینکوب، کولپس، دزړه دریدنه او ناڅاپي قلبي مړینه

د زړه دریمه درجه بلاک او د سینوس غوټې دریدنه هم د ناڅاپي مړینې لامل کیږي. د ناڅاپي قلبي مړینې ۷۵% اخته کسان د اکلیلې شریانونو شدید ناروغۍ لري همدارنګه په زیاتره پېښو کې د زړه د احتشا پخواني تاریخچه شته وي. سربېره پر دې په ۲۰% پېښو کې ناڅاپي مړینه د اکلیلې شریانونو د ناروغي د لومړني څرګندونې په ډول رامنځته کیږي او د یادي ناروغۍ څخه د مړینې ۵۰% پېښې ناڅاپي دي. یو شمیر نوري ناروغۍ چې د ناڅاپي مړینې د پاره زمینه برابروي په لاندې ډول دي:

- د کین بطن شديده هایپرتروفي، هایپرتروفیک کارډیومیوپاتي او Congestive کارډیومیوپاتي

- د ابهر او پلمونري دسامونو تنګوالی.

- Primary pulmonary Hypertension

- ازېني myxoma

- د زړه سیانوتيکي ولادي ناروغۍ.

- د مایټرل دسام پرولپس

- هایپوکسیا

- د الکترولایتونو اېنارملټي

- Long QT Syndrome

- Brugada Syndrome: (یوه اریتموجنیکه ناروغي ده چې د ECG په ۷۳-۷۱ لیږدونو کې د ST

سګمنټ لوړوالی او بشپړ یا نا بشپړه RBBB له مخې پېژندل کېږي.)

- د لیږدونکي سیستم ناروغۍ

پتالوژي:

د ناڅاپي قلبي مړینې د اخته کسانو د مړینې څخه وروسته پلټنو او کلینیکي کتنو دواړو د اکلیلې شریانونو ناروغي د نوموړي پېښې غوره لامل ګڼي.

د زړه اورگونو ناروغۍ سپینکوپ، کولپس، د زړه دریدنه او ناڅاپي قلبي مړینه

د CSD په ۸۰٪ پیښو کې د اکلیلې شریانونو د ناروغۍ پتالوژیکي نښې لکه په اپي کارډیل اکلیلې شریانونو کې پراخه اتيروسکلروزس او بي ثباته اکلیلې لیژن (خیري شوي پلک ، پلاټلیټ Aggregation ، وینه بهیدنه او ترومبوزس) شته وي .
۷۰-۷۵٪ نارینه چې ناڅاپه مړه شوي وي د زړه پخواني روغه شوي احتشا نښې او په ۲۰-۳۰٪ پیښو کې تازه احتشا د لیدلو وړ وي.

کلینیکي څرگندونې :

خبرونکې گیلې: د ناڅاپي قلبي مړینې څخه ورځي ، اونی آن میاشتي مخکې ناروغان د انجینا ، سالنډي ، زړه ټکان ، ژرسترې کیدو او یو شمیر نورو ناڅرگندو گیلو د زیاتوالي څخه گیله من وي . سره له دې چې نوموړي خبرونکي گیلې د زړه د یوې لوي حملې وړاند وینه کوي خو د ناڅاپي قلبي مړینې د وړاند وینې لپاره وصفي ندي .

د زړه د درېدنې پیل: د زړه اورگونو د دودیز حالت بدلون دی چې زړه د دریدنې څخه تر یو ساعت دمخه رامنځته کیږي . که چېرې د زړه درېدنه سمد لاسه پیل شي نو ۹۵٪ شک کېږي چې سرچینه یې د زړه ناروغي وي .

که چېرې ناروغ د دوامداره ECG مونیتورنگ لاندې وي، د زړه دریدنې څخه دقیقې یا ساعتونه مخکې د زړه په برقي فعالیتونو کې بدلون، د زړه د چټکتیا زیاتوالی او PVCs لیدل کیږي. د زړه هغه دریدنه چې د بطني فبریلیشن له کبله پیدا کېږي زیاتره د بطني تکی کارډیا د ثابت یا تېرېدونکي یرغل سره پیل او ورسته په بطني فبریلیشن اوږي. د زړه په دریدنه کې د بیارغونې .

اغیزمنتوب د لاندې حالاتو پورې اړه لري:

- ۱- د پېښې د پیداکیدو او د بیارغونې د پیل ترمنځ وخت
- ۲- میخانیکیت (بطني تکی کارډیا ، بطني فبریلیشن ، بي نبضه برقي فعالیت ، اسیستول)

د زړه اورگونو ناروغۍ سپینکوپ، کولپس، دزړه دریدنه او ناڅاپي قلبي مړینه

۳- د زړه دریدنې څخه مخکې کلینیکي حالت

۴- عمر

که د زړه دریدنې د پیدا کیدو میخانیکیت بطني ټکې کارږي او د درملنې په وړاندې ځواب او انزار یې ډیر ښه وي. خو که د زړه دریدنه د اسیستول او بې نبضه برقي فعالیت له امله وي ښه پایله نه لري.

بیالوژیکي مړینه: که چیرې د زړه دریدنې (VF، اسیستول) په پېښه کې تر ۴-۶ دقیقو پورې د زړه او د سږو بیارغونې عملیه (CPR) «Cardiopulmonary Resuscitation» پیل نه شي بېرته نه را گرځېدونکې دماغي ویجاړتیا رامنځته کیږي. له ۴-۶ دقیقې وروسته، حتی که چیرې کامیابه دیفیبریليشن هم ترسره شي د انزارو په ښه کیدو کې مرسته نه شي کولای.

د زړه د احتشا په سیرکي دوه ډوله د زړه دریدنه (Arrest) پیدا کیږي:

۱- لومړنۍ زړه دریدنه (Primary Cardiac Arrest): په دې حالت کې د زړه دریدنه د هیموډینامیک ګډوډیو په نه شتون کې رامنځته کیږي.

۲- دوهمې (ثانوي زړه دریدنه) (Secondary Cardiac Arrest): په دې حالت کې د زړه دریدنې څخه مخکې غیر نورمال هیموډینامیک کلینیکي څرګندونې په ناروغ کې شته وي.

که چیرې د لومړنۍ زړه دریدنې ناروغ ته سمډلاسه بیارغونه وشي د ژوندي پاتې کیدو هیله یې ۱۰۰٪ ده. ددې په خلاف د دوهمې زړه دریدنې ۷۰٪ اخته کسان سمډلاسه یا د بستر پاتې کیدو په اوږدو کې مري.

د زړه دریدنې او ناڅاپي قلبي مړینې تر خطر لاندې ناروغانو پیژندنه او وقایه:

د زړه اورگونو د ناروغیو د مړینې نږدې نیمایي پېښې د SCD له امله وي نو لدې امله تر ډیر خطر لاندې ناروغانو پیژندنه او تداوي د ناڅاپي مړینې د پېښو په کمولو کې ډیره مرسته کوي. د SCD د وړاندوینې او وقایې ستراتیژي په لومړني یا پرایمري او دوهمې یا ثانوي ډولو ویشل شويده:

د زړه اورگونو ناروغۍ. سپینکوب، کولپس، د زړه دریدنه او ناڅاپي قلبي مړینه

د لومړنۍ وقایې څخه موخه د SCD تر ډیر خطر لاندې ناروغانو تشخیص او وقایه ده. څرنگه چې د SCD غوره او مهم لامل د اکلیلې شراينو ناروغي ده نو د یادي شوي ناروغي خطري فکتورونه، د SCD اوږد مهاله قوي خطري فکتورونو په توګه پیژندل شويدي چې په لاندې ډول دي:

- عمر

- سګرت څکونه

- دیابت

- د کین بطنین هایپر تروفي

- د ECG غیر وصفی بدلونونه

- د C. reactive پروتین د کچې لوړوالی

- د ناڅاپي قلبي مړینې کورنۍ تاریخچه

د زړه د احتشا د حاد، رغیدو (Convulscent) اوځنډنۍ پړاونو کې داسې ناروغان شته چې د SCD مطلق خطر سره مخامخ دي.

- په حاده مرحله کې د احتشا د پیل څخه تر ۴۸ ساعتو پورې د زړه دریدني خطر ۱۵-۲۰% دی.
- له احتشا وروسته د رغیدو مرحله کې (له دریمې ورځې څخه تر ۲ اونیو پورې) د ثابت بطنیني تګي کار دیا یا بطنیني فبریلیشن منځته راتګ په راتلونکي ۱۲ میاشتو کې د ۵۰% مړینې وړاند وینه کوي. د احتشا په ځنډنې درملنه کې د SCD او ټولیزې مړینې خطر د یو شمیر لاملونو پورې اړه لري چې تر ټولو غوره یې د میوکارډ د تخریباتو پراخولې دی چې د انفارکشن له امله منځته راځي چې د تخریباتو پراخوالي د EF د کموالي او د زړه د عدم کفایې منځته راتللو پورې اړه لري.

څیړنو ښودلې ده چې د $EF < 40\%$ په څرګند ډول د مړینې خطر زیاتوي. سربیره پردې په VPC لرونکو ناروغانو کې د الکتروفزیولوجیک تستونو په وخت کې د VT او VF پیدا کیدل او د $EF < 35\%$ - SCD لپاره د خطريو قوي فکتور دی.

د زړه اورگونو ناروغۍ

سېنکوپ، کولپس، د زړه دریدنه او ناڅاپي قلبي مړینه

د IHD څخه وروسته کارډیو مایوپاتي (ډایلیتید او هایپرتروفیک) د SCD دوهم مهم لامل دی. یو شمیر نادري ناروغۍ لکه: Long QT Syndrome، د بني بطین د سپلازیا، هایپرتروفیک کارډیو مایوپاتي، او پروګادا سندروم په ځوانانو په تیره بیا په رقابتي لوبه کوونکو کې د ناڅاپي زړه دریدني سبب کېږي. سره لدې چې پېښې یې په عام نفوس کې ډیر لږ یانې په کال کې یو پر ۱۰۰۰۰۰ دی خو د تشخیص لپاره یې روتین ECG توصیه کېږي. دوهمې یا ثانوي وقایوې کپنلاره د زړه دریدني په هغه ژغورل شویو ناروغانو کې پلي کېږي چې د زړه د حادې احتشا او د SCD د موقتي خطرونو لکه درمل او د الکترولايتونو د اصلاح وړ لاملونو له امله منځته نه وي راغلي. (۱۹، ۱۶)

درملنه:

د ناڅاپي کولپس ناروغان په څلورو پړاونو کې تداوي کېږي.

۱- بنسټیزه بیارغونه Basic Life Support

۲- پرمختللي ژغورنه Advance Life Support

۳- له ژغورني وروسته پاملرنه

۴- اوږد مهاله درملنه

۱- لومړنۍ غبرګون او بنسټیزه بیارغونه:

په لومړنۍ ارزونه کې به معلومه شي چې ایا ناڅاپي کولپس د زړه دریدني له امله دی او که نه. د ناروغ شعوري حالت، تنفسي حرکات، د پوستکي رنګ او د کاروتید او فیمورل شریان نبض په فوري توګه د زړه د دریدني د شتون په اړوند معلومات راکوي. په هر شکمن یا یقیني زړه دریدنه او یا هغه حالت کې چې ګومان کېږي زړه دریدنه د پیل کیدو په حال کې ده باید سمدلاسه بېرني ژغورنکي ډلې ته تیلیفون وشي.

د زړه اورگونو ناروغۍ

سېنکوپ، کولېس، د زړه دریدنه او ناڅاپي قلبي مړینه

د زړه دریدني د پیل څخه تر څو شېبو پورې بې نظمه تنفسي خوځښت دوام کوي خو که ناروغ شدید Stridor ولري او نبض هم د جس وړي د اجنبي جسم یا خوړو انشاق ته باید فکر وشي. په یاد شوي حالت کې د Heimlich مانوري تر سره کول د انسدادې حالت په له منځه وړلو کې مرسته کوي. د سترنوم د منځني او ښکتنې برخې د یوځای کیدو برخه کې د موتي شوي لاس پواسطه د یوې ضربې وهل (Precordial Thump) کله کله بطني ټکي کارېدا یا بطني فبریلیشن بېرته سموي. خو په ځینو پېښو کې بطني ټکي کارېدا په بطني فبریلیشن بدلوي. لدې امله نوموړي عملیه باید د پرمختللي بیاروغونې په وخت کې چې Defibrillation او مونیتورنگ اسانتیاوې شته وي ترسره شي.

د لومړنۍ غبرگون دریم پړاو د تنفسي لارو پاکونه ده. پدې موخه د ناروغ سر لږ شاته کړای شي او خوله خلاصه، مصنوعي غاښونه او اجنبي اجسام وایستل شي.

بنسټیزې بیاروغونې یا CPR ته د غړو د پرفیوژن د ساتلو لپاره تر هغې دوام ورکول کېږي چې د پر مختللي بیاروغونې اسانتیاوې ته لاسرسی وشي. د CPR اساسي کړنه د سپړو د Ventilation ساتل او په منظم ډول ګوګل ته فشار ورکول دي.

۱- که چیرې د ژغورنې توکي (د خولي او فرنکس airway، ماسک لرونکي بګ) په سملاسي توګه شتون ونه لري، خوله په خوله تنفس ورکول کېږي. سینې ته د هرو ۱۵ فشارونو، یا ضربو په ورکولو سره دوه ځلي تنفس ورکول کېږي.

۲- سینې ته د فشار په ورکولو سره د پمپ په ډول د زړه اذینات او بطنیات تش او ډکېږي او تر یوه حده وینه په رګونو کې چلیږي. د یو لاس ورغوی د ناروغ د سترنوم ښکتنې برخه باندي او بل لاس د لاندیني لاس د پاسه ایښودل کېږي. سترنوم ته په داسې حال کې چې مټان نیغ وي په هره دقیقه کې نږدې سل ځلي دومره فشار ورکول کېږي چې ۴-۵ سانتي متره دننه شي.

د زړه اورگونو ناروغۍ

سپینکوپ، کولپس، د زړه دریدنه او ناڅاپي قلبي مړینه

۲- پرمختللي ژغورنه (Advance Life Support):

پرمختللي ژغورنه د لاندې موخو لپاره ترسره کېږي.

- بسندویه وینتیلیشن رامنځته کول

- د زړه د اریتمیاوو کنترول

- د ویني فشار او د زړه out put ته ثبات ورکول

- د غړو د پرفیوژن بېرته سمېدنه

د یاد شویو موخو د لاسته راوړلو د پاره لاندې کړنې ترسره کېږي:

۱- کارډیوورژن، Defibrillation او یا Pacing

۲- Tracheal Intubation's

۳- د داخل وړیدي لاین تطبیق

د انتیوییشن او وړیدي لاین د خلاصولو څخه مخکې سملاسي ډیفیبریلیشن ترسره کېږي. د ډیفبریلیتر د چارچ کیدو په وخت کې باید CPR ته دوام ورکړل شي. کله چې د بطني تکی کارډیا او یا بطني فبریلېشن (VF، VT) تشخیص کینودل شو هر څومره ژر چې شونې وي، لېترلېره J ۲۰۰ شوک ناروغ ته ورکول کېږي. که د نوموړي مقدار انرژي په مټ VF یا VT اصلاح نه شو، د انرژي د لوړو دوزونو څخه تر ۳۶۰ ژول پوري کار اخستل کېږي. کله چې ډیفبریلیشن ناکامه شوه Epinephrine یو ملي گرام د رگ د لاري ورکول کېږي او بیا واري ډیفبریلیشن ته هڅه کېږي. اېپي نفرین هر ۳-۵ دقیقې وروسته تکرار ورکول کېږي.

که چیرې د ناروغ شعوري حالت د ریتم د اصلاح څخه وروسته پوره ښه نه شوه او یا دوه درې ځلي هڅې ناکامي شوی، په فوري توگه Intubation ترسره او د شرياني ویني گاز معاینه کېږي. د اکسیجن د ورکړې سره هاپوکسیمیا او اسیدوزس ډېر ژر له منځه ځي.

هغه ناروغانو ته چې ټینګاریزه اسیدوزس ولري NaHCO_3 لومړي یو ملي اکیولنټ په کیلو گرام وزن د بدن او وروسته د دوز ۵۰% هر ۱۰-۱۵ دقیقې وروسته ورکول کېږي.

د زړه اورگونو ناروغۍ سپینکوپ، کولپس، د زړه دریدنه او ناڅاپي قلبي مړینه

رامنځته کیدو چانس زیات دی. برېږي اریتمیا، اسیستول او بې نبضه برقي فعالیت زیاتره په دوهمې ډول د هیموډینامیک له پلوه بې ثباته ناروغانو کې پیدا کیږي.

که چیرې په یو غیر قلبي ناروغ کې په روغتون کې دننه د زړه دریدنه رامنځته شي انزاري خراب دی او په هغه لږ شمیر کسانو کې چې ژغورل شوي له ژغورنې وروسته څارنه د اصلي ناروغي د کیفیت پورې اړه لري. که ناروغ سرطان، د پښتورگو عدم کفایه، د مرکزي عصبي سیستم حاد اتانات او ناکنترول له اتانات ولري او په روغتون کې دننه د زړه په دریدنه اخته شي د ژوند دوام هیله یې ۱۰% ده.

خو که د زړه دریدني لامل د هوايي لارو تېرېدونکې بندېدنه، د الکترولایتونو ګډوډي، د دواګانو پروارېتمیک اغېزي او پرمختللي میتابولیک نادودې وي، که چیرې ناروغ ژغورل شي او یادې شوي ګډوډۍ له منځه یوړل شي انزاري ډیر ښه دی.

له زړه دریدني وروسته اوږد مهاله درملنه :

هغه ناروغان چې د زړه دریدني څخه د مرکزي عصبي سیستم د نه راګرځیدونکو صدماتو له پیداکیدو پرته وژغورل شي، او ثابت هیموډینامیک حالت ولري د اوږد مهاله درملني او د ژوند د هیلې د زیاتوالي لپاره پراخه تشخیصیه تستونو او مناسبې درملني ته اړتیا لري.

په هغه ناروغانو کې چې د زړه د دریدني لامل یې MI وي، درملنه یې په حاده مرحله کې د تېرېدونکې، وژونکې اریتمیا د پیداکیدو او د میوکارد د تخریباتو د پراخوالي له مخې ترسره کیږي. په هغه ناروغانو کې چې د زړه دریدني حمله یې تیره کړې وي او $EF < 40\%$ وي $EF = 40-35\%$ یا $EF > 40\%$ وي د Amiodarone په پرتله د ICDs د ګټې زیاتوالی پوره څرګنده نه ده. که د زړه دریدنه د تېرېدونکې اریتمیا له امله وي په تیره بیا چې EF هم لوړ وي په فارمکولوژیک او مداخلوي (Interventional) میتودونو د اسکیمیا ضد درملنه ترسره کیږي.

د زړه اورگونو ناروغۍ. سېنکوپ، کولېس، د زړه دریدنه او ناڅاپي قلبي مړینه

د زړه دریدنې د نورو لاملونو لکه هایپرتروفیک او دایلیتید کارډیومیو پاتي، او په یو شمیر نادر وراثي ناروغیو (د بني بطين dysplasia، Long QT syndrom، Brugada سندروم) اخته ناروغان ICD ته کاندیدان دي.

د زړه اورگونو ناروغۍ.

په جراحي او اميدواري کي د زړه ناروغۍ.

خوارلسم فصل

په جراحي او اميدواري کي د زړه ناروغۍ.

Cardiac Disease in surgery and Pregnancy

د زړه ناروغۍ او جراحي عمليات Cardiac Disease and surgery

د هغه مليونونو انسانانو څخه چي هر کال تر جراحي عمل لاندې راځي ۶-۱٪ يې د زړه د لوي او شديدې حملي سره مخامخ کېږي . دهغه کسانو څخه چې د عمليات په وخت کې د زړه په احتشا اخته کېږي ۲۵-۱۵٪ يې د روغتون څخه له خارجېدو مخکې مري.

د امريکا د زړه ټولني (AHA American Heart Association) د وېش له مخي د زړه په ناروغانو کې د غېر قلبي جراحي عمليات خطري فکتورونه په درې درجو وېشل شويدي:

۱- لوي خطري فکتورونه (Major Risk Factors):

- بي ثباته اکليلي سندروم
- غېر معاوضوي CHF
- نا کنترول له اريتميا
- د دسامونو شديدې ناروغۍ.

۲- منځنۍ کچه خطري فکتورونه (Intermediate Risk Factors):

- خفيف ثابتې انجنېنا
- د زړه پخواني احتشا
- معاوضوي CHF
- ديابت
- د پښتورگو پاتې والی

۳- کوچني خطري فکتورونه (Minor Risk Factors):

- د عمر زياتوالی.

دزږه او رگونو ناروغۍ په جراحي او اميدواري کي دزږه ناروغۍ

- غير نورماله ECG
- غير سينوسي ثابت ريت
- د زړه د دنديز ظرفيت خرابوالی
- پخواني CVA
- ناکنټروله لوړ فشار

د اکيليلي شريانونو ناروغۍ او غير قلبي جراحي عمل:

خرنگه چې د جراحي عمليي سترس د زړه چټکتيا زياتوي او د عرضی او بي گيلو اسکېميا سره يو ځاي وي نو لږي امله د ناروغانو کلينيکې ارزونه د اکيليلي شريانونو د ثابت او بي ثباته ناروغيو په تشخيص کې مرسته کوي .

د بهرني اکيليلي سندروم او د اسکېميا له کبله د زړه په پاتې والی اخته ناروغان د جراحي عمليي په اوږدو کې د حالت د لا خرابيدو، نکروز او مړيني تر ډير خطر لاندې دي . نو لږي امله ياد ناروغان نوري ارزوني او ثبات ته اړتيا لري . خو که غير قلبي جراحي عمل بهرنی وي ، Intra Aortic Balloon Pump Counter Pulsation توصیه کيږي .

د سټېبل انجنېنا ناروغان کېداسي د شديد فزيکې تمرين سره لږه انجنېنا او يا د څو پوړيو په جیگيدو سره شديده انجنېنا او سالنډي ولري . په هغه ناروغانو کې چې يواځې د شديد فزيکې تمرين سره د انجنېنا حمله لري زياتره د کېن بطين د دندو د خرابوالي نښې شتون نه لري ، او په ټوليزه توگه د پوره طبي درملنې په تيره بيا د بيتا بلاکرسه ځواب وايي . برخلاف هغه ناروغان چې د لږ تمرين سره سالنډي لري ، د جراحي په وخت کې د بطين د دندو خرابوالي ، دميوکارډ اسکېميا او انفارکشن تر ډير خطر لاندې دي . دا وروستي ډله ناروغان کېدای شي د اکيليلي شريانونو شديده ناروغۍ ولري لږي امله د عمليات څخه مخکې نوري ارزوني او ټسټونو ته اړ دي .

هغه ناروغان چې د احتشا پخواني تاريخچه لري:

په پخواني MI ناروغانو کې د غير قلبي جراحي عمليي اکيليلي خطر ، د MI د حملي او د جراحي عمليي زماني واټن پوري اړه لري . يو شمير څيړنو ښودلې ده چې د MI د حملي څخه تر

دزړه او رگونو ناروغۍ په جراحي او اميدواري کي دزړه ناروغۍ.

شپږو مياشتو پوري که غير قلبي جراحي عمل تر سره شي د بيا ځلي انفارکشن خطر په کي زيات دی. خود MI د درملنې په برخه کي پرمختگ اود جراحي په وخت کي د څارني د زياتوالي سره دغه واټن شپږ او نيو ته لنډه شويده.

هايپرشن او جراحي عمليات:

څيړنو ښودلي ده چې خفيف او مينځني کچه هايپرشن د عمليات څخه ورسته د زړه او رگونو د اختلاطاتو (د عمليات څخه ورسته احتشا، د زړه عدم کفايه او اريتميا) خطر نه زياتوي، خوشديد ځنډني هايپرشن (دياستوليک فشار 110 mmHg) بايد د جراحي عمليي څخه مخکي کنترول شي. په پلان شويو عملياتونو کي د ناروغانو فشار بايد د عمليات په ټولو پړاونو کي د کنترول لاندې وي.

که د جراحي عمل په وخت کي ناروغ د خولي له لاري درمل ونه شي اخيستلاي د زرقي ډول څخه يي کار اخستل کېږي. که چېرې جراحي عمل بيړني وي بيتابلاکر، کلسيم کانال بلاکر، Nitroprosid او نايټروگلسرين د رگ له لاري ورکول کېږي. د يادوني وړ ده چې د بيتابلاکر او Clonidine ناڅاپي بندول د ټکي کار ديا او Rebound Hypertension لامل گرځي چې پدې ناروغانو کي بايد په پام کي وي (۲۱، ۲۷).

د زړه پاتې والي او غير قلبي جراحي Heart Failure and Non Cardiac Surgery

د HF ناروغان د جراحي عمليي د ډير خطر سره مخامخ دي. ددې ناروغانو د عمليات څخه مخکي ارزوني اساسي موخې د HF د لامل پيژندنه او د زړه د سيستوليک او دياستوليک دندې د خرابوالي د شدت معلومول دي. د اسکېميک کارډيوميوپټي ناروغان د عمليات په وخت کي د اسکېميا د زياتوالي د خطر سره مخ دي.

ارېتميا (Arrhythmia):

د عمليات په وخت کي په تيره بيا په زړو خلکو او د گوگل جراحي لاندې ناروغانو کي ډير عموميت لري. درد، شديد نارامي او نور هغه حالات چې ادرېنرژيک ټون زياتوي د اريتميا دپاره زمينه برابروي. وروستي څيړني چې د دوامداره ECG مونيتورنگ سره تر سره شوي ښودلي دي چې د يو شمير بي گيلي بطني اريتمياو لکه Couplets او بي ثباته بطني ټکي

د زړه او رگونو ناروغۍ

په جراحي او اميدواري کي د زړه ناروغۍ

کارد يا شتون په غير قلبي جراحي عملياتونو کي د قلبي اختلالاتو پيښي نه زياتوي. خو سره ددې که يو ناروغ د عمليات څخه مخکي اريتميا ولري، په نوموړي ناروغ کي بايد د زړه او تنفسي ناروغيو، د ميوکارد اسکيميا يا انفارکشن، دوايي تسمم او ميتابوليک گډوډيو لپاره پلټني ترسره شي. د زړه ځيني اريتمياوي سره لدې چي سليم وي خو د زړه د يو شمير ناروغيو د رابرسيره کيدو لامل کيږي د بيلگي په توگه فوق البطني اريتميا وي د ميوکارد د اکسيجين اړتيا زياته او په IDH ناروغ کي د اسکيميا د منځته راتگ لامل کيږي.

هغه بطني اريتميا چي د يو يا څو VPC او يا بي ثباته بطني تکي کار ديا په ډول وي او ناروغ د ميوکارد اسکيميا ونه لري کومي درملني ته اړتيا نه لري. د بيتابلکر درمل ورکړه د عمليات په وخت کي او وروسته د عمليات څخه د ناروغانو مړينه او د زړه او رگونو اړونده اختلالات (د اريتميا د منځته راتگ په گډون) کومي. د انتقاليه سيستم پرمختللي ناروغي لکه دريمه درجه اذيني بطني بلاک که تداوي نه شي د جراحي خطر زياتوي نو لدې امله د غير قلبي جراحي عمليات څخه مخکي بايد موقتي يا دايمي پيسميکر تطبيق شي. که ناروغ د بطين دننه د ليردونې وروالي ولري حتي که RBBB يا LBBB هم شته وي، په نادره توگه د عمليات په وخت کي د زړه دريمه درجه بلاک رامنځته کيدای شي. (۲۱)

د زړه دسامي ناروغۍ:

۱- د ابهر دسام ناروغۍ:

په هغه ناروغانو کي چي غير قلبي جراحي عمليات ته نوماندان دي، د ابهر د دسام شديد تنگوالي د زړه دپاتې والي خطر ډير زياتوي. په زياتره پيښو کي د دسام بدلول انتخابي درملنه ده که چيري د دسام بدلول (Replacement) امکان ونه لري د پوستکي دلاري د ابهر Balloon Valvotomy تر سره کيږي.

۲- د مايترل د دسام ناروغۍ:

د ابهر د دسام د تنگوالي په پرتله د مايترل د دسام په ناروغۍ کي د غير قلبي جراحي عمليي د اختلالاتو خطر لږ دی. څرنگه چي د مايترل د تنگوالي ناروغان تکي کار ديا بنه نشي زغملي نو د عمليات په وخت کي د زړه چټکتيا بايد بنه کنترول شي. همدارنگه د غير قلبي

د زړه او رگونو ناروغۍ په جراحي او اميدواري کي د زړه ناروغۍ.

عملياتونو خطر د مایترل په شدید تنگوالي کې ډیر دی لدې امله ښه به دا وي چې د عمليات څخه مخکې د مایترل د دسام بدلول ، Percutaneous Mitral Valvotomy او يا Surgical Commisurotomy د استطباب له مخي تر سره شي. د مایترل شديده عدم کفایه د دوراني حجم او بار زیاتوالی او د سږو احتقان مینځ ته راوړي چې د اصلاح لپاره يې د دیوریتیکو څخه ښه پورته کېږي.

۳- د زړه مصنوعي دسام :

په فعاله مصنوعي دسام لرونکو ناروغانو کي چې غیر قلبي جراحي عمليات ته نوماندان دي وقایوي انتي بیوتیک او Anticoagulation مهم دی . په هغه عملیاتونو کي چې تیریدونکي باکتریمیا منځته راوړي وقایوي انتي بیوتیک ورکول کېږي . په مصنوعي دسام لرونکو رنځورانو کي چې عمليات ته کاندیدان وي د انتي ترومبوتیک درملو د استعمال له امله . د ویني بهیدني خطر او د بندیدو په صورت کي د ترومبوآمبولیزم د خطر زیاتوالی . سره پرتله شي . په ټولیزه توګه په هغه ناروغ کي چې مصنوعي دسام لري او غیر قلبي عمليات ته کاندید وي دري ورځي مخکي د عمليات څخه انتي کواګولانت بند او یو ورځ وروسته د عمليات څخه بیرته پیلېږي.

د زړه ناروغۍ او اميدواري

د اميدواري اوزیږون په وخت کي د زړه فزیولوژي:

اميدواري د زړه او دوراني سیسټم د یو شمیر بدلونو سره یو ځای وي چې د زړه په ناروغي اخته مور کي کیداشي د یو شمیر څرګندو کلینیکي ښو سره یو ځای وي . د اميدواري هیموډینامیک بدلونونو لنډیز په لاندې جدول کي ښودل شويدي.

د زړه دسامي روماتیزمل ناروغۍ:

په اميدواري کې د مېترال او ابهر دسامونو د تنګوالي (Stenosis) مرمرونه شديده اود نوموړو دسامونو د پاتي والی مرمرونه شدت کمېږی . د اميدواري په دوران کي خفیف مېترال او اورتيک پاتي والی په اسانۍ سره زغمل کېږی خو د تنګوالي زغم ډیر ګران دی او د مور او ماشوم د اختلاطاتو د پاره زمینه برابروي . په اميدواري کې تکی کارډیا ، د ویني د حجم او د

دزپه اورگونو ناروغۍ په جراحي او اميدواري کي دزپه ناروغۍ

زړه د دهانۍ زياتوالی د دسامی ناروغۍ سره په گډه د سږو د Capillary فشار د چټک زياتوالی او د سږو د اذيمالامل کيږي. اذینۍ فبريليشن هم عموميت لری.

لومړي جدول: د اميدواري په وخت کي د زړه او دورانې سيستم بدلونونه:

پارامتر	۵ اونۍ	۱۲ اونۍ	۲۰ اونۍ	۲۴ اونۍ	۳۲ اونۍ	۳۸ اونۍ
د زړه چټکتيا	$\uparrow \leq 5\%$	$\uparrow 15-11\%$	$\uparrow 15-11\%$	$\uparrow 15-11\%$	-12% $\uparrow 20\%$	$\uparrow 20-12\%$
د وينې سيستولیک فشار	$\leftrightarrow$	$\downarrow \leq 5\%$	$\downarrow \leq 5\%$	$\leftrightarrow$	$\uparrow \leq 5\%$	$\uparrow 10-2\%$
د وينې دياستولیک فشار	$\leftrightarrow$	$\downarrow \leq 5\%$	$\downarrow 10-2\%$	$\downarrow 5\%$	$\leftrightarrow$	$\uparrow 10-2\%$
ستروک واليم	$\uparrow \leq 5\%$	$\uparrow 30-21\%$	$\uparrow > 30\%$	$< \uparrow 30\%$	-21% $\uparrow 30\%$	$\uparrow 30-21\%$
دزړه دهانه	$\uparrow 10-2\%$	$< \uparrow 30\%$	$< \uparrow 40\%$	$< \uparrow 40\%$	$< \uparrow 40\%$	$< \uparrow 40\%$
د محيطي رگونو مقاومت	$\downarrow 10-2\%$	$\downarrow 30-21\%$	$< \uparrow 30\%$	$< \uparrow 30\%$	$< \uparrow 30\%$	$\downarrow 30-21\%$
EF د کين بطين	$\uparrow \leq 5\%$	$\uparrow 10-2\%$	$\uparrow 10-2\%$	$\uparrow 10-2\%$	$\uparrow \leq 5\%$	$\uparrow \leq 5\%$

درملنه:

په عام ډول دسامی ناروغۍ د زيږون څخه مخکې تشخيص او طبي تدابي کيږی خو په شديدو حالاتو کي زياتره جراحي درملنه توصيه کيږي.

دزپه او رگونو ناروغی. په جراحي او اميدواري کي دزپه ناروغی.

د مایترل دسام تنگوالی :

روماتیک مایترل ستینوزس په اميدواري کې د نورو دسامی روماتیزمل ناروغیو په پرتله ډیر عمومیت لري دا ناروغان باید د اميدواري په دوران کې د نږدی څخه وڅارل شي ځکه چې د مایترل تنگوالی کیدای شي په چټک ډول شدید شي. د اعراضو د کنترول لپاره بیتابلاکر، ډایجوکسین، دیورتیک او د فزیکي تمرین کموالی توصیه کیږي. که چیرې اړتیا وي Volvotomy نسبتاً بي خطره عملیه ده خو د زپه خلاص جراحي عملیات (Open Hearth Surgery) د ماشوم اړوند خطر ونه زیاتوي. د زیږون په وخت کې زیاتره Spinal یا نخاعي انسټیزی ته لومړیتوب ورکول کیږي.

د ابهر دسام تنگوالی (Aortic Stenosis):

د زیږون په وخت کې ځایي انسټیزی ته ترجیح ورکول کیږي خو که اړتیا وي د عمومی انسټیزی څخه کار اخستل کیږي. Straining (زور وهل)، Filling Pressure، ناڅاپه ټیټوي او د زپه د دهانی د کمیدو لامل کیږي نو لدی امله د زیږون په دویمه مرحله کې ورڅخه ډډه وشي.

که چیرې ممکنه وي وجینل زیږون ته لومړیتوب ورکول کیږي او هم که اړین وي د سیزارین (Cesarean) زیږون وړاندیز هم کېدای شي.

د مایترل دسام Regurgitation:

څرنگه چې د اميدواري په وخت کې د محیطی رگونو ټینګار په فزیولوژیک ډول کم وي لدی امله نومړي ناروغی په اميدواري کې ښه زغمل کیږي. عرضی ناروغانو ته دیورتیک، ډایجوکسین او Hydralazin ورکول کیږي. که ممکنه وي د اميدواري په وخت کې د مایترل جراحي عملیات دي وځنډول شي ځکه چې د ماشوم د زیان چانس ډیر دی.

د ابهر پاتی والی (Aortic insufficiency):

د ابهر پاتی والی هم د مایترل د پاتی والی په شان د اميدواري په وخت کې ښه زغمل کیږي په گیله لرونکو ناروغانو کې دیورتیک، ډایجوکسین او هایډرالازین څخه کار اخيستل کیږي.

دزړه او رگونو ناروغۍ.

په جراحي او اميدواري کي دزړه ناروغۍ.

هايپرټنشن او اميدواری:

په اميدواري کي څلور ډوله هايپرټنشن پيدا کيږي:

۱: پريکلسميا (Preclampsia): چي په اذیما، پروټين يوريا او هايپرټنشن ځانگړي کيږي. که چيري عصبي گډوډي ورسره يوځاي شي د ايکلسميا (Eclampsia) په نامه يادېږي.

۲: مزمن هايپرټنشن: پدي حالت کي دويني فشار د اميدواري د ۲۰ هفتي څخه مخکي لوړ وي اذیما او پروټين يوريا هم شتون نلري. هغه حامله ښځي چي مزمن هايپرټنشن لري پدوي کي د زېږون په وخت کي د مور د مړينې کچه لوړه ده. اوهم د پريکلسميا او Abruptio placenta د پيدا کيدو خطريات وي.

۳: Gestational hypertension: پدي حالت کي داميدواري په دوران اويا د زېږون څخه وروسته په لمړي ۲۴ ساعتو کي فشار لوړېږي. او په ناروغ کي د پريکلسميا او د مزمن هايپرټنشن پخواني تاريخچه شتون نلري.

۴: د پښتورگونو ناروغي

په اميدواري کي د لوړ فشار درملنه نسبتاً گران کار دی ځکه چي د شرياني فشار کميدل په دي ناروغانو کي د جنين د پرفيوژن د کميدو لامل کيږي. په دويم او دريم ترايميسټر کي ترڅو چي دياستولیک فشار د ۹۵ mmHg څخه لوړ شي د فشار ضد درملنه نه توصيه کيږي. همدارنگه د مالگي شديد بنديز، تمرين او د وزن بايلل هم په اميداوره ښځو کي نه توصيه کيږي. د دي ناروغانو د درملني د پاره اغېزمن درمل Methyldopa او هايډرالائيزين دي. ACE-i او Nitroprosid مضاد استطباب دي. د يوريتيک درمل رحم ته د ويني جريان کموي او د نوي زيږيدلي ماشوم د Thrombocytopenia، هايپوټريميا، زيږي او ږدي کارډيا لامل کيږي. بيتا بلاکر نادراً د Hypoalbumeneamia، هايپوگلايسيميا او د ودي وروسته والي منځته راوړي.

د زړه او رگونو ناروغۍ

په جراحي او اميدواري کي د زړه ناروغۍ

د زړه اسکیمیک ناروغۍ او اميدواري (IHD and Pregnancy)

د زړه بېړنۍ احتشا (AMI) د اميدواري په دوران کې نادر دی او د ۳۵۰۰۰ اميدواري څخه په يوه کې پېښېږي. په يوه اميدواره مور کې د ځنډني هايپر تنشن، عمر زیاتوالی، دیابت او د Preeclampsia شتون د بېړنۍ احتشا د مینځ ته راتگ لپاره لاره هواروي.

انفارکشن په درېم ترايمستر کې، هغو ښځو کې چې د ۳۳ کالو څخه زیات عمر ولري او ډیره اميدواره شوی وی (Multiple Pregnancy) زیات لیدل کېږي.

د کلاسیک انسدادی اتیروسکلروز په پرتله د کروڼري شریان سپزم، ترومبوز او Dissection ډیر پېښېږي. په دغه حالاتو کې د زیږون څخه دمخه او د زیږون په وخت کې د مور مړینه ډیره زیاته ده. د ورستی مطالعاتو له مخې ددی ناروغانو مړینه د ۵-۷٪ ده. د AMI درملنه په اميدواري کې د نورو په پرتله ډیر توپیر نلري. سره له دی چې ترومبولیتیک درمل په حامله مور کې د وینې بهیدنی خطر زیاتوی خو که د زړه دکتیترایزیشن اسانتیا شته نه وی د نوموړي درمل کارول جواز لري. کم دوز اسپرین او نایتريت درمل بی ضرره (Safe) دي. بیتابلاکر درمل په عمومي ډول بی ضرره ده، همدارنگه په لنډ مهاله توگه د Heparin ورکړه په مور او ماشوم کې کومې اړخیزې اغیزې منځته نه راوړي. ACE نهی کوونکی او Statin درمل مضاد استطباب دی، او پر ځای یې د Hydralazine او Nitrate څخه گټه اخیستل کېږي. Clopidogrel او Glycoprotein ۲b/۳a رسپتور منع کوونکی درمل هم په محفوظه توگه استعمالیدلی شي. په اميدواره AMI ناروغانو کې PCI هم په بریالۍ توگه د سربې زغر (Lead Shielding) په کارولو سره ترسره کیدای شي.

(PPCM) Peripartum Cardiomyopathy

د کین بطن د دندې خرابوالی دی چې په اډیوپاتیک ډول د اميدواري په آخری میاشت او د زیږون څخه ورسته پنځه میاشتو موده کې په هغه ښځو کې چې د زړه پخوانی ناروغی نه لري منځته راځي.

دزړه او رگونو ناروغۍ

په جراحي او اميدواري کي دزړه ناروغۍ

په امريکا کې د PPCM پيښې په هرو ۳۰۰۰-۴۰۰۰ ژوندي زېږونونو کې يوه پيښه ده. د PPCM لامل پوره څرگند نه دی خو وېروسي مېوکارډايټس، اوتواميونيټي او جنېټيک نيمگړتياوې کيدای شي رول ولري.

غوره کلينيکي څرگندونې يې عبارت دي له: سټريا، د فزيکي فعاليت په وخت کې سالنډې، Orthopnea، د سينې غير وصفی دردونه، محيطی اذيما، د گيډې پرېسوب او نارامۍ.

د PPCM درملنه د اميدواري موده کې پيل او د زېږون څخه وروسته هم دوام مومي. د اميدواري، د زېږون څخه وروسته او د شيدو ورکولو په وختونو کې بايد د درملو Safety ته پاملرنه وشي. Diuretics، Digoxin او Hydralazine په ډاډه زړه ورکول کيدای شي. بيتا بلا کرونه په کارډيومايوېټي ناروغانو کې د کين بطين دندې ښه کوي او په اميدواري کې استعماليدای شي خو د کارولو له کبله يې د جنين د برديکارډيا او د ودې د خرابوالي ځينې راپورونه ورکړل شوي دي. ACE منع کونکي، Angiotensine Receptor Blocker او الدوسترون انتاگونسټ درمل د حمل په دوران کې مضاد استطباب دي. د زېږون څخه وروسته ACE نهې کونکي درمل پيل کيدای شي حتی په تي ورکونکو ښځو کې. انتي کواگولانت يو شمير ځانگړو ناروغانو ته چې د کين بطين د دندو شديد خرابوالي او پراخوالي ولري ورکول کېږي. د ډايليتيډ کارډيومايوېټي د نورو ډولو په شان که چيرې رواجی طبي تداوی ځواب ورنکړي، پدې ناروغانو کې هم داخل وريدی درملنه، Mechanical Assist Device حتی د زړه پيوند توصيه کېږي. د PPCM نږدې ۴٪ ناروغان د زړه پيوند ته اړتيا پيدا کوي.

د PPCM نيمايي څخه زياتو ناروغانو کې د زړه سايز او دندې د زېږون څخه تر شپږو مياشتو پورې پوره نورماله کېږي. په PPCM کې د مور مړينه ۹٪ ده. هغه ناروغان چې د کين بطين د دندو دوامداره خرابوالي لري راتلونکې اميدواري کې د مړينې د زيات خطر سره مخامخ کېږي. نولدی امله په راتلونکې کې د اميدواري کيدو څخه بايد ډډه وکړي. (۲۷)

ماخذونه (References)

- ۱: اپریدی حفیظ الله فزیکل ډیاگنوزیس، د ساپی پښتو څپر نو د پراختیا مرکز ۱۳۸۸ ل ل، م م: ۱۰۵، ۱۰۶
- ۲: اکسیر نادر احمد، بیماری های قلبی وعائی، مطبعه عازم، بهار ۱۳۸۸ خورشیدی م م: ۲۷۲، ۴۰۴-۴۰۵، ۴۱۲-۴۱۴
- ۳: الکوزی عبدالواحد، د سږو په ځنډنۍ غېر وصفی ناروغیو کی د ECG بدلون او د سږو د دندیز تستونو د بدلونو مقایسه، د PhD تېزس، سوفیا، ۱۹۷۹
- ۴: جبار خیل عبدالناصر، د موقعیت له نظره د زړه د احتشا پېښی، د تنګرهار پوهنتون، جوزا ۱۳۸۴ ل ل، م م: ۱۰۰-۱۰۱
- ۵: دل دل آقا، په ختیځ زون کی د ناکنترول لوړ فشار پېښی، د PSVT په درملنه کی د ولسلوا مانوری، پروپرانولول او دایجوکسین اغېزه. تنګرهار پوهنتون، ۱۳۸۴ ل ل، م م: ۱۹، ۲۶-
- ۶: شېری اېمل، د زړه په بېړنی احتشا کی د زړه د عدم کفای پېښی، تنګرهار پوهنتون، ۱۳۸۴ ل ل، م م: ۲۷
- ۷: شریف الله، طبي فزیالوژي، افغان کمپوزنگ سنتر، ۱۳۸۰ ل ل، م م: ۸۱، ۲۲۵-۲۲۸
- ۸: نشاط محمد طیب اندوکراینولوژي او روماتولوژي، د افغان کلتوري ټولنۍ جرګه ۱۳۸۷ ل ل، م م: ۱۳۶-۱۳۷
- ۹: نصر محمد کریم، امراض قلبی وعائی، انتشارات طب کابل ۱۳۷۰ خورشیدی م م: ۳۰۳- ۳۰۵

10 : Chest pain, available on:

<http://www.bloggerspoint.com/chest-pain-and-burning-sensation-are-different-know-the-differences-between-to-treat-them-perfectly/>

11 : Cooper Daniel H, the Washington Manual of Medical Therapeutics, 32nd edition Lippincott, William's and Wilkins, New Delhi 2007, pp 102,117,21-22.

ماخذونه

د زېره اور گونو ناروغۍ

- 22:** Schilling Judith A, Holmes H. Nancy, Professional Guide to signs and symptoms, 5th edition, Lippincott William's and welkin's USA **2007**, pp: **161**
- 23:** Solomon scott D, Essential Echocardiography Humana Press, New Jersey **2007** pp: **162**.
- 24:** syncope, available on: : <http://www.emedicin.com>
- 25:** Ventricular tachycardia, available on: <http://www.smedicineaccess.com>
- 26:** Wagner, Galen's , Marriott's Practical Electrocardiography, Tenth edition , Lippincott William's and wilkin's USA, **2001**, pp: **184**
- 27:** Zipes Douglas P, MD MACC, Libby peter MD Braunwald's Heart Disease 7th edition Saunders, Iran, **2005**, pp: **1143, 1971-77, 2021-2023**

اختصارات

ASD	Atrial Septal Defect
VSD	Ventricular Septal Defect
PDA	patent Ductus Arterious
HID	Ischemic Heart Disease
TG	Triglyceride
HDL	High Density Lipoprotein
LDL	Low Density Lipoprotein
ECG	Electrocardiography
CX	Circumflex Coronary artery
CAD	Coronary Artery Disease
UA/NESTEMI	Unstable Angina and Non ST elevation Myocardial infraction
PCI	Percutaneous Coronary Intervention
CABG	Coronary Artery Bypass Grafting
PMI	Point of Maximum Impulse
STEMI	ST-Elevation Myocardial Infraction
MI	Myocardial Infraction
VPC	Ventricular Premature Beat Complex
VT	Ventricular Tachycardia
VF	Ventricular Fibrillation
APC	Atrial Premature Complex
AF	Atrial Fibrillation
LBBS	Left Bundle Branch Block
RBBS	Right Bundle Branch Block
RAAS	Rennin Angiotensin Aldosterone System
EF	Ejection Fraction
ACEI	Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor

HVD	Hypertensive Vascular Disease
BUN	Blood Urea Nitrogen
FBS	Fasting Blood Sugar
ARDS	Acute or Adult Respiratory Distress Syndrome
PCWP	Pulmonary Capillary Wedge Pressure
ICD	Implantable Cardioverter Defibrillator
OD	Omni Die
BID	Bis in Die
QID	Quarter in Die
TID	Ter in Die
CCU	Coronary Care Unit
APTT	Activated Partial Thromboplastin Time
UFH	Unfractionated Heparin
IABCP	Intra Aortic Balloon Counter Pulsation
ANP	Atrial Natriuritic Peptide
BPM	Beat Per Minute
Kg/bw	Kg body weight
CO	Cardiac Output
NYHA	New York Heart Association

د مولف لنډه پېژندنه:



پوهندوی دوکتور دل آقا دل د امام گل خان خوی په ۱۳۴۸ هـ ش کال کی د تنګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د کوز سلطانپور په کلی کی زېږېدلی دی. په ۱۳۵۴ کال کی د کوز سلطانپور په لومړني ښوونځۍ کی شامل شو. منځنی زده کړی یې په میاعمر ښوونځی او ثانوي زده کړی یې په تنګرهار لېسه کی ترسره کړی. په ۱۳۶۵ کال کی د نوموړی لېسې څخه فارغ او د کانکور

از مومنی له لاری د کابل دولتي طب انستیتوت د معالجوي طب پوهنځي کی شامل شو او په ۱۳۷۱ هـ ش کال کی د نوموړي پوهنځي څخه د فراغت دیپلوم تر لاسه کړ. په ۱۳۷۲ کال کی د ننگرهار د عامی روغتیا روغتون د داخلی په څانگه کی د معالج ډاکتر په توگه په دنده وگمارل شو. په ۱۳۷۲ کال کی د کانکور از مومنی څخه وروسته د ننگرهار طب پوهنځی د داخله څانگی کدر ته د نامزد پوهنیار په توگه ومنل شو. د یو کال نامزادی دوری بریالی پای ته رسولو وروسته یې پوهنیار علمی رتبې ته ارتقا وکړه. په ۱۳۸۰ کال کی د حملوي فوق البطېني تکی کار دیا په درملنه کی د زرقی دیجوکسین، زرقی پروپرانولول اغېزی تر عنوان لاندی د علمی تحقیق له بریالی سرته رسولو وروسته د پوهنمل او په ۱۳۸۴ کال کی د (په شرقی زون کی د ناکنترول له لور فشار پېښی) تر عنوان لاندی د علمی تحقیقي اثر په لیکلو سره د پوهندوی علمی رتبې ته ارتقا وکړه.

استاد پر دی تدریسی کتاب او پورته ذکر شویو اثارو سربره گڼ شمېر نور علمي اثار هم لیکلي چی په معتبرو علمی خپرونو کی نشر شويدي. د DAAD او DAMFve موسسو په مالي او تخنیکي مرسته یې په ۲۰۰۸ او ۲۰۱۰ کلونو کی دوه ځلي جرمني هېواد ته د ایکوکارډیوگرافي او Vascular sonography اختصاصي زده کړې په موخه سفر کړی چی د بریالیتوب پر سند سربره د اړونده طبیي سامان آلتو سره هېواد ته راستون او تر لاسه کړی زده کړی یې د عمل په ډگر کی پلي کړی دی.

Book Name	Cardiovascular Diseases
Author	Dr. Del Aqa Del
Publisher	Nangarhar Medical Faculty
Website	www.nu.edu.af
Number	1000
Published	2011
Download	www.ecampus-afghanistan.org

This Publication was financed by German Aid for Afghan Children (**www.Kinderhilfe-Afghanistan.de**) a private initiative of the Eroes family in Germany. The administrative and technical affairs of this publication have been supported by Afghanic (www.afghanic.org). The contents and textual structure of this book have been developed by concerning author and relevant faculty and being responsible for it. Funding and supporting agencies are not holding any responsibilities.

If you want to publish your text books please contact us:

Dr. Yahya Wardak, MoHE, Kabul, Afghanistan

Office: 0756014640

Mobile: 0706320844

Email: wardak@afghanic.org

All rights are reserved with the author.

ISBN: 978 993 640 0351

Printed in Afghanistan. 2011

Abstract

Cardiovascular disease is the leading causes of death in western countries. And is becoming a major cause of death in developing world . Advances in the therapy and prevention of cardiovascular diseases have clearly improved the lives of patients with these common, potentially devastating disorders. Cardiovascular medicine is therefore, of crucial importance to the field of internal medicine.

This is to be mentioned that cardiovascular disease is studied in the first semester of the forth grade in the subject of medicine in Nangarhar medical faculty.

This textbook is prepared from the reputable and reliable sources of the cardiovascular medicine so that medical students and young doctors can be benefited from it.

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library