



کتاب پیژندنه

د کتاب نوم: اقتصادي رياضي
څانګه: محاسبه
مولف: عبدالعزيز جليلی
ژباړن: عزت الله ځواب

د څار کمېټه:

- محمد آصف ننگ د تخنیکي او مسلکي زده کړو معین
- دیپلوم انجینیر عبدالله کوزایي د تعلیمي نصاب رییس
- محمد اشرف وحدت په تعلیمي نصاب کې د معینیت د مقام سلاکار

د تصحیح کمېټه:

- محب الرحمن محب
- عبدالجمیل ممتاز
- احمد فهیم سپین غر

د ګرافیک او ډیزاین څانګې مسئول : محمد جان علیرضایي

ګرافیک او ډیزاین:

محمد سلیم خان

۱۳۹۲ لمريز کال

چاپ کال:

۳۰۰۰

تیراژ:

لومړی

چاپ ځل:

www.dmtvet.gov.af

وېب پاڼه:

info@dmvtvet.gov.af

برېښنالیک:

۹۷۸۹۹۳۶۳۰۰۵۳۸

کډ ISBN

Ketabton.com

د چاپ حق د تخنیکي او مسلکي زده کړو له معینیت سره خوندي دی



ملي سرود

دا وطن افغانستان دی	دا عزت د هر افغان دی
کور د سولې کور د تورې	هر بچی یې قهرمان دی
دا وطن د ټولو کور دی	د بلوڅو د ازبکو
د پښتون او هزاره وو	د ترکمنو د تاجکو
ور سره عرب، گوجر دي	پامیریان، نورستانیان
براهوي دي، قزلباش دي	هم ایماق، هم پشه یان
دا هیواد به تل څلیږي	لکه لمر پر شنه آسمان
په سینه کې د آسیا به	لکه زړه وي جاوېدان
نوم د حق مو دی رهبر	وایو الله اکبر وایو الله اکبر



د پوهنې وزیر پېغام

گرانو زده کوونکو، محصلانو او درنو ښوونکو!

د یوې ټولنې وده او پرمختګ کاملاً د هماغې ټولنې د پیاوړو کاري کادرونو، بشري قوې او ماهر و فکرونو په کار او زیار پورې تړلي دي. همدا بشري قوه او کاري مټې دي چې د هیواد انکشافی اهدافو ته د رسیدو لارې چارې طي کوي او د یوه نیکمرغه، مرفه او ودان افغانستان راتلونکی تضمینوي. انسان په خپل وار سره د الله تعالی له جانبو او هم د خپل انساني فطرت له اړخه موظف او مکلف دی چې د ځمکې په عمران او د یوه سوکاله ژوند د اسبابو او ایجاباتو د تکمیل لپاره خپل اغیزمن نقش، همدارنګه ملي او اسلامي رسالت ادا کړي.

له همدې ځایه ده چې د یوه ژوندي او فعال انسان نقش، د خپل ژوند د چاپیریال او خپلې اړوندې ټولنې په اړه، تل مطلوب او په هیڅ حالت کې نه نفی کېږي او نه هم منقطع کېږي. په ټول کې د پوهنې نظام او په خاصه توګه د تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت مسوولیت او مکلفیت لري چې د اسلامي ارزښتونو، احکامو او همداراز معقولو او مشروع قوانینو ته په ژمنتیا سره، د افغانستان په انکشاف کې فعاله، چاپکه او موثره ونډه واخلي، ځکه دغه ستر او سپیڅلي هدف ته د رسیدو په خاطر د انساني ظرفیت وده، د حرفوي، مسلکي او تخنیکي کادرونو روزنه او پراختیا یو اړین مقصد دی. همدا په تخنیکي او مسلکي زده کړو مزین تنګي ځوانان کولی شي چې په خپلې حرفې او هنر سره په سیستماتیک ډول د هیواد انکشاف محقق او میسر کړي.

جوته ده چې په افغانستان کې د ژوند ټک لاره، دولتداري او ټولنیز نظام د اسلام له سپیڅلو احکامو څخه الهام اخیستی، نو لازمه ده چې زموږ د ټولنې لپاره هر ډول پرمختګ او ترقي باید په علمي معیارونو داسې اساس او بنا شي؛ چې زموږ د کارګر نسل مادې او معنوي ودې ته پکې لومړیتوب ورکړ شي. د حرفوي ظرفیت جوړونې تر څنګ د ځوانانو سالم تربیت او په سوچه اسلامي روحې د هغوی پالنه نه یوازې پخپل ذات کې یوه اساسي وجیه ده، بلکې دا پالنه کولی شي چې زموږ وطن پخپلو پښو ودروي، له ضعف څخه یې وژغوري او د نورو له سیاسي او اقتصادي احتیاج څخه یې آزاد کړي.

زموږ گران زده کوونکي، محصلان، درانه استادان او مربیون باید په بشپړه توګه پوه شي، چې د ودان او نیکمرغه افغانستان ارمان، یوازې او یوازې د دوی په پیاوړو مټو، وینښ احساس او نه ستړي کیدونکي جد او جهد کې نغښتی او د همدغو مسلکي او تخنیکي زده کړو له امله کیدای شي په ډیرو برخو کې د افغانستان انکشافی اهداف تر لاسه شي.

د دې نصاب له ټولو لیکوالانو، مولفینو، ژباړونکو، سمونکو او تدقیق کوونکو څخه د امتنان تر څنګ، په دې بهیر کې د ټولو کورنیو او بهرنیو همکارانو له مؤثرې ونډې او مرستو څخه د زړه له کومي مننه کوم. له درنو او پیاوړو استادانو څخه رجا مندانه هیله کوم چې د دې نصاب په ګټور تدریس او فعاله تدریب سره دې د زړه په ټول خلوص، صمیمي هڅو او وجداني پیکار خپل ملي او اسلامي نقش ادا کړي. د نیکمرغه، مرفه، پرمختللي او ویارمن افغانستان په هیله

فاروق وردګ

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پوهنې وزیر

لړلیک

خپرکي	سرليکونه	پاڼې
لومړی	د رياضي ځينې مفاهيم او اصطلاحات	۱-۱۰
دویم	معادلې او توابع	۱۱-۲۸
درېیم	الجبري معادلې	۲۹-۵۴
څلورم	ردیفونه او سلسلې	۵۵-۶۲
پنځم	لوگارتتم	۶۳-۸۰
شپږم	مترکس او دیترمینانت	۸۱-۸۸
اووم	د توابعو لمټ او مشتقات	۸۹-۹۲
اتم	د تابع تزاید او مشتقات	۹۳-۱۱۲
	سرچینې او اخیستنې	۱۱۳
	د ښوونیز نصاب د پراختیا د ریاست پیغام	۱۱۴

سریزه

په پیل کې هڅه شوې ده، چې د ځینو اصطلاحاتو او مفاهیمو په توضیح کولو سره لوستونکي د ریاضي له ژبې سره اشنا کړو او دوی د هغو مفاهیمو یو ټولیز تصویر له ځان سره ولري، چې اړتیا ورته لري.

دا کتاب د انسټیټیوټ د لومړي کال د موضوعاتو په سویه ساده مثالونه لري، چې د توابعو په گرافونو، معادلاتو، د معادلو په سیستم، مترکسونو، دیرنانتونو، لوگارتیم، سلسلو، لمټونو، مشتقاتو، د مشتق د کارولو او ورسره د تابع د تحولاتو او د صنعت او اقتصاد لپاره لارښوونې لري.

دا موضوعات په ساده عامو جملو کې له بېلگو سره یو ځای توضیح شوي. له دې هرې موضوع نه یو ځانګړی کتاب جوړېږي؛ خو دلته هڅه شوې ده، چې په شلې او لنډ ډول د ډېرو ساده او روښانه مثالونو پر مټ توضیح شي.

د دې مثالونو په زده کړې سره محصلین کولی شي، چې کم تر کمه د دې کتاب موضوعات زده او درک کړي.

سربرېره پر دې د دې موضوعاتو په زده کولو سره محصل نه یواځې دا چې کولای شي د خپلې مسلکي ریاضيکي ساحې ستونزې حل کړي، بلکې له دې وړ هاخوا کولای شي، چې د پرمختللیو ریاضیاتو لپاره تیاری و نیسي.

دا کتاب د محاسبې په څانګو کې د تدریس وړ دی، د دې کتاب د لیکلو اصلي انگېزه د مفرداتو د راټولولو، د ادارې او د محصلینو د غوښتنو او د مسلکي معینیت د تعلیمي نصاب د پراختیا د محترم ریاست هڅه او لارښوونه وه.

د دې کتاب په تدوین کې د معاصرو لویو ریاضي پوهانو له تألیفاتو او د اقتصادي مدیریت او حسابدارۍ د څانګو له ریاضیکي درسونو نه ګټه اخیستل شوې ده. دا کتابونه به له نیمګړتیاوو خالي نه وي؛ خو هیله ده محصلین، څېړونکي او د نظر خاوندان په خپلو ارزښتمنو نظرونو او منطقي وړاندیزونو د دې کتاب په سمون او بشپړتیا کې له لیکوال سره همکاري وکړي.

په درنښت

عبدالعزیز جلیلي

ټوليزه موخه:

د محاسبې په چاروکې د لازمو او د اړتيا وړ مهارتونو لاسته راوړل، د اقتصادي رياضي د اصولو، اصطلاحاتو او قواعدو سره سم د رياضي د مسايلو حل او په توليد، صنعت، احصايې او نورو برخو کې د دې کارول او ورسره د انسانانو ورځنۍ تکامل او پرمختگ او د ژوند په چارو کې له اقتصادي رياضي نه ګټه اخيستل.

د رياضي ځينې مفاهيم او اصطلاحات

ټوليزه موخه

د رياضي د اصطلاحاتو بيانول، تحليل او کارونه

د زده کړې موخې: د دې څپرکي په پای کې به محصلین د لاندېنيو موضوعاتو په اړه معلومات لاسته راوړي:

- له قواعدو، اصولو او اصطلاحاتو څخه په سمه توګه ګټه اخیستنه او د هغو توضیح.
- د مسایلو په بیان او حل کې د قواعدو، اصولو او اصطلاحاتو کارونه او ورسره د اقتصادي رياضي د مسایلو هوارول.
- د مفاهیمو او اصطلاحاتو په اړه د اقتصادي رياضي د موضوعاتو او قضیو تجزیه او تحلیل.

Exponent توان یا (طاقت)

هر کله چې یو الجبري حد څو ځلې په خپل ځان کې ضرب شي، کولای شو هغه داسې ولیکو:

$$\underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_n = a^n$$

په دې صورت کې a ته قاعده (Base) او n ته توان یا طاقت ویل کېږي. طاقت په الجبر کې د قوانینو لرونکی دی.

د طاقت لرونکو عددونو قوانین

۱- د ضرب قانون: که چېرې قاعدې مساوي وي، له قاعدو څخه د یوې قاعدې په نظر

کې نیولو سره توانونه جمع کېږي. مثلاً:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$1 - a^2 = a \cdot a \quad a^3 = a \cdot a \cdot a$$

$$a^2 \cdot a^3 = a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a = a^{2+3} = a^5$$

$$2 - x^4 \cdot x^3 = x^{4+3} = x^7 \quad 3 - (-x)^2 \cdot (-x)^5 = (-x)^{-2+5} = (-x)^3$$

$$3 - x^{2m+3} \cdot x^{-m-5} = x^{m-2}$$

که چېرې قاعدې مختلفې او توانونه مساوي وي، په دې صورت کې قاعدې ضربېږي او له توانونو څخه یو نیول کېږي. مثلاً:

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

$$1 - (3xP)^5 \cdot (2aPx)^5 = (6aPx)^5$$

$$2 - (2xy)^{m+3} \cdot (-2x^2aP)^{m+3} = (-4x^3aPy)^{m+3}$$

که چېرې یو توان په سر بل توان ولري، په دې صورت کې له لاندې رابطې څخه کار اخستل کېږي:

$$(a^n)^m = a^{nm} \rightarrow (x^2)^3 = x^2 \cdot x^2 \cdot x^2 = x^6$$

$$(x^2)^3 = x^6$$

$$\left((x^{-2})^3\right)^2 = x^{-2 \cdot 3 \cdot 2} = x^{-12}$$

2- د تقسیم قانون: که چېرې قاعدې مساوي وې له قاعدو څخه یوه قاعده په نظر کې نیول کېږي او د صورت له توان څخه د مخرج توان منفي کوو:

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

مثال:

$$1 - \frac{a^5}{a^3} = \frac{a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a}{a \cdot a \cdot a} = a \cdot a = a^2$$

$$\frac{a^5}{a^3} = a^{5-3} = a^2$$

که چېرې په پورته رابطه کې توانونه مساوي وي لاندې نتیجه په لاس راځي.

$$\frac{a^n}{b^n} = a^{n-n} = a^0 = 1 \rightarrow \left(\frac{a^n}{a^n}\right) = \left(\frac{a}{a}\right)^0 = 1$$

که د تقسیم په قانون کې قاعدې مختلفې او توانونه مساوي وي کولای شو ولیکو:

یعنی قاعدې تقسیمېږي او پر یوه توان لیکل کېږي.

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

مثال:

$$\frac{(6x^3p^2)^4}{(3x^2p)^4} = \left(\frac{6x^3p^2}{3x^2p}\right)^4 = (2xp)^4$$

له پورته رابطې څخه لاندې رابطه پیدا کولای شو.

$$a^{-1} \cdot a^1 = 1 \rightarrow a^{-1} = \frac{1}{a}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} \cdot \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = 1$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{1}{\left(\frac{a}{b}\right)^n} = \frac{1}{\frac{a^n}{b^n}} = \frac{b^n}{a^n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

مثالونه:

$$1 - (mx)^{-5} \div (mx)^{-3} = (mx)^{-5+3} = (mx)^{-2} = \frac{1}{(mx)^2}$$

$$\begin{aligned} 2 - \left(\frac{1}{n}\right)^{-\frac{3}{2}} \div (n-1)^{-\frac{3}{2}} &= \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^{-\frac{3}{2}}}{\left(n-1\right)^{-\frac{3}{2}}} = \left(\frac{1}{n}\right)^{-\frac{3}{2}} \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{3}{2}} \\ &= \left(\frac{1}{n}\right)^{-\frac{3}{2}+\frac{3}{2}} = \left(\frac{1}{n}\right)^0 = 1 \end{aligned}$$

فکتوریل، د فکتوریل مفهوم او د فکتوریل د استعمال ځای

د طبیعي عددونو سټ په نظر کې نیسو: $N = \{1-2-3-4-5-6-7-8-9.....\}$

یو په بل کې د دې ټولو عددونو د ضرب حاصل فکتوریل نومېږي او په لاندې ډول

ښودل کېږي.

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot n = n!$$

د $n!$ دا رنگه ښودنې ته د n فکتوریل ویل کېږي، کولای شو $n!$ په لاندې ډول هم

وړاندې کړو.

$$n! = n(n-1)(n-2)(n-3) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$n! = n(n-1)! \Rightarrow (n-1)! = \frac{n!}{n}$$

$$(1-1)! = \frac{1!}{1}$$

که چیرې $n=1$ قیمت واخلې په نتیجه کې صفر فکتوریل دی.

$$0! = 1$$

مثالونه:

$$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$$

$$(n-3)! = (n-3)(n-4)(n-5) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$(n+1)! = (n+1)n!$$

فکتوریل په ترکیبي انالیز کې د کارونې زیات ځایونه لري، همدارنګه د ضریب د لاسته راوړلو لپاره د بینوم حدونو انکشافی شکل $(a+b)^n$ کېدای شي د ګټې اخستنې وړ وي.

۱ - د پارټیشن په عملیه کې بدلون (permutation)، چې د شیانو، اعدادو، حروفو او کلماتو مخې ته ځای پرځای کول دي، د مثال په ډول:

a د توری یواځې یو بدلون لري

a, b د دوو بدلونونو لرونکي دي ab, ba

a, b, c د شپږو بدلونونو لرونکي دي abc bac cab acb bca cba

له پورتنیو رابطو څخه دا نتیجه په لاس راځي.

$$1! = 1 \quad 2! = 1 \cdot 2 = 2$$

$$3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$$

ګورو چې د اجزاء په زیاتېدو د ډلو شمېر هم زیاتېږي، که اجزاء هرڅومره زیاتېږي د ډلو پېژندل ستونزمن کېږي؛ خو کولای شو، چې له فکتوریل څخه په ګټې اخستنې د هغو شمېر معلوم کړو، د مثال په ډول که m د اجزاء شمېر وي د ډلو شمېر به یې د $P_m = m!$ فورمول د اجزاوو د ځای پر ځای کولو له مخې ټاکل کېږي.

مثال: د یو څلور رقمي عدد 1,3,5,4 د ځای پر ځای کولو د رقمونو شمېر په کار دی، په دې ځای کې لکه څنګه چې ارقام څلور رقمي دي د پورته فورمول له مخې لرو:

$$P_4 = 4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$$

۲ - په ترتیب (Arrangement) کې

$$\binom{n}{A_m} = \frac{n!}{(n-m)!}$$

۳ - په ترکیب کې

$$\binom{m-n}{m} = \frac{m!}{(m-n)!n!}$$

په دوه حده انکشاف کې

$$(a+b)_n^n \in \mathbb{N}$$

$$(a+b)^n = \frac{a^n}{0!} + \frac{na^{n-1}}{1!}b + \frac{n(n-1)}{2!}a^{n-2} \cdot b^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}a^{n-3} \cdot b^3 + \dots + \frac{n!}{n!}b^n$$

$$(a+b)^7 = \frac{a^7}{0!} + \frac{7ab}{1!} + \frac{6 \cdot 7}{2!}a^5b^2 + \frac{5 \cdot 6 \cdot 7}{3!}a^4b^3 + \frac{4 \cdot 5 \cdot 7}{4!}a^3b^4 + \dots + b^7$$

$$(a+b)^7 = a^7 + 7a^6b + 21a^5b^2 + 35a^4b^3 + 35a^3b^4 + 21a^2b^5 + 7ab^6 + b^7$$

يادونه: بايد وويل شي چې د رياضي په يو شمېر موضوعاتو کې، چې فکتوريل کارول کېږي د ترکيبي اناليز موضوعات يادول د دې کتاب په بحث کې نه دي؛ بلکې د فکتوريل د کارونې ځايونه پکې شامل دي.
مثلاً:

$$e = \sum_{K=0}^n \frac{1}{K!}$$

جذري الجبري افادي

که $n \in \mathbb{N}, a, x \in \mathbb{R}^+$ او $x^n = a$ وي؛ نو $x = \sqrt[n]{a}$ دی. ليدل کېږي، چې د دې رابطو په منځ کې منطقي تعادل موجود دی.

مثالونه

$$x^n = a \Leftrightarrow x = \sqrt[n]{a}$$

$$2^4 = 16 \Leftrightarrow \sqrt[4]{16} = 2$$

$$3^3 = 27 \Leftrightarrow \sqrt[3]{27} = 3$$

جذر

که الجبري افاده د کسري توان $a^{m/n}$ لرونکې وي، کولای شو هغه د الجبري جذر په شکل وليکو

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} \quad a \text{ د عدد توان تر جذر لاندې}$$

د جذر توان n

مثالونه

$$(3x)^{2/3} = \sqrt[3]{(2x)^2}, (x+y)^{7/6} = \sqrt[6]{(x+y)^7} = \sqrt[6]{(x+y)^6} \cdot \sqrt[6]{(x+y)} = (x+y)^6 \cdot \sqrt{x+y}$$

د جذرونو همدريه کول

که جذري الجبري افادې د مختلفو جذري درجو لرونکې وي؛ د همدريه کولو لپاره يې ترټولو کوچنی مشترک مضرب د جذرونو درجې ټاکو، په جذري درجه يې تقسيموو او نتيجه د افادې په طاقت کې تر جذر لاندې نيسو.

مثال

$$\sqrt[5]{a^2}, \sqrt[3]{b} = \sqrt[15]{a^6}, \sqrt[15]{b^5}$$

$$\sqrt[5]{3^2}, \sqrt[5]{2} = \sqrt[15]{3^6}, \sqrt[15]{2^3}$$

د جذرونو مقايسه

په هغه صورت کې چې جذر همدريه وي، هغه جذر لوی دی چې مجذور يې لوی وي.

مثال

$$\sqrt{64}, \sqrt{25}$$

$$\sqrt{64} > \sqrt{25}$$

که د جذرونو درجې يو شان نه وي، اول يې همدريه کوو او بيا يې مقايسه کوو.

مثال

$$\sqrt[5]{6}, \sqrt[3]{4}$$

$$\sqrt[15]{6^3}, \sqrt[15]{4^5} \rightarrow \sqrt[15]{216}, \sqrt[15]{1064} \rightarrow \sqrt[5]{6} < \sqrt[3]{4}$$

مثال

$$\sqrt{3}, \sqrt[3]{2} \rightarrow \sqrt[6]{3^2}, \sqrt[6]{2^2}$$

$$\sqrt[6]{9}, \sqrt[6]{4} \Rightarrow \sqrt{3} > \sqrt[3]{2}$$

د جذرونو فورمولونه

$$1) \sqrt[n]{a} = a^{1/n}$$

$$2) \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m = a^{m/n}$$

$$3) \sqrt[n]{a^n} = (a)^{n/n} = a$$

$$4) \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$$

$$5) \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

$$6) \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$$

پر جذري الجبري افادو باندې اساسي عمليې

د هغو جذرونو ضرب، چې د يو شان جذري درجو درلودونکې وي:

$$1) \sqrt[n]{a^m} \cdot \sqrt[n]{a^t} = \sqrt[n]{(a)^{m+t}}$$

$$2) \sqrt[3]{(3x)^3} \cdot \sqrt[3]{(2x)^2} = \sqrt[3]{(3x)^3 \cdot (2x)^2} = \sqrt[3]{108x^5}$$

$$3) (-2 \cdot \sqrt[4]{2x^2y^3}) \left(\sqrt[3]{3x^3y^2} \right) = -6 \cdot \sqrt[4]{6x^5y^5} = -6xy^4\sqrt[4]{6xy}$$

که چېرې جذري توانونه متفاوت وي، همدغه کوو یې او بیا یې ضربوو .

مثال

$$1) \sqrt[3]{x^2y^4} \cdot \sqrt{xy} = \sqrt[6]{(x^2y^4)^2} \cdot \sqrt[6]{(xy)^3}$$

$$= \sqrt[6]{(x^4y^8) \cdot (x^3y^3)} = \sqrt[6]{x^7y^{11}} = xy \cdot \sqrt[6]{xy^5}$$

$$2) \sqrt[5]{2x^3y^2} \cdot \sqrt{2xy} = \sqrt[10]{(2x^3y^2)^2} \cdot \sqrt[10]{(2xy)^5}$$

$$= \sqrt[10]{(4x^6y^4)(32x^5y^5)} = \sqrt[10]{(2^2x^6y^4)(2^5x^5y^5)}$$

$$= \sqrt[10]{(2^7x^{11}y^9)} = x \cdot \sqrt[10]{(2^7xy^9)}$$

د جذرونو د تقسیم عملیه

که چېرته جذري توانونه مساوي وي، تر همدغه جذري توان لاندې مجذورو ته تقسیموو.

$$\frac{\sqrt[n]{x^p}}{\sqrt[n]{x^t}} = \sqrt[n]{x^{p-t}}$$

مثالونه

$$1) 6 \cdot \sqrt[4]{3} \div 3 \cdot \sqrt[4]{2} = 2 \cdot \sqrt[4]{\frac{3}{2}}$$

$$2) \sqrt[3]{m+n} \div \sqrt[3]{(m+n)^2} = \frac{\sqrt[3]{m+n}}{\sqrt[3]{(m+n)^2}} = \frac{1}{\sqrt[3]{m+n}}$$

که چېرې جذرونه مختلفې درجې ولري:

$$1) \sqrt[3]{(ax)^5} \cdot \sqrt{ax} = ?$$

$$= \sqrt[6]{((ax)^5)^2} \cdot \sqrt[6]{(ax)^3} = \sqrt[6]{(ax)^{10} \cdot (ax)^3} = \sqrt[6]{(ax)^{13}} = (ax)^2 \cdot \sqrt[6]{ax}$$

تر جذرونو لاندې د افادو د عامل رفع او د هغو عکس

د امکان په صورت کې د جذر د درجې په نظر کې نیولو سره مجذور تجزیه کوو او له

جذر نه یې خلاصوو.

$$1) \sqrt[3]{54x^5} = \sqrt[3]{27x^3 \cdot 2x^2} = \sqrt[3]{(3x)^3 \cdot 2x^2} = 3x \sqrt[3]{2x^2}$$

$$2) \sqrt{54x^5} = \sqrt{9 \cdot 6x^4 \cdot x} = \sqrt{3^2(x^2)^2 \cdot 6x} = 3x^2 \cdot \sqrt{6x}$$

$$3) \sqrt[3]{81x^9y^3} = \sqrt[3]{27 \cdot 3x^9 \cdot y^3} = 3x^3y \sqrt[3]{3}$$

د مجذور په توګه د غیر جذري افادې راوړل

په دې صورت کې د افادې توان د جذر د توان په اندازه پورته وړو: یعنې $a \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}$
مثالونه

$$1) 2 \cdot \sqrt{3} = \sqrt{2^2 \cdot 3} = \sqrt{4 \cdot 3} = \sqrt{12}$$

$$2) y \cdot \sqrt[3]{2x} = \sqrt[3]{(2y)^3 \cdot 2x} = \sqrt[3]{8xy^3}$$

د جذرونو د جمعې او تفریق عملیې

په جذري افادو د جمعې او تفریق عملیه هغه وخت ترسره کولای شو، چې جذرونه یو شان وي. جذرونو ته هغه وخت یو شان جذرونه وایو، چې جذري درجه یې له یو بل سره مساوي او تر جذر لاندې افادې له یو شان درجې او تورو تشکیل شوې وي.

مثلاً:

$$1) 3\sqrt[5]{3a^2x} - \sqrt[5]{3a^2x} = (3-1)\sqrt[5]{3a^2x} = 2\sqrt[5]{3a^2x}$$

$$2) \sqrt{2} + \sqrt{8} = \sqrt{2} + \sqrt{4} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2} + 2\sqrt{2} = (1+2)\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$

مرکب جذرونه

د یوه جذري عدد ترکیب له یوه غیر جذري عدد سره او یا هم د دوو یا څو غیر مشابه همدگره جذرونو ترکیب ته مرکب جذرونه وایي.

مثلاً:

$$2 - \sqrt{2}, \sqrt{5} + 3, \sqrt{x} + a, \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

$$a\sqrt{x} + 2y, -m + \sqrt{n}, 2\sqrt{c} - \sqrt{x}$$

۱- د مرکبو جذرونو د جمعې او تفریق عملیه: پر مشابه جذرونو د جمعې او منفي

عملیه کېدای شي؛ نو بڼا په مرکبو جذرونو کې هم دا قاعده د تطبیق وړ ده.

$$1) A = 3 + 2\sqrt{5} \quad A + B = \{3 + 2\sqrt{2} + (-7 + 4\sqrt{5})\} = -4 + 6\sqrt{5}$$

$$B = 4\sqrt{5} - 7$$

$$3 + 2\sqrt{5}$$

$$2) A - B = \frac{\mp 7 \pm \sqrt{5}}{10 - \sqrt{5}}$$

$$3) A = 3x + 4\sqrt{2y}$$

$$B = -3\sqrt{2y} + x$$

$$3x + 4\sqrt{2y}$$

$$A + B = \frac{x - 3\sqrt{2y}}{4x + \sqrt{2y}}$$

$$3x + 4\sqrt{2y}$$

$$A - B = \frac{\pm x \mp 3\sqrt{2y}}{2x + 7\sqrt{2y}}$$

۲- د مرکبو جذرونو د ضرب عمليه: په مرکبو جذرونو کې د ضرب عمليه د الجبري پولینومونو د ضرب په څېر ده:

مثال:

$$1) (\sqrt{x} + \sqrt{y})(\sqrt{x} - \sqrt{y}) = x - y$$

$$2) (x + \sqrt{y})(2x - \sqrt{y}) = 2x^2 - x\sqrt{y} + 2x\sqrt{y} - \sqrt{y^2} = 2x^2 - x\sqrt{y} + y$$

د جذرونو د ناطق کولو عمليه

په يوه جذر کې ناطق کول داسې يوه عمليه ده، چې که چېرې تر جذر لاندې افاده ضرب شي او له هغې څخه يوه غير جذري افاده لاسته راشي، په مرکبو جذرونو کې د ناطق کولو عامل د هغې مزدوج دی، هره جذري افاده په ځانګړي ډول د ناطق کولو عامل لري.

$$1) \sqrt[n]{x} \rightarrow \sqrt[n]{(x)^{n-1}}$$

$$2) \sqrt[3]{x} \rightarrow \sqrt[3]{x^2}$$

$$3) \sqrt[7]{m^3} \rightarrow \sqrt[7]{m^4}$$

$$4) \sqrt{P} \rightarrow \sqrt{P}$$

$$5) 2x + \sqrt{y} \rightarrow 2x - \sqrt{y}$$

$$6) 3x + \sqrt{2m} \rightarrow 3x - \sqrt{2m}$$

$$7) \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} \rightarrow \left(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{xy} + \sqrt[3]{y^2} \right)$$

$$8) \sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y} \rightarrow \left(\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{xy} + \sqrt[3]{y^2} \right)$$

۳- د مرکبو جذرونو د تقسيم عمليه: د مرکبو جذرونو د تقسيم په عمليه کې له ناطق سازۍ نه په ګټه اخيستو مخرج په غير جذري افاده بدلوو او بيا د تقسيم عمليه تر سره کوو.

مثالونه

$$1) \frac{x-y}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} = \frac{(x-y)(\sqrt{x}+\sqrt{y})}{(\sqrt{x}-\sqrt{y})(\sqrt{x}+\sqrt{y})} = \frac{(x-y)(\sqrt{x}+\sqrt{y})}{x-y} = \sqrt{x}+\sqrt{y}$$

$$2) \frac{x-y}{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{y}} = \frac{(x-y)(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{xy}+\sqrt[3]{y^2})}{(\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{y})(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{xy}+\sqrt[3]{y^2})} = \frac{(x-y)(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{xy}+\sqrt[3]{y^2})}{(x-y)} = \sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{xy}+\sqrt[3]{y^2}$$

لومړي څپرکي پوښتنې

۱- د اعدادو په کرښه د $\sqrt{5}$ موقعیت وټاکئ؟

۲- له طاقت او جذر نه یې خلاص کړئ؟ $i^5, -i, i^3, i^8, i$

$$\sqrt{i^4}, \sqrt[6]{-1}, \sqrt[4]{-16}$$

۳- لاندې افادې جذري شکل ته راوړئ؟ $(x^2 - 1)^{\frac{1}{2}}, (2xy^3)^{\frac{1}{2}}$

۴- لاندې افادې د طاقت په شکل ولیکئ؟ $\sqrt[14]{(x+a^2)^7}, \sqrt[4]{(3xy)^6}$

۵- همدارنګه یې کړئ؟ $\sqrt[6]{2n}, \sqrt[3]{9n}, \sqrt{y^2+1}, \sqrt[15]{y^2+1}$

۶- مقایسه یې کړئ؟ $\sqrt[7]{6}, \sqrt[6]{5}, \sqrt[5]{4}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[5]{x^2}, \sqrt[5]{x}$

۷- لاندې افادې ساده کړئ؟ $\sqrt[4]{\sqrt[2]{(x+y)^{32}}}, \sqrt[3]{\sqrt{(5x)^{24}}}$

۸- تقسیم یې کړئ؟ $\sqrt{15ab^2} \div \sqrt[3]{3a^2b}, \sqrt[7]{8x^3} \div 2\sqrt[5]{x^2}$

۹- ضرب یې کړئ؟ $\sqrt[3]{3x^2}, \sqrt{9x}, \sqrt[3]{x^2} \cdot \sqrt[5]{x} = ?$

۱۰- ممکنه عاملونه له جذر نه رفع کړئ؟ $\frac{2}{3}\sqrt{50ab^5}, \frac{1}{3}\sqrt{27x^3y^2}$

معادلې او توابع

ټوليزه موخه

د معادلو، توابع او د هغو د ډولونو په مفهوم پوهېدنه او د توابعو گراف او په اقتصادي مسايلو کې د هغو کارونه

د زده کړې موخې: د دې څپرکي په پای کې به محصلين په لاندې برخو کې معلومات ترلاسه کړي:

- د رابطې او تابع مفهوم او د هغو د تحولاتو د ساحې پېژندنه.
- د يو شمېر کاري توابعو او د هغو پېژندل، چې د مربوطه ساحې په منځ کې په کارېږي.
- د گرافونو رسمولو لپاره له توابعو څخه کار اخيستل او په اقتصادي ډگرونو کې د کمي او کيفي بدلونونو ښودنه.
- د يوې اقتصادي پروژې د اقتصادي رشد په مسايلو کې له توابع نه گټه اخيستنه.


رابطه او تابع

د رابطې مفهوم: په ټولنيز ژوند کې د انسانانو تر منځ بېلابېلې اړيکې شتون لري لکه: محمود د احمد ورور دی، کريم د محمود پلار دی.

وکیل د محمود ملگری دی، مجيد د قيوم ملگری دی او داسې نور، په پورته مثالونو کې ورور کېدل، پلار کېدل او ملگری کېدل د انسانانو تر منځ اړيکې رابښي.

د همدې په څېر د رياضي د کميتونو په منځ کې بېلابېلې اړيکې شتون لري لکه: $a = b$, $2 > 11,5$, $9 - 3 > 11,5$ او نور، چې $>$ ، $<$ او $=$ علامې د دوو عددونو يا دوو الجبري افادو په منځ کې رابطه ټاکي، همدارنگه د سیتونو تر منځ هم اړيکې شته.

لومړی مثال: که چېرې د $A = \{a, b, c, d\}$ ، $B = \{2a, 2b, 2c, 2d\}$ سټونه په نظر کې ونیسو، گورو، چې د B سټ عناصر د A سټ د عناصرو له دوه چنده کېدو څخه لاسته راغلي؛ نو د A او B سټونو ترمنځ اړیکه دوه چنده کېدل دي، چې کولای شو په لاندې شکل یې وښایو.




که د دوه چنده کولو رابطه په R وښایو، په دې حالت کې د A او B سټونو عناصر د R رابطې ته په پام سره لاندې مرتب جوړه سټونه راښيي.

$$R = \{(a, 2a) (b, 2b) (c, 2c) (d, 2d)\}$$

په دې حالت کې د R مرتب شویو جوړو گډ سټ دی، چې د هرې جوړې اوله مرکبه د A سټ د عنصر مرتب او د هغې دویمه مرکبه د B سټ عنصر ښيي. همدارنگه د A سټ د ډومین Domain په نوم یا د هغې د تعریف ساحه او د B سټ د Range په نوم د رابطې د قیمتونو ساحه یادولای شو:


دویم مثال



لیدل کېږي چې د P او Q سیټ تر منځ رابطه د مربع کېدو رابطه ده، چې هغه د ترتیب شویو جوړو په شکل لیکو.

$$F = \{(1,1) (2,4) (-2,4) (3,9) (-3,9)\}$$

درېم مثال:




د M او N دوه سیټونه مطالعه کوو، د M او N تر منځ رابطه مضرب کېدل رابښي، چې کولای شو هغه په لاندې مرتب شویو جوړو کې وښایو.

$$K = \{(18,3), (18,6), (12,11), (34,17), (35,5), (35,7)\}$$

کله چې د A او B سیټونو عناصر د یو شرط او اصل لاندې ترتیب شوي جوړي جوړي کړي دا اصل او شرط د A او B سیټونو تر منځ رابطه ده.

که چېرې د A او B دوو سیټونو د عناصرو تر منځ یو پر یوه رابطه پیدا شي د A سیټ د B سیټ سره معادله رابطه لري.



که چېرې M یو اختیاري سیټ وي د R یو فرعي سیټ له $M \times M$ څخه د M په رابطه کې وایو:

$$R \subset M \times M$$

معمولاً د $(x, y) \in R$ لپاره داسې ليکل کېږي. $x \approx y$
معادله رابطه

په M کې يوې رابطې ته هغه وخت معادله رابطه ويل کېږي، چې
د انعکاس خاصیتونه $x \approx x$ $x \in m$ د ټولو لپاره
تناظري خاصیتونه $x \approx y \Rightarrow y \approx x$
انتقالي خاصیتونه $x \approx y, y \approx z \Rightarrow x \approx z$ وي.

نوت: هرکله چې يوکيفي سيټ وي، نو دټولو جفتو مرتب سيټ.

$$M \times M := \{(x, y) / x, y \in M\}$$

ته د M کارټيزين د ضرب حاصل وايي.
لاندې هر يو مثال يوه رابطه را پېژني:

$$1) \{(0,0), (0,1), (0,2), (1,0), (1,1), (2,0)\}$$

هغه سيټ چې د هرې جوړې د اعضاوو مجموعه يې له 3 څخه کمه ده.

$$2) \{(0,1), (1,1), (3,1)\}$$

$$3) \{(1,4), (1,8), (1,9)\}$$

$$4) y^2 = x, y = x^2, y = \pm\sqrt{x}$$

$$5) f(x) = 2x^3 - 3$$

توابع

د اناлиз يو له په زړه پورې مسایلو څخه د توابعو مطالعه ده. يعنې د دوو متحولونو
تر منځ د تابعیت (پيروۍ) مطالعه، چې په يو وخت تغير کوي. د علومو په زیاتره ساحو،
لکه رياضي فزیک، تخنیک، اقتصاد حتا ټولنيزو مسایلو لکه احصایو او نورو کې له همدې
مسایلو سره مخ کېږو.

تعريف: تابع د دوه يا څو متغيرو تر منځ تبعي رابطې ته وايي. يا په بل عبارت، يو
متغير له بل متغير سره د رابطې له مخې تړاو مومي. چې په دې حالت کې يو ته خپلواک
متغير او بل ته تابع متغير وايي، کلي شکل يې $y = f(x)$ دی. په دې ځای کې x خپلواک
متغير او y د هغې تابع دی. د خپلواک متغير په هکله ويلای شو، چې x کولای شي په خپله
خوښه او خپلواکه توگه د (a, b) په فاصله کې تحول وکړي، همدارنگه تابع کولای شو په
لاندې ډول توضیح او تعريف کړو:

د دوو حقيقي اعدادو D او R دوه مجموعې په نظر کې نيسو د f يو تابع د هر حقيقي عدد تابع x ، D مجموعه يواځې يو حقيقي عدد $f(x)$ د R مجموعه ته ربط ورکوي. د D مجموعه د تابع د تعريف ناحیه او د R مجموعه د F تابع د قيمتونو ناحیه نومېږي. د یاد ربط د لیکلو معمولي بڼه په لاندې ډول ده.

f – function $f : D \rightarrow R$


D - Domain $X \rightarrow f(x)$

R - Range

معمولا د لیکلو لاندې ډول کارول کېږي.
د لیکلو پورتنی ډول کولای شي لاندې شکل ته واوري.
د f توری له D څخه R ته تابع را ښيي، یعنې د F په وسیله د x هر قیمت د D مربوط د $f(x)$ یو قیمت R سره ربط ورکړل شوی دی.

په لنډه توګه تابع داسې تعريفولای شو:

تابع عبارت له یوې رابطې یا د A او B دوه سیټونو ترمنځ ارتباط دی، داسې چې د A د سیټ له هر عنصر سره یواځې او یواځې د B سیټ یو عنصر ربط پیدا کړي.



$y = f(x)$ یا yx دا مفهوم لري، چې y د x تابع دی.

تابع یا Function چې د لومړي ځل لپاره G.W Leibniz ترې په (1646 – 1716) ګټه اخیستې د f یو میپینګ چې د هغې د تعريف ساحه $D(f)$ او د هغې د تصویر ساحه $B(f)$ ده د IR فرعي سیټونو تابع نومېږي او دارنگه لیکل کېږي.

$$f: D(f) \rightarrow B(f)$$

$$f: D(f) \rightarrow \mathbb{R}$$

د فاصلې په اړه کېدای شي دا ډول توضېح ورکړو:

د $a, b \in \mathbb{R}$ دوه عددونه په نظر کې نیسو، دا دوه عددونه کولای شي یوه فاصله (انتروال) شي سره د دې چې د x متغیر د $\{a, b\}$ تر منځ فاصله کې واقع شوی، یعنې $a \leq x \leq b$ دلته کولای شو ووايو، چې x خپل حقيقي ټول مقادیر په یاده فاصله کې اختیاروي. په پورته نا مساوي کې a د فاصلې لاندې حد او b د فاصلې پورته حد نومېږي.

د انتروال ډولونه

۱- پرانیستی: که په ذکر شوې فاصله کې a او b د فاصلې جز نه وي، په دې حالت کې پرانیستی فاصله نومېږي او په لاندې ډول ښودل کېږي.


$$(a, b), \quad a < x < b$$

$$A = \{x / x \in \mathbb{R}, a < x < b\}$$



۲ - نیمه پرانیستی: په دې حالت کې یو له a او b څخه د فاصلې جز شمېرل کېږي

یعنې:



$$[a, b), (a, b]$$

$$a \leq x < b \quad a < x \leq b$$

$$A = \{x / x \in \mathbb{R}, a \leq x < b\}$$


$$a < x \leq b$$

۳- تړلې فاصله: کله چې a او b دواړه هر یو د فاصلې جز وشمېرل شي، په دې حالت

کې یاده فاصله تړلې ده.

$$[a, b] \quad a \leq x \leq b$$

$$A = \{x / x \in \mathbb{R}, a \leq x \leq b\}$$



د تابع د تعريف ناحیه

په یوه فاصله کې د متغیرو مقادیرو مجموعه د تعريف ناحیه نومېږي. د تعريف په ناحیه کې که د مستقل متحول په هر قیمت یواځې یو قیمت د مربوط متحول لپاره په لاس راشي. دا چې رابطه د تابع ده البته د یو مقدار برعکسو تابع. د دې په څېر که د تعريف په ساحه کې د مستقل متحول په هر قیمت مربوطه متحول له یو نه زیات قیمت واخلي، په دې حالت کې ذکر شوې رابطه تابع راپېژني.

مثلاً:

$$1) y = \pm\sqrt{x}$$

د تعريف ناحیه $D \rightarrow [0, \infty), 0 \leq x < \infty$

د پورتنۍ رابطې د تعريف د ناحیې سیټ $D = \{x/x \in R, 0 \leq x < \infty\}$

$$2) y = x^2$$

د تعريف ناحیه $D \rightarrow (-\infty, \infty), -\infty < x < \infty$

$$3) \sqrt{x-4}$$

د تعريف ناحیه $D \rightarrow 4 \leq x < \infty, [4, \infty]$

د توابعو گراف

څرنگه چې گرافونه پر ریاضي سربېره په فزیک، کیمیا، بیولوژي او نورو طبعي او ټولنیزو علومو، لکه احصایه اقتصاد او نورو کې پکارېږي، دهغو په واسطه ډېر موضوعات واضح بیانېږي. همدارنگه تابع ډیر کله د خپل مربوطه گراف په واسطه بیانېږي، نو د ډېر اهمیت وړ ده او پکار ده، چې د گرافونو د رسمولو په حالت کې دقت او پاملرنه وشي او د توابعو د گرافونو د ترسیم قوانین او اصول وپېژنو. دا چې مختلف الجبري توابع د متفاوتو گرافونو لرونکي دي، بڼا د گراف د لارښود لپاره ځینې له توابعو څخه رسموو.

د توابعو د گراف هندسي ښودنه

په تحلیلي هندسه کې هر جفت مرتب د حقیقي اعدادو (x, y) په یوه نقطه یو بل ته مخامخ واقع کېږي، داسې چې د x او y عددونه نسبت د مختصاتو یو سیستم ته Cartesian

د ذکر شوي نقطې مختصات دي.

اوس د هر تابع لپاره

$$f: D \rightarrow R$$

$$x \rightarrow f(x)$$


کولای شو مرتبې جوړې $(x, f(x))$ په نظر کې ونیسو، دا مرتبې جوړې هغه نقطې په لاس راکوي، چې د x او $F(x)$ مختصاتو لرونکې وي.

تعریف: د هر تابع لپاره

$$f: D \rightarrow R$$

$$x \rightarrow f(x)$$

د ټولو هغو نقطو مجموعه، چې د $(x, f(x))$ مختصاتو لرونکې ده د f د تابع د گراف هندسي ښودنه نومېږي.



څرنگه چې پورتنۍ تابع اوله درجه ده، نو د هغې گراف پر مستقیم خط دی.

له دا ډول توابع $x \rightarrow x^m$ یا $y = f(x) = x^m$

په پورته تابع کې m یو ناطق عدد دی، چې په دوو حالتونو کې مطالعه کېږي.

لومړۍ حالت m په تامو اعدادو کې شامل دی $m \in \mathbb{Z}$

دویم حالت m په نسبي اعدادو کې شامل دی $m \in \mathbb{Q}$

په لومړي حالت کې $y = x^m$ په څلورو فرعي حالتونو کې مطالعه کېږي.

مثبت تاق $m \rightarrow$ (C) مثبت جفت $m \rightarrow (a)$

منفي تاق $m \rightarrow$ (d) منفي جفت $m \rightarrow (b)$

دویم حالت

کسري m په $\frac{P}{q}$ شکل (په داسې حال کې، چې P او q تام اعداد دي).

په پورته توگه لاندې فرعي حالتونه په نظر کې نیول کېږي.

$$a - m = \frac{P}{q} > 1$$

$$b - m = \frac{P}{q} < 1$$

$$c - 1 < m = \frac{P}{q} < 0$$

$$d - m = \frac{P}{q} < -1$$

د خصوصیاتو لنډه پېژندنه او توابعیه د دې کتاب په درسونو کې کارول کېږي.

۱- **مشرح تابع او ضمني تابع:** هر کله چې د تابع او مستقل متغیر تر منځ رابطه شتون ولري، چې وکولای شو تابع له هغې استخراج کړو؛ یعنې که په یاده رابطه کې تابع وتوانېږي

د دې $y = f(x)$ په څېر و لیکل شي دا رابطه مشرح تابع بلل کېږي.

مثلاً $y + 2 = 3x^2$ یا $xy = x^2 - 1$ او نور ...

او که په یوه رابطه کې له متحولینو څخه د هیڅ یوه لپاره مستقل حل پیدا نه شي، دا رنگه رابطه ضمني تابع نومېږي مثلاً:

$$x + x^2 y^2 + y = 0$$

$$y + x^2 + x^2 y^2 = 0$$

مشرح تابع کېدای شي ناطق یا آهم وي.

$$y^2 - x = 0$$

ناطق تابع هغه دی، چې د یوه یا دوه پولینومونو له نسبت څخه لاسته راغلی وي.

لکه:

$$y = \frac{3x^2 + 1}{2x + 3} \quad y = 3x^2 + 2x + 1$$

$$y = \pi^2$$

آهم تابع هغه دی، چې په هغې کې یو یا څو تر جذر لاندې واقع شوي وي.
لکه:

$$y = \sqrt{\frac{2x^2 + 5}{5x^3 + x}} \quad y = 2x^2 + \sqrt{3x} + 4$$

غیره و y

متمادي او غیر متمادي تابع

که د $y = f(x)$ تابع یو پولینوم وي او x وکولای شي له $-\infty$ څخه تر $+\infty$ قیمتونه واخلي، داسې چې د X په ټولو قیمتونو د تابع لپاره قیمت وټاکل شي متمادي تابع ده

$$y = x^3 - 3$$

$$y = 3x + 5$$

مثلاً:


د دې برعکس که تابع ونه شي کړای د تعریف په حوزه کې د x د متحول د ځینو قیمتونو لپاره قیمت واخلي دا رنگه تابع، چې پکې قیمتونه نا ټاکلي دي متمادي نه دی.
مثلاً:

$$y = \frac{x^2 + 3x}{x - 2}$$

په نوموړي تابع کې لیدل کېږي، چې د $x = 2$ په قیمت د تابع قیمت غیر معین دي بڼاً د $x = 2$ په قیمت کې تابع غیر متمادي دی او یا په $y = \sqrt{3 - x}$ کې $x > 3$ په قیمتونو د تابع قیمت د حقیقي اعدادو په سیټ کې غیر معین دی، بڼاً د $x > 3$ په قیمتونو د تابع گراف غیر متمادي دی.

متزایده تابع او متناقضه تابع

که مستقل متحول او تابع یو اړخ ته یونواخت تحول ولري متزایده تابع ورته ویل کېږي. یا په بل عبارت که تابع په یوه ټاکلې فاصله کې د سعودي یو نواخت تغیراتو لرونکې وي، داسې چې په قیمتونو دوه مقداره x_1 او x_2 ولرو $x_1 < x_2$ $f(x_1) < f(x_2)$



تابع یو نواخته نزولي ده (متناقص) په هغه حالت کې، چې $x_1 < x_2$ په قیمتونو دا $f(x_1) > f(x_2)$ قیمتونه شي.

د زوج تابع (موازي) او د فرد تابع (متناوب)

که د $y = f(x)$ تابع کې د x عدد قیمت $-x$ ته واړوو او د y عدد په قیمت کې کوم تغیر رانه شي دارنگه تابع (جفت) موازي تابع نومېږي.

د دې برعکس که x په $-x$ بدلوو او د y عدد قیمت $-y$ ته واړوو، تابع ته (طاق) تابع ویل کېږي.

کثیر الحده تابع

دا تابع داسې $y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ ده. په دې تابع کې $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ ثابت مقادیر، n کثیر الحده درجه او x د تابع مستقل متحول دی، له دې تابع څخه نورې توابع هم مشتق کېږي، یعنې په $n=0$ ثابت تابع $n=1$ خطي تابع $n=2$ دویمه درجه تابع $n=3$ درېیمه درجه تابع

ثابته تابع

هغه تابع چې د تغیراتو حدود یې په یو حد کې شامل شوي وي. په دې ډول توابعو کې د تابع مقدار له متغیر سره تړاو نه لري لکه: $y = a$

توان لرونکې تابع

په دارنگه توابعو کې مستقل متغیر د توان یا طاقت په توګه ځای نیسي، چې د $f(x) = a^x$ په څېر ښودل کېږي، البته $a \neq 0, 1$ دی، دا هغه وخت دقیقاً متزایده ده، چې کله $a > 0$ وي او هغه وخت دقیقاً متناقضه ده، کله چې $a < 0$ وي.

لوګارتمي تابع

دا تابع په $y = F(x) = \text{Log}_a x$ بڼه وي، چې په هغې کې $a \neq 1, 0$ وي او $x > 0$ دی. که دا رانګه $a = e = 2.7.828$ وي په دې حالت کې به په طبیعي قاعده کې وي، چې هغه پایه پزین نومېږي او په لاندې ډول لیکل کېږي.

$$y = f(x) = \text{Lnx}, e = \sum_{K=0}^{\infty} \frac{1}{K!}$$

که $a = e = 2.7.828$ وي، په دې حالت کې به لوګارتم په طبیعي قاعده کې وي، چې هغه نېرین قاعده نومېږي او په لاندې ډول لیکل کېږي.

$$y = f(x) = \text{Log}_e x \quad e = \sum_{K=0}^{\infty} \frac{1}{K!}$$

$$y = f(x) = \text{Lnx}$$

معکوسه تابع

د $y = f(x)$ تابع په نظر کې نیسو، چې په هغې کې x مستقل متغیر او y د هغه تابع ده. څرنگه چې لیدل کېږي y د x په حساب بیان شوی دی، اوس که داسې رابطه ولیکو، چې په هغې کې x تابع او y مستقل متغیر وي، یا په بل عبارت پورته رابطه د y په حساب بیان کړو؛ په دې حالت کې هغې ته معکوسه تابع ویل کېږي، چې په هغې کې به x د y تابع وي او کولای شو هغه په لاندې ډول وښايو

$$x = f(x), x = f^{-1}(x)$$

تعریف: د f د تابع پر وړاندې، چې په f^{-1} شکل ښودل کېږي د (y, x) جفتو له مجموعي

څخه عبارت دی، داسې چې د (x, y) جفتونه په f کې قرار لري. f^{-1} یو په یو دی، کله چې F یو په یو وي.

ټولې توابع چې د یوې ټاکلې فاصلې پر مخ وي او د مستقل متحول او تابع ترمنځ یو په یو رابطه ټینګه وي یا دقیقاً نزولي یا صعودي وي او د معکوس لرونکې دي.

تابع $f: D \rightarrow R$,

$$x \rightarrow f(x)$$

یوه یو په یو تابع ده په داسې حال کې، چې د x په مختلفو قیمتونو پورې مربوط وي یعنې کله چې x_0, x_1, x_2 د D مجموعې مربوط وي او $x_0 \neq x_1 \neq x_2$ وي د $f(x_0) \neq f(x_1) \neq f(x_2)$ تر منځ دی.

تعریف: هر کله چې د f تابع یو په یو وي، په دې حالت کې:

$$f: D \rightarrow R$$

$$x \rightarrow f(x)$$

$$f^{-1}: R \rightarrow D$$

$$x \rightarrow f^{-1}(x)$$

$$x = f(y)$$

په لنډه توګه ویلی شو، چې دوه تابع ګانې یو له بلې څخه راګرځېدلې وي، معکوسې توابع ورته وایي، لکه:

$$y = \log_a x \rightarrow x = a^y$$

$$y = \sin x \rightarrow x = \arcsin y$$

$$y = \cos x \rightarrow x = \arccos x$$

مثال: معکوسه تابع

$$f^{-1}: R \rightarrow D$$

$$f: D \rightarrow$$

$$x \rightarrow f^{-1}$$

$$x \rightarrow -2x + 1$$

$$x = -\frac{y-1}{2}$$


$$y = -2x + 1$$

$$f(y) = -\frac{y-1}{2}$$

$$x = -\frac{y-1}{2}$$

د معکوسې تابع ګراف

لومړی د f د تابع ګراف رسموو د f د هندسي ښودنې د انعکاس له امله $y=x$ عینیت ته په کتو هندسي ښودنه تر f^{-1} پورې په لاس راځي.



$$y = -2x + 1$$

$$\begin{array}{c|cc} x & 0 & 1/2 \\ \hline y & 1 & 0 \end{array}$$

مثال : د g تابع په پام کې نیسو.

$$g_+ : D_+ \rightarrow R$$

دا تابع په داسې حال کې، چې د D_+ مجموعه ټول غیر منفي عددونه دي یو په یو تابع ده او g_+^{-1}

$$g_+^{-1} : R_g \rightarrow D_+$$

$$x \rightarrow \sqrt{x}$$

د طاقت لرونکې تابع ځانګړنې

که f_a یا $x \rightarrow a^x$ په پام کې ونیسو، په دې صورت کې:

$$f_a : D \rightarrow R$$

$$x \rightarrow a^x$$

د لاندې خاصیتونو درلودنکې دي:

۱- د D مجموعه د ټولو حقيقي عددونو له مجموعې څخه عبارت ده؛ خو د R مجموعه ټول مثبت حقيقي عددونه دي.

۲- د x_1, x_2 په ټولو حقيقي قیمتونو کې لاندې رابطه سمه ده. $f_a(x_1 + x_2) = f_a(x_1) f_a(x_2)$.

۳- د f_a تابع په $a > 1$ ډول دقیقاً متزایده ده او په $0 < a < 1$ ډول متناقصه ده.

د توابعو هندسي جوړښت $y = 2^x$ او $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ په لاندې ډول ليدل کېږي. شکل ته په کتو د $a = 2 > 1$ او $a = \frac{1}{2} < 1$ پر وړاندې د f_2 او $f_{1/2}$ ورکړل شوو توابعو د 2 او 3 د رابطې خواص کولای شو په شکل کې ووينو.

که پورته توابعو ته په دقت سره وگورو، وينو چې د مستقل متحول او تابع تر منځ يو په يو رابطه موجوده ده. بڼا پورته توابع د معکوس درلودونکې دي، چې کولای شو په لاندې شکل کې يې رابطې وگورو.

نو ويلای شو، چې طاقت لرونکې تابع او لوگارتمي تابع يو د بل معکوسې او سرچېه دي.

د توابعو ترکيب

کله چې f او G دوه اختياري توابع وي؛ په دې حالت کې $(fog)_x$ نوي تابع د $(fog)_x = f(2(x))$ په وسيله تعريفوو.

fog د f او g ترکيب نومېږي، چې د fog د تعريف ناحیه له x څخه عبارت ده. په دې حالت کې، چې x د $g(x)$ د تعريف په ناحیه کې د f د تعريف په ناحیه کې دی.

عموماً $fog \neq gof$ دی.

مثال:

$$f(x) = x^2$$

$$g(x) = x + 1$$

$$(fo2)_x = f(2(x)) = f(x + 1) = (x + 1)^2$$

$$(2of)_x = 2(f(x)) = 2(x^2) = x^2 + 1$$

نو ليدل کېږي چې:

$$(x + 1)^2 \neq x^2 + 1$$

خو اتحادي ترکيب په توابعو کې موجود دی، چې په لاندې ډول ښودل کېږي.

$$(fog)oh = fo(goh) =$$

تاسې کولای شئ د هغو په لرلو سره تابع تطبيق او ارزيايي کړئ.

$$f(x) = x^2$$

$$2(x) = x + 1$$

$$h(x) = x - 1$$

$$(f \circ g \circ h) = f(2(h(x)))$$

$$f(2(h(x))) = f(2(x-1)) = f(x-1+1) = x^2$$

$$fo(2oh) = f(2(h(x))) = x^2$$

$$(fo2)oh = f(2(h(x))) = x^2$$

$$f(x) = 2x^2$$

$$2(x) = 3x + 2$$

$$h(x) = x + 1$$

$$f \circ g \circ h = f(2(h(x))) = f(2(3(x+1)+2)) = 2(3x+5)^2$$

مثال: د $y = |x|$ تابع رسم کړئ!

$$y = x$$

$$y = -x$$

$$x > 0$$

$$x < 0$$

مثال: د $y = |x^2 - 2x|$ تابع رسم کړئ!

د دې تابع د ترسیم لپاره لومړی د $y = x^2 - 2x$ تابع رسموو او د تابع د گراف هغه برخه، چې د x تر محور لاندې ده یا په بل عبارت د $y > 0$ هغه قیمتونه دي، چې د هغوی متناظر د x په محور رسموو.

$$-2 \leq x < -1 \xrightarrow{[x] = -2} y = -2 + x$$

$$-1 \leq x < 0 \xrightarrow{[x] = -1} y = -1 + x$$

$$0 \leq x < 1 \xrightarrow{[x] = 0} y = x$$

$$1 \leq x < 2 \xrightarrow{[x] = 1} y = 1 + x$$

د دوه یا څو متغیرو تابع

د دې تابع کلي شکل په لاندې ډول ښودل کېږي. $z = f(x, y)$ او یا $Z = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$

دا رابطې ښيي، چې z د دوه یا څو متحولونو تابعیت کوي. مثلاً $z = ax + by$ داسې تابع ده، چې د دوه متغیرو x او y پېروي کوي او $z = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n$ تابع داسې تابع ده، چې د څو مستقلو متغیرو تابعیت کوي.

د دوه يا څو توابعو د تعريف د ناحيې جمع، تفريق، ضرب او تقسيم

هرکله چې F او g دوه اختياري توابع وي، په دې حالت کې نوې تابع گانې لکه $f \pm g$ کولای شو د لاندې معادلې په وسيله تعريف کړو. $(f \pm g)_x = f(x) \pm 2(x)$ د $(f \pm g)_x$ تعريف ناحيه د x له ټولو عددونو څخه متشکله ده، چې د هغې پر وړاندې $F(x) \pm 2(x)$ معنی ورکوي.

يعنې د ټولو $x \in R$ عددونو مجموعه، چې F او g په هرو دوو ناحيو کې قرار لري. هر کله چې د A او B دوه مجموعې اختياري وي په دې حالت کې $A \cap B$ د $x \in R$ مجموعې ته اشاره کوي، چې په A او B کې قرار لري؛ نو کولای شو وليکو:

$$\begin{aligned}(f \pm g)_x &= f(x) \pm 2(x) \rightarrow \text{dom} \\&= \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g) \\(f \cdot g)_x &= f(x) \cdot 2(x) \rightarrow \text{dom} = \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g) \\ \left(\frac{f}{g} \right)_x &= \frac{f(x)}{g(x)}, \text{domain } \frac{f(x)}{2(x)} = \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g) \\ 2(x) &\neq 0\end{aligned}$$

هرکله چې g تابع او C اعداد وي د $C \cdot g$ نوې تابع د $(C \cdot g)_x = C \cdot g(x)$ په وسيله ښيي. د $C \cdot g$ د تعريف ناحيه فقط د g د تعريف ناحيه ده. مثال: د F او g توابع په لاندې ډول تعريف کېږي.

$$\begin{aligned}f(x) &= x^2 + 1 & \text{dom} f &= (-\infty, \infty) \\g(x) &= \sqrt{x} & \text{dom} g &= (0, \infty) \\(f \pm g)_x &=? & \text{dom}(f \pm g)_x &=? \\(f \cdot g)_x &=? & \text{dom}(f \cdot g)_x &=? \\\left(\frac{f}{g} \right)_x &=? & \text{dom} \left(\frac{f}{g} \right)_x &=? \\g(x) &\neq 0\end{aligned}$$

حل:

$$\begin{aligned}(f \pm g)_x &= f(x) \pm g(x) = x^2 + \sqrt{x} + 1 \\ \text{dom}(f \pm g)_x &= [0, \infty) \\(F \cdot g)_x &= \sqrt{x}(x^2 + 1), \text{dom}(f \cdot g)_x = [0, \infty) \\ \left(\frac{f}{g} \right)_x &= \frac{x^2 + 1}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}(x^2 + 1)}{x} \\ \text{dom} \left(\frac{f}{g} \right)_x &= [0, \infty) \\ 2(x) &\neq 0\end{aligned}$$

د څو مثالونو د حل نمونه:

۱- تعین کړئ، چې لاندې تابع په کومه فاصله کې ټاکلې ده؟

$$y = \sqrt{x-4}$$

حل: د دې لپاره چې تابع ټاکلې وي باید حدونه یې د یو مثبت عدد تر جذر لاندې وي.

$$x-4 \geq 0$$

$$x-4 = 0$$

$$x = 4$$

$$4 \leq x < \infty$$

۲- د $y = \sqrt{x^2-1}$ تابع د تعریف ناحیه تعین کړئ؟

حل: د دې لپاره چې د پورته تابع د تعریف ناحیه ټاکلې وي؛ باید حدونه یې تر مثبت جذر لاندې وي.

$$x^2 - 1 \geq 0 \rightarrow x^2 = 1$$

$$x^2 > 1$$

$$x = \pm 1$$

$$x \geq 1$$

$$x \leq -1$$

۳- هغه نقطې، چې پکې تابع متصله وي په لاس راوړئ؟

$$y = \frac{2x}{x^2 - 3x + 2}$$

حل: د مخرج جذر یې پیدا کوو.

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$(x-2)(x-1) = 0$$

$$x = 2$$

$$x = 1$$

پورته تابع په ټولو نقطو کې متصله ده.

$$A = \{x / \in R, x \neq 2, x \neq 1\}$$

منفصلې دي. $x=2$ او $x=1$ خو دوه نقطې

الجبري معادلې

ټوليزه موخه

د معادلو او په اقتصادي او تخنیکي مسايلو کې له معادلو نه د گټې اخیستنې په اړه معلومات

- د زده کړې موخې: د دې خپرکي په پای کې به محصلین په لاندې موضوعاتو وپوهېږي:
- د معادلو د مفهوم درک کول، د مجهولاتو له پلوه د معادلو پېژندنه.
 - د معادلاتو له خواص نه خبرېدنه او د اړتیا په ټولو ساحوکې د هغې کارونه
 - د یوې مسألې د خصوصیت له نظره د یوې معادلې تشکیل او تړل.
 - د عبارتي مسايلو حل او د معادلې له خواصو نه په گټه اخیستو د مجهولاتو پیدا کول.
 - له معادلاتو نه په گټه اخیستنه د اقتصادي مسايلو حل.

الجبري معادلې

هغه الجبري مساوات، چې په یو یا څو مشخصو قیمتونو، حروف مساوي وي، معادله نومېږي. مثلاً دا $5x + 2 = 2x + 8$ مساوات یوه معادله ده، ځکه د $x = 2$ په قیمت دواړه خواوې مساوي دي.

په معادله کې مجهول: هغه دی، چې د قیمت پیدا کول یې مطلوب وي.

د معادلې جذر: د مجهول هغه قیمت ته ویل کېږي، چې معادله صدق کړي.

د معادلې درجه: د معادلې د مجهول تر ټولو لوی توان د معادلې درجه ده.

مثلاً.

$$5x - 10 = 0 \text{ اوله درجه}$$

$$3x^2 - x + 2 = 0 \text{ دويمه درجه}$$

$$2x^3 - 3x^2 + 6 = 0 \text{ درېيمه درجه}$$

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + a_{n-3} x^{n-3} + \dots + a_1 + a_0 = 0 \text{ درجه } (n)$$

دمجهولونو د شمېر له مخې د معادلو ډولونه: يوه معادله کېدای شي د يو، دوه، درې يا n مجهولونو لرونکې وي.

مثلاً:

$$2x + 4 = 3x - 6 \rightarrow \text{يو مجهوله معادله}$$

$$8x - 4y = 6 \rightarrow \text{دوه مجهوله معادله}$$

$$3x - 2y + 6z = 8 \rightarrow \text{درې مجهوله معادله}$$

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 + \dots + a_n x_n \text{ } n \text{ مجهوله معادله}$$

د معادلو خاصيتونه

- ۱- که د يوې معادلې (شرطيه مساوات) دواړو خواوو ته عدد جمع يا تفریق شي په شرطيه مساوات کې کوم تغير نه راځي.
- ۲- که د مساوات دواړه خواوې په خلاف د صفر عدد کې ضرب يا تقسيم شي مساوات په خپل حال پاتې کېږي.
- ۳- هر کله چې د مساوات دواړه خواوې په کلي توگه له يو طرف څخه بل طرف ته انتقال شي د هغې د حدونو علامې تغير نه کوي.
- ۴- که د معادلې يو جز د مساوات له يو طرف نه بل طرف ته انتقال شي، د هغې جز علامه تغير کوي.

$$4x + 1 = 3x + 22$$

$$4x - 3x = 22 - 1 \rightarrow x = 20$$

اوله درجه يو مجهوله معادله

د اوله درجه معادلې کلي شکل $ax = b$ دی، b ثابت عدد او x مجهول دی او $x = \frac{b}{a}$ د ذکر شوې معادلې جذر دی.

که په اوله درجه يو مجهوله معادله کې د معادلې دواړو خواوو ته څو جزه مشابه او ثابت عددونه وجود ولري؛ کولای شو مجهول عددونه د مساوات يوې خوا ته او معلوم اعداد د مساوات بلې خوا ته انتقال کړو، د ارجاع نه وروسته په $ax = b$ شکل راځي او وروسته

مجهول پیدا کړي.

اوله درجه یو مجهوله معادلې په لاندې شکلونو راتلای شي، چې هر یو تر مطالعې لاندې نیسو.

۱- پولینومي معادلې (کسري، غیر کسري، حرفي)

۲ - اوله درجه یو مجهوله جذري معادلې

اوله درجه یو مجهوله پولینومي معادلې

$$6x + 3 = 11 + 2x$$

$$6x - 2x + 11 - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{8}{4} \Rightarrow x = 2$$

امتحان: په معادله کې د $x = 2$ په اېښودلو باید د مساوات دواړه طرفونه برابر شي.

$$6(2) + 3 = (11) + 2(2) \Rightarrow 12 + 3 = 11 + 4$$

$$15 = 15$$

یو مجهوله کسري معادلې

$$\frac{4x-3}{2x} = \frac{1}{2}$$

$$2x \frac{(4x-3)}{2x} = \frac{1}{2} (2x) \Rightarrow 4x - 3 =$$

$$4x - x = 3 \Rightarrow x = 1$$

$$\frac{2}{x-1} + \frac{4}{x-1} = \frac{3}{x+1}$$

$$\frac{2+4}{x-1} = \frac{3}{x+1} \Rightarrow \frac{6}{x-1} = \frac{3}{x+1}$$

$$3(x-1) = 6(x+1) \Rightarrow 3x - 3 = 6x + 6$$

$$6x - 3x = -3 - 9$$

$$3x = -9 \Rightarrow x = -3$$

اوله درجه یو مجهوله حرفي معادلې

$$2(m-1)(x+1) = (m+2)(x-1)$$

$$(2m-2)(x+1) = (m+2)(x-1)$$

$$2mx + 2m - 2x - 2 = mx - m + 2x - 2$$

$$2mx - mx - 2x - 2x = -m - 2m$$

$$mx - 4x = -3m$$

$$x(m-4) = -3m \Rightarrow x = \frac{-3m}{m-4}$$

$$m \neq 4$$

د dx معادله $cx - \frac{4}{C} = d$ د x لپاره یې حل

$$\frac{c^2x - 4}{c} = d - dx$$

$$c^2x - 4 = cd - dx \Rightarrow c^2x + cdx = cd + 4$$

$$x = \frac{cd + 4}{c^2 + cd}$$

$$c^2 + cd \neq 0$$

$$c \neq 0$$

$$c \neq -d$$

مناقشه وکړئ؟

د $c \neq 0, c = -d$ په استثنا د c او d ټولو قیمتونو ته پاسنۍ معادله قیمت لري، ځکه په دغو قیمتونو باندې ټاکلی حل نه لري. لاندې پولینومي معادلې حل کړئ!

$$1) 2x - 2 = 3x + 6$$

$$2) 2(5x - 4) = x + 13$$

$$3) 2x(2 + x) + 3 = x(2x + 1)$$

$$4) -10x + 3 = 6x + 7$$

$$5) (x + 20)(x + 1) = (x - 2)(8x - 4)$$

$$6) 16x - 5(2x - 3) = 23 + 7(6x + 4)$$

$$7) 3,5 - 0,5(3x - 2), 20 = 2,5x - 0,2(5x - 8)$$

$$8) \frac{3x + 4}{2} - x = 5$$

$$9) \frac{x(x + 2)}{2(2 + x)} = \frac{x}{2}$$

$$10) 5 + \frac{3x}{x - 3} = \frac{9}{x - 3}$$

$$11) \frac{9}{x + 2} - \frac{8}{x} = \frac{7}{x}$$

$$12) \frac{x + 5}{x - 2} = \frac{x + 3}{x + 1}$$

$$13) \frac{2x}{5} - 3 = x + \frac{1}{3}$$

$$14) \frac{5x-3}{4} - \frac{2x+1}{3} = \frac{4x+5}{6} - 2$$

$$15) 3mx - 5b = 2x + 6, x = ?$$

$$16) 6abx + 4ab = 2ax + 3ab, x = ?$$

$$17) -\frac{5x-3}{5} - \frac{4x-1}{2} = \frac{1-3x}{3} + 2$$

$$18) \frac{m + w\sqrt{v}}{2g} = k, V = ?$$

$$19) P = 2I + 2W, W = ?$$

$$20) S = \frac{a}{I-r}, r = ?$$

$$21) F = q \cdot \frac{m_2 m_2}{d^2}, d = ?$$

$$22) V = \frac{1}{3} \pi r^2 h, h = ?$$

اوله درجه یو مجهوله جذري معادلې

د هغې معادلو د حل لپاره، چې مجهول یې تر جذر لاندې وي.

اول هغه افاده، چې تر جذر لاندې قرار لري د مساوات یو طرف ته انتقالوو وروسته د معادلې دواړه خواوې د جذري درجې په توان پورته کوو په هغه صورت کې، چې بیا هم افاده جذري پاتې شوه همدا عملیه تکرارو، چې په ټولیزه توګه یې جذر له منځه لاړ شي.

$$1) 2 \cdot \sqrt[3]{3x-1} = 4$$

$$\sqrt[3]{3x-1} = \frac{4}{2} = 2 \Rightarrow (\sqrt[3]{3x-1})^3 = (2)^3$$

$$3x-1=8 \Rightarrow 3x=9 \Rightarrow x=3$$

$$2) \sqrt{x+14} - \sqrt{3x-10} = 0$$

$$\sqrt{x+14} - \sqrt{3x-10} \Rightarrow \sqrt{(x+14)^2} = \sqrt{(3x-10)^2}$$

$$x+14=3x-10$$

$$2x=24 \Rightarrow x=12$$

$$2x = 24 \Rightarrow x = 12$$

$$3) \sqrt{5+x^2} - x = 1$$

$$(\sqrt{5+x^2})^2 = (x+1)^2$$

$$5+x^2 = x^2 + 2x + 1$$

$$2x = 4 \Rightarrow x = 2$$

$$4) \sqrt{\sqrt{x^2-1}} = \sqrt{x-1} \Rightarrow (\sqrt{\sqrt{x^2-1}})^2 = (\sqrt{x-1})^2$$

$$\sqrt{x^2-1} = x-1$$

$$x^2 - 1 = x^2 - 2x + 1$$

$$2x = 2$$

$$x = 1$$

لاندي جذري معادلې حل کړئ؟

$$1) \sqrt[3]{2x+7} = 2$$

$$2) \sqrt{x^2+2x-2} = x$$

$$3) \sqrt{\frac{2x+1}{x}} - \sqrt{\frac{2x1}{x+3}} = 0$$

$$4) \sqrt{2+\sqrt{x^2-5}} = \sqrt{x+1}$$

$$5) \sqrt{x-1} - 6 = -3$$

$$6) \sqrt[3]{\sqrt{x-2}} = 4$$

$$7) \sqrt{4x^2-16} = 2x-2$$

$$8) (2x-1)^{\frac{4}{3}} = 4x-2$$

$$9) x + \sqrt{x^2-9} = 21$$

$$10) \sqrt{x^2+3} = 9+x$$

$$11) \sqrt{x^2+5} + 1 = x$$

$$12) \sqrt{x+3} - \sqrt{x-1} = 1$$

$$13) \sqrt{x-4} + 2 = \sqrt{x+2}$$

د اولې درجې یو مجهوله معادلو د مسایلو عبارتي حل

د معادلو د تشکیل طریقې: معادلې د ریاضیاتو یو مهم قسمت تشکیلوي او زیات مسائل د هغې په واسطه حل کېږي. کولای شو د دې لپاره، چې د مسائلو په حل کې له معادلو څخه سمه ګټه واخلو؛ لازمه ده، چې د پوښتنو د شرایطو مطابق الجبري جملې تشکیل کړو او وروسته د معادلې شکل ته راوړل شي. د موضوع د توضیح لپاره لاندې مثالونه په نظر کې نیسو.

مثال: د دوو عددونو مجموعه 37 او تر منځ فرق یې 5 دی اعداد پیدا کړئ!

حل: د سوال د متن مطابق

کوچنی عدد $x \rightarrow$

لوی عدد $x+5 \rightarrow$

د دوو عددونو مجموعه $x+x+5=37$

$$2x+5=37$$

$$2x=37-5 \rightarrow 2x=32$$

$$x=16$$

مثال: د دوو عددونو د جمع حاصل 19 دی که د لوی عدد له دوه چنده څخه کوچنی

عدد تفریق شي 17 باقي کېږي، تاسې اعداد معلوم کړئ!

حل: نظر د سوال متن ته

کوچنی عدد $x \rightarrow$

لوی عدد $19-x \rightarrow$

د معادلې تشکیل

$$2x-(19-x)=17$$

$$2x-19+x=17$$

$$3x=17+19$$

$$3x=36 \rightarrow x=12$$

$$19-12=7$$

مثال: کوم عددونه د $\frac{3}{11}$ کسر له صورت او مخرج سره جمع کړو، چې $\frac{2}{3}$ کسر لاس ته راشي.

د سوال مطابق

$$\frac{3+x}{11+x} = \frac{2}{3} \rightarrow 22+2x=9+3x$$

$$3x-2x=22-9 \rightarrow x=13$$

مثال: یو شخص 1000 افغانۍ په گټه کې واچولې، داسې چې د هغې یوه برخه په 3% نرخ او د هغې بله برخه په 5% نرخ تعین شوې؛ هر کله چې د هغې مجموعې ربح 46 افغانۍ شي، د سرمایې د هرې برخې د گټې مقدار، چې مرابحې ته اچول شوی، معلوم کړئ!
حل: د سوال د متن مطابق

اوله سرمایه x

د هغې ربح $\frac{3}{100}x$

د دویمې سرمایې ربح + د اولي سرمایې ربح = 46

دویمه سرمایه $1000 - x$

ربح $\frac{5}{100}(1000 - x)$

$$\frac{3x}{100} + \frac{5000 - 5x}{100} = 46$$

$$3x - 5x = 4600 - 5000$$

$$-2x = -400 \rightarrow x = 200$$

$$1000 - 200 = 800$$

تقرین

لاندې سوالونه حل کړئ!!

- ۱- د 54 عدد داسې په دوه حصو تقسیم کړئ، چې د لوی عدد څلور چنده د کوچني عدد له پینځه چنده سره مساوي شي؟
- ۲- د یو کیلو ګرام چایو قیمت 36 افغانۍ د یو کیلوګرام بورې له قیمت څخه زیات دی که د 10Kg چای او 12Kg بورې مجموعي قیمت 1284 افغانۍ وي، د یو کیلو ګرام چای او بورې قیمت معلوم کړئ؟
- ۳- که د پلار عمر 43 کاله وي او د زوی عمر 23 کاله وي، معلوم کړئ، چې وروسته له څو کالو د پلار عمر د زوی دو چنده کېږي؟
- ۴- د فردوس درمل 400gr د سلفوریک اسید محلول او اوبه لري، چې 25% د اسیدو لرونکي دي، کوم مقدار اوبو ته پراس ورکړي، چې 50% سلفوریک اسید محلول لاسته راوړي؟
- ۵- څومره اوبه له هغه 300gr ګرامه محلول څخه، چې په سلو کې 2 مالګه پراس ولري، چې داسې یو محلول ورڅخه ترلاسه شي، چې په سلو کې 3 مالګه ولري؟
- ۶- د دوو عددونو تر منځ فرق 12 دی او حاصل جمع یې 49 ده اعداد معلوم کړئ؟
- ۷- 721 افغانۍ د درې تنو تر منځ داسې ووېشلې، چې لومړي ته د دوهم په پرتله دوه برابره او دویم ته د درېیم تن دوه برابره ورسېږي؟

اوله درجه دوه مجهوله معادلې

هغه معادلې، چې د دوو مجهولونو لرونکې وي او د مجهولونو درجه یې یو وي د اوله درجه دوه مجهوله معادلو په نوم یادېږي. یوه اوله درجه دوه مجهوله معادله بې نهایت حلونه لري

$$\text{مثلاً: } x + 2y = 8$$

$$\begin{array}{cccccc} x=0 & x=1 & x=-1 & x=2 & x=4 \\ y=4 & y=\frac{7}{2} & y=4,5 & y=6 & y=2 \end{array}$$

د اوله درجه دوه مجهوله معادلو عمومي شکل $ax + by + c = 0$ دی، چې په هغې کې a, b, c د همزمانه یواځیني حل لپاره په اوله درجه دوه مجهوله معادلو کې د معادلو سیستم ته اړتیا ده، یانې دوه مجهوله په دوو معادلو کې، درې مجهوله په درېو معادلو کې او n مجهوله په n معادلو کې.

د اولې درجې دوه مجهوله معادلو سیستم

د هغې کلي شکل

$$a_1x + b_1y = C_1$$

$$a_2x + a_2y = C_2$$

د اولې درجې دوه مجهوله معادلو حل: د دې سیستم حل په رنگارنگ شکلونو ممکن دی، چې په څو مثالونو کې یې توضیح کوو.
مثال:

$$\begin{cases} 4x + 2y = 8 \\ 5x - y = 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 4x + 2 = 8 \\ 5x - y = 3 \end{cases}$$

$$20x + 10 = 40 \dots\dots\dots I$$

$$\pm 20x \mp 4y = \pm 12 \dots\dots\dots II$$

$$14y = 28$$

$$y = 2$$

د I معادله له II څخه منفي کوو

د Y قیمت له پورته معادلو څخه په یوې کې وضع کوو د x قیمت حاصلېږي.

$$4x + 2(2) = 8$$

$$4x + 4 = 8$$

$$4x = 4$$

$$x = 1$$

د پورته سیستم د حل سیټ $A = \{1, 2\}$

د تعویض په طریقه د اولې درجې دوه مجهوله معادلو حل

په دې حالت کې یو مجهول له یوې معادلې څخه په لاس راوړو، په بله معادله کې یې وضع کوو، د بل مجهول حل ته رسېږو.

مثال:

$$4x + 3y = 6 \dots\dots\dots I$$

$$5x + 4y = 7 \dots\dots\dots II$$

I

II

$$4x + 3y = 6$$

$$4\left(\frac{6-3y}{4}\right) + 4y = 7$$

$$4x = 6 - 3y$$

$$30 - 15y + 16y = 28$$

$$x = \frac{6-3y}{4} \dots\dots\dots III$$

$$y = 28 - 30 = -2$$

$$y = -2$$

دا قیمت له I , II , III څخه په یوې معادله کې ږدو د x قیمت راکوي.

$$x = \frac{6-3(-2)}{4} = \frac{12}{4} = 3$$

$$x = 3$$

$$B = \{3, -2\}$$

۳- د مساوات په طریقو حل: په دې حالت مجهول په دواړو معادلو کې په نظر کې نیسو.

مثال:

$$3x - 2y = 1 \dots\dots\dots I$$

$$2x - y = 4 \dots\dots\dots II$$

$$3x = 2y + 1(I)$$

$$x = \frac{2y+1}{3}$$

$$2x = y + 4(II)$$

$$x = \frac{y+4}{2}$$

$$x = x$$

$$\frac{2y+1}{3} = \frac{y+4}{2}$$

$$2(2y+1) = 3(y+4)$$

$$4y+2 = 3y+12$$

له پورته معادلو څخه په یوه کې د دې قیمت په اېښودو x پیدا کوو.

$$y = 10$$

$$x = \frac{2(10)+1}{3} = \frac{21}{3} = 7$$


$$x = 7$$

$$C = \{7, 10\}$$

د اولې درجې دوه مجهوله معادلو حل


که اوله درجه دوه مجهوله معادله د y لپاره حل کړو؛ یعنې $y = f(x)$, $y = ax + b$ فرض کړو واضح ده، چې د x د متحول په هر قیمت سره د y د متحول قیمت سره یوځای کېږي، په دې حالت کې د (y, x) مرتبې جوړې د حقیقي اعدادو څخه لاسته راځي، که دغه مرتبې جوړې د وضعیه کمیاتو قایم ته انتقال کړو؛ نو هره مرتبه جوړه یو ټکی په گوته کوي، د دغو ټکو د نښلولو څخه د تابع گراف جوړېږي. دا چې پورتنۍ تابع لومړۍ درجه اوله تابع ده؛ نو گراف یې یوه کرښه ده، نوموړې تابع ته خطي تابع ویل کېږي.

مثال: د $2y + 4x = 2$ گراف داسې رسم کړئ، چې $y = f(x)$ دی.
حل: څرنگه چې پورته اوله درجه تابع ده؛ نو د هغې گراف مستقیم خط دی، چې کېدای شي له دوه یا ډېرو نقطو څخه تشکیل شي.




په محورونو باندې تقاطع

د $y = 2x + 1$ معادلې خطي گراف رسم کړئ!
حل: له پورته معادلې سره سم عمل کوو.



په محورونو باندې تقاطع

$$\begin{array}{c|c} x & 0, -\frac{1}{2} \\ \hline y & 1, 0 \end{array}$$



$$\begin{array}{c|c} x & -1, 0, 1 \\ \hline y & -2, 0, 2 \end{array}$$

د لاندې تابع گراف رسم کړئ!

تمرین

د لاندې توابعو گراف رسم کړئ!

1) $2y + 4 = 8x$

2) $y = 2x - 2$

3) $3x + y = 12$

4) $x - y = 4y - \frac{2}{3}x$

5) $\frac{2}{3}y + 2x = \frac{1}{2}$

6) $4x - \frac{1}{2} = -y + 1$

د گراف په واسطه د دوه مجهوله معادلو د سیستم حل


پوهېږو چې د اوله درجه دوه مجهوله معادلو سیستم له دوه معادلو څخه تشکیلېږي، یعنې:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \dots\dots\dots I \\ a_2x + b_2y = c_2, \dots\dots\dots II \end{cases}$$

نو هر یو مستقیم خط د وضعیه کمیاتو د مستوي د پاسه قایم تشکیلوي. په هغه حالت کې، چې دا دوه خطونه په خپلو کې یو بل قطع کړي د تقاطع نقطه یې یعنې (x, y) د هغې همزمان حل دی.

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 2x - y = -4 \end{cases}$$

مثال: د لاندې معادلو سیستم د گراف په طریقو حل کړئ!
حل: د یادو معادلو څخه د هرې یوې گراف رسم کړئ!



گرافونو ته په کتو د خطونو مشترکه نقطه $(-3, -2)$ ده؛ یعنې د یاد سیستم $y = -2, x = -3$ همزمان حل دی.

خطونو سیستم ممکن منطبق یا موازي وي. د سیستم د موازي کېدو په حالت کې حل نه لري او د منطبق کېدو په حالت کې سیستم د لایتناهي لرونکی دی، ټاکلی حل نه لري.

د دې لپاره چې پوه شو خطونه متقاطع، موازي که منطبق دي د سیستم د ضریبونو په منځ کې رابطې په لاندې ډول دي:

$$\frac{a1}{a2} = \frac{b1}{b2} \neq \frac{c1}{c2}$$

سیستم حل نه لري، خطونه موازي دي:


$$\frac{a1}{a2} = \frac{b1}{b2} = \frac{c1}{c2}$$

سیستم بی نهایت حل لري، خطونه منطبق دي:

$$\frac{a1}{a2} \neq \frac{b1}{b2}$$

د لومړۍ موضوع مثال:


$$\begin{cases} x - y = 3 \dots\dots\dots I \\ 2x - 2y = 8 \dots\dots\dots II \end{cases}$$



$$\begin{array}{l} I \dots\dots\dots \begin{array}{c|c} x & 0,3 \\ y & -3,0 \end{array} \\ II \dots\dots\dots \begin{array}{c|c} x & 0,4 \\ y & -4,0 \end{array} \end{array}$$

د دویمې موضوع مثال:

$$\begin{cases} 2x - 4y = 6 \dots\dots\dots I \\ x - 2y = 3 \dots\dots\dots II \end{cases}$$



$$\begin{array}{l} I \dots\dots\dots \begin{array}{c|c} x & 0,3 \\ y & -3/2,0 \end{array} \\ II \dots\dots\dots \begin{array}{c|c} x & 0,4 \\ y & -3/2,0 \end{array} \end{array}$$

سوالونه

د ضرابو د جوړولو په طريقه د لاندې د وه مجهوله معادلو سيستم حل کړئ!

$$1) \begin{cases} x+2y=2 \\ x-4y=1 \end{cases} \quad \begin{cases} 3a+b=a \\ 4b=22-5a \end{cases} \quad \begin{cases} x+y=3 \\ x-y=1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x+4y=18 \\ 5x-y=7 \end{cases} \quad \begin{cases} 4x+3y=3 \\ 6x+15y=-2 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x+y=3a+b \\ 3x-y=2a+4b \end{cases}$$

په تعويضي طريقه يې حل کړئ :

$$\begin{cases} y=2x \\ x+y=6 \end{cases} \quad \begin{cases} x+6y=2 \\ \frac{2}{3}x-4y=7 \end{cases} \quad \begin{cases} x=2-2y \\ 2x-3y=25 \end{cases}$$

د مساوات په طريقه يې حل کړئ:

$$\begin{cases} x-2y=5 \\ 5x=y-2 \end{cases} \quad \begin{cases} 4x-5y=17 \\ 2x+3y=3 \end{cases} \quad \begin{cases} 3a-2b=-19 \\ 2a+5b=0 \end{cases}$$

لاندې عبارتي مسايل حل کړئ:

- ۱- د دوو عددونو د جمع حاصل 5 او د تفريق حاصل يې 3 دی، عددونه پيدا کړئ!
- ۲- دوه عددونه پيدا کړئ، چې د لوی عدد دوه چنده د کوچني عدد له درې چنده څخه د 10 په اندازه لوی او $\frac{1}{5}$ حصه د لوی عدد له $\frac{1}{3}$ حصه د کوچني عدد څخه د 20 په اندازه کوچنۍ وي ؟

- ۳- د دوو عددونو د مربعاتو د تفريق حاصل 56 او د تفريق حاصل يې 4 دی، عددونه پيدا کړئ!

- ۴- احمد دوه رقمه پسته لري؛ يو ډول پسته يو کيلو گرام په 90 افغانۍ او دويم ډول يو کيلوگرام 60 افغانۍ قيمت لري. هغه غواړي 56 کيلو گرامه مخلوط جوړکړي، د هر کيلو گرام پستې څخه څو کيلو گرامه په کار ده ؟

- ۵- کچر او خر هر يو څو کيلو گرامه وزن انتقالوي. که چېرې د کچر بار 100 کيلو گرامه د خره د بار له وزن نه زيات شي، د خره د بار دوه چنده د کچر بار کېږي او که د خره د بار وزن 100 کيلو گرامه د کچر د بار له وزن څخه زيات شي، د کچر د بار وزن څوچنده د خره د بار د وزن کېږي ؟

- ۶- يو دهقان څو کورني چرگان او څو سويان لري. که چېرې چرگان او سويان 50 سرونه او 140 پښې ولري ؟

د اولې درجې درې مجهوله معادلو د حل سیستمونه

د اوله درجه درې مجهوله معادلو عمومي شکل:

$$a_1x + b_1y + c_1z = d_1$$

$$a_2x + b_2y + c_2z = d_2$$

$$a_3x + b_3y + c_3z = d_3$$

په پورته سیستم کې x, y, z مجهولات دي او a_1, a_2, a_3 ، b_1, b_2, b_3 او c_1, c_2, c_3 ثابتې معادلې دي. اوله درجه درې مجهوله معادلې د افنا د طریقي پواسطه د اوله درجه دوه مجهوله معادلو په څیر تعویضي حل کولای شو. په دې ځای کې غواړو څو مثالونه په افنا او تعویضي طریقه حل کړو.

مثال : دغه سیستم په تعویضي طریقه حلوو .

$$x + 6y + 3z = 4 \dots\dots\dots I$$

$$2x + y + 2z = 3 \dots\dots\dots II$$

$$3x - 2y + z = 0 \dots\dots\dots III$$

حل: د x قیمت له I معادلې نه د y او z له جنس څخه په لاس راوړو .

$$x = -6y - 3z + 4 \dots\dots\dots IV$$

د x قیمت په II او III معادله کې ځای پر ځای کوو.

$$2(-6y - 3z + 4) + y + 2z = 3$$

$$-12y - 6z + 8 + y + 2z = 3$$

$$-11y - 4z = -5 \dots\dots\dots V$$

د x قیمت په III معادله کې ځای پر ځای کوو.

$$3(-6y - 3z + 4) - 2y + z = 0$$

$$-20y - 8z = -12 \dots\dots\dots VI$$

V او VI معادلې د y او z له جنس څخه د دوه مجهوله معادلو یو سیستم جوړوي.

$$-11y - 4z = -5 \dots\dots\dots V$$

$$-20y - 8z = -12 \dots\dots\dots VI$$

د پورته سیستم د حل لپاره د یو مجهول قیمت فرضاً z له V معادلې څخه په لاس راوړو او هغه په VI کې وضع کوو.

$$-11y - 4z = -5 \rightarrow -4z = -5 + 11y$$

$$z = \frac{-5 + 11y}{-4} = \frac{-11 + 5}{4} \dots\dots\dots VII$$

اوس کولای شو ولیکو چې:

$$-20y - 8\left(\frac{-11y+5}{4}\right) = -12 \Rightarrow -20y + 22y - 10 = -12$$

$$2y = -2$$

$$y = -1$$

د y قیمت په VI معادله کې وضع کوو او د z قیمت پیدا کوو.

$$z = \frac{-11y+5}{4} = \frac{-11(-1)+5}{4} = \frac{11+5}{4} = \frac{16}{4} = 4$$

که د y او z قیمتونه په IV معادله کې وضع کړو؛ د x قیمت پیدا کېږي.

$$x = -6y - 3z = 4 \dots \dots \dots IV$$

$$x = 6 - 12 + 4 = -2$$

$$x = -2$$

په نتیجه کې د پورته معادلو د حل سیستم عبارت دی له $x = -2, y = -1, z = 4$.

د افنا په طریقه حل

د اوله درجه درې مجهوله معادلو د سیستم په حل کې له مجهولاتو څخه یو افنا کېږي.

وروسته د اوله درجه دوه مجهوله معادلو د سیستم په څېر عمل کېږي او مجهولات پیدا کېږي.

سوالونه: لاندې سیستمونه په افنا او تعویضي طریقه حل کړئ .

$$1) \begin{cases} 2x - y + 2z = -6 \\ x + 2y - 3z = 9 \\ 3x - y - 4z = 3 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} 2x - 2y + 4z = 0 \\ -x + 2y - 3z = 1 \\ 2x - 2y - z = -3 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} x - 2y + 3z = 10 \\ 2x + 3y + 4z = -16 \\ 3x - 4y + 5z = 6 \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} 2x - y + 3z = 5 \\ x + 2y + z = -2 \\ 3x + 2y - 2z = 7 \end{cases}$$

$$5) \begin{cases} x + 2y - z = -3 \\ 2x + 3y + 4z = -16 \\ 3x - 4y + 5z = 16 \end{cases}$$

$$6) \begin{cases} y - 3z = -7 - 2x \\ 4y - x = -7 - z \\ 3x = 4 + 2y + 2z \end{cases}$$

دویمه درجه یو مجهوله معادلې

$ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$ د دې معادلو عمومي شکل دی، داسې چې a, b, c ثابت اعداد، x دویمه درجه مجهول او متحول دی.

خصوصي حالتونه

- ۱- که چېرې $a=0$ وي معادله $bx + c = 0$ د اولې درجې شکل غوره کوي، البته د اولې درجې یو مجهوله معادلو په حل پوهېږئ.
- ۲- که $b=0$ وي معادله دا $ax^2 + c = 0$ شکل اختیاروي، چې په دې حالت کې معادله د دوه حقيقي مخالف اشاره جذرونو لرونکې ده.

۱ مثال

$$4x^2 - 100 = 0 \rightarrow 4x^2 = 100 \rightarrow x^2 = \frac{100}{4} = 25$$

$$x^2 = 25 \rightarrow x = \pm 5$$

- ۳- که چېرې $c=0$ وي معادله د $ax^2 + bx = 0$ شکل لري، چې په دې حالت کې معادله د دوه حقيقي جذرونو لرونکې ده، یو له هغو څخه صفر اوبل یې $x_2 = -\frac{b}{a}$ دی.

مثال

$$2x^2 + 5x = 0 \rightarrow x(2x + 5) = 0$$

$$x = 0$$

$$2x + 5 = 0 \rightarrow 2x = -5$$

$$x = \frac{-5}{2}$$

د دویمې درجې یو مجهوله معادلو حل

۱- د تجزیې په طریقه حل

د پولینومونو له تجزیې نه په استفادې، چې له هغې سره بلد یاست، هرکله چې یوه دویمه درجه یو مجهوله معادله د تجزیې قابل وي؛ کولای شو د هغې جذرونه پیدا کړو.

مثالونه

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$x - 1 = 0$$

$$x = 1$$

$$x - 2 = 0$$

$$x = 2$$

$$\sqrt{x^2 - 5x} = 6$$

$$x^2 - 5x = 36$$

$$x^2 - 5x - 36 = 0$$

$$(x - 9)(x + 4) = 0$$

$$x - 9 = 0$$

$$x = 9$$

$$x + 4 = 0$$

$$x = -4$$

لاندې معادلې د تجزيې په طريقه حل کړئ؟

$$1 - 3x^2 - 10x = 0$$

$$2 - x^2 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{8} = 0$$

$$3 - x^2 - 16 = 0$$

$$4 - 2(x^2 + 20) = 21x$$

$$5 - x^2 - x - 56 = 0$$

$$6 - 26 = 31x + 5x^2$$

له تکميل مربع نه په گټه اخيستو تجزيه حل کړئ؟

$$1 - 3x^2 - 8x = 0$$

$$2 - x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{1}{8} = 0$$

$$3 - 2x(x + 10) = 15 + x$$

$$4 - 18 + 5x^2 + 33x$$

$$5 - 4x + 1 + 3x = 0$$

$$6 - 2x^2 + 3x - 1 = 0$$

د محمد بن موسي خوارزمي د فورمول په طريقه حل

پوهېږو، چې د درېيمه درجه يو مجهوله معادلو عمومي شکل $ax^2 + bx + c = 0$ دی،

البته $a \neq 0$ وي له تکميل مربع نه په گټه اخيستو:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{c}{a} - \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = 0$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - (b^2 - 4ac) = 0$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{2a}}$$

$$x = \frac{-b}{2a} \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{2a}}$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

د عملیاتو د اسانتیا لپاره $b^2 - 4a = \Delta$ وضع کوو (Δ) ممیزه یا قایمه نومېږي، چې لاندې امکانات په کې شاملېږي.

۱- که $\Delta > 0$ وي معادله د دوو مختلفو حقيقي جذرونو لرونکې ده، یعنې:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

۲- هر کله چې $\Delta = 0$ وي معادله د یو مضاعف جذر لرونکې ده، یعنې:

$$x_1, x_2 = \frac{-b}{2a}$$

۳- که چېرې $\Delta < 0$ وي، معادله حقيقي جذر نه لري. په دې حالت کې معادله د دوه مختلط جذرونو لرونکې ده.

که چېرې $\Delta > 0$ او $a > 0$ وي، $y = ax^2 + bx + c$ ترینوم گراف د x محور په دوه نقطو کې قطع کوي.

د لاندې معادلو جذرونه د محمد بن موسی د فورمول پواسطه پیدا کړئ:

$$1) x^2 + x - 6 = 0 \quad a = 1, b = 1, c = -6$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (1)^2 - 4(-6).1 = 25$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 + \sqrt{25}}{2(1)} = \frac{-1 + 5}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 - \sqrt{25}}{2 \cdot 1} = \frac{-1 - 5}{2} = \frac{-6}{2} = -3$$

$$A = \{x_1 = 2, x_2 = -3\} \text{ د حل سیټ}$$

$$2) x^2 + 6x + 9 = 0 \quad a = 1, b = 6, c = 9$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (6)^2 - 4(1)(9) = 36 - 36 = 0$$

$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-6 \pm 0}{2} = -3$$

$$x_1 = x_2 = -3$$

دویمه درجه یو مجهوله جذري معادلې

د هغې معادلو د حل لپاره چې مجهول تر جذر لاندې واقع وي، اول هغه افاده، چې د جذر لاندې ده یو طرف ته انتقالوو، وروسته د معادلې دواړه خواوې د جذر د درجې په توان پورته وړو، چې په دې حالت کې جذر له منځه ځي او د معادلې ځواب په لاس راوړو. که اړتیا وي، کولی شو څو ځله د معادلې اطراف د جذر د درجې په توان پورته یوسو.

مثال: د لاندې معادلو جذرونه په لاس راوړئ!

$$1 - \sqrt{3x+10} = x+4$$

$$(\sqrt{3x+10})^2 = (x+4)^2$$

$$3x+10 = x^2 + 8x + 16$$

$$x^2 + 5x + 6 = 0$$

$$(x+2)(x+3) = 0$$

$$x+2=0, x_1 = -2$$

$$x+3=0, x_2 = -3$$

$$2 - \sqrt{x}\sqrt{2x-3} = 3$$

$$(\sqrt{x}\sqrt{2x-3})^2 = (3)^2$$

$$x(2x-3) = 9$$

$$2x^2 - 3x = 9$$

$$2x^2 - 3x - 9 = 0$$

$$2x^2 - 6x + 3x - 9 = 0$$

$$2x(x-3) + 3(x-3) = 0$$

$$(x-3)(2x+3) = 0$$

$$x-3=0, x=3$$

$$2x+3=0, x = -\frac{3}{2}$$

نوټ: باید ووايو، چې په جذري معادلو کې حاصل شوي جذرونه حتماً امتحان کړو؛ ځکه په دې ډول معادلو کې په لاس راغلي ځينې جذرونه د قبول وړ نه دي.

لاندې عبارتي مسايل حل کړئ؟

۱ - د دوو عددونو د جمع حاصل 16 او د ضرب حاصل يې 63 دی، عددونه لاس ته راوړئ؟

۲ - د دوو طاووسو مسلسلو عددونو د ضرب حاصل 323 دی، اعداد پيدا کړئ؟

۳ - د يو مثلث قاعده نظر ارتفاع ته 4cm زياته ده معلومه کړئ، چې ارتفاع بايد کومه اندازه وي؛ تر څو د مثلث مساحت 10.5Cm² شي؟

۴ - که د يوه عدد مربع پينځه چنده د هماغه عدد مساوي په 36 شي، اعداد پيدا کړئ؟

۵ - د يو قايم الزاويه مثلث يوه ضلع 7Cm او بله نيمه قايمه ضلع د 13 په اندازه له وتر نه کمه ده، د مثلث مساحت پيدا کړئ؟

۶ - د يو مستطيل طول نظر د هغې عرض ته 3m لوی دی، د مستطيل عرض داسې تعين کړئ، چې د هغې مساحت 40m² شي؟

۷ - په $2x^2 - 4x + 1 = 0$ معادله کې x داسې تعين کړئ، چې:

a- معادله دوه حقيقي جذرونه ولري.

b- معادله يواځې يو حقيقي جذر ولري.

c- معادله هېڅ حقيقي جذر نه لري.

۸ - احمد ۵ کاله له محمود نه لوی دی. د عمر حاصل ضرب یې 100 کېږي، د هر یوه

عمر پیدا کړئ؟

۹ - د دوو عددونو مجموعه 7 او د مربعاتو مجموعه یې 25 ده، عددونه کوم دي؟

درېیمه درجه معادلې

$a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 = 0$ د درېیمه درجه معادلو عمومي شکل دی، چې a_3, a_2, a_1, a_0

ثابت حقيقي او x د معادلې مجهول دی. البته $a_3 \neq 0$

$$a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 = 0$$

$$a_3x^3 + a_2x^2 = 0 \quad a_1 = 0, a_0 = 0$$

$$a_3x^3 + a_2x^2 + a_0 = 0, a_1 = 0$$

$$a_3x^3 + a_2x^2 = 0, a_1 = 0$$

$$a_3x^3 + a_1x + a_0 = 0, a_2 = 0$$

$$a_3x^3 + a_1x + a_0 = 0 \rightarrow a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 = 0$$

$$a_3x^3 + a_0 = 0$$

پورته معادلو ته مکعبي معادلې هم وایي.

څرنگه چې $a_3 \neq 0$ دی؛ نو کولای شو مکعبه معادله په a_3 تقسیم کړو، چې لاندې شکل

اختیاروي.

$$x^3 + \frac{a_2}{a_3}x^2 + \frac{a_1}{a_3}x + \frac{a_0}{a_3} = 0$$

د درېیمې درجې معادلو حل: له دویمه درجه معادلو څخه پوهېږو، چې د معادلې د

جذرونو او ضریبونو ترمنځ رابطه شتون لري.

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

په همدې ترتیب د درېیمه درجه معادلو د جذرونو او ضریبونو ترمنځ هم رابطه وجود لري.

$$x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{a_2}{a_3}$$

$$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = \frac{a_0}{a_3}$$

څرنگه چې د معادلو تیوري حکم کوي هغه معادلې، چې تاق درجه لري، حد اقل د یوه

حقيقي جذر لرونکې دي؛ نو درېیمه درجه معادلې حد اقل د یوه حقيقي جذر لرونکې دي،

چې کولای شو د معادلې د جذرونو او ضریبونو ترمنځ رابطې څخه یې پیدا کړو. څرنگه چې پورته یادونه وشوه، کولی شو له $\frac{a_4}{a_3}$ حقیقي جذرونو له فکتورنو څخه درېیمه درجه معادلې پیدا کړو

مثال: د مکعبی معادلې $6x^3 - 29x^2 + 14x + 24 = 0$ حقیقي جذر پیدا کړئ!

$$6x^3 - 29x^2 + 14x + 24 = 0$$

حل: د 24 عدد فکتورونه عبارت دي له:

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 8, \pm 12, \pm 24$$

د 6 فکتورونه عبارت دي له:

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$$

ممکنه نسبي جذرونه عبارت دي له:

$$\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{2}{1}, \frac{2}{2}, \frac{2}{3}, \frac{2}{6}, \frac{3}{1}, \frac{3}{2}, \frac{3}{3}, \frac{3}{6}, \frac{4}{1}, \frac{4}{2}, \frac{4}{3}, \frac{4}{6}, \frac{8}{1}, \frac{8}{2}, \frac{8}{3}, \frac{8}{6}, \frac{12}{1}, \frac{12}{2}, \frac{12}{3}, \frac{12}{6}, \frac{24}{1}, \frac{24}{2}, \frac{24}{3}, \frac{24}{6}$$

دا شمېر عددونه زیات دي، سربېره پر دې اول تام عددونه امتحانوو، پس له امتحانه لیدل کېږي، چې 4 عدد یو د یادې معادلې له جذرونو څخه دی، چې لاندې لیدل کېږي.

$$\begin{array}{r|l} 6 & -29 & +14 & +24 & 4 \\ & 24 & -20 & -24 & \\ \hline 6 & -5 & -6 & 0 & \end{array}$$

له ترکیبي تقسیم څخه نتیجه اخلو، چې د پورته مکعبی معادلې دویم فکتور:

$$6x^2 - 5x - 6 = 0 \text{ دی.}$$

$$(2x-3)(3x+2) = 0$$

$$x_1 = \frac{3}{2}, x_2 = -\frac{2}{3}$$

د حالیه سیټ په منځ کې یاده مکعبه معادله:

$$A = \left\{ 4, \frac{3}{2}, -\frac{2}{3} \right\} \text{ حالیه سیټ}$$

مثال: د $x^3 - x - 6 = 0$ معادلې حقيقي جذرونه

د 6 عدد فکتورونه عبارت دي له:

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$$

وروسته له امتحانه لیدل کېږي، چې د یادې مکعبې معادلې حقيقي جذر 2 دی.

$$\begin{array}{cccc|c} 6 & 0 & -1 & -6 & 2 \\ 2 & 4 & 6 & & \\ \hline 1 & 2 & 3 & 0 & \end{array}$$

د $x^2 + 2x + 3$ پورته مکعبې معادلې دویم فکتور دی.

$$x_1, x_2 = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 12}}{2}$$

نو یاده مکعبه معادله د یوه حقيقي او دوه مختلطو جذرونو لرونکې ده.

درېمه درجه تابع

ښکاري، چې $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ درېیمه درجه تابع ده، چې a, b, c او d ثابت عددونه، x مستقل متحول او y تابع متحول دی. د هغو نیمګړې ښې هم د $y = f(x)$ ډول بیانوي.

د درېیمې درجې تابع د گراف رسمول

د درېیمې درجې تابع د گراف د رسمولو لپاره له ټولو نه مخکې د تابع صفري نقطې پیدا کوو، ځکه صفري قیمتونه د گراف د رسمولو لپاره اسانتیا پیدا کوي. وروسته له دې د جذر لاندې او د جذرونو نه د باندي مناسب قیمتونه ټاکو، چې د تابع قیمتونه له هغې څخه پیدا شي.


له (x, y) څخه جوړې شوې مرتبې جوړې د محورونو د پاسه انتقالوو، د تابع گراف رسمېږي.

نوټ: له دې څخه د درېیمه درجه توابعو گراف له ډېرو دقیقو مشتقاتو نه په ګټه اخیستنې رسمولای شو. د اوس لپاره له مستقیمې قیمت گذارۍ څخه په مناسبو قیمتونو د

درېیمه درجه تابع گراف رسموو، چې چندان دقیق نه دی.

مثال: د $y = -x^3$ تابع گراف رسم کړئ!

x	-2	-1	0	1	-2
y	8	1	0	-1	-8



د درېیم څپرکي پوښتنې

د لاندې درېیمه درجه معادلو جذرونه پیدا کړئ، هغه تجزیه کړئ او وروسته د معادلې گراف رسم کړئ؟

1) $2x^3 - 5x^2 - 14x + 8 = 0$

2) $2x^3 + 3x^2 - 45x + 54 = 0$

3) $x^3 - 9x^2 + 26x - 24 = 0$

4) $6x^3 + 2x^2 - x - 4 = 0$

5) $30x^3 - x^2 - 76x + 15 = 0$

6) $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$

څلورم څپرکی

ردیفونه او سلسلې

ټولیزه موخه

پر ترادف او سلسله او د هغو پر ډولونو باندې پوهیدل او په اقتصادي مسایلو کې له هغوڅخه ګټه اخیستل.

د زده کړې موخې: محصلین به د دې څپرکي په پای کې په لاندې موضوعاتو پوهېږي:

- د ردیف او سلسلې د مفهوم درک او د ردیفونو او سلسلو په ډولونو پوهېدنه.
- د ردیفونو او سلسلو د قوانینو او اصولو په اړه پوهه او د عمومي ردیفونو او سلسلو د جمعې پیدا کول.
- د سلسلو د حاصل جمع لپاره د فورمولونو زده کول او د مسایلو په حل کې د هغې کارول.
- د سلسلو د ډول پیدا کولو په هکله پوهه او د سلسلو د جنس د ټاکلو په هکله د پوهانو د نظرونو کارول او د هغو تحلیل.

ردیفونه او سلسلې

هغه عددونه، چې تر یوې ټاکلې قاعدې لاندې یو پر بل پسي ترتیب شوي وي؛ ردیف

نومېږي، مثلاً:

$$a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n, \dots, I$$

$$2, 4, 8, 16, \dots, 2^n, \dots, II$$

$$1, 1, \frac{3}{4}, \frac{4}{8}, \dots, \frac{n}{2^{n-1}}, \dots, III$$

پورته ترتیبونه ردیفونه تشکیلوي او هر جز یې د ردیف یو حد دی.

که په یوه ردیف کې د هغې حدونه محدود وي؛ ټاکلی (معین) ردیف ورته ویل کېږي،
مثلاً:

$$\frac{1}{1}, \frac{1}{4}, \frac{1}{16}, \frac{1}{64}, \frac{1}{256}$$

هغه ردیف، چې حدونه یې محدود نه وي؛ نا ټاکلی (غیرمعین) ردیف ورته ویل کېږي،
مثلاً:

$$1, 3, 5, 7, 9, 11, \dots, 2^{n-1}$$

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots, \frac{1}{n}$$

د هر n لپاره له طبیعي عددونوڅخه یو ردیف ټاکل کېږي دا چې د عددونو شمېر لایتناهي دی؛ نو د ردیفونو د حدونو شمېر لایتناهي شو؛ بڼا د هغې اخري حد نه شو ټاکلی. د یوه ردیف عمومي جمله، یعنې a_n د یوه فورمول پواسطه تعریفېږي او د $n=1, 2, 3, \dots$ لپاره د هغې حدود لاسته راځي.

مثال: یو ردیف، چې د هغې عمومي جمله $a_n = \frac{1}{n^2}$ ده او $n \in N$ دی لیکو.

$$1, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{3^2}, \frac{1}{4^2}, \frac{1}{5^2}, \dots, \frac{1}{n^2}$$

په لاندې بڼه هم وړاندې کېږي.

$$1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}, \frac{1}{25}, \dots, \frac{1}{n^2}$$

د یوه ردیف عمومي حد ټاکل a_n

مثال: د n ام حد ردیف $1, 2, 4, 8, 16, \dots$ د عمومي حد د پیدا کېدو لپاره، لومړی باید د دوو متعاقبو دوو حدونو ترمنځ روابط مطالعه کړو. په پورته ردیف کې ښکاري، چې د دوو متعاقبو حدونو خارج قسمت 2 دی.

$$a_1 = 1 = 2^0$$

$$a_2 = 2 = 2^1$$

$$a_3 = 4 = 2^2$$

$$a_4 = 8 = 2^3$$

$$a_5 = 16 = 2^4$$

$$a_n = 2^{n-1}$$

حسابي او هندسي ردیفونه

حسابي ردیفونه: د دې $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n$ په څېر یو ردیف ته حسابي ردیف ویل کېږي.

داسې چې د هغې هر حد نظر خپل مخکیني حد ته د یوه مشخص او ثابت تفاضل لرونکی وي.

مثال: $1, 4, 7, 10, 13, 16, \dots$

$3 = 4 - 1$ د پورتنی ردیف تفاضل دی.

د $5 - 2 = -7$ ردیف تفاضل دی $2, -5, -12, -19, \dots$

په عمومي شکل حسابي ردیف د لاندې ترتیب لرونکی وي.

$$a_1, a_1 + d, a_1 + 2d, a_1 + 3d, a_1 + 4d, \dots, a_1 + (n-1)d$$

په پورته ردیف کې n طبیعي عدد دی، d د ردیف د دوه متعاقبونو تر منځ مشترک

تفاضل دی، په دې ځای کې d کولی شي مثبت، منفي او صفر وي.

$$a_n = a_1 + (n-1)d \text{ د یاد شوي ردیف عمومي جمله ده.}$$

تمرین: د لاندې ردیفونو مشترک تفاضل پیدا کړئ او د هغې عمومي جمله ولیکئ!

1) $-11, -7, -3, 1, 5, \dots$

2) $22, 19, 16, 13, \dots$

3) $25, (24, 5), 24, (23, 5), \dots$

$a_{20} = ? \quad a_{200} = ?$

4) $2, -1, -4, -7, \dots$

$a_n = -94, n = ?$

۵- که چېرې د یوه ردیف درېیم حد 7 وي او اووم حد یې 15 وي، پنځم حد یې پیدا کړئ!

۶- د پنځم سوال ردیف ولیکئ!

۷- د شپږم سوال 99 ام حد ردیف ولیکئ!

هندسي ردیفونه

یو ردیف ته هغه وخت هندسي ویل کېږي، چې د دوه متعاقبونو حدونو ترمنځ نسبت

یې مشخص او ثابت وي.

مثلاً: دا $a_1, a_1 r, a_1 r^2, a_1 r^3, \dots, a_1 r^{n-1}$ ردیف یو هندسي ردیف دی.

$3, 6, 12, 24, 48, \dots, 3r^{n-1}$

مثال:

$3, 3 \cdot 2^1, 3 \cdot 2^2, 3 \cdot 2^3, 3 \cdot 2^4, \dots, 3 \cdot 2^{n-1}$

د ردیف له عمومي شکل او پورته مثال څخه په لاس راځي، چې د یوه هندسي ردیف

n ام حد عبارت دی له:

$$a_n = (a_1 r^{n-1}) \quad n \in \mathbb{N}$$

تقرین

د ردیفونو عمومي جملي درکړل شوې دي؛ ردیفونه ولیکئ!

$$۱- a_n = \frac{1}{n+1} \text{ او } n \in N \text{ دى اته اول حدونه يې ولیکئ!}$$

$$۲- a_n(1+(-1)^n) \text{ , } n \in N \text{ د يوه ردیف عمومي جمله ده، ذکر شوى ردیف ولیکئ!}$$

۳- هغه ردیفونه، چې n ام حدونه يې درکړل شوى ولیکئ!

$$a^n = (1+(-1)^n)^n \text{ , } n \in N \quad a^n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \text{ , } n \in N$$

$$a^n = \left(\frac{(-1)^{n+1}}{n}\right)^n \text{ , } n \in N \quad a^n = \left(\frac{\sqrt{2}}{n+1}\right)^n \text{ , } n \in N$$

$$a^n = \left(\frac{1}{(3n-1)^2}\right)^n \text{ , } n \in N \quad a^n = \left(\frac{1}{n}\left(\frac{1}{5}\right)^n\right)^n \text{ , } n \in N$$

۴- که چېرته د يوه هندسي ردیف حد 4 او مشترک نسبت يې 4 وي، اتم حد په کار دى.

۵- که چېرته اول حد $\frac{1}{2}$ او مشترک نسبت يې $\frac{1}{2}$ وي په کار ده د هغې يوولسم حد او ردیف ولیکئ.

۶- اول حد 2 او دويم حد 6 او $a_n = 486$ ، n مطلوب دى.

۷- اول حد 3 او دويم حد 6 او $a_n = 96$ ، n مطلوب دى.

سلسلې

د تطبيقي رياضي په ساحه، اقتصاد، صنعت او نورو کې وروسته د ردیفونو د حدونو د جمعې حاصل ته اړتيا وي؛ نو لازمه ده، چې په اړه يې معلومات حاصل کړو.

د $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_{n-1}$ ردیف په نظر کې نيسو، د ردیف قسمي حاصل جمع عبارت دى له:

$$s_1 = a_1$$

$$s_2 = a_1 + a_2$$

$$s_3 = a_1 + a_2 + a_3$$

$$s_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$$

$$s_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_{n-1} + a_n$$

دا چې د يوه ردیف حدونه ډېر زيات دي؛ نو کولای شو د هغې د جمعې حاصل په پراخه او لنډ ډول وليکو، له يوناني توري؛ سگما څخه گټه اخلو.

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_{n-1} + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

له Σ دې ښکته او پورته علامې ښيي، چې k ټول تام اعداد له يوه څخه تر n ، K د اندکس په نامه يادېږي، کولای شو دې ته ورته I, j, n او له نورو هم گټه واخلو.

$$\sum_{k=1}^n 2k = \sum_{i=1}^n 2I = \sum_{j=1}^n 2j = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + 2n$$

$$\sum_{k=1}^n 5^k = 5^1 + 5^2 + 5^3 + \dots + 5^n$$

$$J = I = K = 1, 2, 3, \dots, n$$

مثال: دلاندي سلسلې د جمع حاصل د Σ په شکل وليکئ!

$$1 + 3 + 5 + 7 + \dots + 2^{n-1}$$

حل: دا چې $2n-1$ د پورته سلسلې عمومي جمله ده؛ نو ليکلی شو:

$$1 + 3 + 5 + 7 + \dots + 2n - 1 = \sum_{k=1}^n 2k - 1$$

حل: د $1 + 4 + 9 + 16 + \dots + n^2$ سلسلې د جمع حاصل د Σ په شکل وليکئ!

$$1 + 4 + 16 + \dots + (n-1)^2 + n^2 = \sum_{j=1}^n j^2$$

د $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ سلسلې د جمع حاصل بې نهايت دی، $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ اعداد د سلسلې حدونه دي او a_n د سلسلې عمومي جمله نومېږي.

هر کله چې $\sum_{k=1}^n a_k$ او $\sum_{k=1}^n b_k$ دوه سلسلې او c ثابت عدد وي، لاندي خاصيتونه يې د قسمي مجموعو لپاره سم دي.

$$\sum_{k=1}^n c = nc, \sum_{k=1}^n ca_k = c \sum_{k=1}^n a_k$$

$$c \sum_{k=1}^n (ak + bk) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

نوټ: د سکما مفهوم او قواعد د دې کتاب په لومړي څپرکي کې تفصيلي وړاندې شول.

تمرین: لاندي مجموعې پيدا کړئ!

$$\sum_{k=1}^3 \frac{2}{k+1}, \quad \sum_{j=1}^4 j^2, \quad \sum_{k=1}^{10} 2, \quad \sum_{l=1}^6 3i$$

$$\sum_{j=1}^5 \frac{j-1}{j+1}, \quad \sum_{n=1}^6 \frac{n^2+1}{n}, \quad \sum_{k=1}^i \left(n + \frac{1}{n}\right)$$

حسابي سلسله

که یو حسابي ردیف په نظر کې ونیسو.

$$a_1, a_1 + d, a_1 + 2d, a_1 + 3d, \dots, a_1 + (n-1)d$$

د پورتنی ردیف مجموعه یوه حسابي سلسله ده.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_1 + (a-1)d = a_1 + a_1 + d + a_1 + 2d + \dots + a_1 + (n-1)d$$

د يادې سلسلې قسمي مجموعې:

$$s_1 = a_1$$

$$s_2 = a_1 + a_1 + d$$

$$s_3 = a_1 + a_1 + d + a_1 + 2d$$

$$s_n = a_1 + a_1 + d + a_1 + 2d + a_1 + 3d + \dots + a_1 + (n-1)d$$

د حاصل جمع لپاره د فورمول د لاسته راوړلو په خاطر يوه حسابي سلسله S_n په دوه طريقو ليکلی شو:

$$S_n = a_1 + a_1 + d + a_1 + 2d + a_1 + 3d + \dots + a_1 + (n-1)d$$

$$S_n = a_1 + (n-1)d + a_1 + (n-2)d + a_1 + (n-3)d + \dots + a_1$$

پورتنۍ رابطې خوا په خوا جمع کوو.

$$2S_n = 2a_1 + (n-1)d + 2a_1 + (n-1)d + \dots + 2a_1 + (n-1)d$$

$$2S_n = n(2a_1 + (n-1)d)$$

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$$

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_1 + (n-1)d)$$

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

$$S_n = \frac{n}{2}(1+n) = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

د مسلسلو طبيعي اعدادو د جمعې حاصل

که په يوه حسابي سلسله کې $d > 0$ وي، سلسله متزايدة ده، که چېرې $d < 0$ وي، متناقصه سلسله ورته ويل کېږي.

پوهېږو چې د يوې حسابي سلسلې اخري حد:

$$L = a + (n-1)d$$

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

په حسابي تصاعد کې د جملو جوړونه

که په يوه حسابي سلسله کې اول او اخر حد معلوم وي، د d د قيمت په اېښودو کولی شو سلسله پوره کړو.

a.....L

جمله m

$n = m + 2$ د سلسلې د جملو شمېر

$$L = a + (n-1)d \Rightarrow (n-1)d = L - a \Rightarrow$$

$$d = \frac{L-a}{n-1} \Rightarrow d = \frac{L-a}{m+1}$$

مثال: په يوه حسابي سلسله کې، چې اول حد يې 7 او اخري حد يې 9- دی، درې جملې جوړې او سلسله وليکئ!

$$d = \frac{L-a}{m+1}$$

$$d = \frac{-9-7}{3+1} = \frac{-16}{4} = -4$$

متناقضه سلسله $7 + 3 - 1 - 5 - 9$

د حسابي سلسلې د مسلسلو جفتو اعدادو د جمعې حاصل پوهېږو چې مسلسل جفت عددونه په حسابي سلسله کې په لاندې ډول دي.

$$2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 2n$$

$$S = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$$

$$S = \frac{n}{2}(4 + 2n - 2) \Rightarrow S = \frac{n}{2}(2 + 2n)$$

$$S_n = n(1 + n)$$

د حسابي سلسلې د مسلسلو طاقو اعدادو د جمعې حاصل پوهېږو چې مسلسل طاق اعداد په سلسله کې په لاندې ډول دي.

$$1 + 3 + 5 + 7 + \dots + 2n - 1$$

$$S = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$$

$$S = \frac{n}{2}(2 + (n-2)2) \Rightarrow S = \frac{n}{2}(2 - 2 + 2n)$$

$$S = n^2$$

که په حسابي تصاعد کې د جملو تعداد طاق وي، مجموعه يې عبارت ده له: N د سلسلې د جملو شمېر دی:

وسطی جمله $S = n$

مثال:

5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 , 21

$$S = 9 \cdot 13 = 117$$

که د m جملې اوله مجموعه او د m جملې اخره مجموعه معلومه وي، د اولې او اخري مجموعه د ټاکلو لپاره په حسابي تصاعد کې د لاندې رابطې څخه گټه اخیستل کېږي.

$$a_1 + a_n = \frac{m \text{ مجموعه } + m \text{ اخره جمله}}{M}$$

په یوه حسابي تصاعد کې، چې 9 جملې لري، د اولو دوو جملو مجموعه یې 12 او د اخرو دوو جملو مجموعه یې 40 ده، د دې تصاعد د جملو مجموعه پیدا کړئ!

$$a_1 + a_n = \frac{12 + 40}{2} = 26$$

$$S = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \Rightarrow S = \frac{9}{2}(26) = 9 \cdot 13 = 117$$

د څلورم څپرکي پوښتنې:

۱- د ټولو تامو عددونو مجموعه د 10 څخه تر 500 پورې، چې د دوو مسلسلو عددونو ترمنځ فرق یې 14 دی، پیدا کړئ؟

۲- په یوه حسابي سلسله کې $a_1=3$ ، $d=5$ ده، څو حدونه ورسره جمع شي، چې مجموعه یې 255 شي؟

۳- که په یوه حسابي سلسله کې $a_1=6$ ، $d=3$ وي، $a_{12}=?$ ، $S_{12}=?$

۴- د لاندې جفتو او طاقو مسلسلو اعدادو د سلسلې د جمعې حاصل پیدا کړئ؟
 $1+2+3+4+5+\dots+83$

۵- 72 ام حد د تصاعد $M+r$ ، $M+2r$ ، $M+3r$ پیدا کړئ؟

لوگارتم

ټوليزه موخه:

په پيچلو محاسبو او اقتصادي مسايلو کې د لوگارېتم په اړه پوهيدل او د هغه کارول

- د زده کړې موخې: ددې څپرکي په پای کې به محصلين په لاندې مواردو وپوهيږي:
- د لوگارتم د مفهوم درک او د هغه معادل د لوگارتم په قوانينو پوهېدنه.
- په محاسبو کې د لوگارتم د قوانينو کارونه، په ځانگړې توگه په اقتصادي محاسباتو کې، لکه مرکبه ربح.
- د لوگارتم په قاعدې پوهېدنه، په يو او بل د لوگارتم د قاعدو بدلول، طبيعي او معمولي لوگارتم.
- د لوگارتم د جدول ترتيبول، اهميت او له جدول څخه گټه اخيستل.
- لوگارتم د رياضي يو لوی بحث دی، چې د ضرب، تقسيم عمليې او لوی توان لرونکي اعداد څو ځله لنډوي او اسانوي.

د مثال په ډول: $(3.035)^{50}$, $(13.052)^{2003}$, $\sqrt[9]{3.54}$ او نور په مستقيم ډول ډېرې ستونزې لري؛ خو د لوگارتم د عمليې په واسطه په اسانه او دقيق ډول حل کېږي.

لوگارتم په کال 1614 د Jan napair انگليسي عالم په واسطه کشف شو.

که د اکسپونانسيلي $a^x = N$ معادله په نظر کې ونيسو، داسې چې N يو مثبت عدد او a يو مثبت او $a \neq 0.1$ وي. په دې حالت کې x د N لوگارتم په قاعده د a نومېږي او داسې ليکل کېږي.

$$x = \text{Logarithm}_a N = \text{Log}_a N$$

پورتني رابطې ښيي چې:

$$x = \text{Log}_a N, N = a^x \text{ سره معادل دي.}$$

$$\text{مثال: } 3^2 = 9 \text{ او لوگاريتمي شکل يې } \text{Log}_3 9 = 2$$

$$\text{Log}_2 8 = 3 \text{ شکل } 8 = 2^3$$

تمرین: لاندې افادې په لوگاريتمي شکل وليکئ!

$$5^a = 1$$

$$2^5 = 32$$

$$\frac{1}{x} = e^{-i}$$

$$10^3 = 1000$$

$$\frac{1}{10^3} = 10^{-3}$$

$$a^{-b} = 1002$$

لاندې افادې د هغې په معادل شکل وليکئ!

$$\text{Log}_5 5 = 1$$

$$\text{Log}_a \frac{1}{10^6} = y$$

$$\text{Log}_m 100 = n$$

$$\text{Log}_5 625 = 4$$

$$\text{Log}_n m = d$$

$$\text{Log}_a 2^{-b} = n$$

د معادل کېدو نه په ګټه اخیستو د اکسپوناسیل معادله او a, y, x لوگارتم په لاندې مساوات کې پیداوو.

مثال:

$$\text{Log}_3 y = 6$$

$$y = 3^6 \Rightarrow y = 729$$

$$\text{Log}_a \sqrt{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow \sqrt{4} = a^{1/2} \Rightarrow a = 2$$

تمرین: د n, m او b قیمتونه له لاندې دوه رابطو څخه ټاکو.

$$\text{Log}_{10} 100000 = n$$

$$\text{Log}_5 10^{-5} = m$$

$$\text{Log}_b \sqrt[3]{64} = \frac{1}{3}$$

$$\text{Log}_y y = m$$

$$\text{Log}_m x = 1$$

$$\text{Log}_b 81 = 4$$

د لوگارتم خاصیتونه

څرنگه چې $y = a^x, \text{Log}_a y = x$ یو له بل سره معادل دي؛ نو کولی شو، چې د لوگارتم خواص د $y = a^x$ تابع له خواصو څخه په لاس راوړو.

اول خاصیت: (۱) لوگارتم د b په هرې مثبتې قاعده داسې، چې $b \neq 1$ وي.

$$\log_b 1 = 0 \Rightarrow 1 = b^0$$

دویم خاصیت: د هر عدد لوگارتیم په خپله قاعده له یوه سره مساوي دی.
هر کله چې (b) یو مثبت عدد او $b \neq 1$ وي.

$$b = b^1 \Rightarrow \log_b b = 1 \quad \log_{0.05} 0.05 = 1$$

درېیم خاصیت: هر کله چې $b > 0, b \neq 1$ وي؛ نو د هر (r) لپاره لرو چې:

$$b^r = b^r \Rightarrow \log_b b^r = r \quad \log_b b^r = r$$

$$7^{-6} = 7^{-6} \Rightarrow \log_7 7^{-6} = -6$$

تمرین: لاندې لوگارتیمونه محاسبه کړئ!

$$1) \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} = ?$$

$$\log_{10} 0.0001 = ?$$

$$2) \log_8 8^{-3}$$

$$\log_4 16 = ?$$

$$3) \log_{100} (100) 0 = ?$$

$$\log_5 25 = ?$$

$$4) \log_3 \sqrt{3} = ?$$

$$\log_4 \frac{1}{16} = ?$$

خلوړم خاصیت: $\log_b m \cdot n = \log_b m + \log_b n$

ثبوت: که $\log_b n = y, \log_b m = x$ فرض شي، پورتنۍ رابطې خوا په خوا سره ضرب کوو.

$$m \cdot n = b^x \cdot b^y \Rightarrow m \cdot n = b^{(x+y)}$$

اطراف د لوگارتیم په قاعده نیسو.

$$\log_b mn = \log_b b^{x+y}$$

نظر درېیم خاصیت ته لرو.

$$\log_b mn = \log_b m + \log_b n \quad \text{د } x \text{ او } y \text{ قیمتونو په اېښودلو لرو چې:}$$

مثال:

$$\log_8 8x = \log_8 8 + \log_8 x$$

$$= 1 + \log_8 x$$

مثال:

$$\log_5 \frac{4y}{5x} + \log_5 \frac{5x^2}{y} = \log_5 \frac{4y}{5x} \cdot \frac{5x^2}{y} = \log_5 4x$$

مثال:

$$\text{Log}_{10} 10x^2y = \text{Log}_{10} 10 + \text{Log}_{10} x^2 + \text{Log}_{10} y = 1 + \text{Log}_{10} x^2 + \text{Log}_{10} y$$

تمرین:

$$\text{Log}_5 25 \cdot 125 = ? \quad \text{Log}_3 \frac{3x^2}{y} + \text{Log}_3 \frac{y^2}{3x} = ?$$

$$\text{Log}_4 16 \cdot x \cdot 64y^2 = ? \quad \text{Log}_5 25m^2n^{-4} + \text{Log}_5 5 \frac{n^3}{m^4}$$

$$\text{Log}_b \frac{m}{n} = \text{Log}_b m - \text{Log}_b n$$

پنجم خاصیت:

ثبوت: پوهېږو چې $m = \frac{m}{n} \cdot n$ دی. د پورتنی مساوات له اطرافو څخه د b په قاعده لوگارتم نیسو.

$$\text{Log}_b m = \text{Log}_b \frac{m}{n} \cdot n \Rightarrow \text{Log}_b \frac{m}{n} + \text{Log}_b n$$

$$\text{Log}_b \frac{m}{n} = \text{Log}_b m - \text{Log}_b n$$

مثال:

$$\text{Log}_5 \frac{120}{210} = \text{Log}_5 120 - \text{Log}_5 210 \Rightarrow \text{Log}_5 \frac{4}{7} = \text{Log}_5 4 - \text{Log}_5 7$$

مثال:

$$\text{Log}_y 10y^2x - \text{Log}_y 2xy = \text{Log}_y \frac{10y^2x}{2xy}$$

$$= \text{Log}_y 5y = \text{Log}_y 5 + \text{Log}_y y = \text{Log}_y 5 + 1$$

خلورم او پنجم خاصیت: رانښيي، چې کولای شو د هغې پو سیله د جمعې او تفریق مسايل په ضرب او تقسیم او برعکس بدل کړو.

شپږم خاصیت: د هر r لپاره لاندې رابطه سمه ده.

$$\text{Log}_a m^r = r \text{Log}_a m$$

ثبوت: فرضاً $x = \text{Log}_a m$ دی؛ نو د هغې $m = a^x$ معادله کیدای شي.

د معادل رابطې دواړه خواوې د r په توان پورته وړو

$$m^r = (a^x)^r$$

د دې رابطې له دواړو خواو څخه د a په قاعده لوگارتم نیسو.

$$m^r = a^x$$

$$\text{Log}_a m^r = \text{Log}_a a^x \rightarrow x = r \text{Log}_a m$$

مثال: لاندې لوگارتونه حساب کړئ!

$$\log_2 64 = ? \quad \log_2 64 = \log_2 2^6 = 6\log_2 2 = 6$$

$$\log_5 125 = ? \quad \log_5 125 = \log_5 5^3 = 3\log_5 5 = 3$$

$$\log_{10} 0.0001 = ? \quad \log_{10} 10^{-4} = -4\log_{10} 10 = -4$$

$$\log_{10} \frac{1}{1000} = ? \quad \log_{10} 10^{-3} = -3\log_{10} 10 = -3$$

تمرین: لاندې لوگارتونه حساب کړئ!

$$\log_3 \frac{1}{9} = ? \quad \log_4 \frac{1}{16} = ? \quad \log_4 \sqrt{256} = ?$$

$$\log_{10} (100)^{\frac{3}{2}} = ? \quad \log_3 (27)^{\frac{1}{3}} = ? \quad \log_3 3^5 \cdot 21 = ?$$

$$\log_{a^b} m = \frac{1}{b} \log_a m$$

اووم خاصیت

ثبوت: فرضوو، چې $\log_a bm$ دی نو د هغې معادله رابطه ده:

$$m = (a^b)^x$$

$$m = (a^x)^b$$

b ام جذر د پورته رابطې $m^{1/b} = a^x$ د دې رابطې له اطراف څخه د a په قاعده لوگارتم نیسو.

$$\log_a m^{1/b} = \log_a a^x$$

د شپږم خاصیت نه په گټه اخیستو کولای شو ولیکو.

$$\frac{1}{b} \log_a m = x \log_a a$$

$$\frac{1}{b} \log_a m = x \Rightarrow \log_{a^b} m = \frac{1}{b} \log_a m$$

مثال:

$$\log_{16} 4 = \log_{4^2} 4 = \frac{1}{2} \log_4 4 = \frac{1}{2}$$

مثال:

$$\log_{25} 125 = \log_{5^2} 125 = \log_{5^2} 5^3 = \frac{3}{2} \log_5 5 = \frac{3}{2}$$

تمرین: د لوگارتم د اووم خاصیت نه په گټه اخیستو ځوابونه ولیکئ!

$$\log_{\frac{1}{9}} 27 = ? \quad \log_8 4 = ? \quad \log_{\frac{1}{9}} 5^{-2} = ?$$

$$\log_{\frac{1}{16}} 8 = ? \quad \log_{64} 16 = ? \quad \log_{\frac{1}{5}} 5 = ?$$

د لوگارتیم د قاعدې د بدلولو فورمول

که چېرې $b \neq 1, a \neq 1, x > 0, a > 0$ وي؛ نو لرو چې:

$$\text{Log}_b x = \frac{\text{Log}_a x}{\text{Log}_a b}$$

د پورته فورمول نه په گټه اخیستو، کولی شو لوگارتیم له یوې قاعدې څخه بلې قاعدې ته واړوو.

ثبوت: فرض کوو، چې $\text{Log}_b x = y$ او د هغې معادل $x = (b)^y$ دی.

د معادلې رابطې له دواړو خواوو څخه د a په قاعده لوگارتیم نیسو.

$$\text{Log}_a x = \text{Log}_a b^y = y \text{Log}_a b$$

$$\text{Log}_a x = \text{Log}_b x \cdot \text{Log}_a b$$

$$\text{Log}_b x = \frac{\text{Log}_a x}{\text{Log}_a b}$$

په رابطه کې د y قیمت ردو.

یاده دې وي، چې د a په قاعده د عددونو لوگارتیم لرو.

که چېرې x په a عوض کړو، رابطه لاندې شکل نیسي.

$$\text{Log}_b a \cdot \text{Log}_a b = 1$$

مثال: $\text{Log}_9 27$ محاسبه کړئ!

$$\text{Log}_9 27 = \frac{\text{Log}_3 27}{\text{Log}_3 9} = \frac{\text{Log}_3 (3)^3}{\text{Log}_3 3^2} = \frac{3 \text{Log}_3 3}{2 \text{Log}_3 3} = \frac{2}{3}$$

مثال: $\text{Log}_5 100$ حساب کړئ، په هغه صورت کې، چې $\text{Log}_{10} 5 = 0.7$ وي.

د فورمول نه په گټه اخیستو:

$$\text{Log}_5 100 = \frac{\text{Log}_{10} 100}{\text{Log}_{10} 5} = \frac{\text{Log}(10)^2}{\text{Log} 5} = \frac{2}{0.7} = \frac{20}{7}$$

تمرین: لاندې لوگارتیمونه حساب کړئ!

$$\text{Log}_{64} 16 = ?$$

$$\text{Log}_{16} 32 = ?$$

$$\text{Log}_{0.01} 0.0001 = ?$$

$$\text{Log}_{121} 14641 = ?$$

$$\text{Log}_{100} 0.001$$

$$\text{Log}_{0.01} 1000 = ?$$

معمولي لوگارتیم او طبیعي لوگارتیم

لکه څنګه چې پوهېږو، هر مثبت عدد خلاف د یوه لوگارتیم قاعده کېدای شي، ولې هغه

قاعدې، چې په عمل کې په کار وړل کېږي، د e عدد او 10 عدد دی، e یو غیر نسبي عدد

دی، چې تقریبي قیمت یې $e = 2.718281828$ دی.

هغه لوگارتیم، چې قاعده یې e ده د طبیعي لوگارتیم په نوم یادېږي، په لاندې ډول ښودل کېږي.

$$\ln x = \log_e x$$

هغه لوگارتیم، چې قاعده یې 10 ده، د معمولي لوگارتیم په نوم یادېږي او په لاندې ډول دی.

$$\log x = \log_{10} x$$

$$\log 0.0001 = \log 10^{-4} = -4$$

$$\log 1000 = \log 10^3 = 3$$

$$\log_e e \cdot e \cdot e = \log_e e^3 = 3$$


$$\ln e \cdot e \cdot e = \ln e^3 = 3$$

$$\ln \frac{1}{ee} = \ln \frac{1}{e^2} = \ln e^{-2} = -2$$

$$\ln \frac{1}{e^{-3}} = \ln e^3 = 3$$

$$\log 100000 = \log 10^5 = 5$$

نوټ: لوگارتمي تابع او د هغې معادل په اصل کې د یو بل معکوس دي، کولی شو موضوع په لاندې گراف کې ښه درک کړو.



د عدد لیکلو علمي طریقه

په ساینس او ریاضیاتو کې داسې ډېر ځایونه شته، چې له لویو او کوچنیو عددونو سره سروکار لري، لکه:

1- یو نوري کال تقریباً 500.000.000.000 میله فاصله ده.

2- په متریک سیستم کې یو ملي مکرون 0.000.000.001 متر دی.

3- د یو مالیکول اکسیجن وزن 0.0000000000000000000053 گرامه دی.

دا عددونه کولی شو په لنډ ډول ولیکو:

$$500000000000 = 5 \cdot 10^8 m$$

$$0.0000000000000000000053 = 5.3 \cdot 10^{-22} gr$$

$$0.0000000000001 = 10^{-12}$$

یو عدد په علمي طریقه لیکل شوی، که لاندې شکل ولري:

که چېرې $1 < a < 10$ وي او n تام عدد وي.

تفرین: لاندې عددونه د لیکلو علمي روش تپه راوړئ!

$$0.000452 = ?$$

$$0.102 = ?$$

$$245000000 = ?$$

$$235.03 = ?$$

$$4300000 = ?$$

$$3004.001 = ?$$

$$502000000 = ?$$

$$0.0000000000000000402 = ?$$

کرکټرستیک او مانیتیس (مشخصه او مانیتیس)

د هر عدد لوگارتم په عمومي توګه له دوو برخو جوړ وي. کرکټرستیک او مانیتیس، چې

کرکټرستیک صحیح برخه او مانیتیس د لوگارتم اعشاري برخه ده.

مشخصه د دوو لاندینیو اصولونو په اساس تعینېږي.

۱- که چېرې N له یوه څخه لوی وي، د یوه عدد د لوگارتم مشخصه د یوه په اندازه د

اعشاري علامې د چپ طرف د ارقامو د تعداد څخه کمه وي، یعنې که د چپ طرف

د رقمونو شمېر K وي.

نو $k-1 =$ مشخصه ده.

۲- که چېرې N له یوه څخه کوچنی وي، د N عدد لوگارتم مشخصه منفي ده، البته

د لوگارتم اعشاري برخه د اعدادو د لوگارتم له جدول څخه اخیستل کېږي، بناءً د

مکملو اعدادو لوگارتم عبارت دی له:

مانتيسه + مشخصه $\text{Log}N$

دا چې مانتيسه هر وخت مثبت وي، بايد $(-K)$ مشخصه په $10 - K - 10$ شکل وليکل شي.

د مثال په ډول: که 0.57325 د يوه عدد د لوگارتم مانتيسه وي؛ نو که مشخصه يې په دې حالت کې $2, 1, 0, -1, -2$ وي، په دې حالت کې يې لوگارتم په لاندې ډول ليکل کېږي.

$8.57325 - 10$, $9.57325 - 10$, 0.57325 , 1.57325

مثال: د لاندې عدد د لوگارتم کرکټرستیک پيدا کړئ!

$$\text{Log}1000.0$$

څرنگه چې د چپ طرف د اعشاري رقمونو شمېر 4 دی؛ نو د ذکر شوي عدد کرکټرستیک $K - 1 = 4 - 1 = 3$ دی.

له يوه نه د کوچنيو عددونو د لوگارتم کرکټرستیک د منفي علامې لرونکی دی، که د صفرونو تعداد د اعشاري علامې نه وروسته n وي، د دې اعشاري کسر کرکټرستیک $(n+1) -$ دی.

مثال: د 0.00025 عدد د لوگارتم کرکټرستیک وټاکئ!

څرنگه چې د اعشاري علامې څخه وروسته 3 صفرونه دي؛ نو $-(3+1) = -4$

تمرین: د لاندې لوگارتم کرکټرستیک وټاکئ!

$\text{Log } 0.1$	,	$\text{Log}0.005$	,	$\text{Log}23005$
$\text{Log}2.3 \cdot 10^{-5}$	,	$\text{Log}232 \cdot 10^2$	,	$\text{Log}0.02 \cdot 10^{-3}$
$\text{Log } 45.3$	,	$\text{Log}3000.0$	,	$\text{Log}200 \cdot 10^3$

مانتيس او د يوه عدد د لوگارتم د مانتيس ټاکل

لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وشوه، د يوه عدد د لوگارتم مانتيس د هغه عدد د لوگارتم اعشاري برخه تشکيلوي، چې هر وخت يو اعشاري عدد مثبت وي او د اعدادو د لوگارتم د جدول څخه اخيستل کېږي، لکه:

$$\text{Log}_{10} 20 = \text{Log}_{10} 2 \cdot 10 = \text{Log}_{10} 10 + \text{Log}_{10} 2$$

$$\text{Log}20 = 1 + 0.30103 = 1.30103$$

0.30103 اعشاري کسر د 20 عدد د لوگارتم د مانتيس په نامه يادېږي.

$$\text{Log}300 = \text{Log}100 \cdot 3 = \text{Log}100 + \text{Log}3 = 2 + 0.4771$$

$$\text{Log}300 = 2.4771$$

مثال: د 0.002 عدد لوگارتم پیدا کوو.

$$\text{Log}0.002 = \text{Log}10^{-3} \cdot 2 = \text{Log}10^{-3} + \text{Log}2 = -3 + 0.30103$$

دا چې د سوال په حل کې مانتیس منفي دی، کولی شو په لاندې ډول یې ثبت کړو.

مثال:

$$1) 1 - 0.30103 = 0.69897$$

مثال:

$$\text{Log}N = -3.23403 = -3 - 0.23406$$

$$= -3 - 0.23403 + 1 - 1 = 4 + 0.76597 = -44.766597$$

د یادولو وړ ده، چې د یوه عدد د لوگارتم مانتیس په قاعدې پورې تړلی وي، که ذکر شوی عدد لس یا لس چنده لوی یا کوچنی کړو، د یاد عدد د لوگارتم په مانتیس کې تغیر نه راځي.

مثال:

$$\text{Log}_{10} 583 = 2.76567$$

$$\text{Log}58300 = \text{Log}583 \cdot 100 = \text{Log}583 + \text{Log}100 = 4.76567$$

$$\text{Log}0.00583 = \text{Log}583 \cdot 10^{-5}$$

$$\text{Log}583 + \text{Log}10^{-5} = 2.76567 + (-5) = -3.76567$$

$$\text{Log}0.0000583 = \text{Log}583 \cdot 10^{-7} = \text{Log}583 + \text{Log}10^{-7}$$

$$= 2.765667 - 7 = -576567$$

د لوگارتم له جدول نه د گټې اخیستنې طریقه

لکه څنګه چې د لوگارتم په حسابي معادلو کې د 10 قاعده د استعمال زیات موارد لري، غواړو، چې د 10 قاعدې د لوگارتم له جدول څخه د گټې اخیستنې طریقه زده کړو.

$$\text{Log}397 = ?$$

$$\text{Log}397 = \text{Log}3.97 \cdot 10^2 = \text{Log}3.97 + \text{Log}10^2$$

$$= 0.5988 + 2 = 2.5988$$

په لسمه قاعده کې د لوگاریتمي اعدادو جدول

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1,0	0,0000	0,0043	0,0086	0,0128	0,0170	0,0212	0,0253	0,0294	0,0334	0,0374
1,1	0,0414	0,0453	0,0492	0,0531	0,0569	0,0607	0,0645	0,0682	0,0719	0,0755
1,2	0,0792	0,0828	0,0864	0,0899	0,0934	0,0969	10000,	0,1038	0,1072	0,1106
1,3	0,1139	0,1173	0,1206	0,1239	0,1271	0,1303	0,1335	0,1367	0,1399	0,1430
1,4	0,1461	0,1492	0,1523	0,1553	0,1584	0,1614	0,1644	0,1673	0,1703	0,1732
1,5	0,1761	0,1790	0,1818	0,1847	0,1875	0,1903	0,1931	0,1959	0,1987	0,2014
1,6	0,2041	0,2068	0,2095	0,2122	0,2148	0,2175	0,2201	0,2227	0,2253	0,2279
1,7	0,2304	0,2330	0,2355	0,2380	0,2405	0,2430	0,2455	0,2480	0,2504	0,2529
1,8	0,2553	0,2577	0,2601	0,2625	0,2648	0,2672	0,2695	0,2718	0,2742	0,2765
1,9	0,2788	0,2810	0,2833	0,2856	0,2878	0,2900	0,2923	0,2945	0,2967	0,2989
2,0	0,3010	0,3032	0,3054	0,3075	0,3096	0,3118	0,3139	0,3160	0,3181	0,3201
2,1	0,3222	0,3243	0,3263	0,3284	0,3304	0,3324	0,3345	0,3365	0,3385	0,3404
2,2	0,3424	0,3444	0,3464	0,3483	0,3502	0,3522	0,3541	0,3560	0,3579	0,3598
2,3	0,3617	0,3636	0,3655	0,3674	0,3692	0,3711	0,3729	0,3747	0,3766	0,3784
2,4	0,3802	0,3820	0,3838	0,3856	0,3874	0,3892	0,3909	0,3927	0,3945	0,3962
2,5	0,3979	0,3997	0,4014	0,4031	0,4048	0,4065	0,4082	0,4099	0,4116	0,4133
2,6	0,4150	0,4166	0,4183	0,4200	0,4216	0,4232	0,4249	0,4265	0,4281	0,4298
2,7	0,4314	0,4330	0,4346	0,4362	0,4378	0,4393	0,4409	0,4425	0,4440	0,4456
2,8	0,4472	0,4487	0,4502	0,4518	0,4533	0,4548	0,4564	0,4569	0,4594	0,4609
2,9	0,4624	0,4639	0,4654	0,4669	0,4683	0,4698	0,4713	0,4728	0,4742	0,4757
3,0	0,4771	0,4786	0,4800	0,4814	0,4829	0,4843	0,4857	0,4871	0,4886	0,4900
3,1	0,4914	0,4928	0,4942	0,4955	0,4969	0,4983	0,4997	0,5011	0,5024	0,5038
3,2	0,5051	0,5056	0,5079	0,5092	0,5105	0,5119	0,5132	0,5145	0,5159	0,5172
3,3	0,5185	0,5198	0,5211	0,5224	0,5237	0,5250	0,5263	0,5276	0,5289	0,5302
3,4	0,5315	0,5328	0,5340	0,5353	0,5366	0,5378	0,5391	0,5403	0,5416	0,5428
3,5	0,5441	0,5453	0,5465	0,5478	0,5490	0,5502	0,5514	0,5527	0,5539	0,5551
3,6	0,5563	0,5575	0,5587	0,5599	0,5611	0,5623	0,5635	0,5647	0,5658	0,5670
3,7	0,5682	0,5694	0,5705	0,5717	0,5729	0,5740	0,5752	0,5763	0,5775	0,5786
3,8	0,5898	0,5809	0,5821	0,5832	0,5843	0,5855	0,5866	0,5877	0,5888	0,5899
3,9	0,5911	0,5922	0,5933	0,5944	0,5955	0,5966	0,5977	0,5988	0,5999	0,6010
4,0	0,6021	0,6031	0,6042	0,6053	0,6064	0,6075	0,6085	0,6096	0,6107	0,6117
4,1	0,6128	0,6138	0,6149	0,6160	0,6170	0,6180	0,6191	0,6201	0,6212	0,6222
4,2	0,6232	0,6243	0,6253	0,6263	0,6274	0,6284	0,6291	0,6304	0,6314	0,6325
4,3	0,6335	0,6345	0,6355	0,6365	0,6375	0,6385	0,6395	0,6405	0,6415	0,6425
4,4	0,6435	0,6444	0,6454	0,6464	0,6474	0,6484	0,6493	0,6503	0,6513	0,6522
4,5	0,6532	0,6542	0,6551	0,6561	0,6571	0,6580	0,6590	0,6599	0,6609	0,6618
4,6	0,6628	0,6637	0,6646	0,6656	0,6665	0,6675	0,6684	0,6693	0,6702	0,6712
4,7	0,6721	0,6730	0,6739	0,6749	0,6758	0,6767	0,6776	0,6785	0,6794	0,6703
4,8	0,6812	0,6821	0,6830	0,6839	0,6848	0,6857	0,6866	0,6875	0,6884	0,6893
4,9	0,6902	0,6911	0,6920	0,6928	0,6937	0,6946	0,6955	0,6964	0,6972	0,6981
5,0	0,6990	0,6998	0,7007	0,7016	0,7024	0,7033	0,7042	0,7050	0,7059	0,7067
5,1	0,7076	0,7084	0,7093	0,7101	0,7110	0,7118	0,7126	0,7135	0,7143	0,7152
5,2	0,7160	0,7168	0,7177	0,7185	0,7193	0,7202	0,7210	0,7218	0,7226	0,7235
5,3	0,7243	0,7251	0,7259	0,7267	0,7275	0,7284	0,7292	0,7300	0,7308	0,7316
5,4	0,7324	0,7332	0,7340	0,7348	0,7356	0,7364	0,7372	0,7380	0,7388	0,7396
5,5	0,7412	0,7412	0,7427	0,7427	0,7435	0,7443	0,7451	0,7459	0,7466	0,7474
5,6	0,7482	0,7490	0,7497	0,7505	0,7513	0,7520	0,7528	0,7536	0,7543	0,7551

په لسمه قاعده کې د لوگاریتمي اعدادو جدول

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5,7	0,7559	0,7566	0,7574	0,7582	0,7589	0,7597	0,7604	0,7612	0,7619	0,7627
5,8	0,7634	0,7642	0,7649	0,7657	0,7664	0,7672	0,7679	0,7689	0,7694	0,7701
5,9	0,7709	0,7716	0,7723	0,7731	0,7738	0,7745	0,7752	0,7760	0,7767	0,7774
6,0	0,7782	0,7789	0,7796	0,7803	0,7810	0,7718	0,7825	0,7732	0,7839	0,7846
6,1	0,7853	0,7860	0,7868	0,7875	0,7882	0,7889	0,7896	0,7903	0,7910	0,7917
6,2	0,7924	0,7931	0,7938	0,7945	0,7952	0,7959	0,7966	0,7973	0,7980	0,7987
6,3	0,9793	0,8000	0,8007	0,8014	0,8021	0,8028	0,8035	0,8041	0,8048	0,8055
6,4	0,8062	0,8069	0,8075	0,8082	0,8089	0,8096	0,8102	0,8109	0,8116	0,8122
6,5	0,8129	0,8136	0,8142	0,8149	0,8156	0,8162	0,8169	0,8176	0,8182	0,8189
6,6	0,8195	0,8202	0,8209	0,8215	0,8229	0,8228	0,8235	0,8241	0,8248	0,8254
6,7	0,8261	0,8267	0,8274	0,8280	0,8287	0,8293	0,8299	0,8306	0,8312	0,8319
6,8	0,8325	0,8331	0,8338	0,8344	0,8351	0,8357	0,8363	0,8370	0,8376	0,8328
6,9	0,8388	0,8395	0,8401	0,8407	0,8414	0,8420	0,8426	0,8432	0,8439	0,8445
7,0	0,8451	0,8457	0,8463	0,8470	0,8476	0,8482	0,8488	0,8494	0,8500	0,8506
7,1	0,8513	0,8519	0,8525	0,8531	0,8537	0,8543	0,8549	0,8555	0,8561	0,8567
7,2	0,8573	0,8589	0,8585	0,8591	0,8597	0,8603	0,8609	0,8615	0,8621	0,8627
7,3	0,8633	0,8639	0,8645	0,8651	0,8657	0,8663	0,8669	0,8675	0,8681	0,8686
7,4	0,8692	0,8698	0,8704	0,8710	0,8716	0,8722	0,8727	0,8733	0,8739	0,8745
7,5	0,8751	0,8756	0,8762	0,8768	0,8774	0,8779	0,8785	0,8791	0,8797	0,8802
7,6	0,8808	0,8814	0,8820	0,8825	0,8831	0,8837	0,8842	0,8848	0,8854	0,8859
7,7	0,8865	0,8871	0,8876	0,8882	0,8887	0,8893	0,8899	0,8904	0,8910	0,8915
7,8	0,8921	0,8927	0,8932	0,8938	0,8943	0,8949	0,8954	0,8960	0,8965	0,8971
7,9	0,8976	0,8983	0,8987	0,8993	0,8998	0,9004	0,9009	0,9015	0,9020	0,9025
8,0	0,9031	0,9036	0,9042	0,9047	0,9053	0,9058	30,906	0,9069	0,9074	0,9079
8,1	0,9085	0,9090	0,9096	0,9101	0,9106	0,9112	0,9117	0,9122	0,9128	0,9133
8,2	0,9138	0,9143	0,9149	0,9154	0,9159	0,9165	0,9170	0,9175	0,9180	0,9186
8,3	0,9196	0,9199	0,9201	0,9206	0,9212	0,9217	0,9222	0,9227	0,9232	0,9238
8,4	0,9243	0,9248	0,9253	0,9258	0,9263	0,9269	0,9274	0,9279	0,9284	0,9289
8,5	0,9294	0,9299	0,9304	0,9309	0,9315	0,9320	0,9325	0,9330	0,9335	0,9340
8,6	0,9345	0,9350	0,9355	0,9360	0,9365	0,9370	0,9375	0,9380	0,9385	0,9390
8,7	0,9395	0,9400	0,9405	0,9410	0,9415	0,9420	0,9425	0,9430	0,9435	0,9440
8,8	0,9445	0,9450	0,9455	0,9460	0,9465	0,9469	0,9474	0,9479	0,9484	0,9489
8,9	0,9494	0,9499	0,9504	0,9509	0,9513	0,9518	0,9523	0,9528	0,9533	0,9538
9,0	0,9542	0,9547	0,9552	0,9557	0,9562	0,9566	0,9571	0,9576	0,9581	0,9586
9,1	0,9590	0,9595	0,9600	0,9605	0,9609	0,9614	0,9619	0,9624	0,9628	0,9633
9,2	0,9638	0,9643	0,9647	0,9652	0,9657	0,9661	0,9666	0,9671	0,9675	0,9680
9,3	0,9685	0,9689	0,9694	0,9699	0,9703	0,9707	0,9713	0,9717	0,9722	0,9727
9,4	0,9731	0,9736	0,9741	0,9745	0,9750	0,9754	0,9759	0,9763	0,9768	0,9773
9,5	0,9777	0,9782	0,9786	0,9791	0,9795	0,9800	0,9805	0,9809	0,9814	0,9818
9,6	0,9823	0,9827	0,9732	0,9836	0,9841	0,9845	0,9850	0,9854	0,9859	0,9863
9,7	0,9868	0,9872	0,9877	0,9881	0,9886	0,9890	0,9894	0,9899	0,9903	0,9908
9,8	0,9912	0,9917	0,9921	0,9926	0,9930	0,9934	0,9939	0,9943	0,9948	0,9952

له پورتنی جدول څخه دوه لومړي رقمونه 39 د N له ستون څخه او 7 عدد په N سطر کې پیدا کوو، هغه عدد چې د سطر او ستون په تقاطع کې واقع دی، د 397 عدد د لوگارتم مانتیس دی.

انتي لوگارتم

د 117 عدد لوگارتم عبارت دی له 2.0682 څخه؛ نو 117 عدد د 2.0682 د انتي لوگارتم په نوم یادېږي؛ نو ویلی شو، چې هر عدد د هماغه عدد انتي لوگارتم دی.
مثال: $\text{Log} x = 2.5988$ دی؛ نو x به څو وي؟
حل: لکه څنګه چې x د 2.5988 انتي لوگارتم دی، د کرکټرستیک په نظر کې نیولو او له جدول څخه په ګټې اخیستنې $x = 397$ دي.

کو لوگارتم

د تعریف له مخې کو لوگارتم د هماغه عدد له معکوس لوگارتم څخه عبارت دی.

$$\text{CoLog} N = \text{Log} \frac{1}{N} = \text{Log} 1 - \text{Log} N = -\text{Log} N$$

$$\text{CoLog} N = -\text{Log} N$$
مثال: که $\text{Log} 35.7 = 1.55230$ وي، د ذکر شوي عدد کو لوگارتم وټاکئ!
 $\text{Log} 35.7 = 1.55267$
 $\text{CoLog} 35.7 = ?$

حل: پوهېږو چې $\text{CoLog} N = \text{Log} \frac{1}{N}$ دی.

$$\text{CoLog} 35.7 = \text{Log} \frac{1}{35.7} = \text{Log} 1 - \text{Log} 35.7 = 1010 - 1.55267 = 8.44733 - 10$$
0.30103 اعشاري کسر ته د 20 د عدد د لوگارتم مانتیس وایي.

$$\text{Log} 300 = \text{Log} 100 \cdot 3 = \text{Log} 100 + \text{Log} 3 = 2 + 0.4771$$

$$\text{Log} 300 = 2.4771$$

د ذکر شوي عدد اعشاري کسر، د 300 د لوگارتم مانتیس دی.
مثال: د 0.002 عدد لوگارتم پیدا کوو.

$$\text{Log} 0.002 = \text{Log} 10^{-3} \cdot 2 = \text{Log} 10^{-3} + \text{Log} 2 = -3 + 0.30103 = -2.69897$$
که د سوال په حل کې مانتیس منفي راغی، کولی شو په لاندې طریقه یې مثبت کړو.

مثال:

$$\log_{10} \frac{1}{2} = \log_{10} 1 - \log_{10} 2 = 0 - 0.30103$$

د دې لپاره چې مثبت مانتیس په لاس راشي، د 1 عدد له هغه سره جمع او منفي کوو.
 $1 - 1 - 0.30103 = \bar{1}.69897$

مثال:

$$\begin{aligned} \log N &= -3.23403 = -3 - 0.23403 = -3 - 0.23403 + 1 - 1 = -4 + 0.76597 \\ &= -3,23463 \end{aligned}$$

انټرپولېشن Inter polation

د څلور رقمي عدد د لوگارتم مانتیس په څلور رقمي جدول کې او د پینځه رقمي عدد د لوگارتم مانتیس له پینځه رقمي جدول څخه په لاس راځي. مګر ځینې وخت د داسې عددونو سره مخامخ کېږو، چې د نوموړو عددونو د لوگارتم مانتیس په جدول کې نه وي، د داسې عددونو د مانتیس د پیدا کولو لپاره دې عدد ته د ډېر نږدې عددونو له مقایسې (یو لوی او بل کوچنی) څخه د تناسب د عملیې په مرسته لاسته راوړو، دا عملیه، چې یوه دقیقه برخه ده انټر پولېشن نومېږي.

موضوع په مثال سره توضیح کوو.

مثال: 24357 لوگارتم په لاس راوړو.

حل: د پورتنی عدد مشخصه 4 ده، د دې عدد مانتیس په جدول کې نشته؛ خو د 24360 او 24350 مانتیس په جدول کې شته.

$$\begin{array}{c} \left[\begin{array}{c} 24350 \\ 24357 \\ 24360 \end{array} \right] \\ 10 \quad \quad 7 \\ \left| \begin{array}{c} 0.38650 \\ ? \end{array} \right| x \left| \begin{array}{c} 0.00018 \\ 0.3866 \end{array} \right| \end{array}$$

د ورکړل شوي عدد ترمنځ توپیر او 7 له دې څخه کوچنی.

د ورکړل شوي عدد ترمنځ توپیر او 10 لوی له دې څخه.

د ورکړل شوي عدد د مانتیس په منځ کې توپیر او X د هغه څخه د کوچني مانتیس

د کوچني عدد د مانتيس په منځ کې فرق او 0.00018 لوی له ورکړل شوي عدد څخه. لکه څنګه چې پورتنۍ رابطې مستقیم تناسب جوړوي؛ نو کولی شو د پورتنیو اعدادو تناسب ترتیب کړو.

$$\frac{10}{7} = \frac{0.00018}{x}$$

د x قیمت د کوچني عدد له مانتيس سره جمع کوو او یا دا د لوی عدد له مانتيس څخه منفي کوو.

$$10x = 0.00126$$

لاسته راغلې نتیجه د ورکړل شویو اعدادو مانتيس دی.

$$x = 0.00013$$

$$0.38650$$

$$\underline{0.00013}$$

$$0.38663$$

په کوم مخ کې چې د اعدادو د لوگارتم مانتيسونه لټوو، ښي لور ته یې واړه جدولونه شته، چې د Poropotional په نامه یادېږي.

په دې جدول کې د چپ طرف په ستون کې له 1 څخه تر 9 پورې صحیح عددونه او د چپ طرف په ستون کې د اعدادو مانتيس د $\frac{1}{10}$ په تناسب لیکل شوي، لکه: که د 1.472.85 لوگارتم د لوگارتم د جدول نه په ګټه اخیستو لاسته راوړو؛ نو داسې عمل کوو.

	9
1	0.9
2	1.8
3	2.7
4	3.6
5	4.5
6	5.4
7	6.3
8	7.2
9	8.1

حل: د یاد شوي عدد کرکټرستیک 2 دی، د مانتيس د پیدا کولو لپاره داسې عمل کوو.

$$x = 4728.5 \text{ د ورکړل شوي عدد مانتيس}$$

$$4728 = 0.67468 \text{ مانتيس}$$

$$47229 = 0.67477 \text{ مانتيس}$$

0.00009 د مانتيس فرق د ۱ عدد فرق

د دې مخ په کوچني جدول کې د 5 عدد مقابل ته، چې له 4728.5 عدد څخه په لاس راځي. د 4.5 مانتيس ليکل شوی دی، هر کله چې د 4.5 مانتيس د کوچني عدد د مانتيس له اخړو ارقامو سره جمع کړو د مطلوب عدد مانتيس په لاس راځي.

$$\begin{array}{r} 0.67468 \\ 45 \\ \hline 0.674725 \\ \text{Log} 472.85 = 2.67472 \end{array}$$

د ۴۷۲،۸۵ لوگارتم د انټرپولیشن له طریقي نه په ګټه اخیستو په لاس راوړو.

$$10 \left[\begin{array}{l} 47280 = 0.6746 \\ 47285 = 7 \\ 47290 = 0.67477 \end{array} \right] x \quad 0.0009$$

د کوچني عدد له مانتيس سره جمع کېږي.

$$\begin{array}{r} 0.67468 \\ 45 \\ \hline 0.674725 \\ \frac{5}{10} = \frac{x}{0.00009} \Rightarrow 10x = 0.00045 \Rightarrow x = 0.000045 \end{array}$$

تمرین: د لاندې عددونو د لوگارتم مشخصه او مانتيسه د جدول نه په ګټه اخیستو پیدا کړئ!

$\text{Log} 24546$	$\text{Log} 0.012353$
$\text{Log} 10012$	$\text{Log} 0.000021314$
$\text{Log} 10135$	$\text{Log} 43256$
$\text{Log} 0.0034521 \cdot 10^{-3}$	$\text{Log} 42341 \cdot 10^{-6}$

د لوگارتم د جدول ترتیب

د هغو سلسلو د عددونو د لوگارتم د مانتيس د لاسته راوړلو په خاطر، چې د تایلور له فورمول نه په ګټه اخیستو ترتیب شوی، کار اخلو.

$$\text{Ln}(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$

که x په $-x$ عوض کړو.

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots II$$

دویمه رابطه له لومړۍ څخه منفي کوو.

$$\ln(1-x) - \ln(1-x) = 2x + \frac{2}{3}x^3 + \frac{2}{5}x^5 + \dots$$

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \frac{x^7}{7} + \dots \right)$$

دارنگه $x = \frac{1}{2n+1}$ وضع کوو.

$$\ln \frac{n+1}{n} = 2 \left(\frac{1}{2n+1} + \frac{1}{3(2n+1)^3} + \frac{1}{5(2n+1)^5} + \dots \right)$$

که اوس $n = 1$ شي $\ln 2$ په لاس راځي.

$$\ln 2 = 2 \left\{ \frac{1}{3} + \frac{1}{3(3)^3} + \frac{1}{5(3)^5} + \frac{1}{7(3)^7} + \dots \right\}$$

$$\ln 2 = 0.693147180$$

د هغې دقت تر 9 رقم دی.

کولای شو $\ln 2$ په قاعده د 10 بدل کړو.

$$\log N = m \cdot \ln N$$

$$m = 0.43429$$

$$\ln 2 = 0.434294 \cdot 0.693147 = 0.30103$$

په همدې ترتیب که $n = 2$ وي، $\ln 3$ حاصلېږي.

$$\ln 3 = 1.0986022$$

$$\ln 4 = \ln 2 \cdot 2 = \ln 2 + \ln 2$$

په همدې ترتیب د مرکبو اعدادو لوگارتم د لوگارتم له خاصیتونو نه په ګټه اخیستو په لاس راوړلای شو او د اولیه اعدادو لوگارتم مستقیماً د فورمول په واسطه په لاس راوړلای شو. **تقرین:** د لاندې عددونو طبیعي لوگارتم له فورمول نه په ګټه اخیستو پیدا کړئ! وروسته یې د 10 په قاعده بدل کړئ!

$$\ln 5 = ?$$

$$\ln 6 = ?$$

$$\ln 7 = ?$$

$$\ln 8 = ?$$

$$\ln 9 = ?$$

$$\ln 10 = ?$$

$$\ln 11 = ?$$

$$\ln 12 = ?$$

$$\ln_{10} 5 = ?$$

$$\ln_{10} 6 = ?$$

$$\ln_{10} 7 = ?$$

$$\ln_{10} 8 = ?$$

د پورته اعدادو د لوگارتم جدول ترتیب کړئ!

د x عددونه	Ln x	Log ₁₀ x

لوگاري افادې

عددي افادې يا برخې، چې په هغې کې لوگارتم موجود وي، لوگاري افادي ورته ويل کېږي، چې کولی شو د لوگارتم له خواصو نه په ګټه اخيستو هغه ساده او په نظر کې نيولی قيمت پيدا کړو.

د مثال په توګه :

$$\begin{aligned}
 1 - \log_2 \sqrt[4]{32} &= \log_2 \sqrt[4]{32} = \log_2 2^{\frac{4}{5}} = \frac{4}{5} \log_2 2 = \frac{4}{5} \\
 2 - \log 50 + \log 2 - \log \sqrt[3]{100} &= \log 50 \cdot 2 - \log 10^{\frac{2}{3}} = \log 100 - \frac{2}{3} \log 10 \\
 &= 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

لوگاري معادلې

د لوگاري معادلو د حل لپاره د لوگارتم له قوانينو نه په ګټه اخيستو هغه ساده کېږي، چې د اړوند مجهول قيمت پيدا شي.

مثالونه: له لاندې لوگاري معادلو څخه د مجهول قيمت پيدا کړئ!

$$\begin{aligned}
 1 - \log 2 + \log 3 &= \log x = \log (2 \cdot 3) = \log x = \log 6 = \log x \\
 x &= 6 \\
 2 - \log_{\sqrt{2}} x &= \log_{\sqrt{2}} 3 + \log_{\sqrt{2}} 6 = \log_{\sqrt{2}} x = \log_{\sqrt{2}} (3 \cdot 6) = \log_{\sqrt{2}} x = \log_{\sqrt{2}} 18 \\
 x &= 18 \\
 3 - \frac{\log_{\sqrt{2}} r}{\log_{\sqrt{3}} S} &= \log_x r \Rightarrow \log_x r = \log_S r \\
 x &= S \\
 4 - \log (x^2 - 1) &= 3 \Rightarrow x^2 - 1 = 2^3 \\
 x^2 &= 8 + 1 \\
 x^2 &= 9 \\
 x &= \pm 3
 \end{aligned}$$

مترکس او دیترمینانت

ټولیزه موخه

په مترکس او دیترمینانت پوهېدنه او د خطي معادلو د مسایلو په حل او د خطي معادلو د مجهولاتو په موندلو کې د هغو کارونه

- د زده کړې موخې: ددې څپرکې په پای کې به محصلین لاندې موضوعات زده کړي:
- د مترکس او دیترمینانت په مفهوم او د هغه په ډولونو پوهېدل.
 - د خطي معادلو د سیستم له ضرایبو څخه د مترکس ترتیب او په ستونونو او سطرونو کې لومړني بدلونونه.
 - پر مترکسونو باندې اساسي عملیې او د معکوس مترکس پیدا کول.
 - د خطي معادلو د سیستم د مجهولاتو پیدا کول.
 - د مترکسونو په واسطه د ضرایبو ترتیب او د خطي معادلو د سیستم ثابتونه.

د خطي معادلو سیستمونه، مترکسونه او دیترمینانتونه

په ریاضي، میخانیکي، تخنیکي او اقتصادي علومو کې ډېرې ستونزې د خطي معادلو د سیستم په حل پورې اړه لري. همدارنګه د ښوونځي په دوران کې د لاندې مسایلو سره اشنا شوي یاست:

مثال: د ثریا، ظاهر او نفیسې د عمر مجموعه 60 ده، د نفیسې د عمر له درې چنده څخه د ظاهر د عمر دوچنده منفي کوو، د ثریا عمر حاصلېږي. د هغو هر یو څو کلن دی، د مسألې د حل لپاره د ثریا عمر په C ، د ظاهر عمر په Z او د نفیسې عمر په N ښیو؛ نو کولی شو ولیکو:

$$\left. \begin{array}{l} Z + N + C = 60 \\ 2Z + N + 3C = 120 \\ -2Z + 3N = C \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} Z + n + C = 60 \\ 2Z + N + 3C = 120 \\ -2Z + 3N - C + 0 \end{array} \right\}$$

په پورته مثال کې لیدل کېږي، چې له ضرایبو سره درې معادلې او درې مجهوله شته، په همدې ترتیب که n مجهول او m معادله په لاندې ترتیب ولرو.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

په دې توګه ویلی شو، چې د n مجهوله ورکړل شویو خطي معادلو m سیستم، چې $x_1, x_2, \dots, x_n$ مجهولونه او $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}, \dots, a_{m1}, \dots, a_{mn}$ د سیستم ضریبونه $b_1, b_2, b_3, \dots, b_m$ ثابت اعداد په سیستم کې ورکړل شوي دي.

که د ذکر شوو معادلو سیستم د حل لرونکی وي، د سازگار سیستم په نوم او که سیستم د حل لرونکی نه وي، د ناسازگار سیستم په نوم یادېږي.

د خطي معادلو د سیستم د حل نه موخه په اول قدم کې د سیستم سازگارېدل او یا نا سازگارېدل دي. که چېرې سیستم سازگار وي، باید هغه حل کړو. د خطي معادلو د سیستم په تیوري کې وړاندې شول، چې د هغې په واسطه د خطي معادلو هر سیستم حل کولای شو.

د خطي معادلو د سیستمونو معادل کېدل او په سیستم کې لومړنی بدلون که د خطي معادلو یو یا څو سیستمونه ورکړل شوي وي، چې په عین مجهولونو د مساوي حل لرونکي وي، له یو بل سره معادل دي او یا په بل عبارت که یو یا دوه سیستمونه د خطي معادلو له یو بل سره معادل وي، د هغوی حل یوله بل سره مساوي دی.

مثال: د خطي معادلو سیستمونه یو له بل سره معادل دي، ځکه چې:

حل:

$$\begin{cases} 2x - y = -3 \\ x + y = 3 \end{cases} \wedge \begin{cases} x + y = 3 \\ -2x - y = -3 \end{cases}$$

یواځینی $(x, y) = (0, 3)$ دی

مثال: د خطي معادلو سیستمونه یو له بل سره معادل دي.

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ -x - y = -3 \end{cases} \wedge \begin{cases} 2x + y = 4 \\ -2x - y = -3 \end{cases}$$

دا ځکه چې دواړه سیستمونه ناسازگار دي، یعنې د هغې د حل سیټ خالي دی.

په خطي معادلو کې لومړني بدلونونه

- ۱- په ورکړل شوي سیستم کې د دوو معادلو د محل تعویض کول
- ۲- یوه له معادلو څخه په یوه حقيقي د صفر خلاف عدد کې ضربول
- ۴- د معادلو له سیستم یو څخه د سیستم له بلې معادلې سره جمع کول، چې په حقيقي عدد کې ضرب شوی وي.

۵- له سیستم څخه د معادلې گرځېدنه، چې مطابقت جوړوي.
د اجرا کولو په نتیجه کې هر یو له لومړنیو بدلونونو څخه د ورکړ شوو خطي معادلو په سیستم کې د نوو خطي معادلو سیستم حاصلېږي، چې له لومړني سیستم سره معادل دی.

د مجهولونو د تدریجي حذف کولو په طریقه د خطي معادلو د سیستم حل د Gauss میتود یو له تر ټولو اسانه میتودونو څخه د حقيقي عددونو له ضریبونو سره د خطي معادلو د سیستم حل د Gauss له میتود څخه عبارت دی، یعنې د مجهولونو د تدریجي حذف کولو طریقه ده.

که د لومړنیو بدلونونو په جریان کې د خطي معادلو په سیستم کې معادله لاندې شکل ونیسي، هغه له سیستمه لیرې کوو.

$$ox_1 + ox_2 + ox_3 + \dots + ox_n = 0 \dots I$$

که د خطي معادلو په سیستم کې د بدلون په جریان کې معادله لاندې شکل ولري، ورکړ شوی سیستم ناساز کار دی، یعنې حقیقت نه لري.

$$ox_1 + ox_2 + ox_3 + \dots + ox_n = b = b \neq 0$$

اوس دلته د گاوس میتود تر مطالعې لاندې نیسو. فرض کوو، چې د ورکړل شویو خطي معادلو په سیستم کې پورته 1 او 2 شکل وجود نه لري.

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_{1n} x_n = b_1$$

$$a_2 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_{2n} x_n = b_2$$

$$a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \dots + a_{mn} x_n = b_m$$

د پورته سیستم اوله معادله د اول حد په ضریب تقسیموو.

$$x_1 + \frac{a_{12} x_2}{a_{11}} + \dots + \frac{a_{1n} x_n}{a_{11}} = b_1$$

$$a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n = b_2$$

$$a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \dots + a_{mn} x_n = b_m$$

اوس لومړۍ معادله په $a_{31} -$ کې ضربوو او له دويمې معادلې سره يې جمع کوو، وروسته د درېيمې معادلې د اول حد ضريب، يعنې $a_{31} -$ په اوله معادله کې ضربوو او له درېيمې معادلې سره يې جمع کوو، په همدې طريقه تر اخره د اولې معادلې ضريب په $a_{m1} -$ کې ضربوو او له اخري معادلې سره يې جمع کوو او دې ته ورته طريقې ته تر هغې دوام ورکوو، چې سيستم لاندې شکل خپل کړي.

$$\begin{aligned}x_1 + c_{12}x_2 + \dots + c_{1n}x_n &= d_1 \\0 + c_{22}x_2 + \dots + c_{2n}x_n &= d_2 \\0 + 0 + \dots + c_{3n}x_n &= d_3 \\0 + 0 + 0 + \dots + c_{mn}x_n &= d_m\end{aligned}$$

پورته عمليات ليدل کېږي، چې تر اصلي قطر لاندې ټول حدونه صفر شوي، بڼا له اخري معادلې څخه $x_n = \frac{d_n}{c_{nn}}$ حاصلېږي، دا قيمت په $(n-1)$ ام معادله کې وضع کوو، د x_{n-1} مجهول قيمت حاصلېږي، په همدې ترتيب د $x_1, x_2, \dots, x_n$ مجهولونو قيمتونه لاسته راځي. مثال: لاندې سيستم د گاوس له ميتود نه په ګټه اخيستو حل کړئ!

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + 4x_3 &= 1 \\x_2 - x_3 &= 2 \\2x_1 - x_2 + x_3 &= -3\end{aligned}$$

حل

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -5 & -7 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -12 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + 4x_3 &= 1 \\0 + x_2 + x_3 &= 2 \Rightarrow -12x_3 = 5 \rightarrow x_3 = -\frac{5}{12} \\0 + 0 - 12x_3 &= 5 \\x_2 + \frac{5}{12} &= +2 \rightarrow x_2 = 2 - \frac{5}{12} = \frac{19}{12} \\x_1 + 2\left(\frac{19}{12}\right) + 4\left(-\frac{5}{12}\right) &= 1 \rightarrow x_1 = -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

نو د حل سیټ یې عبارت دی له:

$$A = \{x_1, x_2, x_3\} = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{19}{12}, \frac{-5}{12} \right\}$$

د مترکسونو ډولونه Tupes of Matrix

۱- سطري مترکس: هغه مترکس، چې یواځې یو سطر لري.

$$[2], [2 \quad 1], [1 \quad 0 \quad -3]$$

۲- ستوني مترکس: هغه مترکس، چې د یوه ستون لرونکی وي.

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

۳- مربعي مترکس: هغه مترکس چې د سطرونو شمېر یې د ستون له شمېر سره مساوي وي.

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$$

۴- مستطیلي مترکس: هغه مترکس چې د سطرونو شمېر یې د ستونونو له شمېر سره مساوي نه وي.

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{bmatrix}$$

۵- صفري مترکس: هغه مترکس چې ټول عناصر یې صفر وي.

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

۶- مساوي مترکسونه: هغه مترکسونه چې د هغې د سطر اوستونو ټاکلي عناصر تر الجبري عملیاتو وروسته مساوي شي.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 2+2 \\ 3-1 & 2+3 \end{bmatrix} \Rightarrow A = B$$

د دویم او درېیم ترتیب دیترمینانتونه

په تېرو بحثونو کې مو د خطي معادلو د سیستم د حل تیوري مطالعه کړه. البته ذکر شوی میتود پیچلی نه دی، ولې د اجراکولو تقاضا یې یو رنگه عمليې ورکوي، چې د هغې د الگورتیم تهیه د کمپیوټري ماشین د پروگرام لپاره امکان لري. ولې یو عمومي فورمول د خطي معادلو د ټولو سیستمونو د حل لپاره نه شو طرحه کولای. معلومه ده چې د عمومي فورمولونو طرح کول د خطي معادلو د ضریبونو او ثابتو پواسطه په بله طریقه امکان لري. د بحث دا طریقه د دیترمینانت د تیورۍ پر بنسټ ولاړه ده.

مخکې له دې چې د دیترمینانتونو عمومي تیوري مطالعه کړو، لومړی د دوه مجهوله او درې مجهوله خطي معادلو په ځانگړو سیستمونو خبرې کوو.

$$\begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{bmatrix} \dots\dots\dots I$$

پورته سیستم د گاوس په میتود حلوو، که $a_{11} \neq 0$ وي؛ نو د 1 سیستم له لاندې سیستم سره معادل دی.

$$\begin{bmatrix} x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 = \frac{b_1}{a_{11}} \\ \left(a_{22} - \frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}}\right)x_2 = b_2 - \frac{b_1a_{21}}{a_{11}} \end{bmatrix}$$

البته که چېرې $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ وي، د اصلي مترکس پواسطه ۱ سیستم وړاندې کولی شو.

واقعاً لیدل کېږي، چې $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ افاده د مترکس د فرعي او اصلي قطر د حاصل ضرب له حاصل تفریق څخه عبارت دی.

تعریف: $D = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ د مترکس د دیترمینانت په نامه یا د دویم ترتیب د

دیتریمینانت په نامه یادوو . ذکر شوی دیتریمینانت په لاندې ډول بودلی شو.

$$D = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

هغه عددونه، چې د فورمول د کسرونو په صورت کې قرار لري، هم د دوو د ترتیب دیتریمینانتونه دي، یعنې د x_1 فورمول لپاره لرو.

$$D = \begin{pmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{pmatrix} = b_1a_{22} - b_2a_{21}$$

لیدل کېږي، چې د هغه عدد پیدا کول، چې د کسر په صورت کې د x_1 د ټاکلو لپاره قرار لري، د مترکس له دیتریمینانت څخه عبارت دی، چې د اول ستون د تعویض په نتیجه کې د ثابتونو سیستم په وکتور ورکړل شوی، یعنې $\vec{b} = (b_1, b_2)$ حاصل شوی همدارنګه د x_2 لپاره لرو چې:

$$D_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{pmatrix} = a_{11}b_2 - a_{12}b_1$$

D_2 د مترکس له دیتریمینانت څخه عبارت دی، چې د دویم ستون د تعویض په نتیجه کې په $\vec{b} = (b_1, b_2)$ وکتور دی، په حاصل شوي مترکس کې لاندې قضیه په دې ترتیب ثبوتوو.

قضیه: که د دوه مجهوله خطي معادلو د سیستم د اصلي مترکس د دیتریمینانت د صفر خلاف وي؛ نو د ورکړل شوي سیستم حل د لاندې فورمول په واسطه وړاندې کولی شو.

$$x_1 = \frac{D_1}{D} \wedge x_2 = \frac{D_2}{D}$$

مثال: د لاندې خطي معادلو سیستم حل کړئ!

$$3x_1 + 4x_2 = -9$$

$$5x_1 + 7x_2 = -17$$

حل:

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} = 21 - 20 = 1$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} -9 & 4 \\ -17 & 7 \end{vmatrix} = 63 + 68 = 5$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 3 & -9 \\ 5 & -17 \end{vmatrix} = -51 + 45 = -6$$

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{5}{1} = 5 \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{-6}{1} = -6$$

د توابعو لمټ او مشتقات

ټوليزه موخه

په عالي رياضياتو او اقتصادي موضوعاتو کې د لمټ له کارونې سره بلدتيا

- د زده کړې موخې: ددې خپرکي په پای کې محصلين لاندې موضوعات زده کولای شي:
- د مجاورت مفهوم، د تابع لمټ او د مستقل متحول لمټ.
 - له مبهمو اشکالو نه خبرېدنه، په لمټ کې د هغې مفهوم پيژندل او د مبهمو شکلونو رفع.
 - له عالي رياضياتو سره د توابعو د لمټ د ارتباط په اړه معلومات.

د يوې تابع لمټ

څرنگه چې د مستقل متحول او تابع له مفهوم سره پوره بلدتيا لرو، اوس که په يوه رابطه کې x مستقل متحول او y د هغې تابع قبول کړو، که چېرې x تحول وکړي، Y هم تحول کوي، په دې تحولاتو کې کله داسې راځي، چې د تابع څرنگوالی د مستقل متحول قيمت ته په نږدې مجاورت کې مطالعه کېږي، کله چې دا قيمت a وي او x تحول تر کومه چې ممکن وي a ته نږدې کوو.

$$x \rightarrow a$$

په دې ځای کې لازم دي لومړی د يوې تابع د لمټ د مفهوم په اړه بحث د لمټ تعريف ته پرېږدو. که $y = f(x)$ په نظر کې ونيسو، هغه وخت چې x ټاکلی عدد a ته تقرب کوي، y د b خواته تقرب کوي، چې دې قيمت ته د تابع لمټ ويل کېږي. البته کله داسې هم پېښېږي، چې تابع لمټ نه لري. ځکه د تابع او د متحول په تحولاتو او ماهيت پورې اړه لري.

مثال: $y = 3x + 5$ تابع په نظر کې نیسو، کله چې د x متحول 2 ته ډېر نږدې قیمتونه اختیار کړي، یعنې د 2 طرف نږدې شي، یعنې $x \approx 2$ او $y \approx 11$ دا حقیقت لاندې جدول ته په کتو درک کولای شو.

X	1.5	1.9	1.95	1.99	2	2.09	2.1
$Y=3x+5$	10.4	10.7	10.9	10.97	11	11.27	11.3

په $y = 3x + 5$ کې که چېرې x 2 قیمت واخلي، تابع مساوي په 11 کېږي، مګر په یو شمېر توابعو کې کله چې مستقل متحول د یوه ثابت عدد خواته تقرب کوي، د تابع قیمت ناپاکلی (نامعین) کېږي.

څرنگه چې په $y = 3x + 5$ تابع کې $(x \rightarrow 2)$ د تابع قیمت $(x \rightarrow 11)$ کېږي. کولای شو ووايو، چې د یادې تابع لمټ هغه وخت، چې x د 2 طرف ته تقرب کوي په طرف د 11 تقرب کوي. د افادې دا طرز په سمبولیکه بڼه لیکلی شو.

$$\text{Limit}(3x + 5) = 11$$

$$x \rightarrow 2$$

$$\lim(3x + 5) = 11$$

$$x \rightarrow n$$

مثال:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x}{x+1} = \frac{2(-2)}{-2+1} = \frac{-4}{-1} = 4$$

مبهم شکلونه (ناپاکلي)

ډېر کله له داسې توابعو سره مخامخ کېږو، چې د متحول په ځینو قیمتونو غیر متماضي دي یا کاملاً ځان ته ناپاکلی شکل اختیاروي، لکه:

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty, -\infty, 1^{\infty}, \infty^0, 0^{\infty}, 0 \cdot \infty$$

له لمټ نه په ګټه اخیستو کولای شو د پورته شکلونو لپاره د حد قیمت پیدا کړو. له پورته شکلونو څخه هر یو د ابهامو په خاصه شیوه رفع کېږي.

۱- د $\frac{0}{0}$ مبهم شکل رفع: که د $\frac{f(x)}{g(x)}$ تابع نسبت د a په قیمت $\frac{0}{0}$ ناپاکلی شکل اختیاروي، یعنې.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

د ابهامو د رفعې لپاره تابع تر ټولو اسانه شکل ته راوړو. له دې ځايه چې د $x=a$ په قيمت صورت او مخرج صفر کېږي؛ نو صورت او مخرج د مشترک فکتور لرونکی دی، چې اختصار کېدای شي او د تابع د حد قيمت پيدا کېږي.

مثال:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1} = ?$$

حل: څرنګه چې د $x=1$ په قيمت $\frac{0}{0}$ شکل اختياروي؛ نو د هغې د حد قيمت پيدا کوو.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

د ابهامو رفع $\frac{\infty}{\infty}$

که چېرې توابع د نسبت $\frac{f(x)}{g(x)}$ شکل ولري، داسې چې.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{F(x)}{g(x)},$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \infty$$

په دې حالت کې د ابهامو د رفع لپاره صورت او مخرج په هغه متحول تقسيموو، چې تر ټولو لوړ توان لرونکی وي. البته په درو حالتونو کې مطالعه کېږي:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^3 = bx^2 + c}{ax^2 + bx + c} = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{ax^3}{x^3} + \frac{bx^2}{x^3} + \frac{c}{x^3}}{\frac{ax^2}{x^3} + \frac{bx}{x^3} + \frac{c}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a + \frac{b}{x^2} + \frac{c}{x^3}}{\frac{a}{x} + \frac{b}{x^2} + \frac{c}{x^3}} = \frac{a}{0} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^2 + bx}{ax^3 + bx} = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{ax^2}{x^3} + \frac{bx}{x^3}}{\frac{ax^3}{x^3} + \frac{bx}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{a}{x} + \frac{b}{x^2}}{a + \frac{b}{x^2}} = \frac{0}{a} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^2 + bx}{ax^2 + bx} = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^2 + bx}{ax^2 + bx} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{ax^2}{x^2} + \frac{bx}{x^2}}{\frac{ax^2}{x^2} + \frac{bx}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a + \frac{b}{x}}{a + \frac{b}{x}} = \frac{a}{a} = 1$$

$(\infty - \infty)$ د ابهامو رفع

کله چې $g(x), f(x)$ دوه تابع وي، داسې چې:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - g(x)] = \infty - \infty$$

په دې حالت کې هغه په $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ دې شکلونو راوړو، وروسته د ابهامو په رفع اقدام کوو:

مثال:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{9}{x-1} - \frac{8x+10}{x^2-1} \right)$$

حل:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{9}{x-1} - \frac{8x+10}{x^2-1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{9(x+1) - 8x - 10}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(9x+9-8x-10)}{x^2-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-1}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{2}$$

د تابع تزايد او مشتقات

ټوليزه موخه

په اقتصادي او تخنيکي مسایلو کې د مشتق د کارونې په موخه د هغو توضېح.

د زده کړې موخې: ددې خپرکي په پای کې محصلین لاندې موضوعات زده کولای شي:

- د مستقل متحول په تزايد، د تابع په تزايد پوهېدل او د هغوی تر منځ رابطه.
- د الجبري او هندسي مشتق تعريف او د هغه د مفهوم درک.
- د مشتق د قضیو نه په ګټه اخیستو د الجبري او مثلثاتي توابعو د مشتق تطبیق.
- په اقتصاد، صنعت او نورو کې له مشتق نه ګټه اخیستل.
- د مشتق په مرسته د توابعو د پېچلو لټونو پیدا کول.
- تعريف او د قسمي مشتقاتو پیدا کول.

د تابع تزايد او مشتقات

کله چې $y = F(x)$ تابع په نظر کې ونیسو، که x متحول د Δx په اندازه زیات شي د y تابع هم د Δy په اندازه زیاتوالی کوي، چې کولای شو دا زیاتوالی داسې پیدا کړو.

$$y = F(x)$$

$$y + \Delta y = F(x + \Delta x)$$

$$\Delta y = F(x + \Delta x) - y$$

$$\Delta y = F(x + \Delta x) - F(x)$$

مثال: د $y = 3x^2$ تابع زیاتوالی پیدا کړئ!

$$\begin{aligned}y + \Delta y &= 3(x + \Delta x)^2 \\ \Delta y &= 3(x + \Delta x)^2 - y \\ \Delta y &= 3(x + \Delta x)^2 - 3x^2 \\ \Delta y &= 3(x^2 + 2x\Delta x + \Delta x^2) - 3x^2 \\ \Delta y &= 3x^2 + 6x\Delta x + 3\Delta x^2 - 3x^2 \\ \Delta y &= 6x\Delta x + 3\Delta x^2\end{aligned}$$

مثال: د لاندې تابع تزايد پیدا کړئ!

$$\begin{aligned}y &= 6 + x \\ y + \Delta y &= 6 + x + \Delta x \\ \Delta y &= 6 + x + \Delta x - y \\ \Delta y &= 6 + x + \Delta x - 6 - x \\ \Delta y &= \Delta x \\ y &= 7 \\ y + \Delta y &= 7 \\ \Delta y &= 7 - y \\ \Delta y &= 7 - 7 \\ \Delta y &= 0\end{aligned}$$

تمرین:

- ۱- په $y = 2x + 5$ تابع کې به د x قیمت څو وي، که چېرې $x_0 = 4, \Delta x = 0.007$ وي.
- ۲- د $y = 3x^2 - 5x + 4$ تابع تزايد پیدا کړئ!
- ۳- په $y = \frac{1}{x}$ تابع کې د Δy قیمت پیدا کړئ، که چېرې $x_0 = 9, \Delta x = 0$ وي؟
- ۴- په $y = x^2$ تابع کې د Δy او Δx تزايد پیدا کړئ!

مشتقات

د مشتق الجبري تحليل او د هغه تعريف

فرض کوو چې $y = f(x)$ تابع د (a, b) په څېر فاصله کې یوه متمادي تابع ده، که x_0 د متحول لومړنۍ قیمت x او x_1 بل قیمت، چې x_0 ته ډېر نږدې دی، یعنې $x_1 = x_0 + \Delta x$ وي، په دې حالت کې به د پورته تابع قیمت y_1, y_0 وي.

څنگه چې $y_1 = y_0 + \Delta y$ دی، په دې ځای کې به $\Delta x = x_1 - x_0$ وي. کولی شو نسبت $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ یې تشکیل کړو. هغه وخت چې $\Delta x \rightarrow 0$ وي، په دې حالت کې $\Delta y \rightarrow 0$ کوي، بڼا $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ نسبت د $\frac{0}{0}$ په طرف ځي، چې دا یو مبهم حالت دی او کولی شو د تابع د حد قیمت محاسبه کړو او د ابهامو رفع وکړو، په نتیجه کې کولی شو مشتق دارنگه تعريف کړو:

لمټ د تابع تزايد د متحول پر تزايد هغه وخت، چې د متحول تزايد د صفر طرف ته تقرب کوي، عبارت د تابع له مشتق څخه دی، چې هغه دارنگه لیکل کېږي.

$$\begin{aligned} y &= f(x) \\ y + \Delta y &= f(x + \Delta x) \\ \Delta y &= f(x + \Delta x) - f(x) \\ \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ \frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \end{aligned}$$


د تابع مشتق نظر x ته عموماً په $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ ، $y' = f'(x)$ یا y'_x ښودل کېږي.

مثال: د $y = 2x - 3$ تابع په نظر کې نیول شوی، په الجبري تحليل د هغې مشتق پیدا کړئ!

$$\begin{aligned} y &= 2x - 3 \\ y + \Delta y &= 2(x + \Delta x) - 3 \\ \Delta y &= 2x + 2\Delta x - 3 - 2x + 3 \\ \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{2\Delta x}{\Delta x} \rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 2 \\ y &= 2 \end{aligned}$$

د مشتق هندسي تحليل

فرضاً د $y = f(x)$ تابع د (a, b) په انټروال کې متمادي ده. د دې تابع د منحنی د پاسه دوه نقطې $P_0(x_0, y_0)$ او $P_1(x_1, y_1)$ په نظر کې نیسو، د L قاطع چې له P_0 او P_1 نقطې تېرېږي د x محور له مثبت جهت سره ∞ زاویه جوړوي. که د P_1 نقطه P_0 ته بې نهایت نږدې شي، د L قاطع په یوه حدي حالت کې د P_0 په نقطه کې د ذکر شوې تابع په منحنی باندې مماس وي. د پورته شکل له قراره د L قاطع د P_1 په حالت کې راځي، چې د x محور له مثبت جهت سره زاویه تشکیلوي.



$$\tan \alpha = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = m = L$$

$$\tan \alpha = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = m = L$$

په حدي حالت کې یعنې په هغه وخت کې، چې P_1 د P_0 طرف ته تقرب کوي د α زاویه عوض کېږي.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \tan \theta = L = m$$

نو نتیجه اخلو، چې د تابع د منحنی په یوه نقطه کې د مماس میل د منحنی په هغه نقطه کې د تابع د مشتق له قیمت څخه عبارت دی.

د الجبري توابعو مشتقات

قضیه: د ثابتې تابع مشتق $y = C$ صفر دی.

ثبوت: پوهېږو چې:

$$y + \Delta y = C$$

$$\Delta y = C - y \rightarrow \Delta y = C - C$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{C - C}{\Delta x} \rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 0$$

مثال:

$$1 - y = 7 \Rightarrow y = 0$$

$$2 - y = \log 25 \Rightarrow y = 0$$

$$3 - y = \sin 30^\circ \Rightarrow y = 0$$

۲ قضیه: په طاقت لرونکې افاده کې مشتق مساوي دی په:

$$y = ax^n \Rightarrow y = anx^{n-1}$$

$$y + \Delta y = a(x + \Delta x)^n$$

$$\Delta y = a(x + \Delta x)^n - ax^n = a[(x + \Delta x)^n - x^n]$$

$$\Delta y = a[(x + \Delta x - x)(x + \Delta x)^{n-1} + (x + \Delta x)^{n-2}x + \dots + x^{n-1}]$$

$$\Delta y = a[\Delta x(x + \Delta x)^{n-1} + (x + \Delta x)^{n-2}x + \dots + x^{n-1}]$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = a[(x + \Delta x)^{n-1} + (x + \Delta x)^{n-2}x + \dots + x^{n-1}]$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = a \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [(x + \Delta x)^{n-1} + (x + \Delta x)^{n-2}x + \dots + x^{n-1}]$$

$$y = a(x^{n-1} + x^{n-1} + \dots + x^{n-1})$$

$$y = anx^{n-1}$$

N ځلې x^{n-1} جمع کېږي، پورته قضیه د منفي، کسري طاقتونو لپاره هم سمه ده.

د مرکبو توابعو مشتق يا د تابع د تابع مشتق

الجبري قاعده Chain Rule

که y د u تابع او u د x تابع وي، په دې صورت کې y د x د تابع تابع ده.يعنې که $y = f(u)$ او $u = g(x)$ وي؛ نو د $(f \circ g)_x = f(g(x))$ هغې مشتق:

$$(f \circ g)_x = f(g(x)) \cdot g(x)$$

$$\Delta y = \Delta y$$

$$\Delta y \cdot \Delta u = \Delta y \cdot \Delta u \Rightarrow \Delta y = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \Delta u$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x} \Rightarrow \begin{bmatrix} y = y_a \cdot u_x \\ y = f(u) \cdot u(x) \end{bmatrix}$$

که خو متغیره یو د بل تابع وي، مثلاً $y = F(u)$ او u د V تابع او V د W تابع او W د X تابع وي، په دې صورت کې کېدای شي ولرو:

$$y_x = y_u \cdot u_v \cdot V_w \cdot W_x$$

مثال: د $F(x) = (x^3 + 3x)^5$ تابع مشتق پیدا کړئ!

حل: کله چې $x^3 + 3x = g(x)$ وټاکل شي، نو بیا $F(x) = F(g(x))$

$$(f \circ g)_x = F(g(x))$$

$$f(x) = F(g(x)) \cdot g(x)$$

$$f(x) = 5(x^3 + 3x)(3x^2 + 3)$$

$$y = \left(\frac{2x^2 - 6x + 3}{x - 1} \right)^7$$

د مثلثاتي توابع مشتقات

قضیه: د $y = \sin x$ مشتق عبارت دی له $y = \cos x$ څخه.

ثبوت:

$$y + \Delta y = \sin(x + \Delta x)$$

$$\Delta y = \sin(x + \Delta x) - \sin x$$

د مثلثاتي فورمولونو په اساس

$$\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cdot \sin \frac{A-B}{2}$$

$$\Delta y = 2 \cos \frac{x + \Delta x + x}{2} \cdot \sin \frac{x + \Delta x - x}{2}$$

$$\Delta y = 2 \cos \frac{2x + \Delta x}{2} \cdot \sin \frac{\Delta x}{2}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \cos \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right) \cdot \sin \frac{\Delta x}{2} \cdot \frac{1}{\Delta x}$$

$$\Delta y = L(x + \Delta x) - Lx$$

$$\Delta y = L \left(\frac{x + \Delta x}{x} \right)$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\Delta x} L \left(\frac{x + \Delta x}{x} \right)$$

د لوړو مرتبو مشتقونه

که f متمادي تابع او مشتق منونکې وي، کولای شو لومړی، دویم، درېیم او n ام مشتق یې پیدا کړو. په داسې حال کې، چې د تابع درجه n وي، $(n+1)$ یې صفر دی. لاندې رابطې د مشتقاتو د مراتبو ښودونکې دي.

$$\frac{dy}{dx} = f(x), \frac{d^2y}{dx^2} = f'(x), \frac{d^3y}{dx^3} = f''(x), \dots, \frac{d^n y}{dx^n} = f^{(n)}(x)$$

مثال: د $y = 5x^3 - 2x^2 + \log 5$ تابع درېیم او څلورم مشتق پیدا کړئ!

$$f(x) = \frac{dy}{dx} = 45x^2 - 4x + 0$$

$$f'(x) = \frac{d^2y}{dx^2} = 90x - 4$$

$$f''(x) = \frac{d^3y}{dx^3} = 90, f'''(x) = \frac{d^4y}{dx^4} = 0$$

د لوگاريتمي تابع مشتقات

د $y = Lx$ لوگاريتمي تابع په نظر کې نیسو، نظر تزايد ته لرو.

$$y + \Delta y = L(x + \Delta x)$$

د لوگارتم د قاعدو څخه په ګټه اخیستو لیکلای شو.

$$\Delta y = L(x + \Delta x) - Lx$$

$$\Delta y = L \left(\frac{x + \Delta x}{x} \right)$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\Delta x} L \left(\frac{x + \Delta x}{x} \right)$$

که Δx صفر شي، پورته رابطه د $\frac{0}{0}$ مبهم شکل اختیاروي، د ابهام د رفع کولو لپاره فرض

$$\text{کوو، چې } \frac{\Delta x}{x} = a \text{ نو } \Delta x = ax.$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{ax} \cdot L(1+a)$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{x} \cdot L(1+a)^{1/a}$$

د لوگارتم د قاعدو په اساس لیکلای شو.

کله چې Δx صفر ته تقرب وکړي.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{x} \lim (1+a)^{\frac{1}{a}}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{x} L e = \frac{1}{x}$$

$$y = \frac{1}{x}$$

که د لوگارتیم قاعده پرته له e کوم بل عدد وي، لکه a ، په دې صورت کې لرو چې:

$$y = \log_a x \Rightarrow$$

$$y = \frac{1}{x} \log_a e = \frac{1}{x} \cdot \frac{\log_a e}{\log_e a}$$

$$y = \frac{1}{x \cdot La}$$

هرکله $y = \log u$ وي او x د تابع وي؛ نو لرو چې:

$$y = \log u = Lu$$

$$\frac{\bar{u}}{y} = \frac{u}{u}$$

مثال: د لاندې تابع څخه نظر x ته مشتق ونیسئ!

$$y = \log_a x + \log_x a$$

حل: کولای شو د قاعدو د تبدیلی پر اساس ولیکو.

$$y = \log_a x + \frac{1}{\log_x a}$$

$$y' = \frac{1}{xLa} + \frac{1}{x \cdot La (\log_a x)^2}$$

مثال: $f'(x) = ?$, $f(x) = L(x^2 + 1)$

حل:

$$u = x^2 + 1 \Rightarrow f(x) = Lu$$

$$u' = 2x$$

$$\frac{\bar{u}}{y} = \frac{u}{u} Le$$

$$f'_{(x)} = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

د الجبري توابعو د مشتقاتو جدول

تابع (y)	مشتق $(\bar{y})$
$y = a$	$y' = 0$
$y = u$	$y' = u'$
$y = au$	$y' = u'$
$y = u + v + w$	$y' = u' + v' + w'$
$y = u \cdot v$	$y' = u'v + v'u$
$y = \frac{u}{v}$	$y' = \frac{u'v + v'u}{v'}$
$y = au^n$	$y' = nau^{n-1}$
$y = a^u$	$y' = e^u$
$y = e^u$	$y' = \frac{u'}{e^u}$
$y = Lu$	$y' = \frac{\bar{u}'}{uLa}$
$y = \text{Log}_a u$	$y' = \frac{\bar{u}'}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}}$
$y = \sqrt[n]{u}$	$x = \frac{1}{y}$
$y = f(x)$	

د مثلثاتي توابعو د مشتقاتو جدول

تابع (y)	مشتق ($\bar{y}$)
$y = \text{Sinu}$	$y' = u' \text{Cosu}$
$y = \text{Cosu}$	$y' = -u' \text{Sinu}$
$y = \text{Logu}$	$y' = \frac{1}{u} (1 + \text{Tag}^2 u)$
$y = \text{Cotagu}$	$y' = -\frac{1}{u} (1 + \text{Cotg}^2 u)$
$y = \text{Secou}$	$y' = \text{Secou} \cdot \text{utagu}$
$y = \text{ArcSinu}$	$\bar{y}' = -\text{Cu secu} \cdot \bar{u} \text{Cotgu}$
$y = \text{ArcCosu}$	
$y = \text{Arctagu}$	$y' = \pm \frac{\bar{u}}{\sqrt{1-u^2}}$
$y = \text{ArcCotgu}$	$y' = -\frac{\pm \bar{u}}{\sqrt{1-u^2}}$
$y = \text{ArcSecou}$	
$y = \text{Arc cosecu}$	$y' = \frac{\bar{u}}{1+u^2}$
	$y' = -\frac{\bar{u}}{1+u^2}$
	$y' = \frac{\bar{u}}{u \cdot \sqrt{u^2-1}} = -\frac{u'}{u \cdot \sqrt{u^2-1}}$

په اقتصادي مسایلو کې د مشتقاتو کارونه

په عام ډول مشتق او د مشتق اخیستل په ځینو اقتصادي بحثونو کې، چې په مقداري ډول تر ارزونې لاندې نیول کېږي، فوق العاده اهمیت لري. په دې ترتیب چې د گټې د مینیمم او مکزیم کولو او همدارنګه د مکزیم او مینیمم د شرایطو ټاکل د گټې او موخې په مقصد او همدارنګه د ناچاری له مخې د ټولو مقادیرو د محاسبې لپاره د مشتق څخه ګټه اخلو.

دلته په لنډ ډول د مشتق محدوده کارونه په اقتصادي مسایلو کې په کار وړو. پوهېږو چې د یوې تولیدي موسسې ګټه عبارت ده د ټولو لاسته راغلو او ټول مصرف ترمنځ له توپیر څخه؛ نو په دې اساس که د ټولو لاسته راغلو او ټول مصرف توابعو په ترتیب سره په لاندې ډول وښیو.

$$TR = R(Q) \text{ د ټول عاید تابع}$$

$$TC = C(Q) \text{ د ټول لګښت تابع}$$

که تابع شي، عبارت ده له:

$$TT = TR - TC$$

$$TT = R(Q) - C(Q)$$

اوس که د مکزیم کولو مقصد ګټه وي؛ نو مقادیر باید له محصول څخه تولید کړي؛ څو ګټه حد اکثر ته ورسېږي. د ګټې لوړ حد ته د رسولو لپاره لازمي شرط دا دی، چې د ګټې تابع نسبت د مقدار محصول (Q) ته مشتق ونیول شي، وروسته دا مساوي له صفر سره شي؛ څو د Q مقدار چې د ګټې کچه حد اکثر یا حد اقل ته رسوي، لاس ته راشي.

کله چې د Q مقدار مشخص شي، باید تحقیق وکړو، چې آیا د Q لاسته راغلي مقدار ګټه مکزیم ته رسوي که مینیمم ته. د دې کار د سرته رسولو په خاطر باید د Q مقدار مشتق د دویمې مرتبې تابع ګټه فرض شي. که د دویمې مرتبې مشتق د Q قیمت ته منفي شو، په دې وخت کې به د Q مقدار ګټه مکزیم ته ورسوي او که برعکس د دویمې مرتبې مشتق علامه منفي شي، په دې وخت کې به د Q مقدار ګټه کم حد ته ورسوي. د مطلب د وضاحت په خاطر لاندې مثال په نظر کې نیسو.

مثال: د یوې تولیدي موسسې د ټول عاید او لګښت توابع په لاندې ډول راغلې دي:

$$R(Q) = 1000Q - 2Q^2$$

$$C(Q) = Q^3 - 59Q^2 + 1315Q + 2000$$

د محصول هغه مقادیر، چې گټه لوی ته رسوي مشخصه کړئ!

حل: پورته توابعو ته په کتو د گټې تابع تشکیلوو:

$$\pi = RQ - C(Q)$$

$$\pi = -Q^3 + 57Q^2 - 315Q - 2000$$

او د گټې د ماکزیم او منیمم معلومولو لپاره لازمي شرط عبارت دی له:

$$\frac{d\pi}{dQ} = -3Q^2 + 114Q - 315 = 0$$

$$Q_1 = 3$$

$$Q_2 = 35$$

اوس باید تحقیق وکړو، چې کوم یو د محصول Q_1 او Q_2 څخه گټه مکزیم ته رسوي، چې د دې کار لپاره باید د گټې د دویمې مرتبې مشتق تشکیل کړو.

$$\frac{d^2\pi}{dQ^2} = -6Q + 144$$

$$Q_1 = 3 \Rightarrow \frac{d^2\pi}{dQ^2} = -6Q + 144 > 0$$

$$Q_2 = 35 \Rightarrow \frac{d^2\pi}{dQ^2} = -6(35) + 144 < 0$$

لکه چې لیدل کېږي، موسسه د $Q=3$ په تولید سره خپله گټه حد اقل او د $Q=35$ په تولید سره خپله گټه اعظمي حد ته رسولی شي.

وروستی عاید او وروستی لگښت

که د ټول عاید او ټول لگښت تابع مشخصه وي، کولای شو د هغوی څخه په مشتق نیولو سره د نهایي توابعو د محصول د پارامتر نسبت او نهایي لگښت مشخص کړو. که د ټول عاید تابع او د ټول لگښت تابع په لاندې ډول په نظر کې ونیسو.

$$TR = R(Q)$$

$$TC = C(Q)$$

په دې وخت کې د نهایي عاید او نهایي لگښت توابع به په ترتیب سره مساوي شي په:

$$\frac{dTR}{dQ} = R(Q) = MR \rightarrow \text{د نهایي عاید تابع}$$

$$\frac{dTC}{dQ} = C(Q) = MC \rightarrow \text{د نهایي لگښت تابع}$$

مثال: د ټولو عوایدو او ټولو لگښتونو توابعو ته په پام سره په لومړي مثال کې په نهایتي سره او نهایتي لگښت به عبارت وي له:

$$MR = 1000 - 4Q$$

$$MC = 3Q^2 - 48Q + 1315$$

د گټې د ماکزیم او منیم کولو شرطونه

لکه څنګه چې مخکې ولیدل شول، د یوه تولید کوونکي له نظره مهمه مسأله دا ده، چې د خپل محصول څومره برخه تولید کړي؛ خو ځان ماکزیم ته ورسوي، د ریاضي له نظره کولای شو د رابطې یا روابطو تر عنوان لاندې د گټې د ماکزیم یا منیم کولو شرطونه بیان کړو. فرضوو چې د یوه تولیدونکي د ټول عاید او ټول لگښت توابع په لاندې ډول وي.

$$TR = R(Q)$$

$$TC = C(Q)$$

په دې حالت کې د گټې تابع عبارت ده له:

$$\pi = R(Q) - C(Q)$$

لازم شرط د گټې د ماکزیم یا منیم کولو لپاره:

$$\frac{d\pi}{dQ} = 0 \Rightarrow R(Q) - C(Q) = 0$$

$$R(Q) = C(Q)$$

$$MR = MC \dots I$$

نو تولیدوونکی باید د خپلې گټې د مکزیم لپاره تر هغه وخته تولید ته ادامه ورکړي، چې د هغه وروستي لگښتونه له وروستۍ گټې سره مساوي شي.

$$P = MR = MC \text{ قیمت}$$

لوړ حد ته د رسولو لپاره کافي شرط:

$$\frac{d^2\pi}{dQ^2} < 0 \Rightarrow R''(Q) - C''(Q) < 0$$

$$R''(Q) < C''(Q)$$

په پورتنۍ نامساوي $R''(Q)$ کې د ننوتلي منحنی میل او $C''(Q)$ د نهایتي قیمت د منحنی میل دی.

$$MR < MC \text{ میل}$$

په بل عبارت که کافي شرط د حد اکثر لپاره وي، دا چې د MC منحنی میل د MR منحنی له میل څخه زیات وي.

تمرین: د لاندې توابعو د هر یوه جزوي مشتقات لاسته راوړئ!

$$5x_1^3 - 2x_1^2x_2 + 7x_2^2 = y$$

$$y = 7x_1 + 16x_1x_2^2 + 4x_2^3$$

$$y = (2x_1 + 3)(x_2 - 2)$$

$$z = F\left(\frac{x}{y}\right)$$

$$z = F\left(\frac{y}{z}\right)$$

$$y = f(x^2 + y^2 + z^2)$$

انتیگرالونه

تعریف: د توابعو د عکس عمل مشتق اخیستلو ته د توابعو انتیگرال وایي، په بل عبارت که تابع $y = F(x)$ په نظر کې ونیسو، پوهېږو چې د دې تابع مشتق عبارت دی له:

$$y' = f'(x) = f(x)$$

په دې صورت کې د $F(x)$ تابع ته اولي تابع د $f(x)$ وایي، لکه څنګه چې ملاحظه کېږي، که $F(x)$ معلوم وي، د انتیگرال په نیولو سره کولای شو $F(x)$ ته ورسېږو، د $f(x)$ انتیگرال د ښودلو لپاره د $\int$ نښې څخه ګټه اخلو.

$$\int f(x)dx = F(x)$$

په پورتنۍ رابطه کې dx د دې مطلب ښودونکی دی، چې د $f(x)$ تابع څخه د x په نسبت انتیگرال نیول شوی، اوس لاندې دوه رابطې په نظر کې نیسو.

$$[F(x)] = f(x)$$

$$[F(x) + C] = f(x)$$

لکه څنګه چې لیدل کېږي د $F(x)$ مشتق له $F(x) + C$ مشتق سره برابر دی، په دې اساس تر C د پورته دواړو توابعو ترمنځ فرق مشخص کوي؛ نو ویلی شو چې د $f(x)$ هره تابع کولای شي بېنهایت اولیه توابع ولري او یوازې هغه عامل د دې باعث کېږي، چې اولي توابع په خپلو کې سره فرق ولري، هماغه د C ثابت مقدار دی؛ نو د انتیگرال اخیستو په وخت کې باید C ثابت ته په هغه کې ځای ورکړل شي.

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

د $f(x)dx$ عبارت ته تحت انتیگرال وایي.

د $\int f(x)dx$ انتیگرال ته غیر معین انتیگرال وایي، ځکه چې د عددي معین مقدار لرونکی نه دی.

د انتیگرالونو حل

د $y = f(x)$ تابع په نظر کې نیسو، فرضوو چې دا تابع د $a \leq x \leq b$ په فاصله کې معینه او پیوسته تابع وي.

لکه څنګه چې د انتیگرال په تعریف کې ورته اشاره وشوه، انتیگرال اخیستل د مشتق نیولو عکس عمل دی او په دې هم پوهېږو، چې مشتق اخیستل له توابعو لاندې رابطو او د خاصو فورمولونو څخه پیدا کېږي. نو په دې اساس دا نتیجه لاسته راځي د توابع د انتیگرال محاسبه هغه وخت ترسره کېږي، چې هغه توابع مشخصې توابع وي، یعنې معلومې وي، چې هغوی د کومو توابعو مشتقات دي، په دې صورت کې له دې پرته د اولي تابع محاسبه امکان نه لري.

مثلاً: د مشتق د لاندې فورمول څخه یو توان لرونکې تابع:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right) = x^n$$

$$x \neq -1$$

کولای شو دا نتیجه واخلو، چې $\left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right)$ اصلي تابع (اولیه تابع) ده، د x^n تابع مشتق لپاره؛ نو د مشتق د تابع د پېژندلو لپاره، چې څه ډول تابع ده، کولای شو اولیه تابع یا په پام کې نیول شوی تابع انتیگرال محاسبه کړو، د پورته مثال په اړه به یې ولرو.

$$\int x^n \cdot dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$$

$$n \neq -1$$

د انتیگرال اخیستلو مهمه طریقه

د $\int F(x)dx$ متغیر انتیگرال د تغیر طریقه په نظر کې نیسو، فرض کوو چې دا انتیگرال د پېژندل شویو صورتونو جز نه وي، که په دې پېژندل شویو صورتونو کې تبدیلی وکړو، انتیگرال د حل وړ دی او نوموړې طریقه ته د متغیر د تغیر طریقه وایي. په دې طریقه کې لاندې ټکي په پام کې نیول کېږي او مراعات کېږي:

۱- لومړۍ د x متغیر (یا هر بل متغیر) یا یوه برخه د دې نه د $F(t)$ سره مساوي کوو؛ خو باید دقت وشي، چې $F(t)$ حتماً باید دوه لاندې خاصیتونه ولري.

الف- $F(x)$ تغیر باید د انټیګرال لپاره یو مناسب متغیر وي، په دې معنی، چې د تغیر د عمل څخه وروسته باید په مشخص شوي انټیګرال بدل شي؛ خو د انټیګرال اخیستو جوګه شي.
ب- د $F(t)$ متغیر تغیرات باید مجاز وي، یعنې د متغیر x د تغیراتو حوزه باید د $F(t)$ تغیر له میدان سره اړیکه ولري.

۲- باید د تابع دیفرانسیل داسې وي:

$$x = F(t)$$

$$dx = \overline{f}(t) \cdot dt$$

نو د x او dx دوه انټیګرالو پر ځای د هغوی مقادیر ځای پر ځای کوو، یعنې:

$$\int f(x) \cdot dx = \int F(f(t)) \overline{f}(t) \cdot dt$$

انټیګرال چې په دې ترتیب لاسته راځي، د t متغیر په اساس وي. اوس که د مناسب متغیر تغیر ټاکل شوی وي، لاسته راغلی انټیګرال به د محاسبې وړ وي.
پس د لاسته راغلي انټیګرال د محاسبې څخه باید د t متغیر پر ځای د هغې مقدار د x په اساس حساب کړو او د انټیګرال په ځواب کې ځای ورکړو.

$$f(t) + C = f(x) + C$$

له هغه ځایه چې په دې طریقه کې د متغیر د تغیر لپاره مناسب دي، په انټیګرالونو کې د خاص اهمیت لرونکي دي، په نتیجه کې په دې ځای کې ځینې د متغیرونو د تغیر څخه د انټیګرالونو د حل د اسانۍ او کومک په خاطر راوړو.

۱- که انټیګرال $\int u = F(u) du$ شکل ولري، باید د متغیر تغیر په لاندې شکل وي. $u = F(t)$

$$u = t \quad \text{یا}$$

۲- د $\int \sqrt{a^2 - x^2} \cdot dx$ انټیګرال لپاره، باید متغیر ته $x = a \sin(t)$ یا $x = a \cos(t)$ تغیر ورکړو.

۳- که لاندې انټیګرال ولرو، $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx$ متغیر ته یې باید $x = a \tan(t)$ تغیر ورکړو.

۴- د لاندې انټیګرال د حل لپاره

$$\int \frac{1}{(a^2 + x^2)^n} \cdot dx$$

باید متغیر ته $x = a \tan(t)$ تغیر ورکړو.

مثال: د لاندې انتیگرال محاسبه مطلوب ده.

$$\int (x^2 - x + 1)^2 (2x - 1) \cdot dx$$

$$u = x^2 - x + 1$$

$$du = (2x - 1)dx$$

$$\int u^2 \cdot du = \frac{1}{3}u^3 + C = \frac{1}{3}(x^2 - x + 1)^3 + C$$

د جزء په جزء طریقه

دا طریقه د دوه تابعو د ډیفرانسیل د حاصل د فورمول په بنا ده، په دې معنی چې د دوه غیر همجنسو تابعو حاصل $g(x) \cdot f(x)$ په نظر کې نیسو.

اوس دا انتیگرال په مستقیم ډول امکان پذیر نه دی، د داسې انتیگرالونو د حل لپاره د

$$\int F(x) \cdot g(x) dx$$

په دې طریقه کې که $u = g(x), u = f(x)$ په پام کې ونیول شي، د ډیفرانسیل د فورمولونو

په اساس به ولرو:

$$d(u \cdot v) = u dv + v du$$

اوس د پورته رابطې د دواړو خواوو څخه انتیگرال نیسو.

$$\int d(uv) = \int u dv + \int v du$$

$$uv = \int u dv + \int v du$$

$$\int u dv + uv - \int v du$$

$$\int F(x)g(x)dx = F(x) \cdot g(x) - \int f(x)g(x)dx$$

پورتني رابطې ته جزء په جزء رابطه وايي، د رابطې څخه دا مهمه نتیجه په لاس راځي،

چې د دا ډول انتیگرالونو د حل لپاره د تحت انتیگرال عبارت په دوه برخو په پام کې ونیول

شي، یوه برخه مساوي له u سره او بله برخه مساوي له dv سره او وروسته له دې څخه

فورمول څخه گټه واخیستل شي.

وروستنۍ رابطې ته په کتو، لرو چې:

$$u = f(x)$$

$$dv = g(x) \cdot dx$$

د لومړۍ تابع څخه du او د دویمې رابطې څخه V په لاس راځي.

$$du = f(x)dx$$

$$\int dv = \int g(x) \cdot dx \Rightarrow v = \int g(x) \cdot dx$$

د دې لپاره چې څه وخت له دې طريقې څخه گټه اخيستل کېږي، بايد وويل شي دا طريقه عموماً د هغو انټيگرالونو لپاره په کار وړل کېږي، چې د انټيگرال تحت د ضرب د حاصل په شکل وي او يو له هغو عواملو نه يې مشتق دی، چې اوليه تابع يې معلومه وي.

د دې طريقې د کارولو لپاره لاندې ټکي مراعت کړئ!

۱- هر وخت بايد کوشش وشي، چې dx د dv په قسمت کې ځای ونيسي.

۲- ورکړل شوی ديفرانيسل بايد په دوه عواملو u او dv تقسيم شي.

۳- بايد وکولای شو dv انټيگرال کړو.

مثال: د لاندې انټيگرال محاسبه مطلوب ده.

$$\int x \cdot \cos x \cdot dx$$

$$u = x$$

$$dv = \cos x \cdot dx$$

$$du = dx$$

$$v = \int \cos x \cdot dx = \int u dv$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$= x \sin x - \cos x + C$$

سټېنډرډ انټيگرالونه او د هغو کارونه

په مخکې مثالونو کې مو نوی تغير، لکه u د تابع د عنوان x پېژندلی او وروسته د انټيگرال اخيستنې فورمولونو نه مو کار واخيست، دا چې دا طريقه ډېر وخت په کار وړل کېږي. ښه به وي چې ځينې د دې فورمولونو څخه په ياد کې وساتو، په دې فورمولونو کې u د مستقل تغير په توگه تر مستقل متغير تابع پېشنهاد شوی او du د u ديفرانيسل دی.

د اساسي فورمولونو جدول

$$I. \int u^n \cdot du = \frac{u^{n+1}}{n+1} = C, n \neq -1$$

$$II. \int \frac{du}{u} = Lnu + C$$

$$III. \int e^u \cdot du = e^u + C$$

$$IV. \int a^u \cdot du = \frac{a^u}{Lna} + C$$

$$V. \int \cos u \, du = \sin u + C$$

$$VI. \int \sin u \, du = -\cos u + C$$

$$VII. \int \frac{du}{\cos^2 u} = \tan u + C$$

$$VIII. \int \frac{du}{\sin^2 u} = -\cot u + C$$

$$IX. \int \frac{du}{1+u^2} = \arctan u + C$$

$$X. \int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \arcsin u + C$$

$$1 - \int \cos 5x \cdot dx$$

حل: $\cos 5x$ مرکب تابعیت ساده تابع ته د بدلولو لپاره، له 5 فورمول نه له کار اخیستو

څخه داسې فرض کوو چې:

$$5x = u$$

$$5dx = du \rightarrow dx = \frac{du}{5}$$

$$\cos 5x = \cos u$$

$$\int \cos 5x \cdot dx = \int \cos u \cdot du = \frac{1}{5} \int \cos u \cdot du = \frac{1}{5} \sin u + C$$

$$2 - \int \frac{dx}{\sin^2 3x}$$

حل: د 8 فورمول د کارونې لپاره داسې فرض کوو.

$$3x = u$$

$$3dx = du \Rightarrow dx = \frac{du}{3}$$

$$\int \frac{dx}{\sin^2 3x} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{\sin^2 u} = -\frac{1}{3} \cot u + C = -\frac{1}{3} \cot 3x + C$$

د مشتق د برخې پوښتنې

1) $5x_1^3 - 2x_1^2 + 7x_2^2 = y$

2) $y = 7x_1 + 16x_1x_2^2 + 4x_2^3$

3) $y = (2x_1 + 3)(x_2 - 2)$

4) $y = \frac{2x_1 + 3}{x_2 - 2}$

5) $f(x, y) = (x^2 - 7x)(x - y)$

6) $z = 25xy + y^2 - 3x^2$

7) $z = f\left(\frac{x}{y}\right)$

8) $z = f\left(\frac{y}{x}\right)$

9) $y = f(x^2 + y^2 + z^2)$

10) $y = f\left(x, \frac{x}{y}\right)$

11) $z = 2x^2y^2 + xy + x^3$

د انتيگرالونو د برخې پوښتنې

1) $\int x^3 \cdot dx$

2) $\int \frac{dx}{\sqrt{x}}$

3) $\int (x^4 - 3x^2 + x) dx$

4) $\int \sqrt[3]{x} \cdot dx$

5) $\int \frac{dx}{x\sqrt{x}}$

6) $\int \frac{(x+2)^2}{x} \cdot dx$

7) $\int (1-2x)(1+3x) \cdot dx$

8) $\int (nx)^{\frac{1-n}{n}} \cdot dx$

9) $\int \sin^2 x \cdot \cos x \cdot dx$

10) $\int \frac{x}{x^2-1} \cdot dx$

11) $\int e^x \cdot dx$

12) $\int e^{-2x} \cdot dx$

13) $\int \sin 2ax \cdot dx$

14) $\int \frac{1}{x} dx$

14) $\int \frac{dx}{\cos^2 x}$

15) $\int \frac{dx}{\sin^2 x}$

16) $\int \frac{dx}{9x^2-4}$

17) $\int \frac{dx}{x^2-9}$

18) $\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$

19) $\int \frac{dx}{\sqrt{9+x^2}}$

20) $\int 13e^x dx$

21) $\int \frac{5}{x^2+6} dx$

22) $\int \frac{7x^2 \cdot dx}{1+x^3}$

23) $\int 10x^{-3} \cdot dx$

24) $\int x^2 \cdot e^{ax} \cdot dx$

سرچينې او اخيستني:

- ۱- تحليل رياضيات پوهاند دكتور عبدالغفار کاکړ
- ۲- رياضيات مهدي صفر
- ۳- اناليز (یک) پوهندوی داکتر موهين لعل مهرا پوهنمل گل محمد
- ۴- اناليز (دو) داکتر موهن لعل مهرا پوهنمل گل محمد
- ۵- رياضيات پيش دانشگاهی مولف اس - تی - هو

د ښوونیز نصاب د پراختیا د ریاست پیغام

د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت دښوونیز نصاب د انکشاف ریاست د ټولنې دیني او ښکاره ضرورت په درک کولو سره چې د محصلینو او شاگردانو د درسي کتابونو په برخه کې یې تخنیکي او مسلکي رشتې درلودې او لري یې، په لومړي سر کې یې تصمیم ونيو، چې په ښوونیزو پلانونو او درسي مفرداتو باندې بیاکتنه وکړي او ورپسې بیا د شاگردانو او محصلینو د درسي کتابونو د تالیف لپاره مبادرت او کوشښ وکړي. د خدای (ج) په فضل او مرحمت سره او د ادارې او حسابدارۍ څانګې د ښوونکو په میرانې او همت سره د ادارې او حسابدارۍ درسي کتابونه تالیف شول تر څو په وړیا ډول د شاگردانو او محصلینو په واک او اختیار کې ورکړل شي.

د علم او معرفت له ټولو لوستونکو، علاقمندانو، د ادارې او حسابدارۍ د مکاتبو له ښوونکو، گرانو شاگردانو او د تخنیکي او مسلکي زده کړو د چارو له متخصصینو او همدا شان له ټولو خپرونکو او شنونکو څخه صمیمانه هیله کېږي، چې د دې کتابونو په مطالعې سره چې په لومړي ځل د ښوونکو او د ادارې او حسابدارۍ څانګې د مسلکي غړو له لوري تالیف او تدوین شوي دي. د مسلکي، تخنیکي او علمي مطالبو او مفاهیمو د څرنگوالي په هکله خصوصاً د هغوی املايي او انشايي اشتباهاتو په اړه مونږ ته لارښوونه وکړي، ترڅو په راتلونکي کې وکړای شو، په همدې او نورو برخو کې گرانو شاگردانو ته له دې څخه ښه، غوره، گټور او ارزښتناکه موضوعات وړاندې کړو.

همدا شان له گرانو شاگردانو او محصلینو څخه هیله کوو ترڅو د دې کتابونو د مطالعې او استفادې پر مهال د هیواد اقتصادي ستونزې، فقر او وروسته پاتې والی په نظر کې ونیسي او د کتابونو په ساتنه کې کوشښ او زیار وباسي، ترڅو د ډېرو شاگردانو او محصلینو د گټې وړ وگرځي.

پته: دپوهنې وزارت - د تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت د تعلیمي نصاب د انکشاف ریاست - د کتابونو د تالیف او د درسي ممدو موادو د برابرولو عمومي مدیریت.

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library