

عضوي کيميا

دولسم ټولگی



کيميا - دولسم ټولگی





ملي سرود

دا عزت د هر افغان دی
هر بچی یې قهرمان دی
د بلوڅو د ازبکو
د ترکمنو د تاجکو
پامیریان، نورستانیان
هم ایماق، هم پشه بان
لکه لمر پر شنه آسمان
لکه زړه وي جاویدان
وایو الله اکبر وایو الله اکبر

دا وطن افغانستان دی
کور د سولې کور د تورې
دا وطن د ټولو کور دی
د پښتون او هزاره وو
ورسره عرب، گوجر دي
براهوي دي، قزلباش دي
دا هیواد به تل ځلیري
په سینه کې د آسیا به
نوم د حق مودی رهبر


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



عضوي کيميا

دولسم ټولگی

د چاپ کال: ۱۳۹۹ هـ. ش.



د کتاب ځانګړتیاوې

مضمون: کیمیا

مؤلفان: د تعلیمي نصاب د کیمیا ډیپارټمنټ د درسي کتابونو علمي او مسلکي غړي

اېډیټ کوونکي: د پښتو ژبې د اېډیټ ډیپارټمنټ غړي

ټولګی: دولسم

د متن ژبه: پښتو


انکشاف ورکوونکي: د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تألیف لوی ریاست

خپروونکي: د پوهنې وزارت د اړیکو او عامه پوهاوي ریاست

د چاپ کال: ۱۳۹۹ هجري شمسي

برېښنالیک پته: curriculum@moe.gov.af

د درسي کتابونو د چاپ، وېش او پلورلو حق د افغانستان اسلامي جمهوریت د پوهنې وزارت سره محفوظ دی. په بازار کې یې پلورل او پېرودل منع دي. له سرغړوونکو سره قانوني چلند کېږي.



د پوهنې د وزیر پیغام

اقرأ باسم ربك

د لوی او ښوونکي خدای ﷻ شکر په ځای کوو، چې موږ ته یې ژوند رابښلی، او د لوست او لیک له نعمت څخه یې برخمن کړي یو، او د الله تعالی پر وروستي پیغمبر محمد مصطفی ﷺ چې الهي لومړنی پیغام ورته (لوستل) و، درود وایو.

څرنگه چې ټولو ته ښکاره ده ۱۳۹۷ هجري لمريز کال د پوهنې د کال په نامه ونومول شو، له دې امله به د گران هېواد ښوونیز نظام، د ژورو بدلونونو شاهد وي. ښوونکي، زده کوونکي، کتاب، ښوونځي، اداره او د والدینو شوراگانې د هېواد د پوهنیز نظام شپږگوني بنسټیز عناصر بلل کيږي، چې د هېواد د ښوونې او روزنې په پراختیا او پرمختیا کې مهم رول لري. په داسې مهم وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت د مشرتابه مقام، د هېواد په ښوونیز نظام کې د ودې او پراختیا په لور بنسټیزو بدلونونو ته ژمن دی.

له همدې امله د ښوونیز نصاب اصلاح او پراختیا، د پوهنې وزارت له مهمو لومړیتوبونو څخه دي. همدارنگه په ښوونځیو، مدرسو او ټولو دولتي او خصوصي ښوونیزو تاسیساتو کې، د درسي کتابونو محتوا، کیفیت او توزیع ته پاملرنه د پوهنې وزارت د چارو په سر کې ځای لري. موږ په دې باور یو، چې د باکیفیته درسي کتابونو له شتون پرته، د ښوونې او روزنې اساسي اهدافو ته رسېدلی نشو.


پورتنیو موخو ته د رسېدو او د اغېزناک ښوونیز نظام د رامنځته کولو لپاره، د راتلونکي نسل د روزونکو په توګه، د هېواد له ټولو زړه سواندو ښوونکو، استادانو او مسلکي مدیرانو څخه په درناوي هیله کوم، چې د هېواد بچیانو ته دې د درسي کتابونو په تدریس، او د محتوا په لېږدولو کې، هېڅ ډول هڅه او هاند ونه سیموي، او د یوه فعال او په دیني، ملي او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه کې، زیار او کوښښ وکړي. هره ورځ د ژمنې په نوي کولو او د مسؤلیت په درک سره، په دې نیت لوست پیل کړي، چې د نن ورځې گران زده کوونکي به سبا د یوه پرمختللي افغانستان معماران، او د ټولنې متمدن او ګټور اوسېدونکي وي.

همدا راز له خوږو زده کوونکو څخه، چې د هېواد ارزښتناکه پانګه ده، غوښتنه لرم، څو له هر فرصت څخه ګټه پورته کړي، او د زده کړې په پروسه کې د ځیرکو او فعالو ګاونوالو په توګه، او ښوونکو ته په درناوي سره، له تدریس څخه ښه او اغېزناکه استفاده وکړي.

په پای کې د ښوونې او روزنې له ټولو پوهانو او د ښوونیز نصاب له مسلکي همکارانو څخه، چې د دې کتاب په لیکلو او چمتو کولو کې یې نه سترې کېدونکې هلې ځلې کړې دي، مننه کوم، او د لوی خدای ﷻ له دربار څخه دوی ته په دې سپېڅلې او انسان جوړوونکې هڅې کې بریا غواړم. د معیاري او پرمختللي ښوونیز نظام او د داسې ودان افغانستان په هیله چې وګړي یې خپلواک، پوه او سوکاله وي.

د پوهنې وزیر

دکتور محمد میرویس بلخي



فهرست

مخونه

سرليکونه

۱ سریزه

لومړی څپرکی

- ۲ په عضوي مرکبونو کې د کیمیايي اړیکو جوړیدل
- ۱-۱: د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژيکي سوې ۳
- ۱-۲: د کاربن و لانس او د اړیکو جوړیدل ۴
- ۷ هایپریدیزیشن
- د لومړي څپرکي لنډيز ۱۴
- د لومړي څپرکي پوښتنې ۱۵

دویم څپرکی


- د مالیکول جوړښت او فورمولونه ۱۸
- ۱-۲ : مالیکولي فورمول ۱۹
- ۲-۲ : جوړښتیز فورمولونه ۲۲
- ۲-۳ : د جوړښتیزو فورمولونو د لیکلو لارې ۲۳
- ۲-۴ : ایزومیري (Isomers) ۳۱
- د دویم څپرکي لنډيز ۳۳
- د دویم څپرکي پوښتنې ۳۴

درېم څپرکی

- د عضوي مرکبونو ډل بندې ۳۶
- ۱-۳ : عمومي معلومات ۳۷
- ۲-۳ : د هایډروکاربنونو د ډلو ویشل ۳۸
- ۳-۳ : په هایډروکاربنونو کې د وظيفه يي ډلې ۳۹
- ۴-۳ : د الکانونو هومولوگي سلسله ۳۹
- ۳-۵ : عضوي مرکبونه او د وظيفه يي گروپونه (د هایډروکاربنونو مشتقات) ۴۰
- ۳-۶ : له وظيفه يي گروپونو سره عضوي مرکبونه ۴۲
- د درېم څپرکي لنډيز ۴۸
- د درېم څپرکي پوښتنې ۴۹

څلورم څپرکی

- الکانونه او سایکلوکانونه ۵۱
- ۱-۴ : الکانونه (Alkanes) ۵۲
- ۲-۴ : کره ييز مرکبونه (سایکلو الکانونه) ۶۴
- د څلورم څپرکي لنډيز ۶۹
- د څلورم څپرکي پوښتنې ۷۰



فهرست

سرلیکونه

مخونه

پنځم څپرکی

- ۷۲..... الکینونه او الکاینونه :
۷۳..... ۱-۵ : الکینونه
۸۲..... ۲-۵ : الکاینونه (Alkynes)
۸۸..... ۳-۵ : اسیتلین
۹۲..... د پنځم څپرکي لنډیز
۹۳..... د پنځم څپرکي پوښتنې

شپږم څپرکی

- ۹۶..... اروماتیکي مرکبونه (Arenes)
۹۷..... ۱-۶ : د بنزین جوړښت
۱۰۰..... ۲-۶ : د اروماتیک مرکبونو نوم ایښودنه
۱۰۰..... ۳-۶ : د اروماتیکو هایډروکاربنونو تعاملونه
۱۰۷..... د شپږم څپرکي لنډیز
۱۰۸..... د شپږم څپرکي پوښتنې

اووم څپرکی


- ۱۱۰..... الکایل هالایدونه
۱۱۱..... ۱-۷ : الکایل هالایدونه
۱۱۸..... د اووم څپرکي لنډیز
۱۱۹..... د اووم څپرکي پوښتنې

اتم څپرکی

- ۱۲۱..... الکولونه او ایترونه
۱۲۲..... ۱-۸ الکولونه (Alcohols)
۱۳۷..... ۲-۸ ایترونه (Ethers)
۱۴۱..... د اتم څپرکي لنډیز
۱۴۲..... د اتم څپرکي پوښتنې

نهم څپرکی

- ۱۴۶..... الډیهایدونه او کیتونونه
۱۴۷..... ۹ : الډیهاید او کیتون (د کاربونیل د ګروپ مرکبونه)
۱۴۷..... ۱-۹ : الډیهایدونه
۱۵۹..... ۲-۹ : کیتونونه (Ketones)
۱۶۴..... د نهم څپرکي لنډیز
۱۶۵..... د نهم څپرکي پوښتنې



فهرست

سرلیکونه

مخونه

لسم څپرکی

- ۱۶۷ عضوي تيزابونه (کاربوکسلیک اسید)
۱۶۸ ۱-۱۰ : عضوي تيزابونه
۱۷۶ ۲-۱۰ : ځنې مهم کاربوکسلیک اسیدونه
۱۸۲ د لسم څپرکي لنډيز
۱۸۳ دلسم څپرکي پوښتنې

یولسم څپرکی


- ۱۸۵ امینونه (Amines)
۱۸۶ ۱-۱۱ : د امینونو جوړښت او ډلبندي
۱۹۷ ۲-۱۱ : امایډونه (Amides)
۱۹۹ د یوولسم څپرکي لنډيز
۱۹۹ د یوولسم څپرکي پوښتنې

دوولسم څپرکی

- ۲۰۱ طبیعي پولي میرونه
۲۰۲ ۱-۱۲ : د طبیعي پولي میرونو ډلبندي
۲۰۵ ۱- مونو سکرایډونه
۲۱۲ ۲ : ډای سکرایډونه
۲۲۰ ۲-۱۲ : پروتینونه
۲۲۰ ۳-۱۲ : امینو اسیدونه (Amino acids)
۲۲۸ ۴-۱۲ : ډای اکسي رایبوز نوکلیویک (D.N.A) او رایبوز کلویک اسید (R.N.A)
۲۳۱ دولسم څپرکي لنډيز
۲۳۱ د دوولسم څپرکي پوښتنې

د یارلسم څپرکی

- ۲۳۳ مصنوعي پولي میرونه
۲۳۴ ۱-۱۳ جمعي پولي میرونه
۲۴۰ ۲-۱۳ : متراکم شوي پولي میرونه (Condensation Polymers)
۲۴۱ ۳-۱۳ : ساینس، تکنالوژي او ټولنه
۲۴۳ ۴-۱۳ : د مصنوعي پولي میرونو په واسطه د هستوگنې د چاپیریال ککړتیا
۲۴۶ د دیارلسم څپرکي لنډيز
۲۴۶ د دیارلسم څپرکي پوښتنې
۲۴۷ اخځلیکونه



سريزه

کاربن ځانته ځانگړې خواص لري چې په طبيعت کې يې بيلابيل مرکبونه منځته راوړي دي. دهغه مرکبونه په طبيعت کې ډېر دي چې يوې ځانگړې برخې ته يې په کيميا کې اختصاص ورکړ شوی دی او هغه له عضوي کيميا څخه عبارت ده. عضوي کيميا، د کيميا يوه برخه ده چې له هايډروکاربنونو او دهغه له مشتقاتو څخه بحث کوي.

هايډروکاربنونه او د هغوی مشتقات په ننني صنعت کې اساسي رول لري. دارو، رنگونه او اوسني نور عصري سامان آلات له عضوي مرکبونو څخه جوړ شوي دي.

د دولسم ټولگي کيميا د عضوي کيميا يوه برخه ده او هغه مرکبونه تر مطالعې لاندې نيسي چې له کاربن او هايډروجن څخه جوړ شوي وي؛ يعنې هايډروکاربنونه او د هغو مشتقات دي. د دولسم ټولگي کيميا ديارلس څپرکي لري چې لومړی څپرکی يې په عضوي مرکبونو کې د کيميايي اړيکو جوړېدل روښانه کوي.

دوهم څپرکی ماليکولي جوړښت او فورمولونه وړاندې کوي.

درېم څپرکی د عضوي مرکبونو د ډل بندي په هکله دی .

څلورم څپرکی الکانونه او سايکلو الکانونه روښانه کوي.

پنځم څپرکی الکين او الکاين، شپږم څپرکی اروماتيک مرکبونه، اووم څپرکی الکايل هلايدونه، اتم څپرکی الکولونه او ايترونه، نههم څپرکی د الډهايډونو او کيتونونو په هکله معلومات وړاندې کوي.

په همدې ډول لسم څپرکی عضوی تيزابونه، يوولسم څپرکي امينونه، دولسم څپرکی طبيعي پولي ميرونه او ديارلسم څپرکی مصنوعي پولي ميرونه روښانه کوي.


د هر څپرکي مطلبونه حياتي خوا وې لري او د هر څپرکي د تدريس بنسټيزې موخې دا دي چې په دې برخه کې د زده کوونکو د زده کړې کچه لوړه شي او د خپل ژوندانه په بيلابيلو برخو کې د زده کړې له مطلبونو څخه گټه واخلي او هم په صنعتي مسايلو کې لاس رسی ولري.

د هر څپرکي په پيل کې د زده کړې موخې د پوښتنو په بڼه ليکل شوي دي او د هر څپرکي په پای کې د څپرکي لنډيز ليکل شوی دی تر څو زده کوونکي له مفاهيمو او د زده کړې له ميتود څخه ښه گټه واخلي.

په همدې ډول د هر څپرکي له لنډيز وروسته تمرين او نه حل شوې پوښتنې طرح شوي دي چې زده کوونکي يې په خپله حل کړي چې د اړوند څپرکي د مطالبو په زده کړه کې ورسره مرسته وکړي.

هر څپرکی په ساده او عام فهمه کلموسره ليکل شوی دی.

د څپرکو د متنونو په منځ کې عملي او نظري فعاليتونه هم راغلي دي چې زده کوونکي يې په خپله د ښوونکي په مرسته په ډله ييز او يوکسيز ډول سرته ورسوي او دغه فعاليتونه له زده کوونکو سره لا زياته مرسته کوي.



لومړۍ څپرکۍ

په عضوي مرکبونو کې د کیمیاوي اړیکو جوړیدل




د کاربن د مرکبونو شمېر دومره زیات دی چې د کیمیا د علم یوه مهمه برخه د دې عنصر مرکبونو ته ځانگړې شوې ده او هغه علم چې کولی شو د هغه په واسطه د کاربن او هایډروجن مرکبونه او د هغوی مشتقات تر څېړنې لاندې ونیسو، د عضوي کیمیا په نوم یادېږي . هر کال یو ډېر شمېر د نړۍ تجارت د عضوي مرکبونو او د هغوی پر محصولاتو باندې ولاړ دي. چې د هېوادونو په اقتصادي ودې کې ډېر اهمیت لري. پردې بنسټ د عضوي مرکبونو د خواصو پیژندنه او نوم ایښودنه له ځانگړې اهمیت څخه برخمنه ده. د عضوي مرکبونو د پیژندنې لپاره د اړیکو پیژندنه بنسټیز رول لري؛ نو باید پوه شو چې اړیکه څه ده؟ د اړیکو د جوړیدو لامل څه دی؟ د اړیکو ډولونه کوم دي؟ د دې څپرکي په مطالعه به په عضوي مرکبونو کې د کیمیاوي اړیکو په اړه معلومات تر لاسه کړئ.

1-1: د کاربن الکتروني جوړښت او دهغه انرژيکي سويې

کاربن د $1s^2 2s^2 2p^2$ الکتروني جوړښت لرونکی دی، دهغه د مرکبونو شمېر ډېر او د اهمیت لرونکي دي چې د عضوي کیمیا یوه مهمه برخه یې جوړه کړې ده. په 1880 کال کې د 1200 په شمېر عضوي مرکبونه او په 1998 کال له 20 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. د عضوي مرکبونو په دې شمېر کې د کاربن اتومونه د C^{4+} د ایون په بڼه شتون نه لري؛ خو په عمومي ډول کولی شو ووايو چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اتوم د تحریک په حالت کې دی او الکتروني جوړښت یې $1s^2 2s^1 2p^3$ دی.

د کاربن د اتوم د ولانسي الکترونونو د انرژۍ د سويې ډیاگرام په (1-1) شکل کې ښودل شوی دی:



1 - 1 شکل: د کاربن د اتوم د انرژيکي سويې ډیاگرام


په ځینو غیر عضوي مرکبونو کې کولی شئ چې د کاربن اتوم د C^{4-} په بڼه وگورئ؛ د بیلگې په ډول: Be_2C ، $Al_4C_3^{+3}$ او نور.

په عمومي ډول د کاربن اتومونه کولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږد زنځیرونه او یا لویې او کوچنۍ کړۍ یې جوړې کړې دي، په دې زنځیرونو او یا کړیو کې د کاربن د اتومونو ترمنځ یوه گونې، دوه گونې یا درې گونې اړیکې لیدل کیږي، خو دهغه یوه نیمه (1.5) اړیکه هم لیدل شوې ده چې دا اړیکه کیدای شي په بنزین کې د ریزونانس (گرځیدو) په حالت کې ولیدل شي، د کاربن - کاربن د اړیکې انرژي $E_{(C-C)} = 360 \text{ KJ/mol}$ ده.

طبیعي کاربن د دوو ایزوټوپونو $^{12}_6C$ او $^{13}_6C$ لرونکی دی چې په طبیعت کې دهغوی د خپریدو سلنه په وار سره 98.93% او 1.07% ده؛ خو په طبیعت کې $^{14}_6C$ هم شته دی چې د اتموسفیر په لوړو طبقو کې چې


د لاندې هسته یې تعاملونو په پایله کې جوړیږي، شتون لري: $^{14}_7N + ^1_0n \rightarrow ^1_1H + ^{14}_6C$

د $^{14}_6C$ د نیم عمر اوږدوالی 5730 کاله دی او د β^- ذرو د وتلو په پایله کې په نایټروجن بدلیږي:



د ژوندیو موجوداتو په عضوي مرکبونو کې $^{14}_6C$ او $^{12}_6C$ د تعادل په حالت کې شتون لري او د هغو د تعادل


نسبت $\frac{^{14}_6C}{^{12}_6C} = 10^{-12}$ او ثابت دی. که چیرې ژوندي موجودات چې په هغوی کې حیوانات او نباتات شامل



دي، له طبيعت سره اړيکه پرې کړي، پورتنی تعادلي نسبت گډوډ کيږي؛ نو د هغه له دې ځانگړتيا څخه د لرگينو شيانو، انسانانو يا د ژويو د جسدونو د نيم عمر د اوږدوالي د ټاکلو لپاره چې له نن څخه 15 تر 30 زره کاله مخکې يې ژوند کاوه، د 10 % سوچ سره کيدای شې، گټه واخېستل شې.

1-2: د کاربن ولانس او د اړیکو جوړیدل

په تعاملونو کې د کیمیايي عناصرو نو د اټومونو د یوځای کیدو قوه او د اړیکو شمېر چې یو اټوم یې جوړولای شي، د ولانس په نوم یا ډیرې، نو د کاربن ولانس به څو وي ؟ تاسې کولی شئ په ساده بڼه پورتنۍ پوښتنې ته د لیویس (Lewis) د سمبولونو او جوړښتونو پر بنسټ ځواب ورکړئ؛ په دې جوړښت کې ولانسي الکترونونه په ټکو ښودل شوي دي؛ خو دا چې کاربن څلور ولانسي الکترونه لري، نو د هغه د لیویس سمبول په لاندې ډول لیکل کېږي :



(2-1) شکل دلیویس جوربنت او دکارین فضایی جوربنت

د اته الكتروني يا او کتیت (octate) حالت د پوره کولو او ولانسي قشر د اته الكتروني کولو لپاره، د کاربن اټوم بايد خپل څلور ولانسي الكترونونه نورو اټومونو او د کاربن له نورو اټومونو سره شريک کړي، نو د کاربن ولانس څلور دی.

په ټولو عضوي مرکبونو کې د کاربن هر اټوم څلور اشتراکي اړیکې د کاربن او یا نورو عناصرو د اټومونو؛ لکه: هایډروجن، اکسیجن، نایټروجن، هلوجن سره جوړوي.

له عناصرو د دوره یي جدول څخه په ګټه اخیستنه د اکسیجن، نایټروجن او هلوجن ولانس موندل کېږي.

لاندني جدول د کاربن ځای د نورو عناصرو په منځ کې ښیي:

H																	
Li	Be											B	C	N	O	F	
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	
Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	112	113	114	115	116		


(1 - 1) جدول: د عنصرونو په دوره یی جدول کی دکاربن خای.

کاربن کولی شي یو گونې، دوه گونې او درې گونې اړیکه ولري چې په لاندې توگه روښانه کیږي: خرنګه چې کاربن په خپل ولانسي قشر کې خلور ولانسي الکترونونه لري؛ نو پردې بنسټ د خپل اکثیت د پوره کولو لپاره خلورو نورو الکترونونو ته اړتیا لري، د ایتان (C_2H_6) په مالیکول کې د کاربن هر اټوم د کاربن له بل یو اټوم سره او د هایډروجن له درې اټومونو سره اړیکه لري. د کاربن د یو اټوم او د هایډروجن د یو اټوم ترمنځ یوه گونې اړیکه تړل شوې ده چې یوه، یوه جوړه مشترک الکترونونه د هغوی ترمنځ شتون لري، نجوم پوهان په دې باور دي چې د زحل سطحه مایع ایتان جوړه کړې ده.

H


(3-1) شکل د زحل په سطحه کې د مایع ایتان شتون

سربېره پردې کاربن او نور عنصرونه اود هغوی له ډلې څخه نایتروجن، اکسیجن او سلفر کولی شي له نورو اټومونو سره د اکثیت د قاعدې په پام کې نیولو سره له یوې جوړې الکترونونو څخه زیات، دوه جوړې الکترونونه (خلور الکترونه) سره گډ او دوه گونې اړیکه جوړوي؛ د ایتلین د مالیکول په ترکیب کې دوه اټومه کاربن او خلور اټومه هایډروجن برخه لري چې د کاربن - کاربن د اټومونو ترمنځ اړیکه دوه گونې ده، هارمون ډوله ایتلین په ډیرو نباتاتو کې په ځانګړې توګه په رومیانو کې شته دی چې د پخیدلو په وخت کې هغه ازاد وي او د نورو رومیانو د پخیدلو لامل ګرځي؛ نو پردې بنسټ په کرڼه کې د رومیانو د پخیدلو لپاره له ایتلین څخه ګټه اخېستل کیږي:



(1-4) شکل: رومي بادنجان د ایتلین سرچینه.


همدارنګه د کاربن دوه اټومونه کولی شي چې درې گونې اړیکه جوړه کړي او درې جوړې الکترونونه یو له بل سره گډ کړي، د بیلګې په ډول: د استلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ درې گونې اړیکه شتون لري، د دې مرکب په مالیکول کې د کاربن دوه اټومونه او د هایډروجن دوه اټومونه برخه لري. د کان پیژندنې په څراغونو کې د کلسیم کار بایله له تېرې څخه ګټه اخېستل کیږي، داسې چې په کلسیم کاربایله باندې اوبه ورزیاتوي د کارباید د ډبرو د هایډرولیز په پایله کې استلین تر لاسه کیږي.



(1-5) شکل: دکانوند پیژندونکو، اوكسې استلین په خراغونو کې داستلین د گاز کارول.

د کاربن د اتومونو له مهمو ځانګړتیاوو څخه یو د زنځیر او تړلي زنځیر (کړۍ) جوړول دي چې په هغوی کې کاربن- کاربن اتومونه یو له بل سره اړیکه لري. لاندې فورمولونه په عضوي مرکبونو کې زنځیري او کړیز کاربنې اسکلیټ ښيي:

د نورو اتومونو لکه: د نایتروجن او اکسیجن د اتومونو پر خلاف، د کاربن د اتومونو د اړیکو پرله پسې والې د کاربن - کاربن د اړیکو د قوت د لږوالي لامل نشي کیدای. په زنځیرونو او کړیو کې د کاربن اتومونه کولی شي چې د کاربن د نورو اتومونو او د نورو عناصرو له اتومونو سره دوه ګوني او درې ګوني اړیکې جوړې کړي؛ د بیلګې په ډول:




د کاربن د اتومونو د اړیکو د جوړېدو بېلابېلې طريقې د هغه د مرکبونو او ډلو د زیات والي او شتون لامل ګرځیدلي دي.

مثال: د فارم الیهاید (CH_2O) د مرکب د لیویس جوړښت ولیکئ.


حل: په لومړۍ سر کې د ولانسي الکترونونو مجموعي شمېر محاسبه کېږي.

د هایدروجن هر اتوم یو ولانسي الکترون لري، نو د هغه په دوه اتومو کې، دوه ولانسي الکترونونه شته دي؛ په همدې توګه د کاربن هر اتوم څلور ولانسي الکترونونه او یو اتوم اکسیجن شپږ ولانسي الکترونونه لري چې په دې مرکب کې ټول دولس (12) ولانسي الکترونونه شته دي، د فارم الیهاید مرکب د مالیګول د

جوړوونکو اتومونو د ولانسي الکترونونو په پام کې نیولو سره، د دې مرکب د مالیکول جوړونکي اتومونه یو له بل سره نژدې کېږي، دلته کاربن چې مرکزي اتوم دی، په منځ کې ځای لري، په دې صورت کې ولانسي الکترونونه د دغو اتومونو د نژدې کیدو لامل ګرځي او د لیویس قاعده پلې کېږي:



په پورتنی فورمول کې د لیکل شوو الکترونونو شمېر 12 عدده او د ولانسي الکترونونو شمېر یې هم د 12 عدده دی. کاربن دوه یو ګونې اړیکې او یوه دوه ګونې اړیکه لري او په مجموع کې څلور کوولانټ اړیکې یې جوړې کړي دي. که چیرې اړیکې د یو خط په واسطه وښیو؛ نو لاندې ساختماني فورمول لاسته راځي:



په دې فورمول کې دوه ګونې اړیکه د څلورو شریکو الکترونونو ښودونکې ده، چې د کاربن او اکسیجن ترمنځ تړل شوې ده؛ نو پردې بنسټ او کتیت قاعده ترسره شوې ده.



فعالیت

د لاندې مالیکولونو د لیویس جوړښت رسم کړئ:


الف - کاربن ډای اکساید (CO_2) ، ب - کاربن تترا کلوراید (CCl_4) ج - آمونیا (NH_3)

۱- ۳: هایبریدایزیشن (Hybridization)

څرنگه چې په پورتنیو کړښوکې مطالعه شول، د کاربن اتومونه یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اړیکې جوړولی شي، نو باید پوه شئ چې څرنگه دا اړیکې جوړېږي؟ د اوربیتالونو کوم ډولونه د هغوی په جوړېدو کې ونډه اخلي؟ د دې پورتنیو پوښتنو د ځوابونو لپاره، هایبرید شوي اوربیتالونه مطالعه کوو.

په یوناني ژبه کې د هایبرید (Hybrid) کلمه د وینې د ګډون په معنا ده، یعنې هغه نسل چې له دوو بیلا بیلو نسلونو څخه حاصل شوي دي، د امتزاج یا ګډوډ کیدو مفهوم رسوي، په دې ځای کې هم د دوو یا څو بیلا بیلو اتومونو د اوربیتالونو له ګډون څخه موخه دا ده چې دوه یا څو نوي هایبریدي اوربیتالونه منځته راوړي.


د کیمیايي عناصرو د اتومونو ولانسي الکترونونه کولی شي چې په s ، p ، d او f اوربیتالونو کې شتون ولري، نو په دې صورت کې ټول نوموړي اوربیتالونه یو شان ارزښت نه لري او د هغوی اړیکې هم له یو شان ارزښت څخه برخمنې نه دي، خو څېړنو په ثبوت رسولي دي چې په مالیکولونو کې د هغوی مرکزي اتومونه د بیلا بیلو ولانسي الکترونونو (s ، p ، d ...) لرونکي دي او د اړیکو له کبله یو ډول ارزښت لري، دا مطلب د علماو هر یو Cleyster او Pamling په واسطه روښانه شوی دی، نوموړو علماو وړاندوینه کړې ده: هغه



اوربیتالونه چې د انرژۍ له کبله ډېر توپیر لري او په عین اصلي قشر کې د اتومونو په وروستیو فرعي قشرونو کې ځای لري، هغوی له لومړنیو شمېرو سره سم یو له بل سره یوځای Hybridization کېږي او د خپلو لومړنیو شمېرو په کچه هایبرید شوي اوربیتالونه جوړوي چې په یوشان انرژیکي سطحه کې شتون لري او د عین الکتروني ورځې جوړښت لرونکي دي، دا اوربیتالونه د اړیکو د جوړېدو په لور کش او د هغوی ننوتل اعظمي وي، د اړیکو د جوړېدو لاره هوارېږي. د اتومي اوربیتالونو د هایبریدایزیشن کیدو په پیل کې لږڅه انرژي په لگښت رسیدلې ده، پردې بنسټ داسې اوربیتالونه بې ثباته وي؛ خو د اړیکې د جوړېدو په وخت کې دا انرژي له لاسه ورکوي او اړونده ثبات تر لاسه کوي.

که څه هم د کاربن اتوم یوازې دوه طاقت الکترانونه په خپل ولانسي قشر کې لري، خو څلور اړیکې د هایډروجن له اتومونو سره تړلی شي؛ په دې معنا چې د کاربن اتوم خپل څلور نیم ډک شوي اوربیتالونه د اړیکو په جوړېدو کې د هایډروجن له اتومونو سره په کار وي، د کاربن د څلورو اړیکو د جوړېدو د روښانه کولو لپاره د اړیکو د جوړېدو تیوري ښکاره کوي چې د کاربن څلور ولانسي الکترانونه چې په $(2s, 2p)$ اوربیتالونو کې شتون لري، یو له بل سره مخلوط او د څلورو الکتروني اوربیتالونو د جوړېدو لامل شوي چې د عین شکل او انرژي لرونکي دي.

sp^3 هایبریدایزیشن: کاربن اتومونه په مشبوع هایډروکاربنونو کې دا ډول هایبریدایزیشن لري او داسې منځ ته راځي چې د s یو اوربیتال او د p درې اوربیتالونه د انرژي د جذب په پایله کې یو له بل سره مخلوطېږي او د sp^3 څلور هایبرید شوي اوربیتالونه جوړوي چې د څلور وجهي رأسونو شتون لري او د هغوی ترمنځ زاویه 109.5° درجې ده، دا هایبریدایزیشن کیدای شي چې په CH_4 ، CCl_4 او په نورو مالیکولونو کې ولیدل شي، په sp^3 هایبریدایزیشن کې د s برخه $\frac{1}{4}$ او د p برخه $\frac{3}{4}$ ده؛ لکه:



(1-6) شکل: sp^3 هایبرید

د هایبریدایزیشن د ډولونو په هکله د ډېرو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره، د CH_4 جوړښت په بشپړه توګه مطالعه کوو. په میتان کې د اړیکې جوړېدل د $C-H$ د څلورو یوشان اړیکو د منځته راتللو او د تترا هیدرال (tetrahedral) (څلور مخیزه) د جوړېدلو لامل د هغه په مالیکول کې کېږي. د کاربن په اتوم کې د ولانسي قشر الکتروني ترتیب، تترا هیدرال او ولانسي زاويي په لاندې شکل کې ښودل شوي دي:

(1-7) شکل: د کاربن د اتوم SP^3 هایبرید او د میتان د مالیکول جوړیدل

تاسو مخکې د هایبرید اوربیتال شکل لیدلی دی او د کاربن د اتوم د هستې د چاپېریال په فضا کې مو د SP^3 د څلورو اوربیتالونو د ځای په اړه معلومات تر لاسه کړي دی او و مولیدل چې څلور هایبرید اوربیتالونه د تترا هایدرال څلور کنجونه چې د اوربیتالونو د منځ زاویه یې 109.5° ده، ځای لري. د sp^3 هایبرید اوربیتالونه د اوربیتالونو د اعظمي جلاکیدلو لامل کیږي او دا اړیکې یو له بل څخه لوی واټن لري. کله چې د هایدروجن د څلورو اتومونو د $1s$ اوربیتالونه د کاربن د څلورو sp^3 اوربیتالونو سره نیغ پر نیغ ننوځي، د تترا هایدرال یو مالیکول له $C-H$ څلورو معادلو اړیکو (شکل 1-7) سره جوړېږي چې د CH_4 د مالیکول جوړښت سره کوم چې په تجربه ثابت شوی دی، سمون لري.

(1-7) شکل د sp^3 د اوربیتالونو د نیغ پر نیغه ننوتل د هایدروجن د اتومونو د $1s$ له څلورو اوربیتالونو سره او د CH_4 تترا هایدرال شکل ښيي او د sp^3 هایبریدایزیشن کارونه د نورو عضوي او غیر عضوي مرکبونو د روښانه کولو لپاره؛ لکه: په NH_3 او H_2O نورو کې کارول کیږي. د ایتان C_2H_6 په جوړښت کې sp^3 د هایبریدایزیشن د روښانه کولو لپاره لاندې فعالیت تر سره کوو:

فعالیت



په ایتان کې د اړیکې جوړیدل

مواد او د اړتیا وړ سامان: یوسیټ د مالیکولونو مودلونه

تاسې په دې فعالیت کې د ایتان د مالیکول (C_2H_6) د لیویس جوړښت په لاندې شکل کې وگورئ او لاندې پوښتنو ته ځواب وپکړئ:

(1-8) شکل: د ایتان د هایبرید شوو اوربیتالونو نیغه ننوتنه.

- 1 - د کاربن د هر اتوم په شاوخوا کې د اړیکو شمېر څو دی؟
- 2 - د کاربن د هر اتوم هایبریدایزیشن څه ډول دی؟
- 3 - د اتومونو درې اړخیز ترتیت د کاربن د هر اتوم په شاوخوا کې په څه ډول دی؟

4 - د ایتان یو درې لوري لرونکی مودل جوړ کړئ؟

5 - دوه اوربیتالونه چې د تماس په واسطه یې په ایتان کې د کاربن - کاربن د اتومونو ترمنځ اړیکه منځته راغلې ده، څه نومېږي؟

د کاربن هر اتوم څلور اړیکې لري چې له نورو اتومونو سره یې تړلې دي او د تټرا هایډرال شکل یې جوړ کړی دی. د کاربن هر اتوم د څلورو اړیکو د جوړېدو لپاره، د sp^3 څلور هایبرید اوربیتالونه یې کارولي دي او د هغوی د نیغو ننوتلو له امله د نورو اتومونو له اوربیتالونو سره د سگما (σ) (Sigma) اړیکه جوړېږي چې د کاربن د هر اتوم په شاوخوا د تټرا هایډرال په بڼه د اړیکو د جوړېدو لامل کیږي. په دې هکله پوښتنه پیدا کیږي چې ایا د کاربن اتوم د هایبریدایزیشن بل ډول هم د اړیکو په جوړېدو کې کارولی شي؟ دا پوښتنه لاندې توضیحات روښانه کوي:


د sp^2 هایبریدایزیشن: په دې ډول هایبرید کې د s یو اوربیتال او د p دوه اوربیتالونه یو له بل سره امتزاج او په پایله کې د sp^2 درې هایبرید شوي اوربیتالونه جوړوي، دا اوربیتالونه په یوه سطحه کې وي چې د s برخه په sp^2 هر اوربیتال کې $\frac{1}{3}$ او د p برخه $\frac{2}{3}$ ده، د دې اوربیتالونو ترمنځ ولانسي زاویه 120° درجه ده:

(1 - 9) شکل: د sp^2 هایبرید


د کاربن اتومونه د غیر مشبوع هایډروکاربنونو (د ایتلین په کورنۍ کې) په مالیکول کې د sp^2 هایبرید لري. د BF_3 په مالیکول کې بورون sp^2 هایبرید لري:

(1 - 10) شکل: په BF_3 اتوم کې sp^2 هایبرید.

په هایبریدایزیشن کې نیم ډک شوي او یا بشپړ ډک شوي اوربیتالونه برخه اخلي او مالیکول اوربیتال جوړوي؛ په هایبریدایزیشن کې نه یوازې د s او p اوربیتالونه برخه اخلي؛ خو د d او f اوربیتالونه هم برخه لري. د کاربن په مرکبونو کې د sp^2 هایبریدایزیشن چې د دوه گونې اړیکې د جوړېدو لامل کیږي، شتون لري. ساده عضوي مالیکول چې د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ یې دوه گونې اړیکه شته، د ایتلین مرکب دی چې دهغه



لیویس جوړښت په لاندې بڼه دی :



(11 - 1): د ایتلین په مالیکول کې د لیویس جوړښت.


تجربې ښيي چې د ایتلین مالیکول مسطحه جوړښت لري او په هغه کې د اړیکو تر منځ زاویه د 120° درجو په شاوخوا کې ده.

د ایتلین په مرکب کې د کاربن د دوو اتومونو تر منځ څه ډول هایبریدایزیشن شته دی؟ د ایتلین د لیویس په جوړښت کې لیدل کیږي چې د کاربن یو اتوم د کاربن له بل اتوم سره اړیکه جوړه کړې ده، د کاربن د درې هایبرید شوو اوربیتالونو د اړیکو د جوړیدو لپاره، ددې کاربنونو هر اتوم د درې نورو اتومونو سره چې د هغه په شاوخوا (د کاربن د یو اتوم او د هایډروجن له دوو اتومو سره) شتون لري، ضرورت دی؛ نو له دې کبله د sp^2 هایبریدایزیشن د جوړیدو لامل ګرځي.


د sp^2 د اوربیتالونو فضايي شکل د کاربن د اتوم په شاوخوا کې څه ډول دی؟ درې واړه نوموړي اوربیتالونه په یوه سطحه کې شتون لري او د هغو تر منځ زاویې 120° درجې دي؛ نو د p نه هایبریدیزیشن شوي اوربیتال په عمودي بڼه د دوی په سطحه کې شتون لري چې په (12-1) شکل کې ښودل شوی دی:

(12 - 1) شکل: د sp^2 درې هایبرید اوربیتال، په ایتلین د مرکب کې د اړیکې جوړیدل.

د ایتلین په مرکب کې د اړیکو د جوړیدو لپاره د کاربن دوه sp^2 اوربیتال هریوې د هایډروجن له دوه اتومونو سره اړیکې ټینګوي او د $C-H$ دوه اړیکې جوړوي، د کاربن په هر اتوم کې د sp^2 پاتې شوي یو هایبرید اوربیتال یو له بل سره نیغ ورتګ کوي او د کاربن د دوو اتومونو تر منځ د σ اړیکې د جوړیدو لامل ګرځي او څرنګه چې تاسې مخکې د ایتلین د اړیکو په جوړیدو کې ولیدل، دویمه اړیکه د کاربن د دوو اتومونو تر منځ د هغوی د p نه هایبرید شوو اوربیتالونو د څنګ پر څنګ ننوتنې له امله منځته راځي چې په (13 - 1) شکل کې ښودل شوي دي:



(13-1): شکل: د ایتلین په مرکب کې له اوربیتالونو څخه د ګټې اخیستنې د اړیکو جوړیدل.



p د اوربیتالونو د څنګ پر څنګ ننوتنې څخه د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي چې د پای (π) د اړیکې په نوم یا دیرې د کاربن د دوو اتومونو دوه غیر هایبرید شوو P اوربیتالونو الکترونونه د مالیکول په پورته او ښکته برخه باندې یو له بل سره ننوتنه کوې او د π اړیکه جوړوي، تل په یوه دوه گونې اړیکه کې یوه د σ او یوه د π اړیکه شامله ده د π اړیکه د P غیر هایبرید شوي اوربیتالونو له څنګ پر څنګ ننوتنې څخه جوړه شوې ده، (1 - 13) شکل وگورئ.

فکر وکړئ




ستاسې له نظره د σ اړیکه قوي او مستحکمه ده او یا دا چې د π اړیکه قوي ده ؟ څرګنده یې کړئ .

SP هایبرید: په پورتنیو لوستونو کې مو مطالعه کړل چې څرنگه کولی شو چې د sp هایبریدایزیشن په واسطه د کاربن د دوو اتومونو په منځ کې دوه گونې اړیکه روښانه کړو، اوس به یې زده کوو چې څرنگه د sp له هایبریدایزیشن څخه په ګټه اخیستلو کولای شو چې د کاربن د دوو اتومونو په منځ کې درې گونې اړیکه څرګنده کړو، په دې ډول هایبرید کې یو د s اوربیتال او یو د p اوربیتال یو له بل سره ګډوډ کیږي؛ په پایله کې د sp هایبرید اوربیتالونه ($sp - hybrid$) تشکیلېږي چې د اړیکو ولانسي زاویه یې 180° درجې ده، د هغوی بیلګه کیدای شي چې د Be, Zn, Cd, Hg عنصرونو sp هایبرید په هلوچنیدونو مرکبونو کې وړاندې شي. تجربې ښيي چې د Be, Zn, Cd, Hg هایبرید په هلوچنیدونو کې sp هایبرید دی او د هغوی مرکبونه خطي هندسي جوړښت لري، په SP هایبرید کې د s او p هره یوه برخه $\frac{1}{2}$ ده.


(1 - 14) شکل: د sp هایبرید

د sp هایبرید او درې گونې اړیکې جوړیدل د استلین (C_2H_2) په مرکب کې چې یو ډېر ساده عضوي مرکب دی، د هغه د لیویس د جوړښت سره په لاندې ډول مطالعه کوو:



(1 - 15) شکل: د استلین مرکب د هغه د لیویس د جوړښت سره.

څرنگه چې په شکل کې مو ولیدل، استلین یو خطي مالیکول دی چې د هغه د اړیکو زاویه 180° درجه ده. کوم ډول هایبریدایزیشن د استلین د مرکب د کاربن په اتومونو کې شتون لري ؟ د استلین په مرکب کې د کاربن هر اتوم دوو هایبرید اوربیتالونو ته اړتیا لري چې په خپل منځ کې او د هایډروجن له اتومونو سره اړیکې جوړې کړي.



(16-1) شکل: په استلین کې د کاربن د دوو اتومو sp هایبرید

په (16-1) شکل کې د کاربن په اتوم کې د اوربیتالونو ځایونه او د sp هایبریدایزیشن لیدل کیږي، دلته د sp دوه اوربیتالونه خطي حالت لري او 180° درجه زاویه یې په خپل منځ کې جوړه کړې ده؛ په داسې حال کې چې د کاربن د اتومونو دوه p نه هایبریدایزیشن شوي اوربیتالونه یو له بل سره موازي او د هغه خط د پاسه عمود ولاړ دي کوم چې د sp دوه اوربیتالونه یې سره نښلولي دي، د استلین د جوړیدو لپاره د کاربن د هر اتوم یو sp اوربیتال د هایډروجن د هر اتوم له $1s$ اوربیتال سره نیغه ننوته ترسره کوي چې د کاربن او هایډروجن $C-H$ اړیکه جوړوي، د sp دوه پاتې اوربیتالونه د کاربن په دوو اتومونو کې نیغه ننوته کوي چې د σ اړیکه د کاربن د دوو اتومونو تر منځ جوړیږي او د کاربن د اتومونو د هریو دوه الکترونونه چې د p په غیر هایبرید شوو اوربیتالونو کې ځای لري، یو له بل سره څنګ پر څنګ ننوته کوي؛ نو د استلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اتومونو تر منځ د π دوه اړیکې منځته راځي، چې په لاندې شکل کې ښودل شوي دي:

(17-1) شکل: په استلین کې د SP له هایبرید شوو اوربیتالونو څخه ګټه اخیستنه.

فعالیتونه



۱- د مرکبونو مالیکولي جوړښت او دهغوی درسمولو په پام کې نیولو سره، داوبو د مالیکول د اکسیجن هایبریدایزیشن، د 1 او 4 نمبر کاربن د اتومونو هایبریدایزیشن د $CH_3-CH=C=CH_2$ مرکب په مالیکول کې وټاکئ.

۲- د SO_3 د مالیکول فضايي شکل ولیکئ او لاندې پوښتنه ته ځواب ورکړئ.
سلفر اتوم څو جوړې الکترونونه احاطه کړي دي؟



د لومړي څپرکي لنډيز

- عضوي کيميا د کاربن، هايډروجن د مرکبونو او د هغوی له مشتقاتو څخه بحث کوي.
- د کاربن د اتوم الکتروني جوړښت $1s^2 2s^2 2p^2$ دی چې د کاربن اتوم د هڅولو په حالت کې $1s^2 2s^1 2p^3$ الکتروني جوړښت لري .
- د اته الکتروني (octate) حالت د پوره کولو لپاره، د کاربن اتوم د خپل ولانسي قشر څلور الکترونونه د نورو عناصرو له اتومونو او د کاربن له اتومونو سره شریک وي، په پایله کې د کاربن ولانس څلور دی.
- د کاربن اتومونه کولی شي یو گونې، دوه گونې او درې گونې اړیکې جوړې کړي.
- Hybridization د دوو یا څو بیلا بیلو اتومونو د اوربیتالونو له گډوډو څخه عبارت دی چې دوه او یا څو نوي هایبریدي اوربیتالونه منځ ته راوړي .
- sp^3 هایبریدایزیشن: د کاربن اتومونه په مشبوع هایډروکاربنونو کې دا ډول هایبریدایزیشن لري او داسې منځ ته راځي چې د s یو اوربیتال او د p د درې اوربیتالونو د انرژي د جذب په پایله کې یو له بل سره مخلوطیږي او د sp^3 څلور هایبرید شوي اوربیتالونه جوړوي.
- sp^2 هایبریدایزیشن: په دې ډول هایبرید کې د s یو اوربیتال او د p دوه اوربیتالونه یو له بل سره امتزاج او په پایله کې د sp^2 درې هایبرید شوي اوربیتالونه جوړوي.
- sp هایبرید: په دې ډول هایبرید کې یو د s اوربیتال او یو د p اوربیتال له بل سره گډوډ کیږي، په پایله کې د sp هایبرید اوربیتالونه جوړوي.
- د سگما اړیکه: که چېرې د الکتروني ورېځې پوښښ د هغه خط په اوږدو (امتداد) چې د دوو اتومونو هستې سره نښلوي، ترسره شي؛ یعنې د اوربیتالونو ننوتل مستقیم او لوړ وي، اړیکه کلکه ده چې د (σ) سگما اړیکې په نوم یادېږي.
- د π اړیکه: په مالیکول کې د دوو اتومونو تر منځ اړیکه کیدای شي دوه گونې یا درې گونې وي، دا ډول اړیکې له یوې جوړې څخه د زیاتو الکترونونو په واسطه جوړېږي؛ د بیلگې په ډول: د اکسیجن

په ماليکول کې د اکسیجن د دوو اتومونو ترمنځ اړیکه دوه گونې او د نایتروجن په ماليکول کې د نایتروجن د دوو اتومونو تر منځ اړیکه درې گونې ده . که چیرې د اتومي اوربیتالونو ننوتل څنگ پرڅنگ وي، یعنې د p د اوربیتالونو د الکتروني وریځې پوښښ څنگ پرڅنگ وي او د x د محور د پاسه ځای ونیسي، دا منځ ته راغلې اړیکه د π د اړیکې په نوم یادېږي .

• دوه گونې اړیکه د یوې سگما (σ) اړیکې او له یوې پای π اړیکې څخه جوړه شوې ده او درې گونې اړیکه د یو سگما (σ) اړیکې او دوه له (π) اړیکو څخه جوړه شوې ده .

د لومړي څپرکي پوښتنې

څلور ځوابه پوښتنې

$$1s2s^12p^2$$

- 1 - د کاربن اتوم دهڅې په حالت کې د ----- الکتروني جوړښت لري .
- الف - $1s^22s^22p^2$ ب - $1s2s^1sp^3$ ج - $1s^22s^12p^3$ د - $1s^22s^12p^3$
- 2 - د $^{14}_6C$ د نیم عمر اوږدوالی ----- کاله دی او د ----- د وتلو په پایله کې په نایتروجن بدلیږي.


الف - $5568, \beta^+$ ب - $5730, \bar{\beta}$ ج - $5580, \gamma$ د - $5580, \alpha$

- 3 - په ټولو عضوي مرکبونو کې د کاربن هراتوم ----- شریکې اړیکې د کاربن له نورو اتومونو سره او یا دا چې د نورو عناصرونو له اتومونو سره؛ لکه: هایډروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړوي.

- الف - دوه اړیکې، ب - درې اړیکې، ج - څلور اړیکې . د - یوه اړیکه
- 4 - کاربن کولی شي ----- اړیکې ولري.

- الف - یوه گونې، ب - دوه گونې، ج - درې گونې، د - درې واړه ځوابونه سم دي
- 5 - د کاربن د هر اتوم او د هایډروجن د هر اتوم تر منځ یوه اړیکه شته ده چې ---- گډ الکترونونه د هغه په منځ کې شتون لري.

- الف - یوه، یوه جوړه، ب - دوه، دوه جوړې، ج - درې، درې جوړې، د - څلور، څلور جوړې
- 6 - Hybrid د دوو یا څو بېلابېلو ----- له گډوډیدو څخه عبارت دی چې دوه او یا څو نوي



----- اوربیتالونه منځته راږوي .

الف - اتومي اوربیتال، هایبریدی، ب- مالیکول اوربیتال، هایبریدی،

ج - الف او ب دواړه سم دي، د - هیڅ یو

7 - که چیرې د s یو اوربیتال د p له درې اوربیتالونو سره د انرژي د جذب په پایله کې ګډوډ شي، کوم هایبریدی اوربیتال جوړوي؟

الف - SP ب- SP^4 ج - SP^2 د - SP^3

8 - د s برخه د SP^2 په هر اوربیتال کې د ----- او دې درې اوربیتالونو ترمنځ ولانسي زاویه ----- درجه ده.

الف- $120^\circ \frac{1}{3}$ ب- $120^\circ \frac{2}{3}$ ج- $180^\circ \frac{2}{3}$ د- $180^\circ \frac{4}{5}$

9 - که چیرې د s یو اوربیتال د p د یو اوربیتال سره ګډ شي، کوم هایبرید لاسته راځي؟

الف - sp ، ب - sp^2 ، ج - sp^3 ، د - spd

10 - که چیرې د اوربیتالونو ننوتل نیغ او لوړ وي، اړیکه کلکه ده چې د ----- په نوم یا ډیري .

الف - سګما ب- σ ج - الف او ب د - هیڅ یو

11 - په $CH_3 - CH = CH = CH - C \equiv CH$ مرکب کې د π څو اړیکې شتون


لري؟

الف - درې، ب- څلور، ج - پنځه، د - دوه،

تشریحي پوښتنې

1 - ولې مالیکولونه د CH_3 او C_2H_5 له فورمولونو سره شتون نه لري؟

2- د هایډروجن څو اتومه د لاندې کاربنی اسکلیټ له اتومونو سره ترکیب کیدای شي؟




3 - د ایتایل الډیهاید (CH_3CHO) خطي اړیکې او د لیویس جوړښت رسم کړئ.

4 - د پروپین ($CH_3CH = CH_2$) دخطي اړیکو جوړښت، هایبریدایزیشن او د هغه د اړیکو زاوې


رسم کړئ.

5 - د کاربن د اتوم هایپریدایزیشن د لاندې مرکبونو په مالیکولونو کې وټاکئ .




6 - له هایپریدایزیشن څخه په گټه اخیستنه د CCl_4 په مرکب کې د اړیکو جوړیدل روښانه کړئ.

7 - د لاندې مرکبونو په مالیکول کې د مرکزي اتومونو هایپریدایزیشن روښانه کړئ :



8 - په لاندې مالیکولونو کې به د اړیکو زاویه په تقریبي توگه څو وي؟



9- د اسپرین د مالیکول موډل چې لاندې لیکل شوی دی، په پاملرنې سره وگورئ، د هغه مالیکولي

فورمول د خطي اړیکو په بنسټ رسم او د کاربن د اتومونو هایپریدایزیشن په کې وټاکئ .

(د اسپرین په موډل کې نضواري غونډاري د کاربن اتوم، سره غونډاري د اکسیجن اتوم او سور سپین

ته ورته غونډاري د هایډروجن اتومونه ښیي).

د اسپرین مالیکول




10 - په لاندې مرکبونو کې څو د سگما اړیکې او څو د پای π اړیکې شتون لري ؟ د هغوی د

لیویس جوړښت ولیکئ اوهم د کاربن د ټولو اتومونو هایپریدایزیشن روښانه کړئ.

الف - 1,3-butadiene ب- 1-pentyne ج- 1,2-propadiene

دویم څپرکی

د مالیکول جوړښت او فورمولونه



د کیمیايي مرکبونو مالیکولونه د هغو له ډلې څخه د عضوي مرکبونو مالیکولونه د ځانګړو اړوندو جوړښتونو لرونکي دي او د عناصرو له اتومونو څخه په بېلابېلو شکلونو او یا بېلابېلو قواو په واسطه جوړ شوي دي.

د مرکبونو مالیکولونه د بېلابېلو عناصرونو د اتومونو لرونکي دي چې د اتومونو د اړیکو له لارې په بېلابېلو شکلونو لیدل کېږي، باید پوه شو چې مالیکول څه شی دی او د مالیکولونو جوړښت څه ډول دی؟ د مرکبونو مالیکولونه د کومو سمبولونو په واسطه ښودل کېږي؟ فورمول څه شی دی او د مالیکول کومه ځانګړتیا ښیي؟ فورمولونه په څو ډوله دي؟ او څه رنگه لیکل کېږي؟ ایزومیري څه شی دی او د ایزومیریو مفهوم څرنگه روښانه کولی شو؟ د دې څپرکي په لوستلو پورتنیو پوښتنو ته ځوابونه ویلی شو.

۲-۱: مالیکولي فورمول

تل یو کیمیايي مرکب د هغه جوړونکو عنصرونو د سمبولونو د تړون له لارې د هغو د نسبي ضریبونو سره چې د سټوکیومتری (Stoichiometry) ضریبونو په نوم هم یادېږي، ښودل کېږي، د بیلگې په ډول: NaCl د خوړو مالګې ښودونکی او H_2O د اوبو ښودونکی دی چې جوړونکو عنصرونو د سمبولونو د تړون لاره د مرکبونو د نسبي ضریبونو سره د مالیکولي فورمول په نوم یادېږي. یو مالیکول اوبه د دوو اتومو هایدروجنونو او یو اتوم اکسیجن څخه جوړې شوې دي، په دې بنسټ د اوبو مالیکولي فورمول H_2O دی.

مالیکولي فورمول کېدای شي د کیمیايي تجزیې په واسطه وټاکل شي. د کیمیايي فورمولونو بل ډول له تجربې فورمول څخه عبارت دی، په دې فورمول کې د بېلابېلو عنصرونو د اتومونو شمېر په یو مرکب کې ښودل کېږي، د تجربې کلمه په دې ځای کې په دې معنا ده چې وړاندې شوی فورمول یوازې د لیدنې او اندازه کولو پر بنسټ یعنې د توصیفې او مقداري تحلیل په واسطه ټاکل شوی دی، د گلوکوز مالیکول له 6 اتومونو کاربن، 12 اتومونو هایدروجن او 6 اتومونو اکسیجن څخه جوړ شوی دی او تجربې فورمول یې CH_2O دی چې یوازې دکاربن د اتومونو، د هایدروجن د اتومونو او اکسیجن د اتومونو نسبت د گلوکوز په مالیکول کې ښیي، څرنگه چې دا نسبتونه تل د یوې مادې ډیر ساده بڼه ښکاره کوي، نو له دې کبله دا فورمول د ساده فورمول په نوم یادېږي. په لاندې شکل کې د گلوکوز فورمولونه په څو ساده شکلونو ښودل شوي دي:

مالیکولي فورمول $C_6H_{12}O_6$

تجربې فورمول CH_2O


مشرح ساختماني فورمول

دگلوکوزموډل

(2 - 1): شکل: د گلوکوز فورمولونه

تجربې فورمولونه

په لاندې جدول کې د تجربې او مالیکولي فورمولونو بیلګې وړاندې شوي دي.
(2 - 1) جدول د تجربې او مالیکولي فورمولونو بیلګې

مرکب	ساده فورمول	مالیکولي فورمول	مالیکولي کتله	د ښودلو تګ لاره
فارم الډیهایډ	CH_2O	CH_2O	30.03	
اسیتیک اسید	CH_2O	$C_2H_4O_2$	60.06	
گلوکوز	CH_2O	$C_6H_{12}O_6$	180	

د دې لپاره چې د مرکبونو ساده او ماليکولي فورمولونه مو په سمه توګه لیکلي او موندلي وي، ښايي چې لومړی د مرکب توصیفي او مقداري تحلیل باندې پوه شو، د مرکب د توصیفي او مقداري تحلیل په پوهیدلو سره کېدای شي چې هغه تجربی فورمول له لاندې موادو سره سم لیکلی او ترلاسه شي.

1- هر عنصر مقداري کمیتونه چې د انالیز (د تجزیې) په واسطه لاسته راغلي دي، په مول بدلولو.
2- د مرکب د تشکیل کوونکو عناصرونو د مولونو کچه چې له لومړي بند سره سم لاس ته راغلي ده، په پوره پام سره ګورو او د هغوی کوچنی کمیت په ګوته کوو، وروسته له دې د غوښتونکي مرکب د مالیکول د جوړونکو عناصرونو ټول مولی کمیت په همدې کوچني مولی کمیت باندې ویشل کېږي؛ نو رقمونه به پرته له قیاسي واحد څخه لاسته راشي.

3- هغه کمیتونه چې له دویم بند سره سم لاسته راځي، د مطالعې لاندې نیسو، که چیرې تام عددونه وې د مرکب د مالیکول د جوړونکو عناصرونو د اتومونو ضریبونه په ساده فورمول کې دي او که تام رقمونه نه وي، هغوی د روندا ف په تګ لاره او یا د تام ډېر کوچني عدد په ضربولو په واسطه په تامو عددونو تبدیلوو، دا تام عددونه د عناصرونو اتومي نسبت په ساده فورمول کې ښیي، د عناصرونو نسبتي رقمونه د مالیکولي فورمول د سم لیکلو د لارو په پام کې نیولو سره د کېمیایي عناصرونو د سمبولونو سره یوځای کوو چې ساده فورمول لاسته راځي.

4- د مرکب د مالیکولي فورمول د صحیح لیکلو لپاره د توصیفي او مقداري تحلیل سریره باید د مرکب مالیکولي کتله هم معلومه وي، په دې بنسټ د توصیفي او مقداري تحلیل په پام کې نیولو سره ساده فورمول د پورتنیو موادو سره سم لاسته راوړو او د مطلوب مرکب مالیکولي کتله د ساده فورمول نسبتي مالیکولي کتلي باندې ویشل او تام عدد به حاصل شي چې دا عدد د عناصرونو په نسبت په ساده فورمول کې ضربوو او په پایله کې د مرکب مالیکولي فورمول حاصلېږي.

$$X = \frac{\text{مالیکولي فارمول کتله}}{\text{د تجربی فورمول کتله}}$$

لومړی مثال: 7.2g یو عضوي مرکب د مس له ډاکساید سره په آزمایشي نل کې تودوخه ورکړ شویده چې په پایله کې 10.52 کاربن ډای اکساید او 4.32 د اوبو پراس تر لاسه شوی دي، که چېرې د هغه 1.8 ګرام په کچه په 50g اوبو کې حل شي، لاسته راغلی محلول په 0.372°C کې کنگل کېږي، د نوموړي مرکب ساده او ترکیبي فورمول ولیکئ.

حل: د کاربن ډای اکساید فیصدي

عضوي ماده کاربن ډای اکساید

$$\left. \begin{array}{rcl} 10.52\text{g CO}_2 & - & 7.2\text{g} \\ x & - & 100 \end{array} \right\} x = \frac{10.52\text{g} \cdot 100}{7.2\text{g}} = 146.11\%$$

د کاربن فیصدي:

$$\left. \begin{array}{rcl} 44\text{g CO}_2 & - & 12\text{gC} \\ 146.11\text{gCO}_2 & - & x \end{array} \right\} x = \frac{146.11\text{gCO}_2 \cdot 12\text{gC}}{44\text{CO}_2} = 40\% \text{C}$$

د اوبه فیصدي:

$$\left. \begin{array}{rcl} \text{عضوي ماده} & & \text{د اوبو اندازه} \\ 4.32gH_2O & - & 7.2g \\ x & - & 100 \end{array} \right\} x = \frac{4.32g \cdot 100}{7.2g} = 60\%$$

د هايډروجن فیصدي:

$$\left. \begin{array}{rcl} 18gH_2O & - & 2gH \\ 60gH_2O & - & x \end{array} \right\} x = \frac{6.6g \cdot 100}{7.2} = 6.67\%$$

د اکسیجن فیصدي:

$$\left. \begin{array}{rcl} 18gH_2O & - & 16gO \\ 60gH_2O & - & x \end{array} \right\} x = \frac{60gH_2O \cdot 16gO}{18H_2O} = 53.3\%$$

$$C = 40g / 12g \cdot mol^{-1} = 3.33mol$$

$$H = 6.66 / 1g \cdot mol^{-1} = 6.66mol$$

$$O = 53.3 / 16g \cdot mol^{-1} = 3.3mol$$

$$C = 3.33mol / 3.33mol = 1$$

$$H = 7mol / 3.33mol = 2$$

$$O = 3.3mol / 3.33mol = 1mol$$

$$\left. \begin{array}{l} C=1 \\ H=2 \\ O=1 \end{array} \right\} CH_2O$$

د عنصرونو فیصدي په هغوی په مولونو تبدیلو، وروسته ټول د هغوی په کوچني عدد تقسیموو تر څو د اټومونو نسبت د مرکب ساده فارمول لاسته راځي.

$$\Delta t = K \cdot C_m = K \cdot \frac{m \cdot 1000g \cdot molal}{M \cdot m'} \quad \text{په یوولسم ټولگې کې موزده کړل چې}$$

$$M = K \cdot \frac{m \cdot 1000g \cdot molal}{\Delta t \cdot m'}$$

$$M = 1.85 \frac{CKg}{mol} \cdot \frac{1.8g \cdot 1000g \cdot molal}{0.37C^\circ \cdot 50g} = 180$$

$$M = 180$$


$$M(CH_2O)n = 180$$

$$(12 + 1 \cdot 2 + 16)n = 180$$

$$(30)n = 180 \Rightarrow n = \frac{180}{30} = 6$$

$$(CH_2O)n = (CH_2O)6 \Rightarrow C_6H_{12}O_6$$

نو حقيقي فارمول د ماليکولي کتلې له مخې پيدا کوو:



مشق اوتمرین وکړئ



د یو عضوي مرکب توصیفي او مقداري تحلیل ښيي چې د هغه په جوړښت کې 6g کاربن او 1.2g هایدروجن شتون لري، د هغه ساده فورمول ولیکئ. که چېرې د هغه مالیکولي کتله 72 وي، مالیکولي فورمول یې ومومئ.

د الکانونو مالیکولي فورمول

مالیکولي فورمول، مرکبونه په کیمیايي ژبه ورپیژني، فورمول نه یوازې په مالیکول کې د اتومونو ډول ښيي؛ خو د اتومونو شمېر او ډولونه هم ښيي. میتان د الکان هایدروکاربن ډیر ساده مرکب دی او د الکانونو نور دوه مرکبونه د ایتان (C_2H_6) او پروپان (C_3H_8) دي، آیا کولی شئ C_nH_{2n+2} د هغه الکان فورمول چې د څلورو کاربنونو لرونکی وي، وښیي؟ د دې لپاره د لومړي الکان له فورمول څخه کومک واخېستل شي، د کاربن او هایدروجن د اتومونو د شمېر ترمنځ اړیکه د هغوي په هریو کې ومومئ، په دې فورمول کې n د کاربن د اتومونو شمېر په هر الکان کې ښيي.

جدول: (2 - 2) د الکانونو د عمومي فورمول ټاکل C_nH_{2n+2}

CH_4	C_2H_6	C_3H_8	$C_4H_?$
شمېر $C=1$	شمېر $C=2$	شمېر $C=3$	شمېر $C=4$
شمېر $H=2(1)+2=4$	شمېر $H=2(2)+2=6$	شمېر $H=2(3)+2=8$	شمېر $H=2(4)+2=10$

فعالیت



د هغو الکانونو مالیکولي فورمولونه پیدا کړئ کوم چې د کاربن د اتومونو شمېر یې په لاندې جدول کې لیکل شوي دي:

د هر الکان د کاربن شمېر (n)	5	6	7	8	9	10
مالیکولي فورمول						

2-2: جوړښتیز فورمولونه

د مرکبونو مالیکولي فورمولونه مونږ ته راښيي چې کوم عنصرونه د یو مرکب په جوړښت کې شتون لري او د هر مرکب په جوړښت کې د نوموړو عنصرونو د اتومونو شمېر په کومه کچه دي، خو د دې لپاره چې پوه شو د عنصرونو اتومونه د مرکبونو په مالیکولونو کې څرنگه سره نښتي دي، باید د هغوی جوړښتیز فورمول ولیکلی شو. جوړښتیز فورمولونه د مالیکولونو په هکله زیات معلومات وړاندې کوي، د اتومونو ځایونه په مالیکول کې ښيي.

د جوړښتیز فورمولونو د ډولونو سربېره، د هر عنصر د اتومونو شمېر، د اتومونو نښلیدل یو له بل سره ښيي. د دوو مرکبونو


(ایتیل الکول او ډای میتیل ایتیر) تجربی، مالیکولي او جوړښتیز فورمولونه چې په (2-2) جدول کې لیکل شوي دي، یو له بل سره پرتله کړئ، د دواړو مرکبونو په مالیکولونو کې د اتومونو شمېر او ډول یو شان دی، خو د اتومونو د اړیکو څرنگوالی او د هغوی جوړښت یو له بل څخه توپیر لري، همدا کوچني جوړښتیز توپیرونه د هغوی د کیمیايي خواصو د توپیرونو لامل ګرځیدلي دي، ډای میتیل ایتیر ګاز په یخچالونو کې کارول کېږي او بیهوشه کوونکې ماده ده، خو ایتانول مایع حالت لري چې د عضوي موادو د محلول په توګه له هغه څخه په صنعت کې ګټه اخیستل کېږي او یو نشه کوونکې ماده ده او انسان ته بیخودي ورکوي. ساختماني فورمولونه یې د لیویس د جوړښتیز د فورمولونو په شان دی، یولنډ خط د یوې ساده اړیکې ښودونکی چې د یو-یو الکترون تصور، د دې خط په څوکو کېدای شي. هغه مالیکولونه چې یو شان مالیکولي جوړښت ولري، خو د هغوی جوړښتیز فورمولونه یو له بل څخه توپیر ولري، یو د بل ایزومیر دي.

(2-3) جدول: د ایتانول او ډای میتیل ایتیر د خواصو پرتله


مرکب	ساده فورمول	مالیکولي فورمول	جوړښتیز فورمول	د اېښودو درجه	کثافت
ایتانول	C_2H_6O	C_2H_6O	$ \begin{array}{c} H \quad H \\ \quad \\ H - C - C - O - H \\ \quad \\ H \quad H \end{array} $	$78^\circ C$	$0.816g/cm^3$
ډای میتیل ایتیر	C_2H_6O	C_2H_6O	$ \begin{array}{c} H \quad \quad H \\ \quad \quad \\ H - C - O - C - H \\ \quad \quad \\ H \quad \quad H \end{array} $	$-24.5^\circ C$	$0.661g/cm^3$

2-3: د جوړښتیزو فورمولونو د لیکلو لارې


څرنگه کېدای شي چې د مالیکولونو د هندسي شکلونو وړاند وینه شي او هغه ولیکل شي؟ تر اوسه مو ډېر زیات مطلبونه د مالیکولونو د جوړښت په اړه زده کړي دي؛ خو د مالیکولونو درې اړخیز لوري یا هندسي جوړښت مو نه دی مطالعه کړی، د مالیکولونو هندسي شکلونه د هغوی د کیمیايي خواصو په ټاکلو کې ډېر مهم عامل دي. ساده مالیکولونه د ساده هندسي شکلونو لرونکي دي، دوه اتومي مالیکولونه؛ لکه: د هایدروجن مالیکول د یو ساده شکل لرونکی دی چې لاندې ښودل شوی دی؛ خو هغه مالیکولونه چې له دوو اتومونو څخه زیات اتومونه لري، د هندسي پیچلو شکلونو لرونکي دي او په دې هکله باید زیات معلومات وړاندې شي:



(2-2) شکل: د هایدروجن مالیکول ته ورته دوه اتومي مالیکولونه



په عمومي ډول دېو مرکب د مالیکولي فورمول او دهغه د هندسي شکل ترمنځ روښانه اړیکه شتون نه لري، دیبلګي په ډول: د کاربن ډای اکساید (CO_2) او سلفر ډای اکساید (SO_2) د مرکبونو دوه مالیکولونه په پام کې نیسو، په دواړو مرکبونو کې درې اتومونه شته دي چې دوه یې د اکسیجن اتومونه دي، خو د دې مرکبونو مالیکولونه بېلابېل هندسي شکلونه لري. د (CO_2) مالیکول خطي او (SO_2) مالیکول کورب دی، ولې؟ د دې پوښتنې ځواب کېدای شي د ولانسي الکترونونو په جوړښت کې په ځانګړې توګه دهغوی د اتومونو په ازادو جوړوالی الکترونونو کې ولټول شي:



(2-3) شکل: کاربن ډای اکساید او سلفر ډای اکساید د مالیکولونو جوړښت

یوه نظریه چې د مالیکولونو د هندسي شکلونو د جوړښت لپاره یې وړاندوینه شوې ده، د ولانسي قشر د جوړه الکترونونو د دافعه قوې (Valence shell Electron pairs Repulsion) له نظریې څخه عبارت ده، چې په (VSEPR) سره ښودل کېږي. له دې نظریې سره سم، د الکتروستاتيکې د لري کولو قوا و شتوالې په یو مالیکول کې د اړیکو او یا د نه اړیکو د جوړو الکترونونو ترمنځ د دې لامل ګرځي ترڅو الکترونونه د امکان تر حده پورې یوله بل څخه فاصله نیولې وي او لوری ولري؛ خو دا لوری نیول داسې دی چې ډیر کلک هندسي جوړښت مالیکول ته ور په برخه کوي. او د اتومونو د ځانګړي جوړښت لامل ګرځي ترڅو د مالیکولونو د اړیکو او یا د نه اړیکو جوړه د الکترونونو ترمنځ ډیره لږه د لري کولو قوه شتون ولري، د الکتروني ساحې په نوم یادېږي او مرکزي اتوم له شاوخوا ساحې څخه عبارت ده چې الکترونونه د شمېر نه پاملرنې سره په هغه ځای کې شتون ولري. د دې تعریف پر بنسټ یوه ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اړیکې هم یوه ساحه شمېرل کېږي.

فعالیت



د مالیکولونو د هندسي شکلونو د ښودلو لپاره کېدای شي له باد لرونکو پوکانيو څخه ګټه واخیستل شي. څو پوکاني په عین کچه تیارې او لاندې تجربې ترسره کړئ:

- 1- په لومړي سر کې دوې وړې پوکاني د باد څخه ډکې کړئ، وروسته د تار څخه په ګټه اخیستلو سره د پوکانو سرو نه یوله بلې سره داسې وتړئ چې سره نژدې وي، خو آزادې دي وي. پوکاني د ورښمېنې ټوټې مخ سره وموښئ ترڅو د برښنا چارج تر لاسه کړي، وروسته بیا هغوی پر میز خوشې کړئ ترڅو ثابت حالت ځانته غوره کړي، پوکاني له لاندې حالتونو څخه کوم یو ځانته غوره کوي؟



(۳) شکل: د تجربې لپاره (2-4)

2- که چېرې په پورتنی ازمایښت کې درې پوکاڼۍ وکارول شي، هغوی ته به لاندې کوم جوړښت مناسب وي؟

(2-5) شکل

3- که چېرې په پورتنی ازمایښت کې څلور پوکاڼۍ وکارول شي، هغوی ته به لاندې کوم جوړښت مناسب وي؟

(2-6) شکل

4- څرنګه چې د مالیکولونو هندسي شکل د هغوی د لیویس جوړښت پر بنسټ ټاکل کېږي، د دې موخې لپاره له لاندې لارو څخه کار اخلو:


الف - د لیویس د مالیکول جوړښت رسم کېږي.

ب - د مرکزي اټوم په شاوخوا کې د الکتروني ساحو شمېر ټاکل کېږي.

ج - اړونده هندسي جوړښت د الکتروني ساحو د شمېر پر بنسټ وټاکي.

دوه الکتروني ساحې: (خطي جوړښت)

هغه زاویه چې درې نښلولی اټومونه یو له بله سره جوړوي، د اړیکو د زاویه په نوم یادېږي چې زیاتره کچه یې 180° ده. د CO_2 مالیکول چې د لیویس جوړښت لري، په پام کې نیسو:




د مرکزي اټوم په شاوخوا کې دوې الکتروني ساحې (کېن اوبڼې لورې) شتون لري.


یوازې د ممکنه لوري نیول چې کولی شي د کاربن د اټوم په شاوخوا دوه الکتروني ساحې د امکان تر حده پورې یوله بل څخه لېرې وساتي، له خطي جوړښت څخه عبارت دي. لاندې شکل وګورئ:

(2-7) شکل: د خطي مالیکول جوړښت.

د (VSEPR) له نظریې سره سم، هغه مالیکول چې د مرکزي اټوم په شاوخوا کې د دوو الکتروني ساحو لرونکي دي، څرنګه چې په کاربن ډای اکساید کې لیدل کېږي، خطي جوړښت لري او ولانسي زاویه یې 180° ده.



د درې الکتروني ساحې (درې ضلعي يامسطح) جوړښت: په دې اړه دسلفر ترای اکساید (SO_3) جوړښت گورو:



په SO_3 کې درې اړخيزې الکتروني ساحې د مرکزي اتوم سلفر (S) په شاوخوا کې شتون لري. ددې ماليکول هندسي جوړښت چې درې ضلعي يا مسطح دی، لاندې ډول ليکل شوی دی:


$$120^\circ$$

(8-2) شکل: د SO_3 د ماليکول مسطح جوړښت

په ماليکولونو کې د SO_3 په شان، کله چې مرکزي اتوم د نورو درې اتومونو په واسطه چاپېر شوی وي او په هغوی کې الکتروني جوړې له اړیکو الکترونونو جوړه يي ډولو څخه وي؛ نو د ماليکول جوړښت مسطح دی او د هغه ولانسي زاویه 120° درجې ده.


څلور الکتروني ساحې (څلورمخه جوړښت)

دالکترونونو څرنګوالی چې څلور الکتروني ساحې لري، د هغوی ماليکولي جوړښت لږ څه پېچلی دی، چې بیلګه يې کېدای شي میتان CH_4 وویل شي؛ ځکه د یو مسطح شکل په عوض چې د کاغذ په پاڼه کې ښودل کېږي، یو درې اړخیز شکل لري او د څلور وجهي په نوم یادېږي. د میتان د ماليکول دښودلو څو بېلابېلې لارې په (2-8) شکل کې ښودل شوي دي. شکلونه کېدای شي د درې ستنو په ډول په پام کې ونیول شي چې د هغوی څلورمه ستنه له پورته خوا څخه پر هغه باندې ټینګه ده، په دې ډول جوړښت کې الکتروني جوړې یوه له بلې سره په 109.5° کې دي.



(2-9) شکل: د میتان ماليکولي فورمولونه


په ماليکولونو کې د جوړه الکترونونو د نه اړیکو شتون په صورت کې د اړیکو زاوې داسې برابرې کړي چې د نه اړیکو جوړو الکتروني ساحې لپاره اړونده لویه فضا پرانستل شي. د سلفر اتوم د SO_2 په ماليکول کې گورو.



د سلفر اتوم په شاوخوا کې درې الکتروني ساحې شته دي، له دې کبله د هغو جوړښت د مسطح درې ضلعي گروپ پورې اړه لري، په دې جوړښت کې الکتروني ساحې یوه له بلې سره 120° درجې زاویه لري، خو د یوې نه اړیکې الکتروني جوړې په پرتله ډیره فضا نیسي، ځکه د نه اړیکو الکتروني جوړې د یوې هستې د اغیزې لاندې دي، په داسې حال کې چې د اړیکو الکتروني جوړې د دوو هستو د اغیزو لاندې دي.

د لرې کولو قوه د نه اړیکو-اړیکو الکتروني جوړو ترمخ لږ څه د اړیکو اړیکو د الکتروني جوړو ترمخ دلرې کولو له قوې څخه زیاته ده، د لرې کولو د قواو د زیات والي له امله، د اړیکو الکتروني جوړې یوه له بلې څخه لږ څه لرې دي، نو له دې کبله د SO_2 د مالیکول د اړیکو زاویه چې باید 120° وي، $119,5^\circ$ ته ټیټه شوې ده، د SO_2 په هکله باید وویل شي چې په هغه کې دوه گونې او دوه گونې اړیکه هم همدارنګه ده، ځکه د هغوی الکتروني ساحې د یو گونې اړیکې له ساحې په نسبت ډیرې فضا ته اړتیا لري. لاندې شکلونه د ایتلین او استلین مالیکولي فورمولونه ښيي چې د هغوی په مالیکولونو کې د دوو کاربنو ترمخ په ترتیب سره دوه گونې او درې گونې اړیکې شتون لري:

(2-10) شکل: د ایتلین د مالیکول فورمول او خطي جوړښت





(2-11) شکل: د استلین د مالیکول فورمول خطي جوړښت

د ځینو الکانونو جوړښتیز فورمولونه لاندې جدول کې لیکل شوي دي:

4-2 جدول دځینوالکانونو نوم او د لیویس جوړښت

د الکانونو نومونه	مالیکولي فورمول	جوړښتیز فورمولونه
پروپان	C_3H_8	$\begin{array}{c} H & H & H \\ & & \\ H-C & -C & -C-H \\ & & \\ H & H & H \end{array}$
بیوتان	C_4H_{10}	$\begin{array}{c} H & H & H & H \\ & & & \\ H-C & -C & -C & -C-H \\ & & & \\ H & H & H & H \end{array}$
پنتان	C_5H_{12}	$\begin{array}{c} H & H & H & H & H \\ & & & & \\ H-C & -C & -C & -C & -C-H \\ & & & & \\ H & H & H & H & H \end{array}$
هگزان	C_6H_{14}	$\begin{array}{c} H & H & H & H & H & H \\ & & & & & \\ H-C & -C & -C & -C & -C & -C-H \\ & & & & & \\ H & H & H & H & H & H \end{array}$
هپتان	C_7H_{16}	$\begin{array}{c} H & H & H & H & H & H & H \\ & & & & & & \\ H-C & -C & -C & -C & -C & -C & -C-H \\ & & & & & & \\ H & H & H & H & H & H & H \end{array}$
اوکتان	C_8H_{18}	$\begin{array}{c} H & H & H & H & H & H & H & H \\ & & & & & & & \\ H-C & -C & -C & -C & -C & -C & -C & -C-H \\ & & & & & & & \\ H & H & H & H & H & H & H & H \end{array}$
نونان	C_9H_{20}	$\begin{array}{c} H & H & H & H & H & H & H & H & H \\ & & & & & & & & \\ H-C & -C & -C & -C & -C & -C & -C & -C & -C-H \\ & & & & & & & & \\ H & H & H & H & H & H & H & H & H \end{array}$
دیکان	$C_{10}H_{22}$	$\begin{array}{c} H & H & H & H & H & H & H & H & H & H \\ & & & & & & & & & \\ H-C & -C & -C & -C & -C & -C & -C & -C & -C & -C-H \\ & & & & & & & & & \\ H & H & H & H & H & H & H & H & H & H \end{array}$


که د پورتنی جدول د الکانونو جوړښت ته پاملرنه وشي، لیدل کېږي چې د دوی د یو میتیلین ($-CH_2-$) گروپ په کچه (اندازه) یوله بل څخه توپیر لري، هغه مرکبونه چې د یو ($-CH_2-$) په کچه یوله بل څخه توپیر ولري، یو د بل د هومولوگ (Homolog) په نوم یادېږي:



څرنگه چې لیدل کېږي الف اوب الکانونه دواړه د عین مالیکولي فورمول (C_4H_{10}) لرونکې دي، خو دهغوی دکاربن دنځیر جوړښت یوله بل څخه توپیر لري، داسې چې الف فورمول نورمال زنځیر او د ب فورمول ښاخ لرونکی زنځیر دی، له پورتنیو څرگندونو څخه پایله اخیستل کېږي، چې د مالیکول جوړښتیز فورمولونه د مرکب په مالیکولونو کې د شاملو اتومونو د اړیکو څرنگوالي په هکله مونږ ته معلومات وړاندې کوي.

مثال: داوبو (H_2O) او امونیا (NH_3) د مالیکولونو د هندسي بڼې وړاندېز وکړئ او ویې لیکئ.

حل:



2 - د الکتروني ساحو شمېر د دواړو مالیکولونو د مرکزي اټوم په شاوخوا کې شمېرو:

الف - په NH_3 کې دنایتروجن اټوم درې اړیکې دهایدروجن د اټومونوسره جوړېږي دی او یوه جوړه ازاد الکترونونه لري؛ پردې بنسټ څلور الکتروني ساحې لري.

ب - په اوبو (H_2O) کې داکسیجن اټوم دوه اړیکې دهایدروجن سره تړلي دي اودوه جوړې ازاده الکترونونه هم لري، پردې بنسټ دڅلورو الکتروني ساحو لرونکې دي.

3 - اړونده هندسي جوړښت د VSEPR د نظریې پر بنسټ ټاکو:


الف - په اټومونو کې الکتروني ساحه به خامخا څلور مخیزه جوړښت ولري او د اړیکو زاویه یې $109,5^\circ$ درجه ده.

4 - د الکترونونو د جوړو څرنگوالی ټاکو.

الف - د امونیا په اړه څلورو جهې د درې ستونپه بڼه په پام کې نیسو چې د مالیکول څلورمه ستنه له پاس لوري پرې ټینګه ولاړه ده. که چیرې ازاده جوړه الکترونونه په څلورمې ستنې باندې ومنو، لاسته راغلې هندسي شکل به دېوهرم درې ضلعي قاعده ولري. (2-12 شکل).

ب - د اوبو په اړه، د اوبو د مالیکول شکل کور دی، دوه جوړې ازاد الکترونونه دڅلورو جهې دوه ستنې نیولې دي.

ج - د نه اړیکو - نه اړیکو، نه اړیکو اود اړیکو د جوړه الکترونونو د شتون پر بنسټ چې لږې کوونکې قوه په وار سره دهغوی ترمنځ کمیږي، د اوبو او امونیا په مالیکول کې د اړیکو زاویه د $109,5^\circ$ دنورمال زاوې څخه لږه کوچنۍ ده، (د امونیا په مالیکول کې د اړیکو زاویه 107° او اوبو په مالیکول کې $104,5^\circ$ ده) لاندې شکلونه وګورئ:



(2-12) شکل: د اوبو او امونیا مالیکولي جوړښت

فعالیت




دلاندې ماليکولونو د هندسي شکلونو وړاندوینه وکړئ او وپې لیکئ:



د ساختماني فورمولونو دساده کولولاره




که په (2-3) جدول کې دالکانونو جوړښتیزو فورمولونو ته پام وکړو، و به مومو چې د دوی لیکل او رسمول ستونزمن او غیراقتصادي دي. له دې کبله د جوړښتیز فورمولونو د ښودنې او لیکنې لپاره نورې لارې ټاکل شوې دي چې په لاندې ډول دي:

- دجوړښتیزو فورمولونو دلیکلو لپاره په لنډ ډول، دکاربونونو اوهایدروجن ترمنځ اړیکې هم نه ښودل کېږي او ځینې وخت دکاربونونو داتومونو اړیکې هم نه لیکل کېږي؛ دیلگي په ډول:




د کیمیاوي علامو ښودل

- په دې کرڼلاره کې دکاربن اوهایدروجن ټول اتومونه له جوړښتیزو فورمولونو څخه لرې کېږي او یوازې هغه اړیکې چې د زاویې لرونکو خطونو په واسطه وړاندې کېږي، ښودل کېږي. دا ډول جوړښت دسکلیټي جوړښت او یا دخطي - زوايه یې جوړښت په نوم یا دوي، په دې جوړښت کې یوازې دکاربن اړیکې (C-C) ښودل کېږي، داسې چې دکاربن داتومونو ځایونه دخطونو دپریکړو ځایونو په سر او په پای کې په پام کې نیول کېږي او C-H له لیکلو څخه ډډه کوي:









1- دلاندي مرکبونو نیمگړی جوړښت، ناقص مشرچ اوسکلتي فورمولونه وليکئ:



2- دلاندي مرکبونو بشپړه جوړښتیز فورمول وليکئ:



دسپرين کيميايي نوم استايل سالیسیلیک اسید دی، څرنگه چې دهغه د جوړښتیز فورمول بشپړ ښودل ستونزمن دی؛ نو پردي بنسټ کېمیا پوهانو دهغه له سکليتي فورمول څخه گټه اخېستې ده چې په لاندې ډول دی:




(2- 13) شکل: اسپرين او دهغه فورمول

ډیرپوه شئ


د مرکبونو مالیکولونو د ولانسي اړیکو ترمنځ نورماله زاویه 109.5° ده او په ټولومالیکولونو کې په همدې کچه باید وي، له دې کبله د زنځیري هایډروکاربنومالیکولونه د زنگزاگ (کورډر) په بڼه لیدل کېږي.

2-4: ایزومیری (Isomers)

په کېمیا کې په تېره بیا په عضوي کېمیا کې ډېر مرکبونه شته چې دهغوی د مالیکولونو جوړښتیز فورمولونه لري، خو ترکیبي مالیکولي فورمول یې یو شان دی؛ دیلگې په ډول: ایټایل الکول اوډای میتایل ایتیرین مالیکولي فورمول لري؛ خو دجوړښتیز فورمولونه یې سره توپیر لري:




Ethanol












dimethyleter

څرنگه چې لیدل کېږي، په ایټانول کې د اکسیجن اټوم له یو اټوم کاربن اویواټوم هایډروجن سره اړیکه لري؛ په داسې حال کې چې د ډای میتایل ایتیریه مالیکول کې د اکسیجن اټوم دکاربن له دوو اټومونو سره اړیکه لري؛ نو



هغه مرکبونه چې د یوشان مالیکولي فورمولونو لرونکي دي؛ خو دهغوي جوړښتیز فورمولونه یوله بل څخه توپیر لري؛ یعنې دهغوي په مالیکولونو کې د اتومونو د اړیکو توپیر څرگند ږي، یو د بل ایزومیر (Isomer) په نامه یادېږي.

د ایزومیرونو د فورمولونو ترلاسه کولو لپاره لارښوونه کېږي چې باید په لومړي سر کې د مرکبونو د مالیکولونو د کاربنی چوکاټ بڼې ولیکل شي او وروسته دې پرله پسې اصلي زنجیر لاند کړي او له اصلي زنجیر څخه د کاربن لرې شوي اتومونه دې د منشعب زنجیر (د څنگ زنجیر) په بڼه په ټولو شونو حالتونو کې ولیکل شي؛ د بیلگې په ډول: د هپتان (C_7H_{16}) د ایزومیرونو کاربنی چوکاټ تر څېړنې لاندې نيسو:




د هایدروکاربنونو بشپړ فورمولونه د کاربنی چوکاټونو د بڼو له بشپړه کولو څخه وروسته چې د هایدروجنونو د اړوندو شمېرو په زیاتولو ترسره کېږي، لاسته راځي. په عضوي مرکبونو کې ایزومیري زیاتې دي چې د هایدروکاربنو د مرکبونو په هر مبحث او د هغوی په مشتقاتو کې مطالعه کېږي.


الکینونه د جوړښتیز ایزومیري او د دوه گونو اړیکو د ځایونو له ایزومیریو سربیره، فضايي ایزومیري هم لري.

الف: جوړښتیز ایزومیري او د دوه گونو اړیکو ځای

لاندې مرکبونه په پام کې ونیسئ:



1 - Butene.



2 - Butene


د دواړو پورتنیو مرکبونو جمعي فورمول C_4H_8 دی؛ خو د دواړو مرکبونو د مالیکولونو جوړښتیز فورمولونه یوله بل څخه توپیر لري، دا ایزومیري د دوه گونې اړیکې د ځای له کبله د جوړښتیز ایزومیري په نوم یا دوي.

ب - فضايي ایزومیري (Stereo isomeris)

Stereo یوناني کلمه ده چې د جامدو او کلکو جسمونو په معنا ده؛ نو فضايي ایزومیري (Stereo isomeris) یوازې هغو مرکبونو پورې اړه لري چې کلک فضايي جوړښت ولري او د هغوی هندسي شکل فضايي بدلون نه مومي.

د زیاتې پوهې په خاطر

الکینونه له سایکلو الکانونوسره ایزومیر دي او الکاینونه له سایکلو الکینونوسره ایزومیر دي؛ دبیلگې په ډول: هغه مرکب چې جمعي فورمول یې C_3H_6 دی، کیدای شي چې پروپین او یا داچې سایکلوپروپان وي:



Cyclo propane



1 - propene

د دویم څپرکي لنډیز



* تل یو کیمیايي مرکب دهغه د جوړونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب له لارې د هغوی د نسبتي ضریبونو سره چې د ستوکیومتری (Stoichiometry) ضریبونو په نوم هم یادېږي، ښودل کېږي او د جوړونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب لاره د مرکبونو له نسبتي ضریبونو سره یې د مالیکولي فورمول په نوم یادېږي.


* مالیکولي فورمول کېدای شي د کیمیايي تجزیې په واسطه وټاکل شي. د کیمیايي فورمولونو بل ډول فورمول له تجربې فورمول څخه عبارت دي، په دې فورمول کې د بېلابېلو عنصرونو د اتومونو شمېر په یو مرکب کې ښودل کېږي، تجربې کلمه په دې ځای کې دا معنا لري چې وړاندې شوی فورمول یوازې د لیدنې او ټاکلو پر بنسټ یعنې د توصیفې او مقداري تحلیل په واسطه ټاکل شوی دی.

* مالیکولي فورمول، مرکبونه په کیمیايي ژبه معرفي کوي، فورمول نه یوازې په مالیکول کې د اتومونو ډولونه ښیي؛ خو د اتومونو شمېر او ډولونه هم ښیي.

* جوړښتیز فورمولونه مونږ ته د مالیکول په هکله زیات معلومات وړاندې کوي، د اتومونو ځایونه په مالیکول کې ښیي.

* یوه نظریه چې د مالیکولونو د هندسي شکلونو د جوړښتونو لپاره یې وړاندوینه شوې ده، د ولانسي قشر د جوړه الکترونونو د دافعه دقوې (Vaolence shell Elctron pairs Repulsion) له نظریې څخه عبارت ده چې په (VSEPR) سره ښودل کېږي. له دې نظریې سره سم، د الکتروستاتیکې د لرې کولو قوا و شتوالی په یو مالیکول کې د اړیکو او یا د نه اړیکو د جوړه الکترونونو ترمنځ د دې لامل ګرځي، ترڅو دغه الکترونونه د شونې تر حده پورې یوله بل څخه واټن موندلی وي او لوری ولري؛ خو دا لوری نیول داسې دي چې ډېر کلک هندسي جوړښت مالیکول ته ور په برخه کوي.

* هغه زاویه چې درې نښلولي اتومونه یې یو له بل سره جوړوي، د اړیکو د زاویې په نوم یا ډېرې چې زیاته کچه




بې 180° درجې ده.

* هغه مرکبونه چې د یوشان مالیکولي فورمولونو لرونکي دي؛ خو د هغوی جوړښتیز فورمولونه یوله بل څخه توپیر ولري؛ یعنې د هغوی په مالیکولونو کې د اتومونو د اړیکو توپیر څرګند شي، یوله بل د ایزومیر (Isomer) په نامه یادېږي.

د دویم څپرکي پوښتنې

- 1 - مالیکولي فورمول کېدای شي د کیمیايي --- پربنسټ وټاکل شي .
الف - کیمیايي تعاملونه، ب - کیمیايي سنتیز، ج - تجزي، د - هیڅ یو .
- 2 - د مرکبونو د ساده او مالیکولي فورمولونو د پوهیدلو لپاره په کار ده ترڅو د مرکبونو په ---- تحلیل پوه شي .
الف - توصیفي، ب - مقداري، ج - الف او ب د - هیڅ یو .
- 3 - جوړښتیز فورمولونه له ډولونو سره بېره، د هر عنصر د اتومونو شمېر، او د اتومونو هم ښيي .
الف - د نښلولو لاره، ب - د اړیکو څرنگوالی، ج - د مالیکولونو شمېر، د - الف او ب دواړه سم دي .
- 4 - د اتومونو خاص جوړښت چې د مالیکولونو د اړیکو او د نه اړیکو جوړه الکترونونو ترمنځ د لرې کولو لامل ګرځي، ډیره لږه د دفعې قوه شتون ولري د ---- په نوم یادېږي .
الف - الکتروني مدار، ب - الکتروني قشر، ج - الکتروني فرعي قشر، د - الکتروني ساحه .
- 5 - د مالیکولونو د هندسي بڼو ډیر مهم لامل د هغوی د ----- په ټاکلو کې دي
الف - کیمیايي خواص، ب - فزیکي خواص، ج - الف او ب دواړه د - هیڅ یو
- 6 - په څلورمخیز جوړښت کې الکتروني جوړې یوه له بلې سره ----- زوايه لري .
الف - 120° ب - 109.5° ج - 309.5° د - 180°



عبارت دی له!


الف - $\text{C}_4\text{H}_{14}\text{O}$ ، ب - $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ ، ج - $\text{C}_3\text{H}_5\text{O}$ ، د - هیڅ یو هم نه

8 - $\text{H}:\ddot{\text{N}}:\text{H}$ د مالیکول د بڼې جوړښت دلاندې کوم عالم په نوم یادېږي؟
 $\ddot{\text{H}}$

- الف - اوگدرو، ب - واندرواليس، ج - ماکسويل، د - ليويس.
- 9 - هغه مرکبونه چې د عين ماليکولي فورمول لرونکي وي؛ خو د هغوی جوړښتيز فورمولونه. يې يو له بل څخه توپير ولري، يو له بل ويل کېږي.
- الف - ايزومير، ب - (Isomer)، ج - الف او ب دواړه، د - هيڅ يو.
- 10 - د مرکبونو ايزوميري د----- فزيکي خواصو لرونکي دي .
- الف - يوشان، ب - مساوي، ج - مختلف، د - کيميايي.

تشرېحي پوښتنې

- 1- د ساده او ماليکولي فورمولونو ترمنځ توپير څه دی؟ هغه د بيلگې په واسطه روښانه کړئ.
- 2 - په 0.3 کميت کې دېو عضوي مرکب 0.12 کاربن او 0.02 هايډروجن شتون لري، د دغه مرکب تجربې فورمول ترلاسه کړئ (دکاربن اتومي کتله 12، د هايډروجن 1 او اکسيجن 16 ده.
- 3 - د يو مرکب ساده فورمول (CH_2O) دې، د نوموړي مرکب ماليکولي کتله $180g/mol$ ده. د هغه ماليکولي فورمول وليکئ.
- 4 - د عضوي مرکب ماليکولي کتله $180g/mol$ ده، د نوموړي مرکب په ترکيب کې 55% کاربن 36% اکسيجن او 9% هايډروجن شامل دي، د هغه ماليکولي فورمول لاسته راوړئ.
- 5 - د يو عضوي مرکب په ترکيب کې يوازې کاربن او هايډروجن شتون لري چې 1.5g هايډروجن او 9g کاربن د هغه له تجزيې څخه لاس ته راغلي دي ،د هغه ماليکولي کتله $210g/mol$ ده، ماليکولي فورمول يې لاسته راوړئ.
- 6 - د لاندې مرکبونو جوړښتيز او سکليتي فورمولونه وليکئ:
- الف - 1,1- di chloro-1-butene، ب - 1,2 - dibromoethene، ج - 3- hexene
- 7 - هغه مرکب چې د C_6H_{14} ماليکولي فورمول لرونکی دی، څو ايزومرونه لري ؟ دهغه د ټولو ايزوميرو جوړښتيز فورمولونه وليکئ.
- 8 - هندسي ايزوميري څه رنگه ايزوميري ده ؟ په دې هکله معلومات ورکړئ.
- 9 - د C_4H_8O د مرکب ټول ممکنه ايزوميري د هغوی د جوړښت او سکليتي فورمولونو سره وليکئ.



درېم څپرکی

د عضوي مرکبونو ډل بندۍ



عضوي مرکبونو د بیولوژي، طب او اوسني صنعت بنسټ جوړ کړی دی. د ژوندېو موجوداتو د جوړښت بنسټیزه اجزاوې له اوبو سربېره عضوي مرکبونه دي، دا چې عضوي مرکبونه د کاربن عنصر له مرکبونو او د هغوی له مشتقاتو څخه عبارت دي، نو ویلای شو چې مونږ د کاربن د عنصر په مرکبونو کې ژوند کوو. ولې عضوي مرکبونه په ټولګیو وېشل شوي دي؟ آیا د هر مرکب د خواصو زده کړه په ځانګړې توګه ساده کار دی؟ د هومولوګ سلسله څه شی ده؟ وظیفوي ګروپونه کوم دی؟ او د مرکبونو په خواصو څه تاثیر لري؟ څرنگه چې عضوي مرکبونه په زیاته اندازه په طبیعت کې شته دي، د هغوی د هر یو مطالعه په ځانګړې توګه ستونزمن کار دی؛ نو له دې کبله عضوي مرکبونه په بېلابېلو ټولګیو وېشل شوي دي چې د عضوي مرکبونو ډل بندۍ لاندې مطالعه کوو.

۱- ۳: عمومي معلومات

عضوي مرکبونه چې د هغوی شمېر له شل میلیونو څخه زیات دی، د کاربنی زنځیري جوړښت (د کاربنی سکلیټ) او یا وظیفه یي گروپونو د شتون پر بنسټ ډلبندي کېږي، د کاربن د اتومونو د اړیکو ډول یو له بل سره هم د عضوي مرکبونو په ډل بندۍ کې بنسټیز رول لري.

د کاربنی سکلیټ د جوړښت په پام کې نیولو سره، عضوي مرکبونه په دوو ډلو وېشل شوي دي چې د زنځیري اسکلیک (*Acyclic*) او کرپز (*Cyclic*) مرکبونه دي. زنځیري مرکبونه له هغو ډولو مرکبونو څخه دي چې واز زنځیر لري او د هغوی بنسټ د الیفاتیک هایډروکاربنونو جوړښت جوړ کړی دی.

1 - هایډروکاربنونه: د دې مرکبونو مالیکولونه یوازې د کاربن او هایډروجن له اتومونو څخه جوړ شوي دي، دا مرکبونه کیدای شي مشوع؛ لکه: الکانونه (دوه دوه گوتې رابطې لرونکي) (*Alkanes*) او یا غیر مشوع د دوه گونې (*Alkenes*) او درې گونې (*Alkynes*) اړیکې او الکاناینونه دوه دوه گونې رابطې (*Alka di enes*) وي.

2 - کرۍ یز (حلقوي) مرکبونه (*Cyclo alkanes*): دا مرکبونه په خپلو مالیکولونو کې تړلی زنځیري جوړښت لري او د کرۍ په بڼه دي چې د کرۍ د جوړونکو اتومونو د ډولونو په پام کې نیولو سره په کاربوسکلیک (*Carbocyclic*) او هیتروسکلیک (*Hetrocyclic*) وېشل شوي دي.

3 - کاربوسکلیک (*Carbocyclic*): په دې ډول مرکبونو کې کرۍ یوازې د کاربن له اتومونو څخه جوړه شوې ده او د هغوی د کیمیايي خواصو له توپیر په پام کې نیولو سره په دوو ډلو وېشل شوي دي چې د الیسکلیک (*Alicyclhc*) او اروماتیک (*Aromatic*) مرکبونه دي.

د اروماتیکو مرکبونو بنسټ د بنزین مرکبونو جوړ کړی دی او عبارت له: بنزین، نفتالین، انتراسین او د هغوی مشتقات دي.

د الیسکلیکونو مرکبونه د سایکلو الکانونو (*Cyclo alkanes*) او سایکلو الکینونو (*Cyclo alkenes*) په مرکبونو وېشل شوي دي.


د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی مرکب سایکلو پروپان دی او د دوی عمومي فورمول (C_nH_{2n}) دی چې له الکینونو سره ایزومیر دي. داسې سکلیکونه هم شتون لري چې په هغوی کې د کاربن د اتومونو شمېر له دیرشو اتومونو څخه هم زیات دی.

اروماتیک هایډروکاربنونه (*Arenes*)

دا هایډروکاربنونه په خپل ترکیب کې د بنزین کرۍ (اسکلیټ) لري، بنزین نفتالین، انتراسین او فینانترین د دې مرکبونو له ډلې څخه دي چې د بنزین د څوکړیو له تراکم څخه لاس ته راغلي دي.


هتروسکلیک (*Hetro cyclic*)

دا مرکبونه د کاربن د اتومونو سربیره، په خپله کرۍ کې د نورو عناصرو یو یا څو اتومونه لري چې په ځانگړې توگه دا عناصرونه له: اکسیجن، نایتروجن، سلفر او نورو څخه عبارت دي. هتروسکلیک مرکبونه کیدای شي.



مشبوع، غیرمشبوع او یا اروماتیک وي .

ټول عضوي مرکبونه کیدای شي چې د پورتنیو هایدروکاربونونو مشتقات ومنل شي؛ ځکه دا عضوي مشتقات د هایدروکاربونونو دېو او یا دڅو هایدروجنو د اتومونو له ځای پر ځای کیدو څخه د وظیفه یي گروپونو په واسطه لاس ته راځي . لاندې شکل په لنډه توگه د عضوي مرکبونو ټولگي ښيي:



۳-۲: د هایدروکاربونونو د ډلو وېشل

هایدروکاربنونه هغه مرکبونه دي چې د کاربن او دهایدرجن د اتومونو د ترکیب له امله جوړشوي دي، په هایدروکاربونونو کې د کاربن هر اتوم څلور اشتراکي اړیکې لري چې دا اړیکې د کاربن د نورو اتومونو او د نورو عنصرونو له اتومونو سره تړلې شوي دي. د هایدروکاربونونو ډلبندي په لومړي سر کې د شپږ کاربنه کړۍ دشتون او نه دشتون پر بنسټ یعنې د بنزین پر بنسټ ترسره کېږي او دا کړۍ د وظیفه یي گروپ په توگه شمېرل کېږي . د بنزین کړۍ لرونکي هایدروکاربونونه د اروماتونو د مرکبونو په نوم یادېږي او هغه هایدروکاربونونه چې په ترکیب کې یې د بنزین کړۍ نه وي، د الیفاتیکو (تیل جوړونکو) په نوم یادېږي . الیفاتیکو هایدروکاربونونه د کاربن- کاربن د اتومونو د اړیکو له ډولونو په پام کې نیولو سره په مشبوع او غیر مشبوع وېشل شوي دي، د مشبوع الیفاتیکونو په الکانونو (Alkanes) او سایکلو الکانونو ویشل شوي دي، غیرمشبوع الیفاتیک مرکبونه په الکینونو (Alkenes) او الکاینونو (Alkynes) وېشل شوي دي.

الکانونه هغه مرکبونه دي چې د کاربن د اتومونو ټول ولانسونه يې د هايډروجن د اتومونو په واسطه مشبوع شوي دي او په هغوی کې د کاربن اتومونه يوه گونې اړیکې لري او الکینونه هغه مرکبونه دي چې د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ يې دوه گونې اړیکه شتون لري او غير مشبوع دي. نور غير مشبوع هايډروکاربنونه، الکاینونه دي چې په دې مرکبونو کې د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ درې گونې اړیکه شتون لري او د الکانونو په پرتله د هايډروجن څلور اتومونه او د الکینونو په پرتله د هايډروجن دوه اتومه لږ لري.

فعالیت



زده کوونکي دې، په ډلو وویشل شي، هر ډله دې د عضوي مرکبونو زیات شمېر لست کړي او هغوی دې د پوهنیزو دلیلونو د وړاندې کولو پربنسټ ډلبندي کړي او د مرکبونو په ډلبندي کې دې د پورتنی شکل څخه گټه واخلي.

3-3: په هايډروکاربنونو کې وظیفه يي گروپونه

د هايډروکاربنونو په بېلابېلو ډلو کې وظیفه يي گروپونه شتون لري چې د هايډروکاربنونو بېلابېل مرکبونه يې جوړ کړي دي، دا گروپونه د کاربن - کاربن داتومونو د اړیکو د څرنګوالي او وظیفه يي گروپ له امله منځته راغلي دي چې په لاندې جدول کې لیکل شوي دي:

(1-3) جدول: د هايډروکاربنونو وظیفه يي گروپونه

د هايډروکاربنونو گروپونه			
Alkanes	$CH_3 - CH_3$	ایتان	—
Alkenes	$CH_2 = CH_2$	ایتلین یا ایتیلین	د نوکلیوفیلک پاتې شونی
Alkynes	$CH \equiv CH$	ایتاین یا استیلین	د نوکلیوفیلک پاتې شونی
Alkadienes	$CH_2 = CHCH = CH_2$	1،3 - بیوتاداین	د نوکلیوفیلک پاتې شونی
Arenes		بنزین	داروماتیکوالکترولفیلک بې ځایه کونه

4-3: د الکانونو هومولوګي سلسله

هغه مرکبونه چې د یو میتلیني گروپ ($-CH_2-$) په کچه یو له بل څخه توپیر ولري، یو له بل د هومولوګ (Homologe) په نوم یادېږي، هومولوګي سلسله په الکانونو، الکینونو او الکاینونو کې شته ده؛ څرنګه چې د الکانونو په مالیکولي فورمولونو کې لیدل کېږي، د ایتان مرکب د خپل مخکني مرکب یعنې د میتان څخه د یو ($-CH_2-$) په کچه توپیر لري، په همدې ترتیب پروپان د ایتان څخه او بیوتان د پروپان په څخه د یو میتلیني

(-CH₂-) گروپ په کچه لوی دي . دا سلسله د هومولوگ سلسلې (Homologe) په نوم یا دوي .
3- جدول : د الکانونو د هومولوگي سلسله

د مرکب نوم	د مرکب فورمول
Methane	CH ₄
Ethane	CH ₃ -CH ₃
Propane	CH ₃ -CH ₂ -CH ₃
Butane	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃
Pentane	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃
Hexane	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃
Heptane	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃
Octane	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃
Nonane	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃
Decane	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃
Undecane	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃
Dodecane	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃
Tridecane	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃

د هومولوگ د اصطلاح سربېره، د ایزولوگ اصطلاح هم په عضوي کیمیا کې په کار وړل کېږي، د دې اصطلاح مفهوم څرگندوي: هغه عضوي هایدروکاربنونه، مرکبونه چې د کاربن عین شمېر اتومونه ولري، یو له بل ایزولوگ په نوم یادوي.

فعالیت



زده کوونکي دې په څو اړونده ډلو وویشل شي، ترڅو هره ډله په ځانگړي ډول په هایدروکاربنونو کې د هومولوگ د اصطلاح په اړه خبرې اترې وکړي، له ایتان څخه تر هگزان پورې دې جوړښتیز فورمولونه ولیکي او هومولوگي بڼې (شکلونه) دې د نوموړو مرکبونو په فورمولونو کې روښانه کړي او د هرې ډلې استازی دې د ډلې کړنه وړاندې کړي.

3-5 : عضوي مرکبونه او وظیفه یي گروپونه (د هایدروکاربنونو مشتقات)

عضوي کیمیا د هایدروکاربنونو او د هغوی له مشتقاتو له کیمیا څخه عبارت ده.

که چیرې د هایدروکاربنونو د هایدروجن یو یا څو اتومه دځانگړو گروپونو (Functional groups) په واسطه بې ځایه شي، هغه عضوي مرکبونه لاسته راځي چې د هایدروکاربنونو د مشتقاتو په نوم یا دېرې وظیفه یي گروپونه (Functional groups) د هایدروکاربنونو په مالیکولونو کې د اتومونو او یا د اتومونو له گروپونو څخه

عبارت دي چې ځانگړې او ټاکلی جوړښت لري او د عضوي مرکبونو د ځانگړو فزیکي او کیمیايي خواصو دښودل لامل گرځي. هغه هایډروکاربنونه چې عین وظیفه یې گروپونه لري، کیمیايي خواص یې هم یوشان دي. 3-3 جدول: وظیفه یې گروپونه.

د مرکبونو نومونه	مرکبونه	د مرکبونو عمومي فورمول	د وظیفه یې گروپ نومونه	وظیفه یې گروپ
Methyl Iodide	$CH_3 - I$	$R - X$	هالایډها (Halyds)	$(-F - Cl - Br - I)$
Ethanol	$CH_3 - CH_2 - OH$	$R - OH$	Hydroxyl	$-OH$
Propanal	$CH_3 - CH_2 - \overset{O}{\parallel} C - H$	$R - \overset{O}{\parallel} C - H$	Carbonyl	$\overset{O}{\parallel} C -$
Propanon	$CH_3 - \overset{O}{\parallel} C - CH_3$	$R - \overset{O}{\parallel} C - R$		
Acetic acid	$CH_3 - COOH$	$R - COOH$	Carboxyl	$-COOH$
Di methyl ether	$CH_3 - O - CH_3$ Eteres	$R - O - R$	Oxy	$-O-$
Di methyl ester	$H_3 - \overset{O}{\parallel} C - O - CH_3$	$R - \overset{O}{\parallel} C - O - R$	Ester Group	$\overset{O}{\parallel} C - O -$
Methyl amin	$CH_3 - NH_2$	$R - NH_2$	Amines Groups	$-NH_2$
Methyl amide	$CH_3 - \overset{O}{\parallel} C - NH_2$	$R - \overset{O}{\parallel} C - NH_2$	Amides Group	$\overset{O}{\parallel} C - NH_2$
Ethyl Marcaptane	$CH_3 - CH_2 - S - H$	$R - S - H$	Marcaptan Group	$-S - H$
Di methyl thio ether	$CH_3 - S - CH_3$	$R - S - R$	Thioether	$-S -$
Benz Sulphonic acid	$C_6H_5 - SO_3H$	$R - SO_3H$	Sulpho Group	$-SO_3H$

هترو اتومونه د پولونوله کبله چې د وظیفه یې گروپونو په ترکیب کې شتون لري، دا گروپونه په لاندې ډول ویشل شوي دي.

۳-۵-۱ اکسیجن لرونکي وظیفه یې گروپونه: د دې گروپونو په ترکیب کې اکسیجن د هترو اتوم په توګه شتون لري چې د

هغوی بیلګه کیدای شي $\overset{O}{\parallel} C - O -$, $-O -$, $\overset{O}{\parallel} C - OH$ او نور وړاندې شي.


۳-۵-۲ نایټروجن لرونکي وظیفه یې گروپونه: د دې گروپونو په ترکیب کې د نایټروجن اتوم د هترو اتومونو په توګه

شتون لري چې د هغوی بیلګه کیدای شي $\overset{O}{\parallel} C - NH_2$, $-NH_2$, $-NO_2$ او نور وړاندې شي.

۳-۵-۳ سلفر لرونکي وظیفه یې گروپونه: د دې گروپونو په ترکیب کې د سلفر اتوم د هترو اتوم په توګه شته چې د هغوی


بیلګه کیدای شي $-SO_3H$, $-S -$, $-S - H$ او نور وویل شي.

۳-۵-۴ فاسفور لرونکي وظیفه یې گروپونه: د دې گروپونو په ترکیب کې د فاسفور اتوم د هترو اتوم په توګه شتون لري



چې د هغوی بیلګه کیدای شي PH_2 ، H_2PO_3 - او نور وړاندې شي. د عضوي مرکبونو په مالیکولونو کې کیدای شي چې څو وظیفه یې ګروپونه هم شتون ولري، که چیرې دا ګروپونه یوشان وي. د بیلګې په ډول: د هلوجن دوه ګروپه، او یا د هایډروکسیل دوه ګروپه او نور. دا مرکبونه د څو وظیفه یې ګروپونو (Poly Functional Groups) په نوم یادېږي. هغه عضوي مرکبونه چې د هغوی په مالیکول کې څو بېلابېل وظیفه یې ګروپونه شتون ولري، د بېلابېلو ګروپونو لرونکو (Hetro Functional Groups) مرکبونو په نوم یا دېږي.

لاندې د مونو، پولي او هترو وظیفه یې ګروپونو لرونکو مرکبونو بیلګې ورکړل شوې دي:





3-6: له وظیفه یې ګروپونو سره عضوي مرکبونه

3-6-1: د ځینو وظیفه یې ګروپونو ځانګړتیاوې

1- د هالایدونو ګروپ: که چیرې د هلوجنونو د عنصرونو د مالیکولونو د اټومونو اړیکه په هومولیتیکي ډول پرې شي، د هغوی رادیکالونه جوړېږي چې د وظیفه یې ګروپونو په بڼه د هایډروکاربنونو د هایډروجن د اټومونو ځای نیسي، د بیلګې په



د هالایدونو وظیفه یې ګروپونه د طاقه الکترون لرونکي دي او فعاله دي؛ نو له دې کبله په آسانی سره تعامل کوي او د هایډروکاربنونو هلوجني مشتقات جوړېږي:




(۳-۱) شکل: د بروموکلورومتان بڼه

هغه ذرې چې طاقه الکترونونه لري، د رادیکالونو (Radical) په نوم یادېږي

2- د هایدروکسیل وظیفه یي گروپ

د هایدروکسیل گروپ له یو اتوم هایدروجن او یو اتوم اکسیجن څخه جوړ شوی دی چې په هغه کې د اکسیجن اتوم یو طاغه الکترون لري، د جوړښت فورمول یې په لاندې ډول دی:



(2-3) شکل د هایدروکسیل د گروپ مودل

هغه عضوي مرکبونه چې د هایدروکسیل گروپ لري، د الکولونو *Alcoholes* په نوم یادېږي، د الکولونو عمومي فورمول $R-O-H$ دی چې په دې فورمول کې $(R -)$ د هایدروکاربنونو رادیکالونه نښي، د کاربن اتوم چې هغه سره د الکولو د هایدروکسیل گروپ ($-OH$) نښتی دی، د دې گروپ سره یو ځلی د کاربنول گروپ ($\text{Carbinol} - \overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{C}}} -$)


په نوم یادېږي.

د کاربنول گروپ د کاربن د اتومونو د اړیکو له کبله، الکولونه د لومړني، دویمي او دریمي الکولو په نوم یادېږي. که چیرې د کاربنول گروپ د کاربن اتوم خپل یو ولانسي الکترون د کاربن له بل اتوم سره د اړیکې د جوړېدو په موخه په لگښت رسولی وي، دا ډول الکول د لومړي الکول په نوم یادېږي. همدارنگه که دوه ولانسي الکترونونه یې په کار وړي وي، دویمي الکول او که درې ولانسي الکترونونه یې د اړیکو د جوړښت لپاره کارولي وي، د دریمي الکول په نامه یادېږي.

فعالیت




لاندې فورمولونو ته ځیر شئ، د لومړني، دویمي او دریمي الکولونو ډولونه په کې وپېژنئ او همدارنگه روښانه یې کړئ چې څلورمي الکول او له هغه څخه په لوړه کچه الکول هم شتون لري او کنه؟



3- د الدهایدونو او کیتونونو وظیفه یي گروپونه (کاربونیل)

د کاربونیل گروپ د یو اتوم کاربن او یو اتوم اکسیجن څخه جوړ شوی دی چې د کاربن او اکسیجن د اتومونو ترمنځ دوه گونې اړیکه شتون لري. د کاربونیل په گروپ کې د کاربن - اکسیجن ترمنځ اړیکه دوه گونې ده چې د هغوی یوه اړیکه سگما (σ) او بله یې پای (π) ده، د دې اړیکو ترمنځ زاویه 120° ده، د دوه گونې اړیکې اوږدوالی 122 pm دی، کاربن

د کاربونیل په گروپ کې sp^2 هایبرید لري او د هغه جوړښت مسطح دی چې لاندې شکلونه دا جوړښت راښيي:




شکل: (2 - 3) د کاربونیل د گروپ جوړښت او فورمول يې

د $C=O$ دوه گونې اړیکه د $C=C$ دوه گونې اړیکې پر خلاف، د اکسیجن د الکترونیگاتیف عنصر د شتون پر بنسټ چې د π اړیکې الکتروني کثافت ځانته کشوي، زیاته قطبي ده، دې قطبيت د کاربونیل مرکبونو (الديهایدونه او کیتونونه) په کیمیايي او فزیکي خواصو اغیزه اچولې ده چې ډېر زیات الديهایدونه او کیتونونه په اوبو کې خورا ښه حل کېږي.


4 - د کاربوکسیل وظیفه یي گروپ (Carboxylic Group) او د هغه مرکبونه

د کاربوکسیلیک تیزابونو گروپ د کاربوکسیل په نوم یا ډیري چې دهغه فورمول $COOH$ - او جوړښتیز فورمول يې په لاندې ډول دی:



شکل: (3 - 3) د کاربوکسیل گروپ لرونکي اسید د مالیکول مودل

د کاربوکسیل گروپ یو له کاربونیل گروپ او له یو هایډروکسیل گروپ څخه جوړ شوی دی چې ډېر په $COOH$ - بڼه لیکل کېږي؛ خو د $O-O$ ترمنځ اړیکه هیڅ کله شتون نه لري. دا گروپ کیدای شي چې پروتون ورکونکي (Proton - Donator) په توګه عمل وکړي او د کاربوکسلات (COO^-) په آیون بدل شي، په دې آیون کې د اکسیجن دواړه اتومونه ورته ارزښت لري؛ ځکه په هغه کې د (π) الکترونونه د ریزونانس په حالت کې دي:



هغه ټول مرکبونه چې په خپل مالیکولي ترکیب کې د کاربوکسیل گروپ ولري، د کاربوکسیلیک اسید په نوم یا ډیري.

د کاربوکسیلیک اسیدونو د اړیکو ځانګړتیاوې چې لاندې لیکل کېږي، د اکسیجن، هایډروجن او کاربن د اتومونو


شتون د بیلا بیلو الکترونیکا تیویتو سره، د هغوی مالیکولونه قطبي کوي .

(3 - 4) جدول: دتیزابونو فزیکي ځانگړتیا وي:


د ایشیدوټکی	د ویلې کیدوټکی	Pka_1	Pka_2	مروج نوم	فورمول
$101^\circ C$	$8^\circ C$	3.75		فارمیک اسید د مېري تېزاب	$H - COOH$
$118^\circ C$	$17^\circ C$	4.75		اسیتیک اسید، د سرکې تېزاب	$CH_3 - COOH$
$189^\circ C$	$63^\circ C$	2.87		کلورواسیتیک اسید	$CH_2 - Cl - COOH$
$141^\circ C$	$-2^\circ C$	4.87		پروپانویک اسید	$CH_3 - CH_2 - COOH$
$249^\circ C$	$122^\circ C$	4.20		بنزوئیک اسید	$C_6H_5 - COOH$
	تخریب $190^\circ C(d)$	1.23	4.28	اکزالیک اسید	$HOOC - COOH$
	تخریب $136^\circ C(d)$	2.83	5.69	مالونیک اسید	$HOOC - CH_2 - COOH$

5 - د ایتروگروپ (-O-)

هغه مرکبونه چې په هغوی کې د اکسیجن اټوم د هایدروکاربنونو د دوو پاتې شونو سره نښتی وي، د ایترو په نوم یا دېري او د دې گروپ جوړښت (-O-) دی، د ایترونو عمومي فورمول په لاندې ډول دی:




که فرض کړو چې الکولونه د اوبو له مالیکول څخه ترلاسه شوي دي، داسې چې د اوبو د مالیکول یو اټوم هایدروجن د عضوي پاتې شونو سره تعویض شوی وي، الکول لاس ته راځي او که د هایدروجن بل اټوم یې هم تعویض شي، ایترو ترلاسه کېږي، د بیلگې په ډول:



اوبه

ایتانول

ډای ایتایل ایترو







(3 - 4) شکل: د ډای ایتایل ایترو مالیکول مودل


6 - د امینونو وظیفه یي گروپ (-NH₂)

د امین گروپ (-NH₂) د هایدروجن دوو اټومونو او د نایټروجن له یو اټوم څخه جوړ شوی دی چې په رښتیا سره د امونیا د مالیکول یو اټوم هایدروجن له هغه څخه په هومولیتیکي بڼه بیل اوبه پایله کې داگروپ لاسته راغلی دی. که چیرې د دې گروپ اړیکه د هایدروکاربنونو له راډیکالونو سره جوړه شي، د امینونو مرکبونه جوړېږي. د امینونو

عمومي فورمولونه په لاندې ډول دي



په ټولو حالتونو کې د امینونو مالیکول د مثلثي قاعدې سره هر می جوړښت لرونکی دی او د نه اړیکې یوه جوړه الکترون د نایټروجن له sp^3 هایبرید اوربیتال څخه دي او د هغود زاویو سره توپیر لري، زیاتره امینونه په طبیعي موادو او یا په ترکیبي محصولاتو کې موندل شوي دي او د هغوی ډېر مرکبونه بد بوی لري، د عضوي موادو د پروتینونو په ترکیب کې نایټروجن شته دی او امینونه هم د ژونديو موادو له تجزیې او خرابېدلو څخه وروسته له سلفر لرونکو مرکبونو سره بد بوی منځ ته راوړي، د دوو ډولو مرکبونو د ډای امین نوم $\{\text{NH}_2(\text{CH}_2)_4\text{NH}_2\}$ 1.4diamino butane پپوترسین (Putrescine) د تعفن (بدبوی) په معنا 1.5 penta diamine او $\text{NH}_2(\text{CH}_2)_5\text{NH}_2$ کداویرین (Cadaverine) د جسد بدبوی په معنا د مرو جسدونو له تعفن څخه اخیستل شوی دی.



شکل: (3 - 5) د امینونو جوړښت او موډل،

b - میتایل امین

a - امونيا

d - ترای میتایل امین

c - ډای میتایل امین

فعالیت




زده کونکي دې په ډلو وویشل شي، هر ډله دې د کاغذ خمیره، سربیس او د اړتیا نور مواد برابر کړي او له دې موادو څخه دې د ایټرو، الیدهایدونو، کپټونونو او امینونو موډلونه جوړ کړي او د هغوی په هکله دې د هرې ډلې استازې دي په ټولګي کې څرګندونه وکړي.

7 - د ټیول ګروپ، سلفایډونه

د ټیول ګروپ (S-H) له یو اتوم سلفر او یو اتوم هایډروجن څخه جوړ شوی دی چې د هایډروکاربونونو سلفر لرونکي مشتقات جوړوي، د هایډروجن سلفایډ (H-S-H) د یو اتوم هایډروجن د اړیکې د پرې کیدو په پایله

کې ترلاسه کېږي، دا پرې کېدل د هوموليتيکي په بڼه ترسره کېږي، د دې مرکبونو عمومي فورمول $R-S-H$ دی چې الکولو ته ورته دی. که چیرې د تیول د ګروپ دویم هایدروجن هم په عضوي پاتې شونې په واسطه تعویض شي، سلفایډونه جوړېږي چې دهغوی عمومي فورمول $R-S-R$ دی، دا مرکبونه ایترونو ته ورته دي او توپیر یې د ایترونو سره دادی چې په ایتروکې اکسیجنی وظیفه یې ګروپ شته، خو په تیو ایترونو کې سلفر شتون لري، دا وظیفه یې ګروپ د مرکپتو ګروپ (*Mercapto Group*) په نوم هم یا دېږي. د تیول او تیوايتر د مرکبونو ساده بیلګې لاندې لیکل شوي دي:



8 - د ایترونو وظیفه یې ګروپ

د ایترونو وظیفه یې ګروپ $-C(=O)-O-$ دی چې د دې ګروپ د اکسیجن د اټوم یو ازاد ولانسي الکترون د یو عضوي رادیکال د یو ازاد الکترون او د کاربن د اټوم یو طاقه الکترون د یو بل د عضوي رادیکالونو د کاربن د اټومونو سره اړیکه تړلې ده او د ایترونو په نوم مرکبونه یې جوړکړي دي. په رښتیا که چیرې د کاربوکسیل ګروپ د هایدروجن اټوم د عضوي پاتې شوو سره تعویض شي، ایترونه جوړېږي. د ایترونو عمومي فورمول له $R-C(=O)-O-R$ یا $R-C(=O)-O-R$ څخه عبارت دی.



شکل: (3 - 7) د میتایل ایتایل ایستر د مالیکول مودل

فعالیت



زده کوونکي په ډلو وویشئ، هرې ډله د دې د ایترونو د مالیکولونو مودلونه د لرګیو، د رس خاورې د خټو او یا له کاغذ څخه جوړکړي د ډلې استازی دې د خپل ګروپ د کړنې په هکله اړونده څرګندونې وړاندې کړي.



د دریم څپرکي لنډیز

* عضوي مرکبونه د کاربن او هایډروجن د مرکبونو او د هایډروکاربنونو له مشتقاتو څخه عبارت دي.
 * په عمومي ډول عضوي مرکبونه د کاربنی سکلیټ او د وظیفه یي گروپونو د شتون له امله وېشل شوي دي.

* په عمومي ډول هایډروکاربنونه په دوو ډلو ایسکلیک او کاربوسکلیک وېشل شوي دي.
 * ایسکلیکونه زنځیري مرکبونه دي چې دهغوی زنځیر کیدای شي نارمل او یا ښاخ لرونکی وي.
 * سکلیکونه په دوه گروپونو کاربو سکلیک او هتروسکلیک وېشل شوي دي.
 * کاربوسکلیک مرکبونه هغه مرکبونه دي چې د تړلي زنځیر (کړۍ) لرونکي دي او په ایسکلیکونو او اروماتونو وېشل شوي دي، ایسکلیکونه هم په خپل وار په سایکلو الکانونو او سایکلو الکینونو وېشل شوي دي، د هایډروکاربنونو هومولوگونه زیات د هایډروکاربنونو له مرکبونو څخه عبارت دي چې یو له بل څخه د یو میتلین $(-CH_2-)$ گروپ په کچه توپیر لري.

* که چیرې د هایډروکاربنونو د هایډروجن یو اویا څو اټومونه د وظیفه یي گروپونو په واسطه بې ځایه شي، نو هغه مرکبونه لاسته راځي چې د هایډروکاربنونو د مشتقاتو په نوم یا ډیري او له هلو جني، اکسیجني، نایتروجني، سلفري، فاسفوري او له نورو عنصرونو مشتقاتو څخه عبارت دي. دا عنصرونه د وظیفه یي گروپونو په بڼه د هایډروکاربنونو په مرکبونو کې شتون لري چې د نوموړو مرکبونو کیمیايي خواص ټاکي.


* وظیفه یي گروپونه د هلو جني لرونکي، اکسیجن لرونکي، نایتروجن لرونکي، سلفر لرونکي او په داسې نورو وېشل شوي دي.

* هغه مرکبونه چې اکسیجني وظیفه یي گروپونه لري، د الکولونو، الډهایډونو، تیزابونو، ایترونو،

ایسترونو او نورو څخه عبارت دي چې په وار سره یي فورمولونه $R-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-H$ ، $R-OH$ ،



* هغه مرکبونه چې نایتروجن لرونکي وظیفه یي گروپ لري، امینونونه، امایډونه او نور دي چې د



* هغه مرکبونه چې د سلفر لرونکي وظیفه یي گروپونه لري، له $R-S-R$ ، $R-S-H$ او نور و څخه عبارت دي.

د دریم څپرکي پوښتني

څلور ځوابه پوښتني:

- 1 - د عضوي مرکبونو په ترکیب کې د لاندې عناصرونو له جوړو څخه د کومو شتون حتمي دي ؟
 الف - کاربن او سلفر ب - سلفر او هایدروجن
 ج - کاربن او فاسفورس د - کاربن او هایدروجن
 2 - هغه هایدروکاربنونه چې د یو میتیلین ګروپ ($-CH_2-$) په کچه یو له بل څخه توپیر ولري د ---- په نوم یادېږي.

الف - ایزولوګ، ب - ایزومیر، ج - هومولوګ، د - غیر مشبوع.

- 3 - له لاندې فورمولونو څخه کوم یو د ایترونو عمومي فورمول دی ؟

الف - $R-O-R$ ب - $R-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-H$ ج - $R-S-H$ د - الف او ج دواړه

- 4 - د تیولونو عمومي فورمول له : ----- څخه عبارت دی .

الف - $R-OH$ ، ب - $R-NH_2$ ، ج - $R-S-H$ ، د - $R-S-R$.

- 5 - په تیزابي مرکبونو کې وظیفه یي ګروپ له ----- څخه عبارت دی .

الف - $R-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-H$ ب - $R-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-O-H$ ج - $R-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-O-R$ د - $R-C-H$

- 6 - ساده مرکبونه چې د کاربن سربیره، هایدروجن هم دهغو په ترکیب کې شتون ولري د ---- په نوم یا دېږي

الف - الکان ب - الکین ج - هایدروکاربنونه د - الکانونو مشتقات

- 7 - د الکیل هلایدونو عمومي فورمول له ----- څخه عبارت دی .

الف - $R-OH$ ب - $R-X$ ج - $R-S-H$ د - $R-S-R$

- 8 - وظیفه یي ګروپونه له اتوم او یا د اتومونو له ډلو څخه عبارت دي چې د اړیکو په واسطه یوځای او د ټاکلي مرکب په یو مالیکول کې شامل دي او ---- ټاکي

الف - د مرکب ډول ب - مالیکولي ترکیب ج - د مرکب مشتقات د - الف او ج دواړه.


- 9 - $R-OH$ د ----- عمومي فورمول دی:

الف - تېزاب ب - القلی ج - الکول د - الډهايد

- 10 - هایدروکاربنونه په عمومي ډول په ----- ډلو وېشل شوي دي:
- الف - دوو ب- دریو ج - څلورو د - پنځو
- 11 - هتروسکلیکونه هغه مرکبونه دي چې د هغوی په ترکیب کې بیګانه عنصرونه؛ لکه: ---- شتون لري:
- الف - سلفر، اکسیجن ب- نایترجن اونور ج - الف او ب دواړه د - هیڅ یو
- 12 - تيو ايترونه الکولونو ته ورته دي؛ خو د هغو توپیر له ايترونو څخه په دې کې دی چې په ايترونو کې د اکسیجن وظیفه یې ګروپ شامل دی؛ خو په تيو ايترونو کې ---- شتون لري.
- الف - نایترجن ب- فاسفورس ج - سلفر د - نایترجن
- 13 - د کیتونونو وظیفه یې ګروپ له ---- څخه عبارت دی .
- الف - کاربونیل ب- کاربوکسیل ج - هایدروکسیل د - هیڅ یو
- 14 - هغه هایدروکاربنونه چې د ترلې زنځیر لرونکي دي، د '----' په نوم یا ډیري:
- الف - سکلیکونو ب- الیسکلیکونو ج - اروماتونو د - ټول

تشریحي پوښتنې:


- 1 - د هایدروکاربنونو د هومولوګ د سلسلې په اړه لنډ معلومات ورکړئ.
- 2 - وظیفه یې ګروپونه په لنډ ډول توضیح کړئ.
- 3 - لاندې عمومي فورمولونه وګورئ او ولیکئ چې په کومو عضوي مرکبونو پورې اړه لري.



- 4 - د کاربونیل وظیفه یې ګروپ په لنډ ډول توضیح کړئ.
- 5 - د کاربوکسیل د وظیفه یې ګروپ په اړه لازم معلومات وړاندې کړئ.

څلورم څپرکی

الکانونه اوسایکلو الکانونه




هغه مرکبونه چې په هغو کې د کاربن اټومونه د زنځیر یا کړۍ په بڼه یو له بل سره اړیکې لري او په هغوی کې د کاربن ټول اټومونه د یوگوني سگما اړیکې (σ) لرونکي دي، د الکانونو او یا د سایکلو الکانونو په نامه یاد شوي دي. په دې مرکبونو کې د کاربن اټومونه sp^3 هایبرید لري او د کاربن د اټومونو ترمنځ یوه گونې اړیکه شته، الکانونه د کاربنونو زنځیري مالیکولونو لرونکي او سایکلو الکانونه د تړلو زنځیرونو او کړپو لرونکي دي. په دې څپرکي کې به پوه شئ چې الکانونه او سایکلو الکانونه د کومو ډولونو مرکبونو لرونکي دي؟ د هغوی طبیعي سرچینې کومې دي؟ د کومو ځانگړتیاو لرونکي دي؟ په کومو برخو کې په کار وړل کېږي؟ د الکانونو او سایکلو الکانونو ترمنځ توپیرونه کومو فکتورونو سره اړیکه لري؟ د دې څپرکي په لومړي سر کې الکانونه روښانه کوو او وروسته د سایکلو الکانونو په څیړنو پیل کوو.

1-4 : الکانونه (Alkanes)


الکانونه هغه مرکبونه دي چې د هغوی د کاربن د اتومونو ترمنځ یوه ګونې ساده اړیکه شتون لري او د کاربن د اتومونو نور پاتې ولانسونه د هایډروجن د اتومونو په واسطه ډک شوي دي. دهغو ساده مرکب میتان CH_4 او ایتان (C_2H_6) دی.

د میتان مالیکول د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دي او په هغه کې $C-H$ د کاربن د sp^3 هایبرید اوربیتال او هایډروجن د s اوربیتال د نیغ پر نیغ د ننوتنې په پایله کې جوړېږي او د اړیکې ډول یې مستحکمه سګما (σ) ده.

(1-4) شکل کې زاویه، د اړیکې اوږدوالی او هم د میتان د مالیکول څلور وجهي جوړښت ښودل شوی دی، داسې چې د اړیکې اوږدوالی د پیکامتر pm ($10^{-12} m$) په واسطه ټاکلی شوی دی. په یو مالیکول کې د اړیکو د ښودلو لپاره نړیوال تړون د (2-4) شکل سره سمون لري، داسې چې نري خطونه $C-H$ د هغو اړیکو ښودونکي دي چې په سطحه کې شتون لري، مثلي علامه ($\blacktriangleleft$) د سطحې پرمخ اړیکه او مثلي ($\blacktriangleright$) علامه د سطحې د شا اړیکه ښيي:




شکل: (1-4) د میتان د مالیکول د ښودلو دوه بیلا بیلې طریقې ښيي



شکل: (2-4) د میتان او ایتان په مالیکول کې نړیواله تړون ښيي

د ایتان مالیکول د اړیکو ښودلو لپاره کیدای شي چې د میتیل CH_3 - دوو پاتې شوو اړیکو یو له بل سره په جوړښت کې په پام کې ونیول شي. د میتیل ($-CH_3$) په ګروپ کې د کاربن هر اتوم د sp^3 آزاد هایبرید لري او یو له بل سره د تړون په وخت کې د sp^3 هایبرید اوربیتالونو نیغ پر نیغه ننوتنه تر سترګو کیږي چې د $C-C$ اړیکه جوړوي او په (3-4) شکل کې ښودل شوې ده:



(3-4) شکل: د لرگیو مودلونو په واسطه د ایتان د مالیکول فضايي بنودنه


دالکانونو عمومي فورمول ($C_n H_{2n+2}$) دی چې دهغوی د گروپ لومړنی مرکب میتان اودویم یې ایتان او داسې نور دي چې یو له بل څخه د یو میتلین گروپ $-CH_2-$ په کچه توپیر لري. په (4-1) جدول کې د دې کورنۍ د یو شمېر مرکبونو نومونه، اېشېدوټکي او د دهغوی یو ولانسه رادیکالونه ښودل شوي دي، د یاد ولو وړ ده چې ane وروستاړی چې د $Alkane$ له نوم سره اړیکه لري، د هغه په رادیکال کې په $(Alkyl)yl$ بدلیږي.

(4.1-) جدول: د الکانونو نوم او دهغوی اړوند رادیکالونه

نوم	فورمول	د ایشیدو ټکي	رادیکال	فورمول
Alkane	$C_n H_{2n+2}$		Alkyl	$-C_n H_{2n+1}$
Methane	CH_4	$-161^0 C$	Methyl	$-CH_3$
Ethane	$CH_3 - CH_3$	$-89^0 C$	Ethyl	$C_2 H_5 -$
Propane	$C_3 H_8$	$-40^0 C$	Propyl	$C_3 H_7 -$
Butane	$C_4 H_{10}$	$-0.5^0 C$	Butyl	$C_4 H_9$
Pentane	$C_5 H_{12}$	$36^0 C$	Pentyl	$C_5 H_{11} -$
Hexane	$C_6 H_{14}$	$68^0 C$	Hexyl	$C_6 H_{13} -$
Heptane	$C_7 H_{16}$	$88^0 C$	Heptyl	$C_7 H_{15} -$
Octane	$C_8 H_{18}$	$126^0 C$	Octyl	$C_8 H_{17} -$
Nonane	$C_9 H_{20}$	$151^0 C$	Nonyl	$C_9 H_{19} -$
Decane	$C_{10} H_{22}$	$174^0 C$	Decyl	$C_{10} H_{21} -$


4-1-1: د الکانونو ایزومیري

په الکانونو کې ایزومیري د بیوتان له مرکب څخه پیل کېږي؛ د بیلګې په ډول: بیوتان دوه ایزومیري لري چې د هغوی جوړښتیز فورمولونه په لاندې ډول دي:



n - butane

Iso butane



(4 - 4) شکل: د نارمل بیوتان او ایزو بیوتان د مالیکول دجوړښت موډل

د یادولو وړ ده چې د مرکبونو د ایزومیر یو فزیکي خواص یو له بل څخه توپیر لري؛ د بیلګې په ډول: د نارمل بیوتان د ایشیدو تکی 0.5°C - او کثافت یې 0.106g/cm^3 دی، په داسې حال کې چې د ایزوبیوتان د ایشیدو تکی 11.6°C - او د هغه کثافت 0.549g/cm^3 دی.


د زنځیري الکانونو په مالیکولونو کې د کاربن د اتومونو شمېر (n) په زیاتیدو سره د ایزومیري شمېر هم زیاتیږي، لاندې جدول وگورئ:

(4 - 2) جدول: د ځینو الکانونو ایزومیري



د ایزومیري شمېر	مالیکولي فورمول	د کاربن د اتومونو شمېر
2	$\text{C}_4 \text{H}_{10}$	n=4
5	$\text{C}_6 \text{H}_{14}$	n=6
18	$\text{C}_8 \text{H}_{18}$	n=8
75	$\text{C}_{10} \text{H}_{22}$	n=10
څه نا څه 366 زره	$\text{C}_{20} \text{H}_{42}$	n=20
$6.0 \cdot 10^{13}$ په شاوخوا کې	$\text{C}_{40} \text{H}_{82}$	n=40





4-1-2: د IUPAC د قاعدې پر بنسټ د الکانونو نوم ایښودنه

د عضوي مرکبونو نوم ایښودنه له ځانګړې اهمیت څخه برخمنه ده؛ ځکه د مرکبونو ډبروالي ته په پام سره (له شل ملیونو څخه ډېر) او د هغوی د ورځني ډبروالي له کبله نه شي کیدای چې د هغوی نوم ایښودنه له قاعدو څخه د باندې ترسره شي، د IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) تجربې او خالصې کیمیا د نړیوالې اتحادې نوم ایښودنې لاره یې په پام کې نیولې ده چې د هغې پر بنسټ کیدای شي د عضوي مرکبونو نوم ایښودنه ترسره شي: د Metha, Etha, propa, Buta, penta او نورو رقمونو سره پیژندګلوي لری اوه Methane, Ethane, propane, Butane چې د الکانونو لومړني مرکبونه دي، بلد یاست؛ لکه څرنګه چې لیدل کېږي، د (ane) وروستۍ د نوموړو رقمونو د نوم په پای کې لیکل شوی دی چې د مرکب د ډول ټاکونکی دی او دا رقمونه په غوښتل شوی مرکب کې د کاربن د اتومونو شمېر ټاکي. (4-1) جدول د ځینو الکانونو نومونه ښيي. د نیغ زنځیر لرونکو الکانونو ته نارمل الکانونه وایي او په (n) ښودل کېږي. که چیرې د الکانونو له مالیکول څخه د هایډروجن یو او یا څو اتومه لرې کړای شي د اتوم او مالیکول چې طاقه الکترون ولري، داسې ذرې د رادیکال (Radical) یا د فعاله عضوي پاتې شونو په نوم یا دوي، که دا د پام وړ مرکبونه الکانونه وي او د هغوی په مالیکول کې د کاربن د اتوم یو ولانسي الکترون پرته د جوړه کیدلو پاتې وي، د الکیل (Alkyl) په نوم یا ډیري. په دې ذرو کې د ane وروستۍ د یو طاقه الکترون د لرلو په بڼه په yl تعویض او د هغوی د رادیکال نوم لاسته راځي؛ دیلګې په ډول:




د ښاخ لرونکو زنځیري الکانونو نوم ایښودنه داسې ترسره کېږي چې لومړی د الکانونو په مالیکول کې اوږد زنځیر ټاکل کېږي او د کاربن په اتومونو یې نمبرونه وهل کېږي او د زنځیر نمبر وهنه له هغې خواوې څخه پیل کېږي چې ښاخونه ورته نژدې وي؛ نو په دې صورت کې لومړی د هغو کاربنونو نمبر 1, 2, 3 ---- چې له هغه سره پاتې شوني نښتي وي، لیکي او ورپسې یې د معاوضو نومونه لیکل کېږي، د پاتې شوني (بقیې) او اړوند کاربن نمبر ترمنځ د (-) علامه لیکل کېږي. د پاتې شونو د نوم لیکنه په نوم ایښودنه کې د کوچنیوالي او غټوالي پر بنسټ او یا په انګریزي الفبا کې د هغو د نوم د لومړي توري پر بنسټ ترسره کېږي او په پای کې د اوږد زنځیر لرونکي الکانونو نوم په مرکب کې لیکل کېږي. کله چې ورته پاتې شوني په اوږد زنځیر کې شتون ولري، د هغوی شمېر په Tetra, Tri, Di او نورو ارقامو باندې ټاکل کېږي؛ د بیلګې په ډول:






4-3-1: د باخ لرونکو الکانونو اشتقاقی نوم ایښودنه

په دې ډول نوم ایښودنه کې لومړی باید د کاربن ډولونه وټاکل شي چې له لومړني، دویمي، دریمي او څلورمې کاربن څخه عبارت دي. د کاربن اتومونه چې د عضوي مرکبونو په مالیکول کې خپل یو ولانسي الکترون د بل کاربن له اتوم سره د اړیکې د جوړولو لپاره کارولي وي، د لومړني کاربن (primary carbon) په نوم یا ډیري، که چېرې د کاربن د اتوم دوه الکترونونه د کاربن له دوه نور اتومونه سره د اړیکې د جوړیدو لپاره کارولي وي، د دویمي کاربن (secondary carbon) په نوم یا ډیري او همدارنګه که د کاربن درې ولانسي الکترونونه د کاربن له درې نورو اتومونو سره د اړیکې د جوړیدو لپاره کارولي وي، د دریمي کاربن (Tertiary carbon) اوکه د کاربن د اتوم څلور واړه ولانسي الکترونونه د کاربن له څلورو نورو اتومونو سره د اړیکې د جوړیدو لپاره په کار وړي وي، د څلورمې کاربن (quaternary carbon) په نوم یا ډیري؛ لکه:



په اشتقاقی نوم ایښودنه کې هغه کاربن چې د کاربن له نورو ډیرو اتومونو سره اړیکه ولري، د مرکز په توګه منل شوی دی چې د Methane په نوم یا د شوی دی او هغه پاتې شوني چې له همدې کاربن سره اړیکه لري، د رادیکالونو (الکیلونو) په توګه منل شوي دي، په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شوو، وروسته د منځنیو او بیا د لویو پاتې شوو نوم لیکل کېږي او د نوم په پای کې د (Methane) کلمه لیکل کېږي.



4-1-4: د الکانونو فزیکي خواص

په لاندیني جدول کې د الکانونو ځینې فزیکي خواص لیکل شوي دي
(4 - 3) جدول: د الکانونو ځینې فزیکي خواص


نوم	فورمول	د ویلې کیدو تېمپرتیور $^{\circ}\text{C}$	د ایشیدو تېمپرتیور	ځانگړی کثافت
Methane	CH_4	-182.5	-161.5	0.424
Ethane	C_2H_6	-183.7	-88.6	0.546
Propane	C_3H_8	-187.6	-42.2	0.585
Butane	C_4H_{10}	-138.3	-0.5	0.579
Pentane	C_5H_{12}	-129.7	+36.1	0.626
Hexane	C_6H_{14}	-95.3	68.8	0.659
Heptane	C_7H_{16}	90.6	98.4	0.684
Decane	$\text{C}_{10}\text{H}_{22}$	-30.0	173.0	0.730
Tetradecane	$\text{C}_{14}\text{H}_{30}$	+5.5	253.0	0.764
Pentadecane	$\text{C}_{15}\text{H}_{32}$	10.0	270.5	0.769
Hexadecane	$\text{C}_{16}\text{H}_{34}$	18.1	287.5	0.775
Eicosane	$\text{C}_{20}\text{H}_{42}$	36.5	344.0	0.778
pentacontane	$\text{C}_{50}\text{H}_{102}$	93.0	421.0	0.942
Hectane	$\text{C}_{100}\text{H}_{202}$	115.5	-	-

څرنګه چې په جدول کې لیدل کېږي، د دې کورنۍ د هومولوګ لومړي څلور مرکبونه په ټاکل شوو شرایطو کې د ګاز په حالت موندل کېږي او د 5 تر 16 کاربنونو لرونکي یې د مایع په حالت او له 16 څخه لوړ کاربن لرونکي الکانونه په جامد حالت موندل کېږي. د الکانونو په هومولوګي سلسله کې د اېشېدو تېمپرتیور، ویلې کیدو تېمپرتیور او مخصوصه کثافت په پرله پسې توګه زیاتوالی مومي. د الکانونو په ایزومیریو کې هم د اېشېدو درجه توپیر لري، داسې چې د نارمل ایزومیریو د اېشېدو تېمپرتیور لوړ او هغه ایزومیری چې ډېر ښاخونه ولري، د اېشېدو تېمپرتیور یې ټیټ دی؛ ځکه په ښاخ لرونکو الکانونو کې د واندر والس قوه ډیره لږ او د ذرو ترمنځ د جذب قوه ډیره ټیټه ده، نو له دې کبله په لږه تودوخه کې اېشېږي.

فکر وکړئ




د لاندې جمعي فورمولونو لرونکي د نارمل زنځیري الکانونو له مرکبونو څخه کوم یو په چټکۍ سره ویلې کېږي؟ $\text{C}_{45}\text{H}_{92}$ او $\text{C}_{32}\text{H}_{66}$ د مایع الکانونو سرښناکوالی د هغوی د کاربن د اتومونو د شمېر په زیاتوالي (نسبتي مالیکول کتله) ډیرېږي





فعالیت

لاندې شکلونه وگورئ او ووائئ چې کوم الکانه له بل څخه په چټکتیا سره په پیالو کې تو پیري؟



(4 - 5) شکل: الف - د $C_{12}H_{26}$ د حرکت چټکتیا، ب $C_{16}H_{34}$ د حرکت چټکتیا


4-1-5: د الکانونو کیمیايي خواص

د الکانونو کیمیايي فعالیت ډېر لږ دی، له دې کبله هغوی د پارافین (Paraffin) یعنې د لږ میل لرونکي په نوم یا دوي . څرنگه چې د الکانونو په مالیکولونو کې ټولې اړیکې یوه گونې او د σ له ډول څخه دي؛ نو له دې کبله یوازې تعویضي تعاملونه تر سره کولی شي .


الکانونه له اکسیجن سره تعامل کوي، عضوي اکسیجن لرونکي مرکبونه جوړوي. لاندې د الکانونو ځینې تعاملونه مطالعه کوو:

4-1-5: د الکانونو اکسیدیشن

الکانونه په عادي شرایطو کې د هوا د اکسیجن او اکسیدانتونو (د اکسیدیشن عامل) په مقابل کې کلک دي، که چېرې پارافینونه په هوا کې وسوزول شي، دا مرکبونه په آسماني رنگه لمبه سوزي چې کاربن ډای اکساید، اوبه او انرژي تولید وي:



الکانونه د سون بڼه توکي دي او د هغوی له سوزولو څخه ډېره انرژي تولید پیري؛ د بیلگې په ډول:






(4-6) شکل: د طبیعي گاز سوزول

د یو کیلوگرام میتان له سوزولو څخه 55627 کیلو ژول انرژي ازادېږي، سون د پارافینو د ډیرو ځانگړو تعاملونو له ډلې څخه دی چې په عملي چارو کې له هغو څخه گټه اخېستل کېږي. طبیعي گاز د هایدروکاربنونو مخلوط دی، د گاز 90% له میتان څخه جوړ شوی دی .

۱- اکسیدانتونه: هغه مواد دي چې د نورو مواد د اکسیدیشن کولو توان ولري. یا په بل عبارت هغوی د الکترونونو بایلولو ته مجبوري کړي لکه: اکسیجن، هایدروجن،


د الکانونو له اکسیدیشن څخه په اړونده شرایطو کې کیدای شي الکلونه، الیدهايدونه او تیزابونه لاسته راوړل شي چې د پورتنیو مرکبونو د لاسته راوړلو په اړه به معلومات وړاندې شي، په دې برخه کې به د ځینو عضوي مرکبونو سون مطالعه کړو.

کله چې میتان د هوا د اکسیجن په واسطه د کتلست په شتون کې اکسیدیشن شي، میتانول، فارم الیدهايد او فارمیک اسید تولیدیږي:



2-5-1-4: د کرکنګ (ماتیدنه) تعامل


کله چې الکانونونه له 400°C څخه تر 600°C پورې تودوخه ورکړل شي، په دې صورت کې د الکانونو د مالیګولونو د کاربن - کاربن د اړیکو متجانسه پري کېدل ترسره کیږي چې دې عملیې ته د ماتېدنې (Cracking) عملیه وایي. Cracking انگلیسي کلمه ده چې د ماتولو یا د څیرولو په معنا ده، په دې ځای کې هم په همدې مفهوم په کار وړل شوې ده او په مشبوع او غیر مشبوع کوچنیو هایدروکاربنونو د لویو هایدروکاربنونو له ماتیدلو څخه عبارت ده:



په صنعت کې د ماتیدو تعامل بنسټیز رول لوبوي چې د تودوخو په لوړو درجو کې د دې تعامل په مرسته له اومو نفتو څخه قیمتي کوچنۍ اجزاوې؛ لکه: پترول، ډیزل، د خاوروتیل او نور لاس ته راوړي.

3-5-1-4: هلوچینش


هلوچینش د الکانونو د ډیرو مهمو تعاملونو له ډلې څخه دی، د هلوچینش په بهیر کې له کلورین سربیره، فلورین هم په کار وړل کیږي، آیودین د الکانونو د هایدروجن په نیغ (مستقیم) بې ځایونه نه شي ترسره کولی، خو فلورین په چټکۍ سره اغیزه اچوي چې باید د فلورینیشن په عملیه کې پاملرنه وشي. د الکانونو کلورینیشن د تودوخې په 300°C کې ترسره کېدای شي، د میتان د کلورونیشن بهیر په خوړاوونو سره کیدای شي چې ترسره شي، لاندې معادلې وګورئ:




4-1-6: د الکانونو لاسته راوړنه

الکانونه په نفتو کې په زیاته کچه د مخلوطو په بڼه شته چې کېدای شي هغه له نفتو څخه جلا شي، همدارنګه طبیعي ګاز د ګازي الکانونو مخلوط دی؛ خو الکانونه کیدای شي په لاندې لارو هم په لاس راوړل شي:

1 - **د ورتس سنتیز په طریقه:** د الکانونو د لاسته راوړلو ډیره مهمه لاره د ورتس تګ لاره ده؛ په دې طریقه کې د هایډروکاربنونو هلایدونه له فلزي سوډیم سره تعامل کوي، په پایله کې الکان لاسته راځي:



Alkyl halide Alkane





Methyl chloride Ethane

فعالیت



د الکان کوم هلاید ته له سوډیم سره تعامل ورکړل شي چې هګزان تشکیل شي؟
که چېرې $2 - Iodobutane$ ته د سوډیم سره تعامل ورکړل شي، کوم الکان به حاصل شي؟ د دهغوی د تعامل معادله ولیکئ.


2 - **ګرینارډ په طریقه:** په 1901 کال کې د ګرینارډ (Victor Grignard) په نوم یو عالم د مګنیزیم هلاید عضوي مرکب له لاندې معادلې سره سم ترلاسه کړ:





فعالیت




د ګرینارډ د تعامل پر بنسټ دا لاندې مرکبونه لاسته راوړئ او دهغوی کیمیايي معادلې ولیکئ:




3 - د الکیل هلایدونو له ارجاع کولو څخه هم کیدای شي الکانونه لاسته راوړل شي، دا سې چې الکیل هلایدونه د جستو له فلز سره تعامل وکړي، په پایله کې د الکان او جستو هلاید حاصلېږي:



4 - د کاربوکسلیک اسیدونو د فلزي مالگو او د سودالایم ($\text{NaOH} + \text{CaO}$) سودیم هایدروکساید او د کلسیم اکساید مخلوط دی) له تودوخې ورکولو څخه کېدای شي الکانونه لاس ته راوړل شي:



5 - د نکل، پلاتین او نورو کتلستونو په شتون کې د الکینونو او الکاینونو له هایدروجنشن څخه د هغوی ایزولوگ الکانونه لاسته راځي



4-1-7: میتان (Methane)


د پارافین ډیر ساده مرکب، میتان دی چې په بېلابېلو نومونو یادېږي اودا نومونه یې له پیدایښت له بیلا بیلو بڼو سره اړیکه لري، څرنگه چې دا گاز د عضوي توکو د خوسا کیدلو له کبله په خندقونو (ژورو) کې لاسته راځي؛ له دې کبله د خندقونو د گاز په نوم یا دېږي، همدا رنگه دا گاز په کانونو کې هم پیدا کېږي، پر دې بنسټ د کانونو د گاز په نوم هم یا د شوی دی، په کانونو کې د میتان د گاز تولیدل د وژونکو او خطرناکه چاودنو لامل کېږي، له دې کبله Firedamp یعنې د اور منځته را وړونکي گاز په نوم هم یادېږي.

د لویو سیارو اتموسفیر (زحل او مشتري) هم د میتان گاز لري، دا ښیي چې میتان په طبیعي شرایطو کې له حیاتي قوو څخه پرته هم جوړېدلی شي.

د ځمکې په د ننه کې د اور اخیستونکو گازونو ډیرې زیاتې زیرمې شته چې هغوی په ازاد حالت کې د طبیعي گازو په بڼه (د ځمکې د پنبه قشر دننه زیرمې)، د محلول په حالت په نفتو او د ځمکې د لاندې اوبو د گازونو په توګه له نفتو سره یوځای موندل کېږي. په طبیعي گازونو کې 98% د میتان گاز شتون لري او ایتان، پروپان او نور هم د مخلوط په بڼه شته دي. د تېلو سره یوځای گازونه په ډیره لږه کچه میتان لري، په منځني ډول له یو متر مکعب طبیعي گاز څخه 46000 کیلو ټول تودوخه تولیدېږي چې د 30kg چدن د ویلې کولو لپاره کافي ده.

4-1-7-1: د میتان فزیکي خواص

د میتان گاز بې بویه، بې خونده، بې رنگه او د هوا څخه سپک دی. د هغه دروند والی د هوا په نسبت $D = \frac{M}{29} = \frac{16}{29} = 0.552$ دی. د میتان مالیکول غیر قطبي دی او د میتان د مالیکولونو ترمنځ د جاذبې قوه د واندروالس او (London) قوه ده، دا قوه د میتان د مالیکولونو د کوچنیوالي له امله ډیره کمزورې ده؛ له دې کبله د هغه د ویلې کیدو او ایشیدو ټکی ډېر ښکته دی. میتان په اوبو کې نه حل کېږي.



فعالیت




دیوالکان مخصوصه کثافت 1.52 دی، دهغه فورمول او مالیکولی کتله په لاس راوړئ.
2 - دیوالکان مالیکولی کتله 62 ده، دهغه مخصوصه کثافت پیدا کړئ.

4-1-7-2: د میتان کیمیایی خواص


طبیعی گاز % 98 د میتان گاز دی، له هغه څخه د خامې کیمیایی مادې په توګه د لاندې موادو د لاسته راوړلو لپاره کار اخېستل کېږي:

1 - د تورکي (soot) او د هایدروجن د لاس ته راوړلو لپاره د پايرولیز (Pyrolysis) له طریقې څخه ګټه اخلي:




تورکی د زیاتې مادې په توګه د رېږ په خامو موادو کې کاروي او هم د څرمنو په جوړولو کې د رنګ په توګه ترې ګټه اخېستل کېږي.

2 - د استلین د لاسته راوړلو لپاره له میتان څخه ګټه اخېستل کېږي:






3 - میتان د اوبو د بړا سونو د تعامل له امله د کاربن مونو اکساید او هایدروجن گازونه لاسته راوړي:




په دې بنسټ له پورتنیو لاسته راغلو محصولاتو څخه میتایل الکول لاسته راوړل کېږي.





4 - د میتان د اکسیدیشن له تعامل څخه، میتایل الکول، فارم الیدهاید او فارمیک اسید لاسته راځي:



5 - د اکسیجن په شتون کې د میتان او امونیا له پايرولیز څخه هایدروجن سیانید لاسته راځي:



6 - د میتان د کلورونیشن څخه میتایل کلوراید، ډای کلورومیتان (میتیلن کلوراید) کلوروفارم او کاربن تتراکلوراید ترلاسه کیږي:



میتان کیدای شي چې د الکانونو د عمومي لارو په واسطه هم په لاس راوړل شي:


فعالیت



د میتان لاسته راوړنه

د اړتیا وړ مواد: دوه عدده تست تیوبونه، گیر، ستیند له دوه عدده پایو سره کوږ نل، سوري لرونکی کارک، د اوبو څخه ډک تشت، د تودوخې سرچېنه، سودالایم (د سودیم هایدروکساید او کلسیم اکساید مخلوط)، سودیم اسیتات

کړنلاره: له (4 - 7) شکل سره سم، لږ څه سودیم اسیتات د سودالایم سره په یو تست تیوب کې واچوئ، د سوري لرونکي کارک سره یې وتړئ، د کارک د سوري څخه یو کوږ نل له بل تست تیوب سره چې له اوبو څخه په ډک تشت کې سرچېه شتون لري، وردننه کړئ، وروسته د تست تیوب د توکو د تعامل معادله ولیکئ او وویاست چې په نسکور شوي تست تیوب کې چې د اوبو ډک تشت کې شتون لري، ټول شوی گاز کوم دی؟




(4 - 7) شکل: د میتان د لاس ته راوړلو دستگاه

4-2: کره ییز مرکبونه (سایکلوالکانونه)


د سایکلو پارافینونو د هومولوگ سلسلې عمومي فورمول C_nH_{2n} یا $(CH_2)_n$ دی چې په دې ترتیب د سایکلو پارافین مالیکول له هغه له ایزولوگ الکان په نسبت د هایدروجن دوه ائومه لږ لري.

په ځینې مشبوع هایدروکاربنونو کې د کاربن دوه ائومه کولی شي چې په خپل منځ کې یوه گونې اشتراکي اړیکه (کټ مټ د دوو منځنیو کاربنونو له sp^3 هایبریدو اړیکو سره چې د هغوی تر منځ یو یا څو د CH_2 - گروپونه شتون ولري) په حلقه کې چې جوړه کړي دي، دا ډول مرکبونه د سایکلو الکانونو (Cycloalkanes) په نوم یا ډیرې چې دهغوی لومړنی مرکب C_3H_6 چې جوړښتیز فورمول په لاندې ډول دی:



Cyclo propane

د دوی مرکبونه له Cyclo butane، Cyclo pentane، Cyclo hexane او نورو څخه عبارت دي. سایکلو هگزان چې جمعي فورمول یې C_6H_{12} دی، د لیویس د قانون سره سم په یوه سطحه کې د ساده شپږ ضلعي په بڼه لیکل کیږي، خو په رښتیا سره چې د کاربن ائومونه په دې مرکب کې څلور وجهي جوړښت لري، مسطح نه دی، په عادي شرایطو کې هغه فورمول چې د سایکلو هگزان د مالیکول ډېر ثابت حالت رانښيي، د څوکی په بڼه دی (د هغه څوکیو په بڼه چې د سیندونو په غاړو کې ترې گټه اخېستل کیږي) په (4 - 8) شکل کې د سایکلو هگزان فضايي جوړښت د څوکی په بڼه ښودل شوی دی:



(4 - 8) شکل: د سایکلو هگزان فضايي جوړښت د چوکۍ په شکل

4-2-1: د سایکلو الکانونو پیدایښت

سایکلو الکانونه په طبیعت کې په ډیره اندازه پراختیا موندلې ده او نوموړي مرکبونه د ځینو نفتو د جوړښت له بنسټیزو اجزاو څخه دي. سایکلو الکانونه لومړي ځل په نفتوکې د مارکوف نیکوف (Markovnikov) روسي عالم په واسطه ترلاسه شول، نوموړی عالم دا هایدروکاربنونه د نفتین (Naphthenes) په نوم یادکړي دي. نوموړي وموندل چې په طبیعت کې پنځه ضلعي او شپږ ضلعي سایکلو الکانونه، یعنې سایکلو پنتان او سایکلو هگزان او د هغوی مشتقات ډېر زیات خپاره شوي دي. سایکلو الکانونه په نباتي ایتري غوړیو کې شتون لري. د سایکلو هگزان د هومولوگ کاربنی سکلیټ (1-methyl-4-isopropyl cycl)

(hexane) د ډیرو ترپینونو (Terpenes) بنسټ جوړ کړی دی چې د طبیعت د مهمو مرکبونو له ډلو څخه دي .

زیات پوه شی


ترپینونه (Terpenes) عبارت له عطري او تېنټیدونکو هایډروکاربنونو څخه دي چې د هغوی بسیط فورمول $C_{10}H_{16}$ او عمومي فورمول یې $(C_5H_8)_n$ دی. ترپینونه په علمي او صنعتي چارو کې د ډېر اهمیت برخمن او د زیاتو نباتاتو بنسټ جوړونکي دي. ترپینونه د ښه بوی لرونکو موادو اجزای دي او د عطرو په جوړولو کې په کار وړل کېږي، دا مرکبونه له نباتاتو څخه لاس ته راوړل کېږي.

4-2-1-1: فزیکي خواص

د سایکلو الکانونو د ویلې کیدلو د تودوخې درجه د هغوی د ایزولوگو الکانونو په نسبت لوړه ده، لاندې جدول وگورئ: (4-4) جدول: له ایزولوگو الکانونو سره د سایکلو الکانو د ویلې کیدو د درجو پرتله

نارمل الکانونه او سایکلو الکانونه	فورمول	د ویلې کېدو درجه °C	د ایشېدو درجه °C
پروپان	$CH_3 - CH_2 - CH_3$	-187	-42
سایکلو پروپان		-127	-33
بیوتان	$CH_3 - (CH_2)_2 - CH_3$	-135	-0.5
سایکلو بیوتان		-90	13
پنتان	$CH_3 - (CH_2)_3 - CH_3$	-130	36
سایکلو پنتان		-94	49
هگزان	$CH_3 - (CH_2)_4 - CH_3$	-95	69
سایکلو هگزان		7	81

سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان د گاز په بڼه او سایکلو الکانونه چې د کاربن د اتومونو شمېر یې له 30 څخه پورته وي، په جامد حالت موندل کېږي.




4-2-1-2: د سایکلو الکانونو کیمیايي خواص

د کوچنۍ کړۍ لرونکي سایکلو الکانونه جمعي تعاملونه ترسره کوي چې د هغوی کړۍ وازېږي، الکانونه او د هغوی مشتقات جوړېږي چې د الکینونو ځانګړتیا له ځان څخه بېسي. هغه کړۍ چې له 5 څخه تر 7 پورې د کاربن اتومونه ولري، ثبات یې ډېر دی چې د مشبوع هایدروکاربنونو غوندې تعویضي تعاملونه ترسره کوي.

1 - په سایکلو الکانونو باندې د هلو جنو عمل


د کوچنۍ کړۍ لرونکي سایکلو الکانونه او د هغوی مشتقات له برومین سره په ښه توګه تعامل کوي، په پایله کې کړۍ وازه او د الکانونو برومینی مشتقات 1.3 di brom alkanes جوړېږي.



پورتنی تعامل د پروپیلین د برومینشن په نسبت ورو تر سره کېږي او د سایکلو بیوتان برومینشن د سایکلو پروپان په نسبت چټک دی. د سایکلو بیوتان د برومینشن تعامل په لوړه تودوخه کې ترسره کېږي او ورو دی چې 1.4 dibromo butane جوړېږي:





د هلو جنو د عمل په واسطه د سایکلو پنتان او سایکلو هگزان کړۍ نه وازېږي، خو د هغوی د هایدروجن د اتومونو تعویض هلو جنوسره ترسره کېږي:




2 - د سایکلو الکانونو اکسیدیشن

د سایکلو پروپان او د هغه مشتقات په عادي تودوخه کې د پوتاشیم پرمنگنات د محلول په واسطه په خنثي یا القلي محیط کې ورو اکسیدي کېږي او د قوي اکسیدانتونو او زیاتې تودوخې په واسطه نور سایکلو الکانونه هم اکسیدي کېږي، داسې چې کړۍ شکېږي او دوه قیمت ته تیزابونه د کاربن د عین شمېر سره لاسته راځي:



4-2-2: د کره ییزو مرکبونو جوړښت او نوم ایښودنه

د کاربن اتومونه د کره ییزو مرکبونو په مالیکولونو کې د الکانونو په شان د یو ګونې اړیکې په واسطه یو له بل سره نښتې دي چې د سګما (σ) د اړیکې په نوم یا ډیرې او د کاربن اتومونه sp^3 هایبرید لري. د سایکلو الکانونو عمومي فورمول C_nH_{2n} یا $(CH_2)_n$ دی چې له اړونده پارافینونو څخه دوه اتومه هایډروجن لږ لري. د سایکلو الکانونو په نوم ایښودنه کې د سایکلو *Cyclo* مختاړي (Prefix) په زیاتولو سره د هغه ایزولوګ الکان په نوم ترسره کېږي، زیاتره د سایکلو الکانونو د فورمولونو د لیکلو لپاره د هغوی له شرطې فورمولونو څخه ګټه اخیستل کېږي چې په هغوی کې د عناصرونو سمبولونه نه لیکل کېږي؛ د بیلګې په ډول:



فعالیت




لاندې د سایکلو الکانونو شرطې فورمولونه لیکل شوي دي، تاسې د هغوی مشرح فورمولونه ولیکئ او نوم ایښودنه یې وکړئ:




4-2-3: د سایکلو الکانونو ایزومیري

د سایکلو الکانونو جوړښتیز ایزومیري د کرۍ په جسامت، د نښتې شوو زنځیرونو جوړښت او د هغو د زنځیر په ځای پورې اړه لري، لاندې د C_5H_{10} د مرکب ایزومیري له پنځو فورمولونو سره او د هغوي نومونه لیکل شوي دي چې پورتنی مطلب روښانه کوي:




سایکلو پارافینونه فضايي ایزومیري هم لري او دا ایزومیري هغه موده لیدل کېږي چې مواد د یو ډول جوړښتیز فورمول لرونکي وي؛ خو د اتومونو د فضا ځایونه یې یو له بل څخه توپیر لري. فضايي ایزومیري په سایکلو

الکانونوکی د څنگ زنجیر ځای په فضايي ایزومیری پورې اړه لري، دا ډول ایزومیری د هندسي ایزومیری (Geometric isomerism) او یا د ترانس اوسیس ایزومیریو (Trans, cis isomerism) په نوم یادېږي. که د سایکلو الکانونو پاتې شونې د کرپو په یوه سطحه کې شتون ولري، دا ډول ایزومیری د سیس (Cis) په نوم یا دوي او که چېرې پاتې شونې د کرپو په بیلا بیلو سطحو کې شتون ولري، د ترانس (Trans) په نوم یا دېرې؛ د بیلگې په ډول:



Trans di methylcyclopropane



Cis di methyl cyclopropane

د سیس او ترانس ایزومیری بیلا بیل فزیکي او کیمیايي خواص لري.


فعالیت




د لاندې سایکلو الکانونو د جوړښتیزو او فضايي ایزومیرنو فورمولونه ولیکئ او نوم ایښودنه یې تر سره کړئ:
Di ethyl cyclopentane , Di chlorocyclo butane, tri methyl cyclo hexane

4-2-4: د سایکلو الکانونو لاسته راوړل

د سایکلو الکانونو د لاس ته راوړلو عمومي لاره د فلزونو اغیزه د الکانونو د ډای هلایدونو مشتقاتو باندې ده؛ د بیلگې په ډول: که چېرې 1,3 - di bromo butane ته د جستو له فلز سره تعامل ورکړل شي، سایکلو پروپان ترلاسه کېږي:



له 1,6 - dibromobutane مرکب څخه کولی شو چې سایکلو بیوتان په لاس راوړو:



1,4 - di bromo butane

cyclo butane

4-2-5: د سایکلو الکانونو مهم مرکبونه

سایکلو پنتان په نفتو کې موندل کېږي او هغه د موټرو د سون مهمې مادې د کیفیت د لوړولو په موخه کارول کېږي، همدارنګه نوموړي مرکبونه په بیلا بیلو سنتیزونو کې په کار وړل کېږي. داسې نفت هم شتون لري چې د سایکلو پنتان د کاربوکسیل د مشتقاتو لرونکي دي یعنې سایکلو پنتان کاربوکسیلیک اسیدونه او د هغه هومولوگونه چې د نفتینک اسید (Naphthene acid) په نوم یادېږي، په نفتو کې شتون لري.

د څلورم څپرکي لنډيز



- * الکانونه هغه مرکبونه دي چې د هغوی د کاربن د اتومونو ترمنځ یو ګونې ساده اړیکه شتون لري او د کاربن د اتومونو نور پاتې ولانسونه د هایډروجن داتومونو په واسطه پکښه شوي دي .
- * د الکانونو د هومولوګ لومړي څلور مرکبونه په ټاکل شوو شرایطو کې د ګاز په حالت موندل کېږي او له 5 څخه تر 16 کاربن لرونکي یې د مایع په حالت او د 16 څخه لوړ کاربن لرونکي الکانونه په جامد حالت دي.
- * د الکانونو کیمیايي فعالیت ډیر لږ دی، له دې کبله هغوی د پارافین (Paraffins) یعنې د لږ میل لرونکو په نوم یادوي .
- * په یوه سلسله مشبوع هایډروکاربنونو کې د کاربن دوه اتومه کولی شي چې په خپل منځ کې یو ګونې اشتراکي اړیکه (کټ مټ د دوو منځنیو کاربنونو $sp^3 - hybrid$ هایبرید اړیکو ته ورته چې د هغو تر منځ یو یا څو د CH_2 ګروپونه شتون ولري) د حقلې په شکل رابطه جوړه وي، دا ډول مرکبونه د سایکلو الکانونو (Cycloalkanes) په نوم یادېږي چې دهغو لومړنی مرکب C_3H_6 دی:
- * سایکلو الکانونه په نباتي ethereal oil (غوړیو) کې شتون لري. د سایکلو هګزان د هومولوګ د کاربنی سکلیټ (1-methyl4 - isopropyl cyclohexane) د ډیرو تریپینونو (Terpenes) بنسټ جوړوي.
- * د سایکلو پارافینونو د هومولوګ د سلسلې عمومي فورمول C_nH_{2n} یا $(CH_2)_n$ دی چې د سایکلو پارافین مالیکول د هغه له ایزولوګ الکان په نسبت د هایډروجن دوه اتومه لږ لري.
- * د کوچنۍ کړۍ لرونکي سایکلو الکانونه جمعي تعاملونو ته میل لري چې د هغوی کړۍ وازه شي، الکانونه او د هغو مشتقات جوړکړي او د الکینونو خاصیت ښکاره کوي، له 5 څخه تر 7 پورې کاربن لرونکي کړۍ ډېر ثبات لري چې د مشبوع هایډروکاربنونو په شان تعویضي تعاملونه تر سره کوي.
- * سایکلو پنتان په نفتو کې موندل شوی دی او هغه په موټرونو کې د یوې مهمې مادې په توګه د تیلو د کیفیت د لوړولو لپاره ورزیاتوي، همدارنګه نوموړي مرکبونه په بیلا بیلو سنتیزونو په واسطه لاسته راوړي.

د څلورم څپرکي پوښتنې

څلور ځوابه پوښتنې

- 1 - الکانونه هغه مرکبونه دي چې دهغو د کاربن د اتومونو ترمنځ ----- اړیکه شتون لري .
الف - ساده، ب - یوگونې، ج - دوه گونې، د - الف او ب دواړه سم دي.
- 2 - الکانونه دلاندې کوم یو عمومي فورمول لرونکي دي ؟
الف - $C_n H_{2n}$ ، ب - $C_n H_{2n+2}$ ، ج - $C_n H_{2n-2}$ ، د - $C_n H_{2n+1}$.
- 3 - د $CH_3 - \overset{1}{\underset{CH_3}{\underset{|}{CH}}} - \overset{2}{\underset{CH_3}{\underset{|}{CH}}} - \overset{3}{CH} - \overset{4}{CH_2} - \overset{5}{CH_3}$ د مرکب نوم عبارت دي له :
الف - 2,3 - di methyl pen tan e، ب - 3,3 di methyl pen tan e، ج - 4,3 di methyl pen tan e، د - 1,3 di methyl pen tan e
- 4 - د الکان (Alkane) د *ane* وروستاړی د هغه په اړوند رادیکال کې په کوم وروستاړي بدلون مومي ؟
الف - ene، ب - yne، ج - yl، د - yne
- 5 - له 5 څخه تر 16 پورې کاربنو لرونکي الکانونه په کوم حالت موندل کېږي ؟
الف - جامد، ب - گاز، ج - مایع، د - پلازما.
- 6 - د الکانونو کیمیايي فعالیت لږ دی؛ له دې کبله هغوی د ----- په نوم یا دوي .
الف - پارافین، ب - Paraffins، ج - الف وب دواړه، د - هیڅ یو.
- 7 - د یو کیلو گرام میتان له سوځولو څخه ----- انرژي ازاد دیږي .
الف - 55625 کیلو ژول، ب - 57000 ژول، ج - 57000 میگا ژول، د - هیڅ یو.
- 8 - د سایکلو الکانونو په نوم ایښودنه کې د ----- مختاړي (prefix) په زیاتولو ترسره کیږي .
الف - سایکلو، ب - Cyclo، ج - الکیل، د - الف او ب دواړه سم دي .
- 9 - روسي عالم د (-----) په نوم سایکلو الکانونه د لومړي ځل لپاره په نفتو کې کشف کړه .
الف - مارکوف نیکوف، ب - Markovnikov، ج - الف او ب دواړه، د - زایسف
- 10 - په ټولو الکانونو کې د C-C د اړیکې د محور په شاوخوا آزادانه حرکت شته، ترڅو دهغو د اړیکو زاویه له ----- څخه لوړه شي .
الف - 109 درجې او 28 دقیقې، ب - 90 درجې او 30 دقیقې، ج - 60 درجې، د - 65 درجې.

تشریحي پوښتنې

- 1 - لاندې مطلبونه تعریف او روښانه کړئ.
 - الف - پارافین، ب - هومولوگ، ج - ایزومیر، د - ایزولوگ.
- 2 - د مشبوع هایدروکاربنونو په سلسله کې د کاربن د اټومونو د شمېرو په زیاتولو کوم بدلونونه د هغوی په فزیکي خواصو کې لیدل کېږي؟
- 3 - له لاندنیو هایدروکاربنونو څخه کوم یې د مشبوع هایدروکاربنونو له ډولونو څخه دي.
 - الف - C_7H_{14} ، ب - $C_{12}H_{26}$ ، ج - $C_{10}H_{20}$ ، د - $C_{24}H_{50}$.
- 4 - په لاندې مرکبونو کې ایزومیري وټاکئ.
 - الف - $CH_3 - \overset{\overset{CH_3}{|}}{C} - CH_3$ ب - $CH_3 - \underset{\underset{CH_3}{|}}{CH} - CH_3$ ج - $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$ د - $CH_3 - \underset{\underset{CH_3}{|}}{CH} - CH_3$

5 - د لاندې مرکبونو فورمولونه ولیکئ.



الف - 1,2-dichloropropane ب - 1-Ethyl-2-Iso propyl butane

ج - 1,3-di ethyl nonane د - 1-bromo3-chlorodecane

6 - د یو مشبوع هایدروکاربن کثافت $2.59g/L$ دی، د نوموړې مادې مالیکولي کتله د هغه له فورمول سره پیدا کړئ.

7 - د میتایل سایکلو پروپان فورمول ولیکئ او د هغه دکاربنونو ډولونه وټاکئ او نوم ایښودنه یې هم وکړئ.


8 - دلاندې هایدروکاربنونو نوم ولیکئ.



9 - د لاندې سایکلو الکانونو فضايي جوړښت ولیکئ

الف - Cis-1,2-di chloro cyclo propane ب - Trans-1-ethyl-2-isopropylcyclobutane

ج - Cis-1,3-di ethyl cyclo butane د - Trans-1-bromo3-chloro cyclo pentane




پنځم څپرکی الکینونه او الکاینونه

د هایدروکاربنونو له مهمو ټولګو څخه، یو هم غیر مشبوع مرکبونه یعنې د الکینونو او الکاینونو ډلې دي چې زموږ په ورځني ژوند کې بنسټیز رول لوبوي، دا مرکبونه په خپلو مالیکولونو کې دوه ګونې او درې ګونې اړیکې لري، داسې چې په الکینونو کې د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ دوه ګونې او په الکاینونو کې د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ درې ګونې اړیکې شتون لري.


په دې څپرکي کې د دې مرکبونو په اړه معلومات وړاندې کېږي . د دې څپرکي په لوستلو به زده کړئ چې الکینونه او الکاینونه څه ډول مرکبونه دي؟ د اړیکو څرنگوالی په الکینونو او الکاینونو کې په څه ډول دي؟ د ژوند په کومو برخو کې په کارېږي؟ څرنگه او له کومو سرچینو څخه کیدای شي په لاس راوړل شي؟ په طبیعت کې د هغوی خپریدل په څه ډول دي؟ د دې څپرکي په لوستلو به پورتنيو پوښتنو او هغوی ته ورته نورو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ:

5-1: الکینونه

د الکین د کورنۍ د غیر مشبوع هایډروکاربنونو ډېر ساده مرکب ایتلین دی چې د هغه فورمول $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ دی، د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ دوه گونې اشتراکي اړیکه شته ده چې د هغه یوه اړیکه سگما (σ) او بله یې د پای π اړیکه ده، (د ایتلین د اړیکو ځانگړتیاوې) زاويي او د اړیکو اوږدوالی، د الکینونو د جوړښت په مبحث کې وړاندې شوي دي. د الکین د مرکبونو د هومولوگ سلسله د یو میتلین گروپ ($-\text{CH}_2-$) په کچه یوله بل څخه توپیر لري چې د هغوی عمومي فورمول $\text{C}_n \text{H}_{2n}$ دی، په دې فورمول کې n د 2 او له هغه څخه پورته تام قیمتونه ځانته غوره کولی شي. د ایتلین دوه گونې اړیکه په یوه سطح کې واقع ده او په پایله کې د $\text{C} - \text{C}$ په شاوخوا په ازاده توگه تاویدل په کې شوني نه دي. د هغوی دویم مرکب propene ($\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$) دی، د دوه گونې اړیکې شتون د الکینونو د مرکبونو فعالیت د الکانونو په نسبت ډېر کړی دی، له دې کبله د هغوی شتون په نفتي موادو کې ډیر لږ دی. الکینونه په پتروشیمي کې له ځانگړي اهمیت څخه برخمن دي. د نفتي محصولاتو (د الکانونو) د کیمیايي بدلونونو په لومړي پړاو کې الکینونه تر لاسه کیدای شي؛ داسې چې له الکانونو څخه دوه هایډروجنونه جلا کيږي او د هغوی ایزولوگ الکین لاسته راځي:



که چیرې الکیل برومایدونو او القلیو ته تر 55°C تودوخه ورکړل شي، الکینونه لاس ته راځي:




الکینونه د اولفینونو (Olefines) په نامه چې د تېلو جوړوونکو معنا ورکوي، هم یا ډیري؛ ځکه د تېلو په مرکبونو کې هم شته دي.

5-1-1: د الکینونو جوړښت

د الکینونو یوه ساده ځانگړتیا دا ده چې د هغوی په مالیکولي جوړښت کې د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ دوه گونې اړیکې شتون لري، دوه گونې اړیکه د دوو جوړوونکو الکترونونو په مرسته (له څلورو الکترونونو څخه) جوړېږي، د کاربن اتومونه چې په خپل منځ کې دوه گونې اړیکه لري، د SP^2 هایبرید یزیشن حالت لري او د نوموړو کاربنونو هراتوم درې سگما اړیکې چې په یوه سطحه کې شتون لري او 120° درجه زاویه یې جوړه کړې ده، تړلي دي، د دې دوو اتومونو د کاربنونو یو، یو نه هایبرید شوي د p اوربیتالونه چې د سگما په سطحه په عمودي بڼه شتون لري او یوله بل سره موازي دي، په پایله کې یو له بل سره څنګ پر څنګ ننوتنه تر سره کوي او د پای (π) اړیکه (دویمه اړیکه) جوړوي. د π د اړیکو جوړوونکو الکترونونو ته د π الکترونونه (π - electrons) وایي. π الکتروني ورېځ د سگما اړیکې په پاسني اولاندیني برخو کې ځای لري او په دې بنسټ دوو جوړو الکترونونو جوړه ییزه اړیکه جوړه کړې ده. جوړه ییزه اړیکه عبارت له سگما (σ) او د پای (π) اړیکې ($\sigma + \pi$ - bond) مجموعه ده. د p نه هایبرید شوي اوربیتالونه د الکتروني ورېځو څنګ پر څنګ ننوتنه چې د π اړیکه منځ


ته راوړي، د کاربن اتومونه یو له بل سره نژدې او د هغوی ترمنځ واټن لنډوي؛ یعنې $C = C$ د دوه گونې اړیکې اوږدوالی 133pm ته نژدې کیږي، په داسې حال کې چې $C - C$ ساده اړیکې اوږدوالی د 154pm دی. (5-1) شکل ته وگورئ:




(5-1) شکل: په ایتلین کې د اړیکې ښودل، د هغې زاویه او د اړیکو اوږدوالی

2-1-5: د الکینونو نوم ایښودنه


د الکینونو په نوم ایښودنه کې د ene وروستاړی د هغوی د ایزولوگو الکانونو د ane وروستاړي پر ځای ور زیاتېږي. د الکینونو په مرکبونو کې هم ډېر اوږد زنځیر ټاکل کیږي، دلته هم د هغو کاربنونو نمبر چې په هغوی باندې پاتې شوني او یا ښاخونه شته دي، 1، 2، 3 اوداسې نور رقمونه لیکل کیږي او له علامې څخه وروسته بیا د پاتې شوني نوم د هغوی د نوم د لومړي توري پر بنسټ کوم چې د انګلیسي الفبا په تورو کې مخکې وي، لیکل کیږي وروسته د اوږد زنځیر نوم له ene وروستاړي سره لیکل کیږي. د کاربن داتومونو نمبر وهل د بنسټیزو زنځیرو له هغې خوا څخه پیل کیږي چې جوړه یزه اړیکه هم په هغه کې شتون ولري؛ خود اوږد زنځیر نمبر وهل له هغه خوا څخه پیل کیږي کوم چې جوړه یزه اړیکه هغه سر ته نژدې وي، د بیلګې په ډول:



2-butene




1-butene



4-methyl-2-heptene


که چېرې خودوه گونې اړیکې په دې مرکبونو کې شتون ولري، د ene له وروستاړي څخه وړاندې د Tri، Di او نور رقمونه لیکل کیږي چې دا رقمونه د جوړه ییزو اړیکو شمېر ښيي؛ د بیلګې په ډول:




2,4-hexadiene

3-1-5: د الکینونو ایزومیري

الف: د جوړښت ایزومیري او د دوه گونو اړیکو ځای



1-butene




2-butene

لاندې مرکبونه په پام کې ونیسئ:

د پورتنیو دواړو مرکبونو ټولیز فورمول C_4H_8 دی؛ خو د دې د دواړو مرکبونو د مالیکولونو د جوړښت فورمولونه یو له بل څخه توپیر لري، د دوه گونې اړیکې ځای په دې مرکبونو کې بدلون موندلی دی، دا ایزومیري د جوړونکې ایزومیري په نوم د دوه گونې اړیکې د ځای له کبله یاد وي.

ب - فضايي ایزومیري (Stereo isomeris)


Stereo یوناني کلمه ده چې د جامد او کلکو جسمونو په معنا ده، پردې بنسټ دا ایزومیري د هغو مرکبونو پورې اړه لري چې کلک فضايي جوړښت ولري او د هغوی هندسي بڼې په فضا کې بدلون ونه کړای شي؛ بیلگې په ډول: د 2-Butene مرکب په پام کې نیسو او د لرگینو مودلونو په واسطه د هغه شونې بڼې جوړوو، دا مرکب له (5 - 2) شکل سره سم د دوو ایزومیریو حالتونه لري؛ څرنگه چې لیدل کېږي د 2-Butene د مرکب په مالیکول د میتایل د گروپونو ځای پر ځای کیدل بشپړه توپیر لري چې په عادي تودوخه کې د مالیکولونو حرکتی انرژي د هغه د میتایل د رادیکالونو د تاویدولو او بدلون توان نه لري؛ ځکه په دې مرکب کې د π د اړیکې انرژي د دې رادیکالونو د تاویدولو او بدلیدلو خنډ ګرځي، د خنډ د انرژي له منځه وړلو لپاره باید فعالوونکې انرژي (activation Energy) شتون ولري، پردې بنسټ په عادي تودوخه کې کیدای شي چې دا دوه ډوله ایزومیري یو له بل څخه جلا کړای شي؛ ځکه د هغوی د اېشېدو ټکي یو له بل څخه توپیر لري.



شکل: (2 - 5) - د 2-بیوتین د مالیکول دوه فضايي ساختمانونه


1 - د Cis او Trans پخوانیو طریقو نوم ایښودنه چې یوازې په دې ځانګړې حالت کې، 2-Butene او د هغه له هندسي شکلونه سره ورته دي، په دې ډول ده چې یو مستقیم خط د کاربن د دوو اتومونو له مرکز څخه د هغوی په دوه ګونې اړیکې باندې رسم کړی، که چیرې د میتایل دواړه ګروپونه د مستقیم خط لاندې په یوه لوري یعنې په یوه مستوي کې ځای ولري، دا جوړښت د Cis په نوم یا ډیري. که چیرې د میتایل یو ګروپ پاس او بل یې د مستقیم خط لاندې وي؛ یعنې په دوه بېلابېلو مستویو کې شتون ولري، د Trans ایزومیري په نوم یا ډیري.

2 - هغه نوې کړنلاره چې د فضايي ایزومیریو د ښودلو په هکله په کار وړل کېږي، نوموړي ایزومیري د Z او E په تورو راښيي، د دې کړنلارې سره سم هغه ایزومیري چې په هغې کې د میتایل دواړه ګروپونه د مستقیم خط په یوه خوا کې ځای ولري، دا رنگه جوړښت ته Z ایزومیري وايي (Z د الماني کليمې Zusammen لومړۍ توري دی چې د یو ځای په معنی ده) هغه ایزومیري چې د میتایل دوه ګروپونه د خط په دوو بېلابېلو لورو؛ یعنې په بېلابېلو سطحو کې ځای ولري، په E ټاکل کېږي. (E د الماني کليمې Entgegen لومړۍ توري دی چې یو بل سره د مخالف معنا لري)؛ د بیلګې په ډول:




جوړښت (Cis) Z
(Z) butane

جوړښت E (ترانس)
(E) butane



(Z) Cis Isomery



(E) Trans Isomery

4-1-5 : د الکینونو خواص

1-4-1-5 : د الکینونو فزیکي خواص

د الکینونو فزیکي خواص د هغوی له ایزولوګو الکانونو سره ورته والی لري؛ خو د الکینونو د ایشیدو درجه د هغوی د ایزو لوګ الکانونو څخه ډیره ښکته او کثافت یې لوړ دی. د دې مرکبونو درې غړي چې د کاربن اتومونه یې $C_2 - C_4$ وي، د گاز حالت لري، هغه الکینونه چې $C_5 - C_{18}$ کاربن اتومونه لري، د مایع حالت او له C_{18} څخه پورته د موم یا جامد حالت لرونکي دي. د الکینونو د کاربن د سکلیټ او فضايي ایزومیریو جوړښت، دهغوی په فزیکي خواصو اغیزه لري، لاندې جدول وګورئ:

(5 - 1) جدول: د الکینونو فزیکي ځانګړتیاوې

نوم	فورمول	دوبلې کیدو درجه په °C	د اېشېدو درجه په °C	مخصوصه کثافت
Ethylene	$\text{CH}_2 = \text{CH}_2$	-169	-105	0.570
propene 1-	$\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$	-185.2	-47.8	0.610
butene- 1	$\text{H}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	-130.0	-6.3	0.595
butene- 2	$\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$	cis 138.9	+3.5	0.621
		trans (-105.5)	0.9	0.604
Iosbutene	$\text{CH}_2 = \underset{\text{CH}_3}{\text{C}} - \text{CH}_3$	-140	-6.9	0.594


د ټولو اولفینونو مخصوصه کثافت له یو څخه لږ دی او د ځانګړي بوی لرونکی دی، په اوبو کې ښه نه حل کېږي؛ خو په اوبو کې د هغوی حلیدل د هغوی د ایزولوګو الکانونو په نسبت زیات دی.

5-4-1-2: د الکینونو کیمیايي خواص


د الکینونو کیمیايي خواص دوه ګونې اړیکه، د سګما او پای د اړیکو فضايي ځایونه ټاکي، د سګما د اړیکې د الکتروني ورېځې کثافت د هغه خط له پاسه چې د دواړو اتومونو هستې نښلوي، راټول شوي دي او د پای د اړیکې د الکتروني ورېځې کثافت له دې چاپېریال څخه د باندې شتون لري چې د منفي چارج لویه ساحه یې جوړه کړې ده. تحریک د پای د اړیکې بنسټیزه ځانګړتیا ده، چې د دې الکترونونو اړیکه له هستې سره د سګما د الکترونونو د اړیکې په نسبت کمزورې ده؛ نو له دې کبله په اسانۍ سره قطبي کېږي او الکترون خوښوونکو (Electrophilic) ذرو ته د یرغل لارې چارې برابر ږي، له دې امله د پای اړیکه د هترولیتیکې په بڼه پرې او جمعي تعاملونه ترسره کوي. د سګما او د پای د اړیکې ترمنځ د انرژي توپیر 270 kJ/mol دی، د الکینونو ځینی تعاملونه په لاندې ډول دي:

1 - د الکین هایډروجنیشن

که چیرې ایتلین د نیکل د کتلت په شتون کې هایډروجنیشن شي، ایتان لاسته راځي:






د ایتلین مالیکول په یوه سطحه کې شتون لري؛ یعنې مسطح دی؛ خو د ایتان مالیکول څلور وجهي بڼه لري



2- د الكينونو هلو جنيشن


اولفينونه په عادي شرايطو کې هلو جنونه، په ځانگړې توگه کلورين او برومين په ځان پورې نښلوي او د پارافينونو ډای هلو جنيډونه جوړوي؛ د بيلگې په ډول: د ايتلين تعامل له کلورينو، برومينو او هايډروجن کلورايدو سره وگورئ چې تعامل انډو ترميک دی.




د هلو جنونو تعامل له الكينونو سره د Halogenation په نامه او لاسته راغلي مرکبونه يې د الكايل هلايدونو په نوم ياديږي. د برومين د اوبو بې رنگه کول، د دوه گونې اړيکې د توصيفي تعاملونو له ډلې څخه دي. د دې موخې لپاره د برومين او کاربن تتراکلورايد يا کلورو فارم محلول جوړوي او گټه ترې اخېستل کيږي. د دې تعامل پر بنسټ د مايع تيلو د مشبوعيت درجه ټاکل کيږي.

3- د الكينونو اکسيديشن

الكينونه په اسانۍ سره د بيلا بيلو اکسيداتنونو تر اغيزې لاندې راځي، د همدې ځانگړتياوو په واسطه له پارافينونو او سايكلو پارافينونو څخه توپير پري. د شرايطو په پام کې نيولو سره د الكينونو له اکسيديشن څخه بيلا بيل مرکبونه لاسته راځي:






د الكينونو د سوزيدو په پايله کې کاربن ډاي اکسايډ، اوبه او انرژي لاسته راځي. په عادي شرايطو کې د اکسيديشن عمليه د دوه گونې اړيکې په ځای کې ترسره کيږي، که چيرې الكينونه په پوره پاملرنې سره د پوتاشيم پرمنگناټو د القليو محلول په واسطه اکسيديشن شي، دوه قيمته الکولونه لاسته راځي:



د قوي اکسيد انتونو (د پوتاشيم پر منگنيټ تيزابي محلول او د کروميک اسيد محلول) د عمل په پايله کې د الكينونو دوه گونې اړيکه پرې او دهايډروکاربنونو اکسيجن لرونکي مرکبونه لاسته راځي، د بيلگې په ډول:




بیوتین د درې ایزومیزی اکسیدیشن گورو:



فعالیت



د قوي اکسید انتونوپه واسطه په پوره پاملرنې سره د لاندې الکینونو د اکسیدیشن د تعامل محصول د کیمیايي معادلوپه واسطه روښانه کړئ:



4 - د الکینونو پولی میرایزیشن

الکینونه یو له بل سره جمعي تعاملونه تر سره کوي او په پایله کې پولی میرونه جوړوي؛ د بیلگې په ډول: د ایتلین یو مالیکول د هغه بل مالیکول سره اړیکه ټینګوي او همدا مالیکولونه د هغوی له نورو مالیکولونو سره او همدا رنگه د ایتلین څو مالیکولونه یو له بل سره جمعي تعامل ترسره او د ایتلین پولی میر جوړوي. لومړنی الکین د مونومیر (Monomer) په نوم یا ډیري، (Monomer یوناني کلمه ده چې د یوې برخې مفهوم لري). د مونومیرونو له اړیکو څخه جوړشوی زنځیر د پولی میر (polymer) په نوم یا ډیري چې د هغوی ډیر ساده د ایتلین پولی میر دی، د هغه فورمول $-(\text{CH}_2 - \text{CH}_2)_n -$ څخه دی چې اوږده زنځیرونه جوړوي. د پلاستیک جوړونې په صنعت کې پولی میرونه د مونومیرونو له یوځای کولوچي عمومي فورمول یې $-(\text{CHX} - \text{CH}_2) -$ دی، لاسته راوړي، په دې مونومیر کې X د هلوچنونو ښکارندوی دی او په دې مرکبونو کې کیدای شي چې د X پرځای د CH_3 -گروپ وي، که چېرې X کلورین وي؛ نو د پولی میر عمومي فورمول $-(\text{CHCl} - \text{CH}_2) -$ دی چې Polyvinyl Chloride) P V (په نوم یادېږي، د $-(\text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2)_n -$ فورمول د پولی پروپیلین په نوم یا ډیري

5-1-5: د الکینونو لاسته راوړنه



الکینونه د پارافینونو په نسبت په طبیعت کې لږ موندل کېږي، کوچني اولفینونه په لږه اندازه د نفتي گازونو په مخلوط کې موندل کېږي او لوی اولفینونه په نفتوکې موندل کېږي.

۱- د نفتو انشلاق: که چېرې نفت ټوټه او پیرولیز شي، الکینونه لاسته راځي، د دې تعامل میخانیکیت داسې دی چې لوړو الکانونو ته له 400 - 700 سانتي گراد پورې تودوخه ورکوي؛ په پایله کې د الکانونو را ډیکالونه لاسته راځي او د تعامل په بهیر کې د الکینونو را ډیکالونه هم تر لاسه کېږي:





($\text{CH}_3^\bullet$, $\text{RCH}_2^\bullet$) را ډیکالونه چې په لومړي پړاو کې د C-C د اړیکې د پرې کیدو په پایله کې لاسته راځي، د


لورپو پارافینونو مالیکولونه د یرغل لاندې نیسي د دریم او یا دویم کاربن هایدروجن چې د زنځیر د وروستي او پیل څخه لرې وي، له زنځیر څخه جلا کوي:




وروسته بیا د کاربن - کاربن اړیکه د طاقه الکترون لرونکي کاربن د اتوم ترڅنګ چې د هغه په څنګ کې شته، پرې کیږي او په پایله کې کوچني الکانونه او الکینونه جوړیږي:




په همدې توګه د اړیکې پرې کیدل د (α, β) په ځای کې څو وارې ترسره کیږي او په زیاته کچه اولفینونه او د هغوی له ډلې څخه ایتلین لاس ته راځي:



۲- اولفینونو د لاسته راوړلو مهمه لاره د الکانونو د دې هایدروجنیشن لاره ده، په دې عملیه کې د کرومیم له اکساید څخه د کتلست په توګه ګټه اخیستل کیږي او نوموړی تعامل له 450°C څخه تر 460°C پورې تودوخې کې ترسره کیږي:



۳- د الکانونو دی هایدروجنیشن: که چیرې د ایتایل الکولو ته د ګوګرو تیزابو او یا فاسفوریک اسید په شتون کې تودوخه ورکړل شي، په پایله کې ایتلین او اوبه لاسته راځي:



فعالیت




د ایتلین لاسته راوړنه

د اړتیا وړ لوازم او مواد: ایتایل الکول، د ګوګرو تیزاب، بالون، ستیند د نیونکي (گیرا) سره، د تودوخې سرچینه، تست تیوبونه، کاږه نلونه، درې ستنې لرونکې (سه پایه) او له اوبو څخه ډک تشت.

ګډناره: د (3-5) شکل سره سم دستگاه تیاره کړئ، یو مول ایتایل الکول له ګوګرو تیزابو سره مخلوط کړئ او په یوه بالون کې یې واچوئ، وروسته له دې له 150°C څخه تر 170°C پورې تودوخه ورکړئ، خپلې لیدنې ولیکئ او لاندو پوښتونو ته ځواب ورکړئ:


1 - د ګوګرو تیزاب په دې تعامل کې کوم رول لوبوي؟

2 - د تعامل میخانیکیت یې د کیمیايي معادلې پربنسټ روښانه کړئ .



(3 - 5) شکل: له ایتایل الکولو څخه د ایتلین د لاس ته راوړلو د سټګه

۴- د الکایل هلايدونو د دې هايډرو هلو جنيشن له تعامل څخه هم د هغوی ايزولوگ الکينونه لاسته راځي، په دې تعامل کې د قلیو له الکولي محلول څخه گټه اخېستل کېږي؛ د بیلگې په ډول:



2-1-5: ځينې مهم الکينونه


1 - ایتلین

ایتلین د گاز حالت لري، په اوبو کې په لږه او په الکولو کې په زیاته کچه حل کېږي. څرنګه چې ایتلین له میتان څخه یو اتوم کاربن زیات لري؛ نو ځکه په روښانه لمبه سوځي. د ایتلین او د هوا مخلوط چاودیدونکې ځانګړتیا لري؛ نو باید له هغه سره په زیاته پاملرنه کار وشي.

ایتلین د عضوي مرکبونو له وچ تقطیر څخه لاسته راوړل کېږي او تل روښنایي لرونکي گازونه ایتلین گاز هم لري. ایتلین د نفتو په گازونو کې موندل کېږي.

2 - پروپیلین (C₃H₆)


پروپیلین د گاز په حالت پیدا کېږي او په صنعت کې هغه د کرکنګ په لاره د نفتو د گازونو او د پروپان له دې هايډریشن څخه لاسته راځي:



۳ - بیوتلین (C₄H₆)


بیوتلین د دریو ایزومیرونو لرونکی دی چې عبارت دي له 1-butene, 2-butene او Isobutene دا مرکب او د هغه ایزومیرونه د گاز په حالت موندل کېږي چې د الکانونو له فرکشن څخه حاصلېږي، بیوتان د کرکنګ فرکشنی تعامل پربنسټ ترلاسه کېږي، د بیوتان له دې هايډرو جنيشن څخه 2- بیوتین، یا ډای میتایل، وینایل

(Di methylvinyl) لاسته راځي.



4 - سایکلوپنتین C_5H_8 (Cyclopentene)

په عادي شرایطو کې سایکلوپنتین مایع حالت لري او په 44°C کې په ایشیدو راځي، دا مرکب کیدای شي چې له سایکلوپنتان څخه په لاندې توګه په لاس راشي:



ځانونه وازموي؟

- له 9.2 گرامو ایتانول څخه، ایتلین تر لاسه شوی دی :
- الف - څو موله ایتلین لاسته راغلی دی؟
- ب - څولتر هایدروجن ته د ایتلین د هایدروجنیشن لپاره اړتیا ده؟


2-5: الکاینونه (Alkynes)

الکاینونه غیر مشبوع هایدروکاربنونه دي چې د هغوی د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه شته. د الکاینونو لومړی مرکب استلین دی؛ نو له دې کبله هغوی د استلین د کورنۍ په نوم هم یاد شوي دي، د دې هایدروکاربنونو زنځیر هم واز دی او په خپل مالیکول کې یوه یا څو درې ګونې اړیکې لري. که چیرې له الکینونو څخه د هایدروجن دوه اتومه جلا شي، د هغوی اړونده الکاینونه لاسته راځي. الکاینونه چې یوه درې ګونې اړیکه لري، عمومي فورمول یې $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ دی، په دې فورمول کې کیدای شي $n \geq 2$ وي او ډېر کوچنی مرکب د هغوی استلین دی چې سیستماتیک نوم یې Ethyne دی؛ که چیرې ynes وروستاري د هغو د لاین رقمونو ته چې د کاربن د اتومونو شمېر رانېسي، ورزیات کړای شي، د هغوی اړوند الکاین نوم لاسته راځي.

1-2-5: د الکاینونو جوړښت

په الکاینونو کې بنسټیز لامل د هغوی په مالیکول کې د درې ګونو اړیکو ($\text{C} \equiv \text{C}$) شتون دی. درې ګونې اړیکې په جوړښت کې درې جوړې شریک شوي الکترونونه (شپږ الکتروني اړیکه) برخه لري. د کاربن هغه اتومونه چې درې ګونې اړیکه جوړوي، د sp - هایبریدیزیشن په حالت کې شتون لري، هر یو یې د سګما یوه اړیکه لري چې 180° درجې زاویه یې د اړیکو ترمنځ شته ده، د کاربن د اتومونو د p دوه نه هایبرید شوي اوربیتالونه د sp په اوربیتالونو باندې عمود ولاړ دي چې 90° زاویه یې جوړه کړې ده او د دویم کاربن د اتوم له p اوربیتالونو سره موازي دي، ددې اوربیتالونو هره جوړه څنګ پرڅنګ ننوتنه کوي او دوه د پای

(π) اړیکې جوړوي. درې گونې اړیکه د یوې سگما (σ) اړیکې او دوه د پای (π) له اړیکو څخه جوړه شوې ده، د (4-5) شکل د اړیکو ځایونه د استلین په مالیکول کې ښیي:



شکل: په استلین کې د اړیکو ځای او څرنگوالی (4 - 5)

2-2-5: د الکاینونو ایزومیرونه

د الکاینونو ایزومیري د کاربنی زنځیر په جوړښت او په زنځیر کې د درې گونې اړیکې ځای پورې اړه لري چې د الکینونو له ایزومیریو سره لږ څه ورته دی؛ خو د سیس او د ترانس ایزومیري نه لري؛ ځکه د سگما دوه اړیکې چې د کاربن د دوو اتومونو په واسطه جوړې شوي دي، د sp هایبرید په حالت کې له 180° درجې زاوېې سره په یوه نیغ خط کې ځای لري، پر دې بنسټ د استلین مالیکول خطي دی. استلین او پروپاین ایزومیري نه لري؛ خو د بیوتاین ایزومیري په لاندې ډول دي:



1 - butyne

2 - butyne


فعالیت



د C_5H_8 , C_6H_{10} , C_7H_{12} جمعې فورمول لرونکو مرکبونو د جوړښتي ایزومیریو او د درې گونې اړیکې ایزومیري ولیکئ.


2-2-3: د الکاینونو نوم ایښودنه

د الکاینونو د نوم ایښودلو کړنلاره د الکینونو په شان ده، په اشتقاقی (Rational) نوم ایښودنه کې د الکاین گروپ د استلین مشتق گڼل شوی دی چې د هغوی دا لاندې بیلگې مطلب روښانه کوي:




Ethyl acetylene

Di methyl acetylene



Methyl Propyl acetylene

Methyl isopropyl acetylene



فعالیت



د هغه مرکب ایزومیری ولیکۍ چې د C_8H_{14} جمعي فورمول لرونکي دي او په اشتقاقی طریقه یې نوم ایښودنه وکړئ.


د (IUPAC) په لاره د الکانونو نوم ایښودل د الکانونو په شان، داسې دي: چې د درې گونې اړیکې ځای د کاربن په نمبرونو سره ټاکل کیږي. د بنسټیز زنځیر نمبر وهل د زنځیر له هغه لوري څخه ترسره کېږي، کوم چې درې گونې اړیکه ورته نژدې وي؛ د بیلگې په ډول:



فعالیت



الف - د لاندې فورمولونو لرونکي مرکبونو نومونه د (IUPAC) په سیستم ولیکئ:



ب - د لاندې مرکبونو مشرح فورمولونه ولیکئ.

a. 4,4 - dimethyl 1 - pentyne b. 4 - methyl 2 - pentyne

c. 3-Methyl-2-hexene -5-yne d. 3,3,3-trifluoro -1-butene

4-2-5 د الکانونو فزیکي خواص

د الکانونو فزیکي خواص د الکانونو خواص ته ورته دي، هغه الکانونه چې له دوو څخه تر څلورو د کاربنونو اتومونه لري، د گاز حالت لري. له پنځو څخه تر شپاړسو د کاربن اتومونو لرونکي د مایع حالت او له 16 څخه پورته د جامد حالت لري. ایټلین په 103°C - تودوخه کې په ایشیدو راځي خو استلین په 83.5°C - کې په ایشیدو راځي.


په اوبو کې د کوچنیو الکانونو د حل کیدلو وړتیا د هغوی د ایزولوگ الکانونو او الکانونو څخه زیاته ده، خو سره له دې هم په اوبو کې لږ حل کیږي. (5 - 2) جدول د ځینو الکانونو فزیکي خواص ښیي.



(5 - 2) جدول: ځينې الكاينونه او د هغوي فزيکي ځانگړتياوې.

نوم	د کاربنونو شمېر	جوړښتيز فورمول	د ویلي کېدو درجه	د اېشېدو درجه	کثافت g/L
Acetylene	2	$\text{CH} \equiv \text{CH}$	-80.8°C	-75°C	
Propyne	3	$\text{CH} \equiv \text{CCH}_3$	-103°C	-23°C	
1-butyne	4	$\text{CH} \equiv \text{CCH}_2\text{CH}_3$	-125.7°C	8°C	
2-butyne	4	$\text{CH}_3-\text{C} \equiv \text{C}-\text{CH}_3$	-32.3°C	27.0°C	0.691
1-pentyne	5	$\text{CH} \equiv \text{CCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	-106°C	40°C	0.69
2-pentyne	5	$\text{CH}_3\text{C} \equiv \text{CCH}_2\text{CH}_3$	-109°C	56°C	711.0
1-hexyne	6	$\text{CH} \equiv \text{CCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	-132°C	71°C	716.0
2-hexyne	6	$\text{CH}_3\text{C} \equiv \text{CCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	-89°C	84°C	0.73
3-hexyne	6	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C} \equiv \text{CCH}_2\text{CH}_3$	-101°C	84°C	0.723
1-heptyne	7	$\text{CH} \equiv \text{C}(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$	-81°C	100°C	0.738
1-octyne	8	$\text{CH} \equiv \text{C}(\text{CH}_2)_5\text{CH}_3$	-79°C	126°C	0.747
1-nonyne	9	$\text{CH} \equiv \text{C}(\text{CH}_2)_6\text{CH}_3$	-50°C	151°C	0.758
1-decyne	10	$\text{CH} \equiv \text{C}(\text{CH}_2)_7\text{CH}_3$	-44°C	174°C	0.767

5-2-5: د الكاينونو کيميايي خواص

د الكاينونو کيميايي خواص د درې گونې اړيکې په ځانگړتيا او د کاربن د اتومونو د sp هابرېد له ځانگړتياوې سره اړيکه لري. د نه مشبوع هايډرو کاربنونو د تعاملونو ځانگړتيا د هغوی له ډلې څخه د الكاينونو ځانگړتيا دا ده چې جمعي تعاملونه تر سره کوي؛ خو د الكاينونو تعاملونه په دوو پړاونو کې ترسره کېږي. په لومړي پړاو کې جمعي تعامل په درې گونې اړيکه کې ترسره کېږي چې اولفين او دهغه مشتقات لاسته راځي، په دويم پړاو کې اولفينونه او د هغوی جوړ شوي مشتقات په الکانونو او د هغوی په مشتقاتو بدلون مومي. له هايډروجن برومايد سره د استلين د تعامل ميخانيکيت په لاندې ډول مطالعه کوو:






درې گونې اړیکه د دوه گونې اړیکې په نسبت د تودوخې په مقابل کې کلکه ده، دا مطلب د استلین لاسته راوړنه د میتان او د هغه له هومولوگو څخه د تودوخې ($1200^\circ\text{C} - 1500^\circ\text{C}$) د انشقاق په واسطه پیربڼه روښانه کېږي، د S د اوریتال د برخې زیاتوالي د اوریتالونو د هایبرید په حالتونو کې د کاربن د اتومونو برېښنايي منفي خاصیت زیاتېږي، د کاربن او هایدرجن ترمنځ اړیکه ډیره قطبي کېږي:

(3 - 5) جدول: د کاربن د هایبرید ډول او د هغه برېښنايي منفیت

هایبریدیزیشن	په هایبرید اوریتالونو کې د S د اوریتال برخه	برېښنايي منفیت EN
sp^3	$\frac{1}{4}$	2.5
sp^2	$\frac{1}{3}$	2.62
sp	$\frac{1}{2}$	2.75

د استلین د تیزابي خاصیت لامل هم په مالیکول کې د C-H اړیکې په څرگنده قطبیت پورې اړه لري. د اړیکې هومولیتیکي پرې کیدل او د رادیکال جوړیدل ستونزمن دی؛ خود اړیکې هترولیتیکي پرې کیدل په آسانی سره ترسره کېږي:



د الکاینونو ځنې تعاملونه لاندې مطالعه کوو:


1- : جمعې تعاملونه

الف - د هلو جنونو نښتل: د هلو جنونو نښتنه په الکاینونو کې، د اولفینونو په نسبت ستونزمنه ده او ورو، ورو ترسره کېږي. د برومین د اوبو د رنګ له منځه تلل د څو گونې اړیکې توصیفې تعامل روښانه کوي.



1,2 - di bromo ethene

ب - په الکاینونو باندې د هایدرجن هالایدونو نښلول: هایدرجن هالایدونه د درې گونې اړیکې د پاسه د هغوي د نښلولو د دوه گونې اړیکې په پرتله له ستونزو سره ترسره کېږي:




Vinyl fluoride

(Fluoro ethene)

2- : د الکاینونو هایدرجنیشن


د الکاینونو هایدرجنیشن د الکینونو په نسبت ورو، ورو ترسره کېږي:




Ethene

3- : د الکاینونو هایدریشن

د الکاینونو هایدریشن د الکینونو په نسبت په اسانۍ تر سره کیږي؛ خو د کتلتستونو؛ لکه د ګوګرو تیزاب او د سیمابو دوه ولانسه مالګې شتون اړین دی. په لومړي پړاو کې بې ثباته مرکب جوړېږي؛ ځکه د هایډروکسیل د ګروپ شتون په هغه کاربن کې چې دوه ګونې اړیکه ولري، شونې نه دي؛ نو له دې کبله د هغه بڼه بدلون مومي؛ یعنې ایزومیرایزیشن یې ترسره کیږي او الډیهایدونه جوړېږي، که چیرې استلین هایدریشن شي، اسیت الډیهاید جوړېږي:




د پورتنۍ تعامل پربنسټ په صنعت کې اسیت الډیهاید لاسته راوړي. د هایدریشن په پایله کې د استلین له هومولوګونو څخه د هغه ایزولوګ کیتونونه جوړېږي:




4- : د الکاینونو اکسیدیشن

الکاینونه په اسانۍ سره اکسیدي کیږي او د اکسیدیشن عملیه د زنځیر د درې ګونې اړیکې له برخې څخه په پرې کیدو سره یو ځای ترسره کیږي:



الکاینونه د پوتاشیم پرمنگنات او بلن محلول بې رنگه کوي چې له دې تعامل څخه د درې ګونې اړیکې د توصیفې پیژندنې لپاره کیدای شي ګټه واخېستل شي. لاندې معادله پورتنۍ مطلب روښانه کوي:





5- : د الکاینونو پولیمیرایزیشن

الکاینونه کولی شي چې د کتلتستونو په شتون کې یو له بل سره تعامل وکړي او د شرایطو په پام کې نیولو سره بېلابېل مرکبونه جوړ کړي:





که چیرې استلین د تودوخې او سکرو په شتون کې ترای میرایزیشن شي، بنزین لاسته راځي:



6- : د الکاینونو تعویضي تعاملونه



د هایدروجن اتومونه د استلین په مالیکول او د هغه مونو الکایل ($\text{CH} \equiv \text{C} - \text{R}$) په مشتقاتو کې د فلزونو په واسطه سره د بې ځایه کیدو قدرت لري. د استلین او د هغه د مونو الکایل مشتقاتو ($\text{CH} \equiv \text{C} - \text{R}$) د هایدروجن اتومونه د قوي القلیو د اغیزې له امله؛ یعنې د القلی فلزونو د امیدونو محلول په مایع امونیا کې د القلی فلزونو په واسطه بې ځایه کېږي او اسیتلایدونه (acetylides) جوړوي:



په پورتنی تعامل کې الکاینونو د تیزابونو په توګه عمل کړی او قوي القلیو ته یې پروتون ورکړی دی، اسیتلایدونه د مالګو په شان مرکبونه دي او د اوبو په واسطه هایدرولیز کېږي. د استلین تیزابي خاصیت له اوبو څخه کمزوری دی؛ خود ایتلین او ایتان په نسبت ډېر دی. د ګرینارډ معرف ($\text{R} - \text{MgX}$) له الکاینونو سره تعامل کوي، اسیتلایدونه جوړوي:






سودیم اسیتلاید او مګنیزیم اسیتلاید په بیلا بیلو سنتیزونو کې په کار وړل کېږي. کلسیم کار باید هم یو اسیتلاید دی. که چیرې د سپینوزرو نایتریت او د مسو یو ولانسه نایتریت امونیا یې محلول ته له استلین سره تعامل ورکړل شي، په وار سره سپین او خرمايي رنګه رسوب ترلاسه کېږي چې په وچ حالت کې د چاودیدنې ځانګړتیا لري:



فعالیت




د لاندې تعاملونو معادلې بشپړې کړئ:



3-5 : استلین

خالص استلین بوی نه لري، د هغه استلین بد بوی چې له کلسیم کار باید څخه لاسته راځي، په هغه کې هایدروجن سلفایډ او فاسفین د مخلوطو په بڼه شتون لري، استلین په اوبو کې منحل دی، د استلین مخلوط له هوا سره د چاودیدنې ځانګړتیا لري، په دې بنسټ له استلین سره د کار کولو په وخت باید ډېر پام وشي. د استلین له


سوځيدو څخه په ډيره کچه تودوخه 1300KJ/mol توليد يږي. استلين چې د الکاینونو لومړی مرکب دی، په ډيرې تودې لمبې سره په هوا کې سوزېږي او 3000°C تودوخه توليد وي چې د د فلزونو په پرې کولو او ولدینگ کولو کې ترې گټه اخېستل کېږي، دا مرکب د اوبو او کلسيم کاربايد له تعامل څخه لاسته راځي:



د استلين ځينې فزیکي خواص (5 - 2) جدول کې ليکل شوي دي


1-3-5: د استلين کيميايي خواص

۱ - د استلين د سوزيدو تعامل: استلين په آزاد هوا کې سوزې، اوبه، کاربن ډاي اکسايډ او انرژي توليدوي:



2 - د استلين جمعۍ تعاملونه

الف - استلين له هايډروجن سره تعامل کوي، په لومړي پړاو کې ايتلين او په دوهم پړاو کې ايتان جوړوي:



ب - استلين له هلوچنونو سره تعامل کوي د الکینونو هلايد او د الکانونو هلايد جوړوي



هغه ټول تعاملونه چې الکاینونه يې سرته رسوي، استلين يې هم سرته رسوي.

2-3-5: د استلين لاسته راوړنه

1 - د کلسيم کاربايد له هايډروليز څخه


فعاليت




د کلسيم کاربايد څخه د استلين لاسته راوړنه

د اړتيا وړ مواد او لوازم: د کاربايد تيره، مقطرې اوبه، کوږنل، بنښنه يي تست تيوب، له اوبو څخه ډک تشت، سوري لرونکی کارکي سريوش او ايرلين ماير.

ګډنلاره: لږڅه کلسيم کاربايد په يوه ايرلين ماير کې واچوئ او د هغه سر له سوري لرونکي کارکي سريوش سره و تړئ، وروسته د کارکي سريوش له سوريو څخه کوږنل او يوقيف ايرلين ماير ته ور دننه کړئ او د قياف د لارې کلسيم کاربايد باندې اوبه ور زياتې کړئ، کوږنل تست تيوب چې د اوبو په ډک تشت کې سرچپه اېښودل شوی دی، سمون ورکړئ، خپلې ليندې وليکئ.



2- که چیرې ډای برومواتان ته د پوتاشیم هایدروکساید له الکولي محلول سر د تودوخې په شتون کې تعامل ورکړل شي، استلین لاسته راځي:




3- که چیرې کاربن او هایدروجن د برېښنايي قوس له لارې د برېښنا په بهیر کې واچول شي، استلین لاسته راځي:



لومړی مثال: که چیرې 5g کلسیم کارباید په اوبو کې واچول شي، په STP شرایطو کې 1.12L استلین لاسته راځي، د خالص کلسیم کارباید سلنه په دې تعامل کې ومومئ.

حل: په لومړي پړاو کې د کلسیم اسیټلایډ او اوبو د تعامل کیمیاوي معادله لیکو:



$$22.4\text{L} \quad - \quad 1\text{mol}$$

$$1.12\text{L} \quad - \quad n$$






$$n = \frac{1.12\text{L} \cdot 1\text{mol}}{22.4\text{L}} = 0.05\text{mol}$$

$$n_{\text{CaC}_2} = \frac{m}{M} \Rightarrow m_{\text{CaC}_2} = n \cdot M = 0.05\text{mol} \cdot 64\text{g/mol} = 3.2\text{g}$$

$$m_{\text{CaC}_2} = 3.2\text{g} \left\{ \begin{array}{l} 5 - 3.2\text{g} \\ 100 - w\% \end{array} \right\}$$

$$W\%_{\text{CaC}_2} = \frac{3.2\text{g} \cdot 100}{5\text{g}} = 64\%$$

دوہم مثال : د CaCO_3 د تعامل له بهیر څخه لاندې مرکبونه په لاسته راوړئ:
الف - اسیتیلین، ب- ایتیلین، ج - ایتان.



د پنځم څپرکي لنډيز



* د الکینونو د مرکبونو هومولوژي سلسله د یو میتیلین ګروپ $(-\text{CH}_2-)$ په کچه یوله بل څخه توپیر لري چې د هغوی عمومي فورمول C_nH_{2n} دی.


* که چېرې له الکانونه څخه دوه اتومه هایډروجن لرې شي، د هغوی ایزولوګ الکین لاسته راځي
 * په فضايي ایزومیري کې (Stereo isomeris) یوناني کلمه ده چې د جامد او کلکو جسمونو په معنا ده، پردې بنسټ دا ایزومیري هغو مرکبونو پورې اړه لري چې د کلک فضايي جوړښت لرونکي دي او د هغوی هندسي بڼې په فضا کې بدلون کوي.

* د الکینونو کیمیايي خواص دوه ګونې اړیکې د سګما او پای د اړیکو فضايي ځایونه ټاکي، د سګما د اړیکې د الکتروني ورځې کثافت د هغه خط له پاسه چې له دواړو اتومونو هستې سره نښلوي، راټول شوي دي او د پای د اړیکې د الکتروني ورځې کثافت له دې چاپیریال څخه د باندې شتون لري چې د منفي چارج لویه ساحه یې جوړه کړې ده. هڅونه د پای د اړیکې بنسټیزه ځانګړتیا ده، چې د دې الکترونونو اړیکه له هستې سره د سګما د الکترونونو له اړیکې څخه کمزورې ده؛ نو له دې کبله په اسانۍ سره قطبي کيږي او الکترون خوښوونکو ذرو (Electrophilic) ته د یرغل آسانتیا برابر ږي، پر دې بنسټ د پای اړیکه د هترولیتیکي په بڼه پرې او جمعي تعاملونه ترسره کيږي. سګما او پای د اړیکو ترمنځ د انرژۍ توپیر 270KJ/mol دی.

* الکینونه یو له بل سره جمعي تعاملونه سرته رسوي او په دې ترتیب پولي میرونه جوړوي.
 * الکانونه غیر مشبوع هایډروکاربنونه دي چې د هغوی د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه شته. د الکینونو عمومي فورمول C_nH_{2n-2} دی، په دې فورمول کې کیدای شي چې $n \geq 2$ وي او د هغوی ډېر کوچنی مرکب استلین دی چې د هغه سیستماتیک نوم Ethyne دی. که چېرې د yne وروستاړي هغه لاتین رقمونو ته چې د کاربن د اتومونو شمېر په الکانونو کې ښيي، ورزیات کړای شي، د هغوی اړونده الکان نوم لاسته راځي.

په اوبو کې د کوچنیو الکانونو د حل کیدلو وړتیا د هغوی له ایزولوګ الکینونو او الکانونو څخه زیاته ده، خو سره له دې هم په اوبو کې لږ حل کيږي.

* د استلین د تېزابي خاصیت لامل هم په مالیکول کې د $\text{C}-\text{H}$ اړیکې په څرګنده قطبیت پورې اړه لري، د اړیکې هومولیتیکي پرې کیدل او د رادیکال جوړېدل ستونزمن دی؛ خو د اړیکې هترولیتیکي پرې کیدل په



اسانۍ ترسره کيږي:

* د استلین له سوزېدو څخه ډېره زیاته تودوخه (1300kJ/mol) تولیدېږي چې د فلزونو د پریکېدو په موخه ترې ګټه اخیستل کېږي.

* د مارکوف نیکوف د قاعدې په اساس د الکین او یا د تعامل له HX سره هایډروجن په هغه کاربن باندې نصب کېږي چې د هغه هایډروجنونو زیاد او هلوجن په هغه کاربونونه باندې نصب کېږي چې د هغه هایډروجن کم دي.

د پنځم څپرکي پوښتنې او تمرین

څلور ځوابه پوښتنې

- 1 - د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ کومه اړیکه شتون لري ؟
الف - یو ګونې، ب - دوه ګونې، ج - درې ګونې، د - ایوني.
- 2 - دوه ګونې اړیکه له ----- څخه جوړه شوې ده :
الف - یوه د سګما σ اړیکه او یوه د پای π اړیکه، ب - دوه سګما اړیکې، ج - دوې د پای اړیکې د-هیڅ یو
- 3 - د کاربن هغه اتومونه چې په خپل منځ کې دوه ګونې اړیکه لري، د هایبرید یزیشن په کوم حالت کې شتون لري ؟

الف - sp^3 ، ب - sp^2 ، ج - sp ، د - sp^3d^2 .

4 - د $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{C}(\text{CH}_3)_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ مرکب نوم عبارت دي له:

الف - Iso octane، ب - 2-Heptene، ج - 4-Methyl، د - هیڅ یو

5 - دوه ګونې اړیکې د درې ګونې اړیکې په نسبت په ----- اکسیډي کېږي .

الف - ورو، ب - چټکتیا، ج - یوشان، د - نه اکسیډي کېږي.

6 - د $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH} \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4} + \text{H}_2\text{O}$ تعامل یو محصول عبارت دی له:


الف - $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ ، ب - $\text{CH} \equiv \text{CH}$ ، ج - $\text{CH}_3 - \text{CH}_3$ ، د - CO_2

7 - الکانونه د یوې ----- اړیکې لرونکي دي

الف - درې ګونې، ب - دوه ګونې، ج - یوه ګونې، د - هیڅ یو.

8 - C_nH_{2n} عمومي فورمول په کومو هایډروکاربنونو پورې اړه لري ؟

الف - الکانونه، ب - الکانونه، ج - سایکلو الکانونه، د - ب اوج دواړه سم دي.



9 - په الکانونو باندې د هلوځونو نښلیدل له اولفینونو څخه په ----- تر سره کیږي.

الف - سست او ورو ب - چټکتیا، ج - په اسانۍ د - تعامل نه کوي

10 - که چیرې د yne وروستاړی په هغو لاتیڼو رقمونو باندې چې د کاربن د اتومونو شمېر په یو مرکب کې

ښیي، ورزیات شي، د هغه د اړوند --- نوم لاسته راځي.

الف - الکانونه، ب - الکینونه، ج - الکانونه، د - سایکلو الکینونه.

11 - د برومین د اوبو درنګ له منځته تلل د ----- اړیکې توصیفې تعامل ښکاره کوي:

الف - څوګونو، ب - یوه ګونو، ج - الف اوب دواړه، د - هیڅ یو.

12 - د $\text{CH}_2\text{Br}-\text{CH}_2\text{Br} + 2\text{KOH} \xrightarrow{(\text{Alcohol})}$ تعامل محصول ----- دی.

الف - $2\text{H}_2\text{O}$ ، ب - 2KBr ، ج - $\text{CH} \equiv \text{CH}$ ، د - هیڅ یو "

13 - داستلین د تیزابي خاصیت دلرلو لامل د هغه په مالیکول کې د ----- اړیکې په ښکاره قطبیت پورې اړه لري.

الف - $\text{C}-\text{C}$ ، ب - $\text{C}-\text{H}$ ، ج - $\text{C}=\text{C}$ ، د - $\text{C}=\text{C}$.

14 - $\text{CH} \equiv \text{CH} + \text{H}_2 \longrightarrow$ تعامل محصول له ----- څخه عبارت دی:

الف - CH_3-CH_3 ، ب - $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ ، ج - $\text{CH} \equiv \text{CH}$ ، د - هیڅ یو.

15 - د sp - hybryde حالت لرونکي کاربن د الکترونیکاتیویټی درجه له لاندې رقمونو څخه کوم یو یې

ښکاره کوي.

الف - 2.75 ب - 2.5 ج - 2.65 د - 2.3




تشریحي پوښتنې




1 - د هغه الکان مالیکولي فورمول تر لاسه کړئ چې د هغه په 0.63 گرامه کتله کې، 0.07 گرام هایډروجن

شامل وي.

2 - د کاربن د ټولو اتومونو د هایبرید حالت چې په $\text{CH}_3-\text{C} \equiv \text{C}-\text{CH}=\text{CH}_2$ کې شتون لري، وټاکئ.

3 - دا لاندې مرکبونه د IUPAC په لارې نوم ایښودنه وکړئ:





4 - د لاندې مرکبونو د جوړښت فورمولونه وليکئ



a- 1,2 -dichloro ethene b- 2,3 - dimethyl -2-pentene

c - 1,3- dibromo cyclo hexene d- Cis 3,4 dibromo -3-hexene

e- 4 -methyl 2-pentyne f-2- pentyne



g-3-chloro-2-ethyl-1-pentyne h-1,3-pentadiene

5 - دا لاندې کيميايي معادلې د مارکوف نیکوف د قاعدې په پام کې نيولو سره بشپړې او روښانه کړئ:



6 - د الکاینونو د تعویضي تعاملونو په اړه خپل معلومات وليکئ.

7 - له لاندې مرکبونو څخه کوم یو د سیس او ترانس ایزومیري لرونکي دي؟ هغه وليکئ:



شپږم څپرکی

اروماتيکي مرکبونه (Arenes)

Fuel Pump Station


د 19 پېړۍ د دويمې نيمايي په پيل کې هغه مرکبونه د اروماتيک په نامه ياديدل کوم چې له طبيعي عطري موادو څخه په لاس راتلل، اروماتيک مرکبونه د خواصو له کبله له الفاتيکو مرکبونو څخه توپير لري، په اوسني وخت کې اروماتيک مفهوم دکيميا له لحاظه د ښه بوی (عطرو) سره هيڅ اړيکه نه لري. د دې کورنۍ مرکبونه په خپل ماليکول کې باثباته کاربنې کړۍ لري چې د ځانگړو اړيکولرونکي دي. په دې څپرکي کې د اروماتيکو مرکبونو په اړه معلومات وړاندې کېږي او دهغو په مطالعې به پوه شئ چې اروماتيکونه کوم ډول مرکبونه دي؟ د دې کورنۍ لومړنی مرکب کوم دی؟ زموږ په ژوند کې کوم رول لوبوي؟ څرنگه کولی شو چې دا مرکبونه په لاس راوړو؟

1-6: د بنزین جوړښت

داروماتیکو مرکبونو لومړنی مرکب بنزین دی چې په 19 پیړۍ کې د انګلیسي فزیک پوه مایکل فارادی (Mycal Farady) په واسطه د عضوي مرکبونو څخه لاسته راغلی دی.


څه موده وروسته د اروماتیک بېلابېل مرکبونه په عطرونو کې تر لاسه شول او څرګنده شوه چې د اړوندو کیمیايي تعاملونو په واسطه کیدای شي د مرکبونه په بنزین بدلون ومومي. په لومړي سر کې دا مرکبونه د بنزین د مشتقاتو په نوم او وروسته د اروماتیک مرکبونو یا عطري موادو په نوم نومول شوي دي؛ ځکه د دوی زیاتره قوی او په زړه پورې بوی لري.

د بنزین په اندازه چې یو ساده اروماتیک مرکب دی، نورو مرکبونو دومره د پوهانو پام ځان ته نه وه گرځولی؛ د دې کبله علماوو د بنزین لپاره د ډیرو زیاتو جوړښتیزو (ساختماني) فورمولونو وړاندیز کړی دی چې د هغوی له ډلې څخه په 1865 کال کې د کیکولي وړاندې شوی فورمول د بنزین لپاره ډېر برابر دی، د کیکولي له فورمول سره سم بنزین 5,3,1 سایکلو هگزاتراین (1,3,5-cyclohexatriene) دی چې یو هایډروکاربن عضوي د شپږ کاربنه حلقوي د درې جوړو اړیکو لرونکی مرکب دی.



د کاربن او هایډروجن د ټولواتومونو دا جوړښت یوشان ارزښت او د بنزین ځینې نورې ځانګړتیاوې روښانه کوي؛ خو دا فورمول نه شي کولی روښانه کړي چې ولې بنزین د غیر مشبوع هایډروکاربنونو خواص نه لري؟ بنزین د غیر مشبوع مرکبونو د تعاملونو ځانګړتیاوې له ځان څخه نه ښکاره کوي؛ یعنې د برومین اوبه او د پوتاشیم پرمنګنات د القلیو محلولو رنگ ته بدلون نه شي ورکولی، بنزین له برومین سره د جمعي تعاملونو پرځای تعویضي تعاملونه ترسره کوي؛ کله چې د بنزین د مالیکول د هایډروجن یو اټوم د برومین په واسطه تعویض شي، د C_6H_5Br مرکب جوړېږي.


د بنزین د جمعي تعاملونو امکان په ځانګړو شرایطو کې په سترګو کیږي او د هغه له هایډروجنیشن څخه د کتلست په شتون کې سایکلو هگزان لاسته راځي:



له پورتنۍ څېړنې څخه معلومېږي چې بنزین غیر مشبوع خواص له ځان څخه ښکاره کوي؛ خو په عادي شرایطو کې یې دا ځانګړتیا کمزورې ده، د بنزین د تودوخې مقاومت تر $900^\circ C$ پورې دی. د کیمیايي اړیکو په اړه د الکتروني نظریاتو پراختیا او د میخانیک کوانت نظریو د اروماتیکو مرکبونو د ځانګړتیاو د روښانولو امکان برابر کړی دی. د بنزین د مالیکول انرژي کیدای شي چې په بېلابېلو لارو وټاکل شي، د هغوی پایلې ښکاره کوي چې د بنزین رښتیني مالیکول، له سایکلو هگزاتراین څخه لږه انرژي لري، کومه چې د هغوی اړیکو ښودلې ده، د سایکلو هگزاتراین د مالیکول دسوزیدو تودوخه $3453 kJ/mol$ ده؛ خو د بنزین د مالیکول دسوزیدو تودوخه چې په تجربې ډول لاسته راغلی، ده. $2303 kJ/mol$ د سایکلو هگزین هایډروجنیشن د

انرژي له ازادیدو سره ترسره کیږي؛ په داسې حال کې چې د بنزین هایدروجنشن د انرژي له جذب له امله ترسره کیږي. د بنزین او هغه ته د ورته مرکبونو کیمیايي خواص ډېر حیرانونکي دي، سره له دې چې د بنزین مرکبونه غیر مشبوع دي؛ خو الکینونو او الکانونو ته ورته دي؛ جمعي تعاملونه په دې مرکبونو کې ډېر لږ ترسره کیږي، برعکس تعویضي تعاملونه په ښه توګه تر سره کوي، له دې امله اروماتیک مرکبونه له عادي غیر مشبوع مرکبونو څخه توپیر لري او د هغوی ځانګړي خواص د بنزین په کړۍ او د هغه په مرکبونو پورې اړه لري. چه هغه سره تعامل کوي د بنزین جمعي فورمول C_6H_6 دی او له هګزان (C_6H_{12}) څخه د هایدروجن شپږ اتومه او له هګزین څخه د هایدروجن څلور اتومه کم لري. په بنزین کې د اړیکو اوږدوالی 140 پیکامتر او د هغه د اړیکو جوړښت د ریزونانس په حالت دی کوم چې په لاندې شکل کې لیدل کیږي:


د بنزین د مالیکول په جوړښت کې شپږ الکترونونو د π اوربیتالو نیولي دي، د بنزین مالیکول په کاربنی اسکلیت کې یې د سګما (σ) اړیکې مالیکولي اوربیتالونه د کاربن د اتومونو د $SP^2 - hybrid$ سره مستقیم له یو بل سره او د هایدروجن د اتوم سره د مستقیم ننوتلو له کبله جوړ شوي دي. (6 - 1) شکل د بنزین په مالیکول کې د اړیکو اوږدوالی او د اړیکو زاویې او ریزونانس حالت ښکاره کوي:




(6 - 1) شکل: (الف): د اړیکو اوږدوالي او زاویې (ب) د بنزین په مالیکول کې د اوربیتالونو ښودل

څرنګه چې اروماتیک هایدروکاربنونه غیر مشبوع دي؛ نو له دې کبله هغوی د ene په وروستاړي، الکینونو ته ورته او د Ar مختاړي چې له ارومات (Aromate) څخه مشتق شوی دی، نوم ایښودنه شوي ده؛ پر دې بنسټ د هغوی سیستماتیک نوم Arene ایښودل شوی دی. د اړین مرکبونه د بنزین په ساده بڼې سره بېره د څو کړېزو مرکبونو په بڼه هم شته؛ د بیلګې په ډول: د بنزین د دوو یا څو کړیو د یو ځای کیدلو له امله بېلابېل مرکبونه جوړېږي. نفتالین $C_{10}H_8$ او انتراسین $C_{14}H_{10}$ څو کړیز دوه ډېر مهم مرکبونه دي، د هغوی فورمول د بنزین د کړیو او له $-C_2H_2$ (ایتلین) ګروپونو څخه جوړ شوی دی.

د اروماتونو د کړکټر په اړه د هیوکل (Huckel) په نوم عالم یوه قاعده منځ ته راوړه چې د دی قاعدې په بنسټ هغه کړۍ د اروماتیک ځانګړتیا لري چې د هغوی د پای (π) الکترونونو شمېر د $(4n+2)$ سره سمون ولري، په دې فورمول کې n د کړیو شمېر ښکاره کوي. د اروماتیکو سیستمونو بیلګې چې د پای 10 او 14



Anthracene



Naphthalene

الکترونونو لرونکي دي، عبارت دي له:


په (6 - 1) جدول کې د بنزین د مشتقاتو ډولونه د هغود سیستماتیک او مروجو نومونو سره وړاندې شوي دي، نوموړي مرکبونه د ډېرو سکرو له تقطیر څخه جوړېږي.

(6 - 1) جدول: د بنزین مشتقات له سیستماتیک او مروجو نومونو سره


د استعمال ځایونه يي	مروج نوم	سیستماتیک نوم	فورمول
د پولی میرونو برابرولو لپاره	فینول	هایدروکسي بنزین	<chem>Oc1ccccc1</chem>
د رنگونو ځلا او د لاکو په جوړولو کې کارول کېږي	تالوین	میتایل بنزین	<chem>Cc1ccccc1</chem>
د رنگونو ځلا او د حشرو وژونکو په موادو کې کارول کېږي	اورتوزایلین	1,2Dimethyl Benzene	<chem>Cc1ccccc1C</chem>
	میتا زایلین	Meta 1,3- dimethyl Benzene	<chem>Cc1cccc(C)c1</chem>
	پارا زایلین	Para 1,4- dimethyl benzene	<chem>Cc1ccc(C)cc1</chem>
پولي میرونه جوړوي	ستیارین	ethylene phenyl	<chem>C=Cc1ccccc1</chem>
د کوبې وژلو په توگه کارول کېږي	Naphthalene	Naphthalene	<chem>c1ccc2ccccc2c1</chem>
	انتراسین	Antracine	<chem>c1ccc2cc3ccccc3cc2c1</chem>
له ځینو ناروغیو څخه د مخنيوي لپاره	Biphenyl	Di phenyl	<chem>c1ccccc1-c2ccccc2</chem>
پولي میرونه اورنگه مواد	انیلین	Amino Benzene	<chem>Nc1ccccc1</chem>
	بنزویک اسید	Benzoic acid	<chem>OC(=O)c1ccccc1</chem>
	بنز الدیهاید	بنز الدیهاید	<chem>O=Cc1ccccc1</chem>
په 1440 کال کې د کالو مینخلو پوډر تر لاسه شو	الکایل بنزین سلفونات	الکایل بنز سودیم سلفونات	<chem>Rc1ccc(S(=O)(=O)O[Na])cc1</chem>

2-6: د اروماتیک مرکبونو نوم ایښودنه

زیاتو اروماتیک مرکبونو خپل هغه مروج نومونه ساتلي دي کوم چې د هغوی اصلي پیدایښت پورې اړه لري؛ د بیلګې په ډول: تالوین (Toluene) ($C_6H_5 - CH_3$) د ونو له کنډ څخه چې د (Baunde Tolu) له ډول څخه دی او په جنوبي امریکا کې موندل کېږي، لاسته راغلی دی؛ خود هغه سیستماتیک نوم Methyl benzene دی؛ ځکه د بنزین د مالیکول د هایدروجن له اتومونو څخه یو یې د CH_3 پاتې شوني په واسطه تعویض شوی دی، که چېرې څو پاتې شونو د بنزین د هایدروجن اتومونه یې تعویض کړي وي، تر لاسه شوی مرکب بېلابېلې ایزومیرۍ لري چې د هغوی بیلګه کیدای شي، ډای میتایل بنزین Dimethylbenzene وړاندې کړای شي :




درې پورتنۍ ایزومیرۍ د مروجو نومونو د (Xylene) په نامه یادېږي؛ ځکه دوی د لرګیو له تقطیر څخه حاصل شوي دي چې د لرګي یوناني نوم (xulon) دی، د *ortho*، *Meta* او *Para* مختاړي هم پخوانۍ یوناني کلیمې دي چې په ترتیب سره له څنګ پر څنګ، وروسته او د مخامخ په معنا دي. که چېرې دواړه پاتې شوني بېلابېل ترکیبونه و لري، همدا مختاړي د هغوی په نومونو کې ور زیاتېږي. که چېرې د بنزین ډکړۍ څو اتومونه هایدروجن په بېلابېلو ګروپونو تعویض شوي وي، د هغوی سیستماتیک نوم ایښودنه له پورتنیو څرګندونو سره سم ترسره کېږي؛ د بیلګې په ډول:




3-6: د اروماتیکو هایدروکاربنو نو تعاملونه

1-3-6: جمعی تعاملونه

سره له دې چې ټول ارینونه (Arenes) د غیر مشبوع هایدروکاربنونو له ډول څخه دي؛ خو جمعي ترکیبي میل له ځانه نه ښکاره کوي، په ځانګړو شرایطو کې چې د تودوخې درجه $200^\circ C$ ده، د Pt او Ni د کتلست په شتون او لوړ فشار کې کیدای شي چې د هایدروجن درې مالیکوله په بنزین ورزیات او Cyclo Hexane




تر لاسه شي:




په دې صورت کې د بنزين درې د π اړيکې پرې کېږي، دا اړيکې په (6 - 1) شکل کې وړاندې شوي دي چې دريزونانس په بڼه شتون لري او د π د الکتروني ورېځې کثافت د کاربن په ټولو اتومونو باندې په يو ډول خپور شوی دی، په همدې دليل جمعي تعامل د بنزين په کړۍ کې له ستونزو سره ترسره کېږي. سایکلو هگزان د بنزينو پر خلاف مسطح نه دی او د څوکۍ په شان فضايي جوړښت لري، د کاربن 6 واړه اتومونه څلور مخه جوړښت لري چې هغه مو په (6 - 1) شکل کې وليدل.

2-3-6: له بنزين سره د کلورين جمعي تعاملونه

له (6 - 2) شکل سره سم د کلورين د گاز په ډک بالون کې څو څاڅکي بنزين ورزيات کړئ، وروسته هغه د لرگې سر پوښ او پنبې په واسطه وټړئ او ټکان ورکړئ چې ټول زيات شوي بنزين په پراس بدل شي، د رڼا په نشتوالي کې تعامل نه ترسره کېږي، کله چې بالون د رڼا بهير ته کښودل شي، تعامل پيل کېږي او د کلورين شين رنگ له منځه ځي چې سپين رنگی لوگي د بالون په دننه کې ليدل کېږي، د تر لاسه شوي لوگي تحليل او تجزيه ښکاره کوي چې له بنزين سره کلورين جمعي تعامل ترسره کړی دی او د هغه د تعامل معادله په لاندې ډول ده:




تر لاسه شوی مرکب Hexa Chloro Cyclohexane - 1,2,3,4,5,6 دی او د هغه جوړښت سایکلو هگزان ته ورته او د څوکۍ په شان دی. لاندې شکل د نوموړې د تعامل بهير راښيي:



(6 - 2) شکل: د بنزين سره د کلورين تعامل

3-3-6: د اروماتونو تعويضي تعاملونه

په الکينونو او الکاینونو کې جمعي تعاملونه د تعويضي تعاملونو په نسبت په اسانۍ سره تر سره کېږي؛ د بيلگې په ډول: الکينونه په اسانۍ سره د برومين اتومونه په خپلو دوو کاربنونو کې چې دوه گونې اړيکه لري، نښلوي او په ډای هلايد الکانونو (ډای برومو الکانونو) يې بدلوي؛ خو د بنزين په کړۍ کې، فلورين د بنزين دکړۍ د کاربنونو د هايډروجن اتومونه تعويضي او دا تعويض هم دکتلستونو (FeF_3) په شتون کې ترسره کېږي:




د بنزين او د فلورين تعامل چاودېدونکی تعامل دی؛ خو د بنزين او د کلورين تعامل د ليويس تيزابونو ($AlCl_3, FeCl_3$) په شتون کې ترسره کېږي:


د الکایل او نورو پاتې شونو په واسطه دبنزین په مالیکولو کې د هایدروجن د اتومونو تعویض د فریدل چارلیز (Friedel Charles) او جمز کرفت (1832 – 1899) (James Craft م) د پوهانو د نومونو په طریقه ترسره کېږي چې د هغوی بیلگې په لاندې ډول دي:

1 - د اروماتونو نایتریشن

د اروماتونو په کړيو کې د نایټرو (NO_2) د گروپ نصب (نېنلول) د نایټریشن (Nitration) د تعامل په نوم یادېږي، نوموړی تعامل د غلیظو گوگړو تیزابو او غلیظو بنوړې تیزابو د مخلوطولو په واسطه ترسره. د نایټریشن کولو عامل د NO_2^+ ایون دی چې په دی مخلوط کې په لاندې ډول جوړېږي:




په وروستي پړاو کې د نایټرو کیتون د اړیکو د الکترونونو ورځو په ساحه کې له اروماتیک کړۍ د یرغل (حملې) لاندې نیسي چې په پایله کې په لومړي سر کې پای کامپلکس او بیا د سگما کامپلکس د بنزین د کړۍ د کاربن د اتوم او نایټرو گروپ ترمنځ د کوولانت اړیکو په لرلو سره منځ ته راځي، په وروستي پړاو کې د اروماتونو کړۍ د هایدروجن اتوم جلا او له HSO_4^- سره تعامل کوي چې H_2SO_4 بیرته جوړېږي:




2 - د اروماتونو هلوچینشن

د بنزین د هستې هلوچینشن د هلوچونو په مرسته د کتلستونو په شتون کې ترسره کېږي، په ډیره کچه د کتلست په توګه د المونیم او اوسپنې د هالیدونو؛ لکه: FeBr_3 , FeCl_3 , AlBr_3 , AlCl_3 او نورو څخه ګټه اخېستل کېږي، کتلستونه د خپل عمل په واسطه د الکتروفيلي ټوټې د هلوچونو اتومونو د اړیکې د قطبي کولو په پایله کې منځته راوړي؛ د بیلګې په ډول: په المونیم کلوراید کې د المونیم اتوم شپږ الکترونه په خپل ولانسي قشر کې تر لاسه کړي دي؛ خو بیا هم د هغه او کتیت پوره نه دی، نو د خپل او کتیت د پوره کولو لپاره د کلورین د مالیکول د اتوم دوه الکترونونه د ځان خواته کش کوي، د الکتروني ورځې کښولو په پایله کې د کلورین د مالیکول دویم اتوم لږ څه مثبت چارج تر لاسه کوي او د الکتروفيلي ځانګړتیا له ځانه ښيي:




لاندې سلسله د هلوچونو کیمیايي فعالیت ښيي:




3 - سلفونيشن (Sulphonation): د سلفونيك گروپ په واسطه د بنزين د هستې د هايډروجن

د اتومونو تعويض د سلفونيشن په نوم ياديږي. د سلفونيشن تعامل تل اروماتيک هايډرو کاربنونو ته د تودوخې په ورکولو سره د غليظو گوگړو تيزابو په شتون کې ترسره کېږي:




د سلفونيشن تعامل د هلوچينشن د تعامل برعکس رجعي دی او هايډروليز يې تر سره کېږي.




4 - الکايلىشن (Alkylation): د الکايلونو نصب (نېلول) د بنزين په کرۍ او يا دهغه په

هومولوگونو باندې د الکايلىشن تعامل په نوم ياديږي. الکايلىشن په دوو لارو ترسره کېږي:

الف- د اوبو نه لرونکي المونيم هلايد د کتلست په شتون کې په بنزين باندې د الکايلى هلايدونو د عمل په واسطه، د فريډل کرفت (Friedel-Crafts) په لاره:





ب - د اوليفينونو په واسطه هم د اروماتيک هايډروکاربنونو الکايلىشن شوني دی:



5 - د اروماتونو اسايلىشن: د اروماتونو په کرۍ کې د اسايلى د گروپ ($\text{R}-\text{C}(=\text{O})-$) له نېلولو څخه


عبارت دی، د دې تعامل په پايله کې کيتونونه جوړېږي، دا سنتيز د فريډل - کرفت په طريقه د اسايلىشن په نوم

ياديږي چې د تعامل ميخانيکيت يې په لاندې ډول دی:




6 - د اروماتونو اکسيديشن: اروماتونه د اکسيډانتونو په مقابل کې قوي دي، اکسيډانتونه؛ لکه:

نايتريک اسيد، د کروميک اسيد محلول، د پوتاشيم پرمنگنات محلول او د هايډروجن پراکسايډ محلول په عادي شرايطو کې په بنزين باندې اغيزه نه کوي، د اروماتونو ثبات د قوي اکسيډانتونو په مقابل کې له پارافينونو څخه زيات دی، د هوا د اکسيجن د عمل په واسطه د وناډيم پنتا اکسايډ (V_2O_5) د کتلست په شتون او په لوړه تودوخه کې (400°C) له بنزين څخه مليک انهايډريد لاسته راځي:



Maleic anhydride



د بنزین په هومولوگونو باندې د اکسیدانتونو د اغیزې له امله، د هغوی تر څنګ نښتې د الکیل زنځیر اکسیدیشن او تخریب کیږي، چې یوازې د هغوی کړۍ ته نژدې کاربن په کاربوکسیل ګروپ بدلیږي (د بنزین کړۍ پورې ټول تړلي زنځیرونه په کاربوکسیل ګروپ بدلیږي):



د پورتنۍ تعامل په واسطه د ټولو لاسته راغلو اروماتیکو تیزابونو په پام کې نیولو سره کیدای شي چې د هغوی د څنګ (جانبی) نښتې زنځیرونو ځای او تعداد وټاکل شي. د بنزین د څو کړیو مهم مرکبونه په لاندې ډول دي:

نفتالین Naphthalene

د نفتالین مالیکولي فورمول C_{10}H_8 دی، دا مرکب 1819 م کال کې د ډبرو سکرو د قیر له کنډ څخه تر لاسه شوی او د هغه جوړښت د وسکرسینسکي (A.A. Voskresensky) په واسطه ټاکل شوی دی، نفتالین کرسټلي جامده ماده ده او ټاکلی بوی لري، د ویلې کیدو درجه یې 80°C او د هغه د ایشیدو درجه 218°C ده، نفتالین بې رنگه ماده ده، په اسانۍ سره الوځي او حتی په عادي تودوخه کې براس کیږي، نفتالین په اوبو کې نه حلېږي؛ خو په عضوي حل کوونکو کې حل کیږي. له نفتالین څخه دکوپی دضد درمل په توګه کار اخیستل کیږي. د نفتالین د مالیکول کاربنی سکلیټ د بنزین له دوو هستو څخه جوړ شوی دی چې د کاربن د دوو اتومونو په واسطه شریکي او متراکمي شوي دي، د نفتالین په مالیکول کې د بنزین په شان نه مطلق دوه ګونې اړیکې اونه یوه ګونې اړیکې شتون لري. د پای (π) الکترونونه په ټولې کړۍ کې د دیلو کالیزیشن په حالت کې شتون لري، د نفتالین د جوړښت فورمول او مودل په لاندې ډول دی:




(6 - 3) شکل: د نفتالین مودل او فورمول


د نفتالین په مالیکول کې د کاربن ټول اټومونه یو شان ارزښت نه لري، د الفا کاربنونه (α - Carbons) 1، 4، 5، 8 د ځای له کبله یو له بل څخه توپیر لري د نفتالین د کرستلونو راډیوگرافي څېړنې رانښيي چې د نفتالین مالیکول مسطح جوړښت لري او د کاربن - کاربن د ټولو اړیکو اوږدوالی د یوگونو اړیکو او د دووگونو اړیکو ترمنځ قیمت لري.

د نفتالین تعویضي تعاملونه

سلفونیشن: د نفتالین له عمده ځانګړتیاوو څخه یو دهغه د سلفونیشن تعامل دی، دا تعامل د شرایطو په پام کې نیولو سره کیدای شي الفا - نفتالین سلفونیک اسید او یا بیتا - نفتالین سلفونیک اسید په جوړولو پای ته ورسېږي:



د نفتالین اکسیدیشن: نفتالین د بنزین په پرتله په اسانۍ سره اکسیدي کېږي چې په دې عملیه کې د هغه له کرپو څخه یوه تخریب او د هغه له الفا کاربنونو د کاربوکسیل په ګروپونو تبدیلېږي چې په پایله کې دوه قیمت ته تیزاب فتالیک اسید جوړېږي:




Naphthalene

Phthalic acid

انتراسین (Anthracene)

د انتراسین مالیکولي فورمول $C_{14}H_{10}$ دی، دا مرکب د قیر په کڼه او د انتراسین په غوړیو کې شتون لري چې له هغوي څخه د تېلور په لاره جلا کېږي، انتراسین د الوتنې په لارې سره جلاکوي، خالص انتراسین یو جامد کرستلي او بې رنگه ماده ده چې د لاجوردی فلورسنس لري، دهغه د ویلې کیدو درجه $217^\circ C$ او د اېشېدو درجه یې $354^\circ C$ ده. انتراسین په اوبو کې غیر منحل او په تودو بنزینو کې په اسانۍ سره حلېږي. انتراسین د څو هستو لرونکو اروماتیکو هایدروکاربنونو له ډلې څخه عبارت دی چې د خطي بنزین له دریو متراکم شوو هستو څخه جوړ شوی او دهستو جوړښت یې مسطح دی. د هغه سکلیټي جوړښتي فورمول په لاندې ډول دی:




د انتراسین په مالیکول کې د کاربن ټول اټومونه د نفتالین د مالیکول په شان یوشان ځای نه نیسي. د الفا ځایونه (1, 4, 5, 8)، او بیتا β (2, 3, 6, 7) او میزو (9, 10) (*meso*)، په انتراسین کې شته دي چې دا ځایونه یو له بل څخه توپیر لري او په دې بنسټ د انتراسین د یو تعویضه مشتق د الفا - بیتا او میزو (*meso*) ایزومیرونو لرونکي دي، همدارنګه د انتراسین په فورمول کې د اړیکو سمون نه په سترګو کېږي.

د انتراسین کیمیایي خواص:


هغوی په نسبت زیات فعال دی، انتراسین تعویضي تعاملونه هم (هلوجنیشن، نایتریشن، سلفونیشن ترسره کوي او له ځان څخه اروماتیک خواص ښيي چې جمعي تعاملونه هم په اسانۍ ترسره کوي. *meso-9* او *meso-10* ځایونه د کیمیایي فعالیت د لرلو په بنسټ له نورو ځایونو څخه زیات توپیر لري؛ له دې امله تعویضي تعامل او جمعي تعامل په منځنۍ هستې کې ترسره کیږي، په 9 او 10 ځایونو کې د جمعي تعاملونو د ترسره کیدلو په پایله کې دواړو تر څنګ کرپوېي داروماتیکي سیکستیت (Sextet) ثابت ترلاسه کړی دی.

د انتراسین تعویضي تعامل

1- **هلوجنیشن:** په لومړي سر کې کلورین او برومین د تودوخې په 0°C کې 9 او 10 ځایونو کې نښتلی شي، دای کلورو یا دای برومو انتراسین جوړوي او وروسته له دې د لږې تودوخې په واسطه هایډروجن هلاید له دې ځایونو څخه جلا او د تعامل محصول 9- کلورو انتراسین لاسته راځي:




2- **د انتراسین نایتریشن:** د ښورې د تېزابو د عمل په پایله کې لومړی بې ثباته جمعي محصول تولیدیږي او وروسته د اوبو له جلاکیدو څخه د انتراسین تعویضي محصول یعنی 9- نایټرو انتراسین جوړیږي:





د شپږم څپرکي لنډيز

- * اروماتیک مرکبونه په خپل مالیکول کې ټینګې کاربنی کرۍ لري چې د ځانګړو اړیکو لرونکي دي.
- * د اروماتیکو مرکبونو لومړنی مرکب بنزین دی چې په ۱۹ پېړۍ کې د انګلیسي فزیک پوه مایکل (Mycal Farady) په واسطه له عضوي مرکبونو څخه لاسته راوړل شو.
- * بنزین د نا مشبوع (غیر مشبوع) مرکبونو د تعاملونو ځانګړتیاوې له ځان څخه نه ښکاره کوي؛ یعنې د برومین اوبه او د پوتاشیم پرمنگنات د القلي محلول رنگ ته بدلون نه شي ورکولی، بنزین له برومین سره د جمعي تعامل پرځای تعویضي تعامل ترسره کوي؛ کله چې د بنزین د مالیکول د هایدروجن اتومونه د برومین په واسطه تعویض شي د C_6H_5Br مرکب جوړېږي.
- * بنزین او هغه ته د ورته مرکبونو کیمیايي خواص ډېر حیرانوونکي دي، سره له دې چې د بنزین مرکبونه نامشبوع دی او الکینونو او الکانینونو ته ورته دي؛ خو جمعي تعاملونه په دې مرکبونو کې ډېر لږ ترسره کېږي او برعکس تعویضي تعاملونه په ښه توګه ترسره کوي، له دې امله اروماتیک مرکبونه له عادي غیرمشبوع مرکبونو څخه توپیر لري او د هغوی ځانګړی خواص د بنزین په کرۍ او د هغه په مرکبونو پورې اړه لري.
- * څرنګه چې اروماتیک هایدروکاربنونه نامشبوع دي؛ نو له دې کبله هغوی د ene په وروستاړي، الکینونو ته ورته او د Ar د مختاړی چې له ارومات ($Aromate$) څخه مشتق شوي دي، نوم ایښودنه یې شوې ده؛ پر دې بنسټ د هغوی سیستماتیک نوم $Arene$ ایښودل شوې دی.
- * د اروماتونو د کرکټر په اړه د هیوکل ($Huckel$) په نوم عالم قاعده یې منځ ته راوړه چې د دې قاعدې په بنسټ هغه کرۍ د اروماتیک ځانګړتیا لري کوم چې د پای (π) د الکترونونو شمېر یې له $(4n+2)$ سره سمون ولري.
- * په الکینونو او الکانینونو کې جمعي تعاملونه د تعویضي تعاملونو په نسبت په اسانۍ سره ترسره کېږي؛ د بیلګې په ډول: الکینونه په اسانۍ سره د برومین اتومونه په خپلو دوو کاربنونو کې چې دوه ګونې اړیکه لري، نښلوي او په پای هلاکد الکانونو (پای برومو الکانونو) یې بدلوي؛ خو د بنزین په کرۍ کې، فلورین د بنزین ډګرۍ د کاربنونو د هایدروجن اتومونو تعویضوي او دا تعویض هم دکتلستونو (FeF_3) په شتون کې ترسره کېږي.
- * اروماتونه د اکسیدانتونو په مقابل کې مقاومت ښیي، اکسیدانتونه لکه: نایتریک اسید، د کرومیک اسید محلول، د پوتاشیم پرمنگنات محلول او د هایدروجن پراکساید محلول په عادي شرایطو کې په بنزین اغیزه نه کوي، د اروماتونو ثبات د قوي اکسیدانتونو په مقابل کې د پارافینونو په نسبت زیات دی.
- * د نفتالین په مالیکول کې د کاربن ټول اتومونه یو شان ارزښت نه لري، د الفاکاربنونه ($\alpha - Carbon$) په ۱، ۴، ۵، ۸ ځایونو سره او د بیتاکاربنونه ($\beta - Carbon$) په ۲، ۳، ۶، ۷ ځایونو سره یو له بل څخه توپیر لري.
- * انتراسین له څو هستو لرونکو اروماتیکو هایدروکاربنونو څخه عبارت دی چې د خطي بنزین له دریو متراکم شوو هستو څخه جوړېږي او هستوي جوړښت یې مسطح دی. د هغه د سکلیټې جوړښتیز فورمول په لاندې ډول دی:





د شپږم څپرکي پوښتنې او تمرین

څلور ځوابه سوالونه

1 - د اروماتونو لومړنۍ مرکب یعنې بنزین د کوم عالم په واسطه له عضوي مرکبونو څخه استحصال شو؟

الف - مایکل فارادی، ب - Mycal Farady، ج - کیکولي، د - الف اوب دواړه سم دی

2 - له لاندې مرکبونو څخه کوم یو اروماتیک دی؟



د - دویم او دریم دواړه سم دي

3 - له لاندې مطالبو څخه کوم یو د بنزین د مالیکول په اړه سم دي؟

الف - د هایدروجن 12 اتومه لري، ب - د کاربن ترمنځ اړیکې ساده دي، ج - د کاربن - کاربن

ترمنځ اړیکې نه یوگونې او نه دوه گونې دي، د - یو کره یی جوړښت نه دی.

4 - د بنزین حرارتي مقاومت څومره دی؟

الف - تر 700°C ، ب - تر 1900°C ، ج - تر 900°C ، د - تر 920°C .

5 - د بنزین په مالیکول کې څو الکترونونو د π اوربیتالونه پې نیولي دي؟

الف - 6 الکترونونو، ب - 6 الکترونونو، ج - 12 الکترونونو، د - 16 الکترونونو

6 - هغه کرۍ د اروماتیک خاصیت لرونکې ده چې دهغې د پای π الکترونونو شمېر له..... سره سمون ولري.

الف - $(4n+2)$ ، ب - $(2n+4)$ ، ج - $(3n+2)$ ، د - هیڅ یو

7 - په 200°C تو دوخه، د Pt او Ni د کتلست په شتون او لوړ فشار کې کیدای شي چې د هایدروجن درې

مالیکوله پر بنزین ورزیات او..... په لاس راوړشي:

الف - Cyclo Hexene، ب - Cyclo Hexane، ج - Hexane، د - بنزین جمعي تعامل سرته

رسولی نه شي.

8 - د اروماتونو په کرۍ کې د نایټرو دگروپ (NO_2) دننه کول د..... تعامل په نوم یادوي:

الف - نایټریشن، ب - Nitration، ج - الف اوب دواړه، د - هیڅ یو.

9 - : د بنزین په کرۍ او د هغه په مالیکولونو باندې د الکیل دگروپ نښلول د ---- په نوم یادېږي.

الف - هایدریشن، ب - الکیلیشن، ج - Alkylation، د - ب اوج دواړه.

10 - کومې لاندې جملې د نقتالین په هکله صحیح دي؟

الف: دا مرکب د C_{10}H_8 د مالیکولي فورمول لرونکی دی.

ب: نوموړی مرکب له هایدروجن سره د کوټې په تو دوخه کې تعامل کوي:




ج: یو الفاتیک مرکب دی:

د - الف اوب دواړه

تشریحی پوښتنې:

1 - د بنزین په مالیکول کې د اړیکو د څرنگوالي په اړه څرگندونې وکړئ.

2 - د لاندې مرکبونو نوم ایښودنه وکړئ:



3 - د لاندې اروماتیک مرکبونو ساختماني فورمولونه ولیکئ:

(a) nitro benzen , b) m-chlorophenol , c) p-chlorophenol

d) o- ethyl nitro benzene , e) 1- bromo-2-methyl -3- phenyl cyclohexane

4 - C_8H_{10} د مالیکولي فورمول لرونکي اروماتیک مرکب د ایزومیریو ساختماني فورمولونه ولیکئ.

5 - د لاندې مرکبونو د سون د تعاملونو (Combustion) معادلې ولیکئ:

الف - بنزین ب - تالوین ج - نفتالین د - انتراسین

6 - د بنزین له لاندې تعاملونو څخه کوم یو د ریدوکس د تعاملونو له ډولو څخه دی؟ په دې اړه څرگندونه وکړئ:

الف - نایتریشن ب - سلفونیشن ج - برومینیشن د - الکالیشن

7 - خولیتړه هایډروجن ته اړتیا ده چې ترڅو 15.6 گرامه بنزین مشبوع کړي (په STP شرایطو)


8 - د فریدل گرفت د تعامل د میتود پر بنسټ، له 26.5 گرامه الکایل بنزین څخه 0.25 مول بنزین لاسته راغلي دي، د بنزین د لاسته راغلي مشتق جوړښت وټاکئ.

9 - بنزین ته له هغو مرکبونو سره تعامل ورکړئ کوم چه بیوتایل بنزین او وینایل بنزین حاصل شي

10 - د $NaOH$ محلول 750 ملي لیتره له سوډیم بنزویت سره تعامل کړی چې 23.4 گرامه بنزین تولید شوي دي، د سوډیم هایډروکساید مولاریتي لاسته راوړئ.

اووم خپرکی

الکایل هلايدونه




که چیرې د هایدروکاربونونو د هایدروجن اتومونه د هلوچنونو د یو او یا خو اتومونو په واسطه تعویض شي، د هلايدونو په نامه د هایدروکاربونونو هلوچني مشتقات منځ ته راځي. دا مرکبونه د انسانانو په ژوند او صنعت کې بنسټیز رول لوبوي. د هغوی فورمول $R - X$ دی. په دې خپرکي کې دا مرکبونه خپرل شوي دي. د دې خپرکي په لوستلو به زده کړئ چې الکایل هلايدونه څه ډول عضوي مرکبونه دي او کوم خواص لري؟ څرنگه کيدای شي چې هغوی په لاس راوړل شي؟ د طبابت او صنعت په کومو برخوکې په کار وړل کيږي؟ څرنگه د دې مرکبونو نوم اېښودنه کيږي؟ د دې خپرکي په مطالعې به له الکایل هلوچنيدونو سره اشنا او د هغوی کارونه به په بېلابېلو برخوکې زده کړئ.

7-1: الکایل هلايدونه

الکایل هلايدونه د هايډروکاربنونو هلوچني مشتقات دي چې د هلوچنونو په واسطه د هايډروکاربنونو يو او يا خو د هايډروجن د اټومونو د تعويض له امله لاسته راځي. تر اوسه د فلورين، کلورين، برومين او ايودين مرکبونه پيژندل شوي دي. د هايډروکاربنونو هلايدونه کيدای شي، مونو هلايدونه او يا پولي هلايدونه وي.



عضوي هلوچن لرونکي مرکبونه په طبيعت کې خورا ډېر دي چې په ننني صنعت کې ډېر کارول کيږي، په طبيعي توکو کې موندل کيږي. په زرگونو هلوچن لرونکي عضوي مرکبونه په الجيو او په نور سمندري ژونديو موجوداتو کې شته دي؛ د بيلگې په ډول: د سمندرونو په قهوه ای رنگه الجيو کې CH_3Cl شته دی او د ځنگلونو د سوزيدو او د اور شيندونکو پر مهال هم توليديږي. په صنعت کې له دې مرکبونو څخه د حل کوونکي په توگه او د والگي ناروغۍ په وخت کې د درمل په توگه گټه اخېستل کيږي، تر اې کلورو ايتلين په الکترونيکي صنايعو کې ډېر کارول کيږي. د الکایل هلايدونو ځيني مرکبونه په لاندې ډول دي:




تر اې کلورو ايتلين ښه محلل دی، هلوټان انسټيزيک او بې هوشه کوونکي ماده ده.

7-1-1 د الکایل هلايدونو نوم ايښودنه

د الکایل هلايدونو عمومي فورمول $C_n H_{2n+1} X$ دی. په دې فورمول کې X کيدای شي I, Br, Cl, F وي. د الکایل هلايدونو نوم ايښودنه داسې ترسره کيږي چې په لومړي سر کې د الکایل د راډيکال نوم ليکل کيږي او بيا د هلوچنونو نوم د صفت په بڼه د ide وروستاري سره ليکل کيږي؛ د بيلگې په ډول:




الکایل هلايدونه هم د لومړني (Primary)، دويمې (Secondary)، او دريمې (Tertiary) په دې بنسټ چې هلوچن د کاربن له کوم ډول اټوم سره اړيکه لري، ویشل شوي دي او دا کلمې د هغوی د نومونو په سر کې ورزياتيږي؛ د بيلگې په توگه:




د الکایل هالایدونو نوم ایښودنه د ایوپیک IUPAC په سیستم داسې ترسره کیږي چې دکاربن اوږد زنځیر د اصلي زنځیر په توګه منل کیږي، د دوه ګونې یا درې ګونې اړیکې د شتون په صورت کې، په اصلي زنځیر کې باید دا اړیکې شتون ولري.

د هایدروکاربنونو د زنځیر نمبر وهل له هغه سر څخه پیل کیږي چې د هلوجن معاوضه هغې سر ته نژدې وي. د یادونې وړده چې د کاربنې بنسټیز زنځیر ښاخونه هم په دې مرکبونو کې په پام کې نیول کیږي، د پاتې شونو د هالایدونو وظیفه یې ګروپونو نوم داسې لیکل کیږي چې د پاتې شونو د انګلیسي الفبا د نوم د لومړیو تورو ترتیب باید په پام کې ونیول شي؛ د بیلګې په ډول:



2-bromo-5-methylhexane




څرګندونه: که چېرې د عین هلوجنونو تعداد له یوې بې ځایه کونکې څخه ډېر وي، د هغوی د رقمونو شمېر په Tetra, Tri, Di او نورو وروستارو باندې ټاکل کیږي. که چېرې ترکیب شوي هلوجنونه په مرکب کې بېلابېل هلوجنونه وي، د هغوی نومونه د انګریزي الفبا د تورو د وړاندې والي په وارسره د هغوی د مرکب په نوم ایښودنه کې لیکل کیږي؛ د بیلګې په ډول:



مشق او تمرین وکړئ



1 - د لاندې الکایل هالایدونو نوم ایښودنه په راډیکالي او د ایوپیک پر بنسټ ترسره کړئ:



2 - د لاندې مرکبونو د جوړښت فورمولونه ولیکئ:



الف - 2-Chloro 3,3 - di methyl hexane

ب - 1,1-di bromo 4 - iso propylcycl ohexane

7 - 1 - 2: د الکایل هالایدونو لاس ته راوړنه



1 - د الکانونو د مستقیم هلوجنشن له لارې کیدای شي چې الکایل کلوراید او الکایل بروماید لاسته راوړل شي، دا تعاملونه د Chlorination او Bromination په نوم یا ډیري چې په راډیکالي بڼه ترسره کیږي، صنعتي اهمیت یې خورا ډېر دی چې له هغه څخه د الکایل هالایدونو بېلابېل مرکبونه جوړیږي او د تقطیر

په واسطه یوله بل څخه جلا کيږي. د الکانونو chlorination په چټکۍ سره ترسره او اړینه تودوخه يې 300°C ده:



په لابراتوارونو کې الکایل هاليدونه په لاندې ډول لاسته راوړل کيږي:


2 - الکولونه له هايډروجن هاليدونو سره تعامل کوي، په پايله کې الکایل هاليدونه او اوبه لاس ته راځي، په دې میتود کې د هايډروجن هاليدونو وچ گاز له الکولونو څخه تېروي:




n - Propylalcohol

n - Propyl bromide


مثالونه:



1 - Phenylethanol



1 - Bromo - 1 - Phenylethane




Ethylalcohol

Ethyl iodide

3 - د هايډروجن هاليدونو اوډ الکينونو يا الکينونو د جمعې تعامل په پايله کې هم الکایل هاليد لاس ته راځي: د هايډروجن هاليدونو تعامل د الکينونو له اوږدو زنځيرونو سره د مارکوف نیکوف له قاعدې سره سم ترسره کيږي، داسې چې په الکينونو کې هايډروجن په هغه دوه گونې اړيکې لرونکي کاربن باندې نښلي چې د هايډروجن




لومړني اتومونه په کې زيات وي:




4 - د هلوچنونو اوډ الکينونو يا الکينونو د جمعې تعاملونو په پايله کې الکایل هاليدونه لاسته راځي:



مثال:







5 - د ایترونو او هایدروجن هالایدونو د تعامل په پایله کې هم الکایل هالایدونه لاسته راځي:




مشق او تمرین وکړئ



1 - لاندې معادلې بشپړې او توازن کړئ:



2 - د میتان د هلوچنیشن ټول پړاوونه ولیکئ:




1-3: د الکایل هالایدونو فزیکي خواص

هغه الکایل هالایدونه چې د هغوی مالیکولي کتله لویه ده، د هغو الکایل هالایدونو پرتله چې د کاربن د اتومونو یوشان تعداد لري، د اېشېدو درجه یې لوړه ده، په دې بنسټ د الکایل هالایدونو د ایشیدو ټکی له فلورین څخه د ایوډین لوري ته په وار سره لوړېږي؛ د بیلګې په ډول: د میتایل کلوراید د ایشیدو ټکی $24^\circ C$ -، میتایل بروماید $4^\circ C$ او د میتایل ایوډاید $43^\circ C$ دی، سره له دې چې الکایل هالایدونه قطبي مرکبونه دي؛ خو له دې سره هم په اوبو کې نه حلېږي، ځکه هایدروجنی اړیکه نه شي جوړولی، دا مرکبونه په عضوي محلولونو؛ لکه: هایدروکاربنونو، الکولونو او ایترونو کې حلېږي.

د هایدروکاربنونو زیات هلوچني مشتقات بې رنگه او یا ژېړ رنگ او ځانګړی بوی لري. د الکانونو د ایوډین، برومین او پولي کلورین مشتقات لوړ کثافت لري چې له اوبو څخه هم لوړ دی.


1-4: د الکایل هالایدونو کیمیايي خواص

د هلوچنونو اتومونه د هایدروکاربنونو په مشتقاتو کې اود هغوی له ډلې څخه په الکایل هلوچنیدونو کې د کاربن له اتومونو څخه الکترونیکاتیف دي او د کاربن - هلوچن اړیکه قطبي ده:




د هستې خوښوونکي (Nucleophilic) تعامل کوونکي په هالایدونو کې د هلوچنونو مشتق د یرغل لاندې نیسي او د کاربن له هغه اتوم سره چې د الکتروني وریځې کثافت یې لږ دی، اړیکه جوړوي او له مالیکول څخه هلوچن یې ځایه کوي چې په پایله کې د هلوچن اتوم په نوکلیوفیلیک پاتې شوني باندې تعویض کېږي، دا ډول

تعاملونه د نوکلیوفیلیک تعویضي تعاملونو (Nucleophilic Substitution) په نوم یادېږي او په S_N ښودل کېږي. نوکلیوفیلک تعویضي تعاملونه کیدای شي چې په دوو میخانیکیتونو ترسره شي او د $S_N 2$ (Bimolecular Nucleophilic Substitution) او $S_N 1$ (unimolecular Nucleophilic Substitution) تعویضي تعاملونو په نوم یادېږي، عددونه د تعامل د مالیکولونو د هغو ذرو شمیر ښیي چې د تعامل د عمومي چټکتیا په پړاوونو کې برخه اخلي. د Bimolecular تعامل عمومي بڼه، په لاندې ډول ښودل کېږي:




په دې پړاوې تعامل کې دواړه تعامل کوونکي مواد د تعامل په چټکتیا کې برخه اخلي او که چېرې د دوی غلظت یو بل سره نژدې وي، تعامل د $S_N 2$ په بڼه ښودل کېږي او د تعامل کوونکو دواړو موادو له غلظت سره متناسب دی.


د الکایل هلایدونو بای مالیکولي هایدرولیز یو پړاوې تعامل دی، دا تعامل د انتقالي کامپلکس په جوړېدو (Transitional Complex) یا انتقالي حالت (Transition state) سره ترسره کېږي، چې د دې ډول تعامل بیلگه د میتایل بروماید هایدرولیز وړاندې کیدای شي، دا تعامل د نوکلیوفیلیک تعاملونو له ډولونو څخه دي؛ ځکه اوبه ازاد جوړه الکترونونه لري:



د تعامل میخانیکیت:



د کاربن اټوم ته د هایدروکساید د ایون نژدېوالی یوازې د برومین د اټوم له مخالف لوري څخه شونی دی، د کاربن اټوم ته د هایدروکساید د ایون نژدېوالی او د برومین لرې کیدل او د هغه بدلون د برومین په ایون باندې په عین وخت کې ترسره کېږي. په لیږدېدونکي کامپلکس کې منفي چارج د نوکلیوفیل گروپونو تر منځ چې وردننه او جلا کېږي، وېشل شوي دي، د $S_N 2$ د تعامل سرته رسیدل د نوکلیوفیل پاتې شونو نژدې کیدل د الکایل هلایدونو مالیکول ته د اهمیت وړ دي، د نارمل زنځیر لرونکي لومړني الکایل هلایدونه د دویمې الکایل هلایدونو په نسبت په اسانۍ سره تعامل کوي. په الکایل هلایدونو کې ښاخ لرونکي کاربنی سکلیټ د نوکلیوفیل معاوضې د نژدې کیدلو خنډ گرځي. لاندې د الکایل هلایدونو سلسله چې د $S_N 2$ تعویضي تعاملونو چټکتیا په هغوی کې ټیټېږي، وگورئ:





مونو مالیکولي تعویضي تعامل په دوو پړاوونو کې ترسره کېږي چې په لاندې ډول دی:


لومړی پړاو یې د تعامل کوونکو موادو ایونایزېشن او د کرب کټیون جوړېدل دي:




دویم پړاو یې د کرب کټیون اغیزه په نوکلیوفیل پاتې شوني باندې رامنځ ته کوي:




د تعامل چټکتیا د تعامل کوونکو موادو په غلظت پورې اړه لري او S_N1 باندې ښودل کېږي، تعویضي تعامل د S_N1 په ښه قطبي محلولونو کې په ښه توګه ترسره کېږي او په قلوي محیط کې یې ترسره کیدل لا ډېر شونی دی. د تعامل دغه پړاو یې په دریم بیوتایل کلوراید کې د بیلګې په توګه: په لاندې ډول مطالعه کوو:



په دویم پړاو کې د کرب کټیون او هایډروکساید د ایون ترمنځ تعامل ترسره کېږي:




د عمومي قانون په پام کې نیولو سره، د څو پړاوې تعاملونو چټکتیا د هغوی، هغه پړاونه ټاکي چې ورو، ورو ترسره کېږي؛ د بیلګې په ډول: په پورتنی تعامل کې د تعامل چټکتیا لومړی پړاو ټاکي، هر څومره چې د الکیل پاتې شوني د کرب کټیون پر اتوم باندې ډېر شي، په هماغه کچه کټیون ټینګیږي او تعامل د S_N1 په میخانیکیت ترسره کېږي. په لاندې سلسله کې د S_N1 او S_N2 تعاملونو د چټکتیا د بدلون لوري ښودل شوی دي:




1 - **د الکیل هایډونو تعامل له امونیا سره:** ددې تعامل محصول لومړني امینونه او هایډروجن هایلډونه دي:

$$\text{R} - \text{X} + \text{NH}_3 \longrightarrow \text{R} - \text{NH}_2 + \text{HX}$$


مثال:




2 - **له عضوي مالګو سره د الکیل هایډونو تعامل:** که چېرې الکیل هایلډونه له عضوي مالګو سره تعامل وکړي ایسترونه جوړوي:




مثال:










3 - **د الکیل هایډونو دي هایډروهلوجنیشن (Dehydrohalogenation):**



مثال:

4 - د الکایل هایدونو ارجاعي (Reduction) تعاملونه:

**مثال:****مشق او تمرین وکړئ**

لاندې تعاملونه بشپړ کړئ:

۷ - ۱ - ۵: مهم الکایل هایدونه



میتایل کلوراید (CH_3Cl) میتایل کلوراید د تودوخې په 23.7°C کې په ایشیدو راځي او هغه په 400°C تودوخې کې د میتان د کلورینشین تعامل په واسطه په لاس راوړي، همدارنگه دا مرکب د میتایل الکولو او هایدروجن کلوراید له تعامل څخه د لوړ فشار په بهیر کې هم لاسته راوړي. میتایل کلوراید په سپرونکو د ستګاو کې د سپرونکو د عامل په توګه هم په کاروړي.

کلوروفارم (CHCl_3)

کلوروفارم یا ترای کلورو میتان یوه بې رنگه مایع ده او ځانګړې خوږ بوی لري، دا مرکب د تودوخې په 62°C کې په ایشیدو راځي، د هغه کثافت 1.48g/mL دی. که چیرې کلوروفارم هایدرولیز شي، فارمیک اسید لاسته راځي چې د کلوروفارم نوم هم له همدې ځایه څخه اخیستل شوی دی. کلوروفارم د عضوي مرکبونو؛ لکه: کنډ، وازډې او رېر ښه حلوونکی دی، دا مرکب قوي انسیتیزیک ځانګړتیا لري چې په ۱۸۴۸م کال کې په جراحی عملیاتو کې د عمومي بې هوشي په توګه په کار وړل کیده؛ په اوسنۍ پېړۍ کې له دې امله چې نورې ناروغۍ پیداکوي، نو لږ په کاروړل کېږي. کلوروفارم په ازاده هوا کې اکسیدي کېږي چې د هغه د اکسیدیشن یو محصول هم فوسیجن (COCl_2) دی، فوسیجن یوه زهري ماده ده. د فوسیجن د مخنیوي لپاره له کلوروفارم سره ۱% الکول ګډ او ورزیاتوي. په صنعت کې کلوروفارم د کلسیم هایدو کلوریت او ایتایل الکول د تعامل په پایله کې لاسته راوړي.

کاربن تترا کلوراید (CCl_4)

کاربن تترا کلوراید یا تترا کلورو میتان بې رنگه مایع ده، د ایشیدو درجه یې 76.5°C او د هغه کثافت 1.59g/mL دی. د عضوي مرکبونو؛ لکه: کنډ، وازډې، رېر او نورو ښه حل کوونکی دی، کاربن تترا کلوراید نه سوزي او د اور ضد دستگاه کې د اور وژنې لپاره په لابراتوارونو او ګدامونو کې کارول کېږي، د دې دستگاه د کارولو په وخت کې فوسیجن هم تولیدېږي چې د دې ګاز شتون په تړلو ځایونو کې د کاربن-تتراکلوراید کارول خطرناک ګرځولی دی. کاربن تترا کلوراید د جامو په پاکولو او په بېلابېلو سنتیزونو کې په کار وړل کېږي. کاربن تترا کلوراید د کاربن سلفایډ او کلورین له تعامل څخه په لاندې ډول لاسته راوړي:





داووم څپرکی لنډیز

- الکایل هالایدونه د هایدروکاربنونو هلوچني مشتقات دي چې د هلوچنونو په واسطه د هایدروکاربنونو یو او یا څو د هایدروجن اتومونه د بې ځایه کیدو له امله لاسته راځي.
 - د الکایل هالایدونو عمومي فورمول $C_n H_{2n+1} X$ دی. په دې فورمول کې X کیدای شي I, Br, Cl, F وي.
 - الکایل هالایدونه هم لومړني (Primary)، دویمي (Secondary) او دریمي (Tertiary) هالایدونه لري، پر دې بنسټ د هلوچن د کاربن له کومو ډولونو اتومونو سره اړیکه لري، دا ویش تر سره شوی دی او دا کلمې د هغوی د نومونو په سر کې ورزیاتېږي.
 - د الکانونو د مستقیم هلوچنشن له لارې کیدای شي چې الکایل کلوراید او الکایل برومایدونه لاس ته راوړل شي، دا تعاملونه Chlorination او Bromination په نوم یا ډیري او په راډیکالي بڼه ترسره کېږي، صنعتي اهمیت یې خو را ډېر دی چې له هغوی څخه د الکایل هالایدونو بېلابېل مرکبونه جوړېږي او د تقطیر په واسطه یوله بل څخه جلا کېږي.
 - هغه الکایل هالایدونه چې د هغوی مالیکولي کتله لویه ده، د هغو الکایل هالایدونو په پرتله چې د کاربن د اتومونو یوشان شمیر چې د خپل الکایل هالایدونو پاتې شوني باندې ولري، د ایشیدو درجه یې لوړه ده.
 - سره له دې چې الکایل هالایدونه قطبي مرکبونه دي؛ خو له دې سره هم په اوبو کې نه حلېږي، ځکه هایدروچني اړیکه نه شي جوړولی.
 - د هلوچنونو اتومونه د هایدروکاربنونو په مشتقاتو کې او د هغوی له ډلې څخه الکایل هلوچنیدونو کې د کاربن د اتومونو په نسبت الکترونیګاتیف دي او د کاربن - هلوچن اړیکه قطبي ده:
- $$-\overset{\sigma+}{C}-X^{\sigma-} \quad (X = F, Cl, Br, I)$$
- د هستې خوبوونکي تعامل کوونکي په هالایدونو کې د هلوچنونو مشتق د یرغل لاندې نیسي او د کاربن له هغه اتوم سره چې الکتروني ورځي کثافت یې لږ دی، اړیکه جوړوي چې له مالیکول څخه یې هلوچن بې ځایه کوي او په پایله کې د هلوچن اتوم په نوکلئوفلیک پاتې شوني په واسطه بې ځایه کېږي

داووم څپرکي پوښتنې

څلور ځوابه پوښتنې

1. الکایل هالایدونه د هایدروکاربنونو ----- مشتقات دي.
الف - هایدروچني، ب - هلوچني، ج - سلفري، د - اکسیجني.
2. د الکایل هالایدو عمومي فورمول ----- دي.
الف - $C_n H_{2n+1} X$ ، ب - $C_n H_{2n+2}$ ، ج - $C_n H_{2n+1}$ ، د - $C_n H_{2n}$.
3. د مارکوف نیکوف د قاعدې سره سم هایدروجن د دوه گوني اړیکې په هغه کاربن باندې نښلي کوم چې د هغه د

لومړنيو هايډروجنونو شمير ----- دی.

الف - لړ، ب - يوشان، ج - ډير، د - شتون ونه لري.

4 - د $R-O-R'+HX \longrightarrow$ تعامل محصول ----- دی:

الف - ROH ، ب - $R-X$ ، ج - الف او ب دواړه، د - هيڅ يو.

5- د کلورين او ايتلين د تعامل محصول ----- دی:

الف - کلورو ايتان، ب - ډاي کلورو ايتلين، ج- ډای کلورو ايتان، د - هيڅ يو

6- $CH_3-CH_2-CH_2Br$ نوم عبارت له ----- څخه دی:

الف - 1-bromopropane - ب 2-bromopropane - ج 3-bromopropane - د - هيڅ يو

7- ايتايل برومايد او سوډيم اسيتيت د تعامل محصول عبارت له ----- څخه دی.

الف - ايتايل اسيتيت او سوډيم برومايد، ب - ډای ايتايل ايسټر او سوډيم برومايد، ج - ايتايل ايسټر د - الف او ب سم دي.

8- د الکانونو هلو جني مشتقات په کوم نوم ياديږي؟

الف - اسايلونه، ب - هلو جنيډونه، ج - الکاييل هلايدونه، د - ارايل هلايدونه.

9- د ترای کلورو ايتلين فورمول عبارت له ----- دی.


الف - $CHCl=CHCl$ ، ب - $CHCl=CCl_2$ ، ج - CH_3-CCl_3 ، د - هيڅ يو

10 - د کلورو فارم د ----- محصول يوه زهري ماده فوسجين ($Phosgene$) ده.

الف - ريډکشن، ب - اکسيډيشن، ج جمعي تعامل، د - تجريدي تعامل.





تشریحي پوښتنې

1- د لاندې مرکبونو نومونه د ايوپک پر بنسټ وليکئ:



2 - 1-chloro propane او $NaOH$ د تعويضي تعامل معادله وليکئ:

3 - د لاندې تعويضي تعاملونو معادلې بشپړې کړئ:



4 - د Chloro propane - او $NaOH$ د تعويضي تعامل محصول به کومه ماده وي؟

د حل طريقه: دواړه تعامل کوونکي مادې وليکئ او په هغوی کې نوکليوفيل مواد (د بيلگې په ډول: OH^-) او پاتې شوي گروپونه؛ (د بيلگې په ډول: Cl^-) و ټاکئ. د Cl^- گروپ د OH^- د گروپ په واسطه تعويض کړئ او بشپړه معادله يې وليکئ.

5. 1 - Bromopropane او 2 - Chloropropane له OH^- سره د S_N2 تعويضي تعامل ترسره کړی دی،

ستاسې په نظر دکومو نوموړو مرکبونو S_N2 تعامل به سريع وي؟

الف - Bromobenzen يا $(C_6H_5CH_2Br)$ benzylbromide يا CH_3Cl يا $(CH_3)_3CCl$

ج - $CH_3CH = CHBr$ يا $CH_2 = CHCH_2Br$.

6 - له لاندې جوړوالکايال هلايدونو څخه به دکومو د S_N2 تعويضي تعامل له OH^- سره چټک وي؟


7 - د 3 - methyloc tan - 3 - ol او HBr له تعويضي تعامل څخه به کوم محصول د S_N1 د تعويضي تعامل د

ميخانيکيت په بنسټ تر لاسه شي؟ د محصولو اود تعامل کوونکو مواد فورمولونه يې وليکئ.

8. څرنگه کولی شئ چې دا لاندې مواد د نوکليوفيلي تعويضي تعاملونو پر بنسټ تر لاسه کړئ؟

a) $CH_3CH_2CH_2CH_2 - OH$ ، b) $(CH_3)_2CHCH_2CH_2CN$

9. لاندې معادلې بشپړې کړئ.



10 - د لاندې مرکبونو مشرح ماليکولي فورمولونه وليکئ ؟

الف - 2,3 - dichloro - 4 - methyl hexane

ب - 4 - bromo - 4ethyl - 2 - methyl hexane

ج - 3 - iodo - 2,2,4,4 - tetramethyl pentan e

اتم څپرکی الکولونه او ایترونه




ډیر عضوي مرکبونه ځانگړي ډلې لري چې د وظیفه یي گروپونو (Functional groups) په نوم یادېږي. دا گروپونه له هایډروکاربنونو سره تعویضي تعاملونه ترسره کوي او په پایله کې د عضوي مرکبونو ځانگړي ټولگي جوړوي چې د هغوی له ډلې څخه د هایډروکسیل گروپ ($-OH$) او ایتروپ ($-O-$) دی.

د هایډروکسیل او ایتروپونه د اشتراکي اړیکې په واسطه د هایډروکاربنونو له کاربن سره نښتي دي، په دې څپرکي کې د الکولو او ایترونو د خواصو، جوړښت او د استعمال ځایونو په هکله به معلومات تر لاسه کړئ او د دې څپرکي په مطالعه به پوه شئ چې الکولونه او ایترونه کوم ډول مرکبونه دي او د کوم ډول خواصو او جوړښتونو لرونکي دي؟ په صنعت کې په کومو برخو کې په کار وړل کېږي او څرنگه کیدای شي؛ هغوی په لاس راوړل شي؟

8 - 1: الکولونه (Alcohols)


هغه عضوي مرکبونه چې په خپل ماليکولي ترکیب کې د OH وظیفه یي ګروپ ولري، د الکولو په نوم یادېږي. الکول عربي کلمه ده چې معنا یې د شرابو جوهر دی، د الکولو عمومي فورمول R-OH دی چې R کیدای شي د الکایل پاتې شوني د نارمل او یا منشعب زنځیر لرلوسره، الکیل، الکیلینل (د دوه ګوني او یا درې ګوني اړیکې لرونکي) اروماتیک کړي او داسې نور وي؛ د بیلګې په ډول:




Ethyl alcohol

2 - Methyl - 2 - Propanol


Allyl alcohol




Cyclo hexanol



Benzyl alcohol




Ethylene chlorohydrin




Glycerin

8 - 1 - 1: د الکولو نوم ایښودنه


الکولونه د کاربن د اټومونو د شمیر پر بنسټ چې د کاربینول ګروپ یې ($\text{C} - \text{OH}$) سره اړیکه لري یعنې د هغه کاربن سره چې د هایډروکسیل ګروپ په کې نښتی دی، په درې ډلو ویشل شوي دي: لومړنی الکول (primary alcohol) (د OH - ګروپ له لومړني کاربن سره، دویمي الکول (secondary alcohol) (چې د هایډروکسیل ګروپ (OH) - دویم کاربن سره) او دریمي الکول (Tertiary alcohol) (چې د هایډروکسیل ګروپ (OH) - دریم کاربن سره اړیکه لري) دي چې د هغوی عمومي فورمولونه په لاندې ډول دي:



لومړنی الکول




دویمي الکول




دریمي الکول

په پورتنیو فورمولونو کې R بېلابېلې عضوي پاتې شوني بڼې؛ یعنې کیدای شي الیفاتیک ($\text{CH}_3 -$) او یا اروماتیک (C_6H_5) او نور وي. ایتایل الکول (ایتانول) او بنزایل الکول د لومړنیو الکولونو ډولونه دي؛ خو ایزوپروپایل الکول د دویمي الکولونو له ډولونو څخه دی:



دويمی الکول



لومړنی الکول



لومړنی الکول


د الکولو عمومي نوم ایښودنه په دوو سیستمونو ترسره کېږي چې یو یې د معمولي یا رادیکالي سیستم (Common names) نوم ایښودنه ده، ساده الکولونه چې پخوا پیژندل شوي دي، په دې طریقې یې نوم ایښودنه کېږي؛ د بیلگې په ډول:




ethyl alcohol

isopropyl alcohol


iso butyl alcohol



p - nitrobenzyl alcohol




methyl alcohol




propyl alcohol

دوبلو وړ ده چې دا ډول نوم ایښودنه لږه کارول کېږي او په ښاخ لرونکو او اوږدو زنځیرونو کې د پلې کېدو وړ نه ده؛ د بیلگې په توګه:



2,2,3-trimethyl pentanol(3)

همدارنگه د الکولونو په نوم ایښودنه کې د الکولونو ډولونه (لومړني، دویمي او دریمي) هم ټاکل کېږي؛ د بیلگې په ډول: ایزوپروپیل الکول یو دویمي الکول دی او ایزوبیوتیل الکول یو لومړنی الکول دی؛ نو ددوی نوم ایښودنه په لاندې ډول هم ترسره کېږي.



Primary Ethyl alcohol

Isopropyl alcohol


Primary Methylpropyl alcohol



مشق او تمرین وکړئ




یو ډول الکول چې جمعي فورمول یې $\text{C}_7\text{H}_{15} - \text{OH}$ دی، په پام کې ونیسئ، اته بېلابېل جوړښتیز فورمولونه د هغه لپاره ولیکئ چې په هغوی کې لومړنی، دویمي او دریمي الکول وټاکل شي.

ډیر پوه شئ: ځینې وختونه د الکولونو نوم ایښودنه دهغوي $(-\text{C}-\text{OH})$ Carbinol د ګروپ پر بنسټ ترسره کېږي چې د کاربینول سیستم ورته وایي. په دې تګ لاره کې الکولونه داسې په پام کې نیول کېږي چې له کاربینول څخه په لاس راغلي دي؛ نو $\text{CH}_3 - \text{OH}$ ته هم کاربینول وایي. د هغې نورې بیلگې عبارت دي له:





dimethyl phenyl
carbinol

Tri phenyl carbinol











tri ethyl carbinol


د الکولونو سیستماتیک نوم ایښودنه د (IU PAC) پرنسپ داسې ترسره کېږي چې د اړوند هایډروکاربنونو د نوم وروستی د *e* توره د (ol) په وروستاړي تعویض کېږي او په پایله کې د اړوند الکول نوم لاسته راځي. له دې کبله چې په نوم ایښودنې کې تیروتنې لرې شي؛ نو د هایډروکاربنونو د کاربنونو په اتومونو نمبر وهل کېږي او نمبر وهل د زنځیر له هغه لوري څخه پیل کېږي چې د کاربنول د گروپ کاربن کوچنی نمبر ځانته غوره کړي؛ د بیلگې په ډول:




مثال: د لاندې الکولو نوم ایښودنه د ایوپیک پرنسپ ترسره کوو:



الکولونه چې د *OH* - دوو گروپونو لرونکي وي، معمولاً د گلايکولونو (Glycols) په نوم نومول کېږي، د دې الکولونو نوم ایښودنه په دواړو (معمولی او ایوپیک) طریقو ترسره کېږي.




ethylene glycol




proylene glycol

1,2 - propane di ol



tri methylene glycol

1,3 - propane di ol



cis - 1,2 - cyclopentanedi ol

فعالیت:

د اوکتانول لس ایزومیرونه ولیکئ او د ایوپک په طریقه یې نوم ایښودنه وکړئ.

8-1-2: د الکولونو فزیکي خواص

الکولونه د الکایل او هایډروکسیل گروپ لري، د دې مرکبونو په مالیکولونو کې د کاربن او اکسیجن ترمنځ اړیکه قطبي ده او د دې مرکبونو خواص ټاکي. الکولونه د هغو هایډروکاربنونو په پرتله چې د کاربنونو شمیر یې سره یوشان (ایزولوگ) وي، د ایشیدو ټکي یې ورڅخه لوړ دي؛ ځکه د الکولونو د مالیکولونو ترمنځ هایډروجنی اړیکې شتون لري چې دا اړیکې د الکولونو د مالیکولونو د تراکم لامل کیږي. هایډروجنی اړیکه د الکولو او د اوبو د مالیکولونو ترمنځ هم شته چې د هغوی د حل کیدو لامل گرځي، د اوبو مالیکولونه هم په خپل منځ کې هایډروجنی اړیکې لري.

(8-1) شکل: د اوبو د مالیکولونو ترمنځ او د الکولونو د مالیکولونو ترمنځ هایډروجنی اړیکه.


د نه ښاخ لرونکو الکولونو د ایشیدو ټکي د ښاخ لرونکو الکولونو د ایشیدود ټکي په پرتله لوړ دي. د کاربن د اتومونو د شمیر او مالیکولي کتلي له زیاتوالي سره د ایشیدو ټکي هم لوړیږي.

(8-1) جدول: د یو شمیر الکولونو فزیکي خواص او د ایشیدو ټکي

نوم	فورمول	د ایشیدو درجه °C	په اوبو کې حل کیدل (100g اوبو کې په 20°C کې)
Methanol	CH_3OH	65	په هر نسبت حل کیدونکي دي
ethanol	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$	78,5	په هر نسبت حل کیدونکي دي
1-propanol	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	97	په هر نسبت حل کیدونکي دي
1-butanol	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	117.7	7,9
1- pentanol	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	137.9	2.7
1-hexanol	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	155.8	0.59

د وظیفه یې گروپونو په زیاتوالي د الکولونو د ایشیدوټکی هم لوړېږي؛ د بیلگې په ډول: ایتلین گلایکول په 197°C کې په اېشېدو راځي، د دې مرکب د مالیکولونو ترمنځ هایدروجنې اړیکې ډیرې دي؛ نو له همدې کبله د هغوی حل کیدل په اوبو کې هم ډېر دي. ایتلین گلایکول څخه په موټرو کې د کنگل کېدو د ضد مادې په توګه کار اخیستل کېږي.


د الکولو د اېشېدو ټکي د هغوی د ایزولوګ الکانونو په پرتله په لاندې ګراف کې ښودل شوي دي.



(8 - 1) شکل: د الکولو د ایزولوګ الکانونو د ایشیدوټکو د پرتلي ګراف


8 - 1 - 3: د الکولو کیمیايي خواص او فعالیتونه


الکولونه دوه خاصیتونه (*Amphotric*) مرکبونه دي چې هم تېزابي خاصیت او هم القلي خاصیت ښيي، د ټوټه کېدو ثابت یې خورا ډېر زیات کوچنی دی:



د القلیو فلزونو سره د الکولونو تعامل:

الکولونه له القلي فلزونو سره تعامل کوي، الکولیتونه جوړوي؛ د بیلگې په ډول: ایتانول له سوډیم سره تعامل کوي چې د سوډیم ایتانولیت ($\text{C}_2\text{H}_5 - \text{ONa}$) جوړوي:





(8 - 2) شکل: له فلزی سودیم سره د ایتایل الکولو تعامل

سودیم الکولیتونه په اوبلن محلول کې قوي القلي ځانګړتیا لري چې د خپل جوړه تېزابونو ضعیفوالی روښانه کوي.


د الکولونو کیمیايي فعالیت د القلیو فلزونو سره په تعامل کې د هغوی د کاربنی زنځیر له اوږدوالي سره ټیټېږي چې د هغوی د فعالیت ټیټوالی په لاندې سلسله کې ښودل شوی دی:

د فعالیت لږوالي


Activity decreases




الکولونه کولی شي چې د القلیو خاصیت هم له ځان څخه ښکاره کړي؛ ځکه د $-OH$ د ګروپ د اکسیجن د اتوم ازاده جوړه الکترونونه د نورو تېزابونو د پروتونونو د جذب وړتیا لري.




$C_2H_5-OH_2^+$ د ایتایل الکول مزدوج تېزاب دی او د اکسونیم ایون یوه بیلګه ده، عمومي فورمول یې $R-OH_2^+$ دی، د $R-OH_2^+$ جوړیدل د پرله پسې تعاملونو لومړنی پړاو دی چې الکولونه یې د تېزابي کنستونو په شتون کې ترسره کوي؛ د بیلګې په ډول: له الکولو څخه د اوبو ایستل په تېزابي محیط کې (H_2SO_4) د اکسونیم (*oxonium*) د ایون په واسطه ترسره کیږي:




په دې ترتیب د ایتایل الکولو ډی هایدریشن (Dehydration) هایډروکاربنونو ته د نباتی انرژۍ د راکړې ورکړې امکان برابروي؛ ځکه د کرنې محصولاتو؛ لکه غلې، ګنۍ، خرما، انګور او نورو د تخمر څخه چې الکولونه جوړېږي او د الکولو له ډی هایدریشن (Dehydration) څخه ایتلین او بیا پولي ایتیلین لاسته راځي. الکولونه د هایډرو هایدونو او له هایدونو سره تعامل کوي چې الکیل هایدونه جوړېږي:




اکسیدي کوونکي مواد؛ د بیلګې په ډول: $K_2Cr_2O_7$ له الکولو سره تعامل کوي چې د الکولو د اکسیدیشن د عملیې په پای کې الیدهایدونه او تیزابونه جوړېږي:



ایتیل الکول په سروازي لوبني کې له څه مودې وروسته د هوا له اکسیجن سره تعامل کوي، الیدهایدونه جوړوي چې عطري بوی لري خو د الکولونو له بوی سره توپیر لري چې د قوي اکسیدیشن په پایله کې په عضوي تیزابونو بدلېږي چې تیز بوی لري. د لومړني الکولو د اکسیدیشن عملیه د الیدهایدونو او تیزابونو د جوړښت په پای کې ترسره کېږي:




که چېرې دویمي الکول اکسیدیشن شي، د هغه اړوند کیتونونه لاسته راځي:




د ایسترو د جوړولو تعامل (Esterification)

د الکولو او تیزابونو تعامل د ایستریفیکشن په نوم یادېږي، دا تعامل د کتلست په توګه د تیزابونو په شتون کې ترسره کېږي چې د هغوی په پایله کې ایستر او اوبه جوړېږي:



اسیتایل کلورایدونه هم له اوبو سره تعامل کوي چې د هغوی د تعامل محصول هم ایسترونه دي:




$$H_2C=CH_2 \xrightarrow{+H_2O(H_2SO_4)} CH_3-CH_2-OH$$
$$(C_6H_{10}O_5)_n + \xrightarrow{H_2O+HCl+\text{امايليز}} n C_6H_{12}O_6$$

نشاسته یوه قيمته قند

د الكولو د لاسته راوړنې صنعتي او مصنوعي لاره


میتانول په 1920 م کال کې له وچو لرگیو څخه په لاس راوړل شوی دی، اوس په امریکا کې لس (10) میلیونه پونده میتانول د CO او H_2 له تعامل څخه (د CO له ارجاع څخه) لاس ته راوړی:




له پورتنیو لاس ته راوړل شوو کمیټونو کولونو څخه نیمايي یې د فارم الیهاید د لاس ته راوړلو په موخه د بیلایسټیک د تولید لپاره په کار وړل کېږي.




2- دگرینارد بشودونکی ترکیبی تعامل:

الف: دگر بنارد د بنودونکی اود الیهایدونو د تعامل په پایله کې الکولونه لاسته راځي:












2- Propanol

**ب - له کیتونونو سره د ګرینارد بنودونکي تعامل:****۳ - د الډیهایدونو، کیتونونو او عضوي تېزابونو ارجاع**


د الډیهایدونو، کیتونونو او عضوي تېزابونو له ارجاع کولو څخه هم الکولونه لاسته راځي. د الډیهایدونو، کیتونونو او عضوي تېزابونو ارجاع کیدل د ارجاع د عامل په شتون کې ترسره کېږي چې د الډیهایدونو او عضوي تېزابونو له ارجاع څخه لومړي الکول او د کیتونونو له ارجاع څخه دویمي الکولونه لاسته راځي. د الډیهایدونو، کیتونونو او عضوي تېزابونو ارجاع د هایدروجن په واسطه د پلاتین (Pt) په شتون کې ترسره او الکولونه لاسته راځي:









ډېر پوه شئ

ايسټرونه هم ارجاع کيږي چې په پايله کې يې دوه ماليکوله الکول تر لاسه کيږي؛ د بيلگې په ډول: ډای ميتايل ايسټر د ارجاع په پايله کې يو ماليکول ميتايل الکول او يو ماليکول ايتايل الکول لاسته راځي:





4 - د ايترونو او ايسټرونو له هايډروليز څخه د الکولو لاس ته راوړنه

د متناظرو ايترونو د يو ماليکول هايډروليز څخه د يو ډول الکولو دوه ماليکوله او د غير متناظرو ايترونو له ارجاع څخه د بيلو الکولو نو دوه ماليکولونه لاسته راځي:



د يوه ماليکول ايسټر له هايډروليز څخه يو ماليکول الکول او يو ماليکول عضوي تېزاب لاسته راځي:



Methyl ethyl ester



acetic acid

Ethanol

5 - د الکايل هلايدونو د هايډروليز په پايله کې الکول او هايډروجن هلايدونه لاسته راځي:




Alkyl halides alcohol hydrogen halides




8-1-5: میتانول یا میتایل الکول (CH₃OH)

میتایل الکول بې رنگه مایع ده، ښه اور اخلي، ځانگړی بوی لري چې د ایتایل الکولو خوند لري او زهري دی، لږ خوړل یې د ږوندوالي لامل او زیات خوړل یې د مرگ لامل گرځي، د هغه د براسونو پرله پسې تنفس او د بدن له پوستکي سره پرله پسې تماس یې دانسانانو د وژنې لامل کیږي؛ نو باید د هغه له څښلو څخه ډډه وشي. میتانول د تودوخې 97°C کې کنگل کیږي چې په موټرونو کې د یخ د ضد مادې په توگه کار ترې اخېستل کیږي، میتایل الکول د تودوخې په 64.7°C کې په اېشېدو راځي، په اوبو کې په هر نسبت حلېږي، د عضوي موادو او وازدی ښه حلوونکی دی، د فارم الیهاید د تولید لپاره په ډیره کچه په کاروړل کیږي فارم الیهاید څخه د پلاستیکونو، رنگونو او محلولونو په توگه په صنایعو کې کار اخېستل کیږي.

د میتانول کیمیاوي خواص: د میتایل الکولو تېزابي خواص د نورو یو قیمتو الکولو په نسبت ډېر دي:




میتایل الکول په اوبو کې له رنگه لمبې سره سوځي، په اسانۍ سره اکسیدیشن کیږي چې په لومړي پړاو کې فارم الیهاید، په دویم پړاو کې د میزیاو تېزاب، په دریم پړاو کې CO_2 او اوبه جوړېږي:




د میتایل الکول لاسته راوړنه

میتانول ډېر ساده الکول دی چې په لوړه تودوخه او د هوا په نه شتون کې د لرگیو له تقطیر څخه په لاس راوړل کیږي؛ نو له دې کبله د لرگیو د الکولو په نوم هم یادېږي، لرگي یا سلولوز په ساده مرکبونو؛ لکه اسیتون، د سرکې تېزاب او په میتایل الکولو تبدیلوي. تر 1925م کال پورې له همدې لارې څخه گټه اخېستل کېده؛ خو یوه بله ډیره ښه لاره د جرمنیانو په واسطه په 1920م کال کې منځته راغلې ده چې نن ورځ دا لاره په کاروړل کیږي، دا طریقه عبارت له CO او H_2 تعامل څخه د ډېر فشار، تودوخې او کتلسټونو په شتون کې ترسره کیږي:




که چیرته ایتلین په تېزابی محیط کې هایدریشن شي ایتایل الکول لاسته راځي.



8-1-6: ایتانول یا ایتایل الکول

خالص ایتانول بې رنگه ماده ده او ځانگړی بوی لري. د ویلې کېدو درجه یې 114°C - د ایشیدو درجه یې 78.3°C او کثافت یې $0.789^{\text{g}}/\text{mL}$ دی چې په اوبو کې په هر نسبت حلېږي.




(8-3) شکل: د ایتانول مودل

ایتایل الکول خواص


ایتانول چې په لابراتوارونو کې د حلوونکي په توگه کارول کیږي، 95% الکول او 5% اوبه لري او دې مخلوط ته

معمولي الكول هم وايي، په 78°C کې په اېشېدو راځي. 100% الكول (مطلق الكول) له معمولي الكولو څخه د چوڼي په زياتولو سره چې اوبه يې د $\text{Ca}(\text{OH})_2$ په بڼه ښکته کښېږي، په لاس راوړي:



د خالصو ايتانول (مطلق ايتانول) د تصفيې بله لاره، د 95% ايتايل الكولو او اوبو په مخلوط کې د بنزين وړ زياتول دي، بنزين دوه ډوله بېلابېل ايزوتروپونه د اوبو او الكول سره جوړوي چې ترڅو ايتانول په 64.9°C کې په اېشېدو راشي او له اوبو څخه په بشپړ ډول جلا شي.

ايتايل الكول ښه عضوي محلول دی، نو د ټينچر ايوډين، رنگونو، عطرونو او د سينگارو په موادو کې د ښه بوی ورکولو لپاره کارول کېږي، په همدې ترتيب د کلونيا، سپرې (Spray) او څښلو په موادو کې کارول کېږي، د ايتايل الكولو د سوزولو په پايله کې ډيره انرژي توليديږي:



(8 - 4) شکل د ايتايل الكولو کارول د تودوخې او انرژي د لاسته راوړلو په موخه

د ايتانول ښه سوزېدل د دې لامل شوي دي چې د انجنونو د سون د موادو په توگه ترې کار واخېستل شي. ايتايل الكول د يخ د ضد مادې په توگه کارول کېږي او د هغه له محلول څخه د ضد عفوني مادې په بڼه کار اخېستل کېږي. دا مرکب د پروټيني ارگانيزمونو د تخريبولو خاصيت لري چې د بکټرياوو، فنجيو، د ځينو وېروسونو او بکټرياو د سپورونو له منځه وړلو لپاره کارول کېږي.




کله چې ايتايل الكول وڅښل شي او د انسانانو بدن ته ودرنه شي، په بدن کې منفي اغيزې رامنځ ته کوي؛ داسې چې د مغز د اوبو ماليکولونه جذب او د هغوی ځايونو ته په مغز کې بدلون ورکوي چې داعملیه دعصبي سیستم د بدلون لامل گرځي.

د ايتانول لاسته راوړنه:

1 - ايتايل الكول په ډيره کچه د بورې له تخمر څخه لاسته راځي. د ايتايل الكولو د لاسته راوړنې دوه مهمې سرچينې په لاندې ډول دي:

الف - له نشايسته لرونکو نباتاتو څخه؛ د بيلگې په ډول: له غنمو، جوارو، کچالو، اوريشو، جودرو او نورو څخه کيدای شي چې ايتايل الكول لاسته راوړل شي.

ب - له بورې لرونکي نباتاتو څخه؛ لکه چغندر، گني او ميوو څخه کېدای شي ايتايل الكول لاسته راوړل شي. په تېرو لوستونو کې مو د الکولونو د لاسته راوړنې په هکله په پراخه کچه معلومات تر لاسه کړل، په همدې لارو کيدای شي چې ايتايل الكول هم په لاس راوړل شي، دلته د هغه د لاسته راوړنې دوه کيميايي معادلې چې د بورې او گلوکوز د تخمر له امله لاسته راځي، ليکل کېږي:




(5-8) شکل: د بورې تخمر او د ايتايل الڪولو لاسته راوړل




(6-8) شکل: د گلوگوز د تخمر د سټگاه او د ايتايل الڪولو لاسته راوړل


2 - په صنعت کې ايتانول د ايتلين له هايډريشن څخه د H_3PO_4 د کتلست او تودوخې په شتون کې لاسته راوړي، دا تگ لاره د تخمر په نسبت ډېر ارزانه ده:



3 - استيت الډيهايد د نیکل (Ni) د کتلست په شتون کې ارجاع کيږي چې په پایله کې ايتانول لاسته راځي:



4 - که چېرې ايتلين په تېزابي محيط کې هايډريشن شي، ايتايل الڪول لاسته راځي:




8-1-7: څو قيمته الڪولونه

که چېرې د الڪولو په ماليکولي ترکيب کې د هايډروکسيل يو گروپ شتون ولري، دا ډول الڪولونه د يو قيمته الڪولو په نوم يادوي او که چېرې د الڪولو په ماليکولي ترکيب کې د هايډروکسيل څو گروپونه شتون ولري، دا ډول الڪولونه د څو قيمته الڪولونو په نوم ياديږي.


گلايکول (Glycol)

هغه الکولونه چې د $(-OH)$ د دوو گروپونو لرونکي وي، د گلايکولونو په نوم يا دېري. د هغوی ښه بېلگه ايتلين گلايکول (CH_2OHCH_2OH) ده.


ايتلين گلايکول: د ايتلين گلايکول ماليکول چې د هغه سيستماتيک نوم 1,2 - Ethanediol دی، د دوه قيمته الکولو له ډلې څخه دی چې فورمول يې په لاندې ډول دی:




ايتلين گلايکول بې رنگه، بې بوږه او د شربت په شان مايع ده چې په اوبو کې په هر نسبت حل کېدای شي، د کنگل کېدو ښکته درجه (-155°C) لري؛ نو په انټي فريز (د يخ ضد) په توگه په موټرو کې په کارول کېږي، د هغه د اېشېدو درجه (197°C) ده؛ نو د اوړي کې هم د موټرو په اوبو کې ور زياتېږي. د موټرونو په بريک کې د هايډروليک مادې په توگه، په رنگونو، تېلو او د قلم د رنگونو محلولونو په توگه په کار ورل کېږي. ايتلين گلايکول لومړنی دوه قيمته الکول دی، د هغه له اکسیديشن څخه اکزاليک اسيد لاسته راځي:



له اوبو سره د ايتلين ډای کلورايد (1 - 2 - ډاي کلورو ايتان) د تعامل په پايله کې ايتلين گلايکول لاسته راځي:






ايتلين گلايکول د $(-OH)$ دوه گروپونه په خپل ماليکولي ترکيب کې لري او له هغه څخه د يخ ضد مادې په توگه په گرځنده موټرونو کې گټه اخېستل کېږي او هم د مصنوعي تارونو په لاسته راوړنې کې له هغه څخه گټه اخېستل کېږي. د گلايکول عمل د يخ د ضد مادې په توگه د هغه دښو حل کيدلو له کبله په اوبو کې دی او د $-OH$ د دوو گروپونو د شتون له امله هايډروجنې اړيکه يې د اوبو له ماليکولونو سره جوړه کړې ده. همدارنگه له نايټريک اسيد (HNO_3) سره تعامل کوي چې د نايټرو گلايکول په نوم چاوديدونکي ماده جوړوي:



گليسرين:


گليسرين يو درې قيمته الکول دی او د $-OH$ درې گروپونه لري چې د هغه فورمول په لاندې ډول دی:






(7-8) شکل: د گلیسرین مودل

د گلیسرین سیستماتیک نوم 1, 2, 3-Propanetriol دی، دا مرکب په عادي شرایطو کې مایع او سربینګ حالت لري چې په اوبو کې په ښه توګه حل کیږي او د اوبو د نرمولو د مادې په توګه په کار وړل کېږي، په 18°C کې کنگل، په 290°C کې په اېښېدو راځي او کثافت یې 1.26 g/mL دی، له اوبو سره د میتانول او ایتانول په شان مخلوط کیږي، د شربتو په شان مایع ده او د جذب ښه وړتیا لري. گلیسرین د حیواني وازدې او نباتي غوړیو د هایدرولیز فرعي محصول دی:



د گلیسرین او نایتریک اسید د تعامل په پایله کې (ایستریفیکیشن) د نایټرو گلیسرین په نوم عضوي او غیر عضوي ایستر (گلیسرایل ټرای نایټریت) حاصلیږي:



نایټرو گلیسرین ډیره زیاته چاودیدونکې او بې ثباته ماده ده چې په 1970 م. کال د نوبل (Noble) په نوم د نارګي کیمیا پوه هغه د ارې له بورې سره لږ څه با ثباته کړه او له هغې زمانې څخه تر اوسه پورې د ډینامیټ په نوم په لګښت رسېږي. نوبل له دې لارې ډیره شتمني په لاس راوړه؛ خو کله چې له هغه څخه د جنګي وسیلې په توګه کارواخیستل شو، د انسانانو د وژلو لامل وګرځېده، نو نوبل خپله ټوله شتمنۍ د نوبل د جایزې په نامه وقف کړه او انسان دوستو پوهانو ته یې له دې شتمنۍ څخه ورکړه ومنله. پورتنۍ تعامل اکزوترمیک دی نو ژر یې سړوي؛ ځکه چې په 45°C کې نایټرو گلیسرین چاودنه ترسره کوي، ډینامیټ د گلیسرین او د ارې د بورې له مخلوط څخه لاسته راوړل کیږي چې یوه فوق العاده چاودیدونکې ماده ده.


گلیسرین د تنباکو د نم د جذب لپاره، د حمام په صابون او د بیری خریلو په کریم، د سینگار په کریمونو او موادو کې، د پلاستیکو په تولید او برابرولو، د رنگونو اوبو، د پرنتر په رنگونو، مطابع، مرهمونو، انټی فریز اوبو او په ډینامیت کې کارول کیږي.



(8 - 8) شکل: الف - ډینامیت

ب - د پوتاشیم پرمگانټ سره د گلیسرین تعامل


قطبي حیوانات د هغوی له ډلو څخه قطبي خوځ په خپل بدن کې د ساریتول (Sorbitol) او گلیسرول (glycerol) د جوړولو قدرت لري چې د سرې هوا په موده کې د هغوی د بدن د اوبو کچه ښکته را ځي او د دې مرکبونو غلیظ محلول په ټیټه تودوخه کې نه کنگل کیږي او د تودوخې په 87°C - هم ژوند کولی شي. گلیسرین د الکولو د استحصال په عمومي تگ لاره کېدای شي چې لاسته راوړل شي؛ خو غیر اقتصادي ده. اقتصادي طریقه یې د وازدې او نباتي غوړپو هایدرولیز او تخمر دی. د سرې وینې لرونکو حشراتو او قطبي حیواناتو په بدن کې د گلیسرین تولید د دې لامل کیږي ترڅو د هغوی د بدن مایع تر 87°C - پورې کنگل نه شي. ترای نایټرو گلیسرین یا ډینامیت د لاندې تعامل سره سم د چاودیدو لامل گرځي:



(8 - 9) شکل: قطبي خوځ:

8 - 2: ایترونه (Ethers):

که چیرې فرض کړو چې الکولونه د اوبو د مالیکولونو مشتق دي؛ داسې چې د اوبو د هایدروجن یو اټوم په عضوي پاتې شوني تعویض او الکول حاصل شوي دي، نو که چیرې د اوبو د هایدروجن بل اټوم هم په عضوي پاتې شوني تعویض شي، ایترون تر لاسه کیږي:



water


ethanol

Di ethylether

د ایترونو عمومي فورمول $R-O-R$ یا $Ar-O-Ar$ دی، دوی هغه مرکبونه دي چې د $(C-O-C)$ واحد لری.

8-2-1: د ایترونو نوم ایښودنه


څرنګه چې د ایترونو وظیفه یې ګروپ د اکسیجن اټوم ($-O-$) دی، په معمولي نوم ایښودنه کې له هغه څخه نوم اخېستل شوی نه دی او داسې نوم ایښودنه کېږي چې لومړی د ایترو ګروپ ($-O-$) پورې تړلي عضوي پاتې شونو نومونه د کوچني والي او لوي والي پر بنسټ نومول کېږي او د ایترو کلمه په هغوی باندې ورزیاتېږي؛ یعنې د ایترو د وظیفه یې ګروپ په بنسټ د پای الکایل ایترونو نوم ایښودنه ترسره کېږي؛ که چېرې معاوضې یو ډول وي، د پای (di) مختاړی د معاوضو په نوم ورزیاتېږي؛ د بیلګې په ډول:



Di methylether




Di ethylether



Methylethyl ether





3-Chloro propyl ethyl ether



Di phenyl ether

ایترونه د ایوپک د نوم ایښودنې پر بنسټ د الکا اوکسی (کوچنې معاوضې) په نوم یادوي، داسې چې د الکا کوچنې معاوضه د الکا اوکسي په نوم او بیا د الکانونو د لویو معاوضونوم کوم چې د اوږد زنځیر لرونکي او د ایترو له ګروپ سره تړلي دي، ورزیاتېږي؛ د بیلګې په ډول:




Methoxy methane

Ethoxy ethane

methoxy ethane



1-Chloro-3-ethoxypropane








Phenoxybenzene

3-Chloropropylethylether

Diphenylether

مشق او تمرین

د لاندې مرکبونو نوم ایښودنه د معمولي او ایوپک له طریقي سره سم وکړئ:



8-2-2: د ایترونو فزیکي خواص

ایترونه لږ په اوبو کې حلېږي، د ایترونو د ایشیدو ټکي د هغوی د مالیکولونو د لږ قطبیت له کبله د هغو له ایزومېرو

الکولونو اوازولوگو الکانونو څخه لږ دي؛ د بیلگې په ډول:

فورمول او نوم	$CH_3CH_2-O-CH_2CH_3$ Di ethyl ether	$CH_3(CH_2)_3CH_3$ Pentane	$CH_3(CH_2)_3-OH$ 1-Butanol
د ایشیدو ټکي	$35C^\circ$	$36C^\circ$	$117C^\circ$
په اوبو کې حلیدل	$7.5g/100mL$	نه حل کیدونکی	$9g/100mL$

د الکولو د ایشیدو لوړه درجه د هایډروجنی رابطی د موجودیت په اساس دي ایترونه نسبت الکولو او اوبو ته ضعیفه هایډروجنی رابطه لري او په الکانونو کې هایډروجنی رابطه وجود نه لري

فعالیت:




دا لاندې مرکبونو د اېشېدلو او کنگل کیدلو درجې د زیاتوالي او لږ والي پربنسټ ترتیب کړئ او د هغوی جمعي فورمولونه ولیکئ.

- $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$
- $CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3$
- $CH_3-O-\underset{\substack{| \\ CH_3}}{C}-H-CH_3$

د ایترونو کیمیايي خواص د ساده ایترونو کیمیايي فعالیت د الکولونو په نسبت لږ دی، د کاربن او اکسیجن اړیکه په ایترونو کې ډیره کلکه ده او د هغې پرې کیدل په ستونزو ترسره کیږي.



1 - ساده ایترونه د کمزورو القلیو خواصو په درلودلو سره د اکسیدانتونو او تېزابونو په واسطه ټوټه کیږي، د هغوی ایتري اړیکه پرې کیږي؛ د بیلگې په ډول: له هلو جني تېزابونو سره د لاندې معادلې سره سم تعامل کوي:





د پورتنۍ تعامل پربنسټ تولید شوي الکولونه له اضافي HX سره تعامل کوي، اوبه او $R-X$ تولیدوي:






په رښتیا د ایترونو او هایډرو هلو جنيډونو د تعامل وروستني محصولونه له الکایل هلایدو او اوبو څخه عبارت دي:



2 - ایتري د اوبو په واسطه په تېزابي محیط کې هایډرولیز او ایتري اړیکه یې پرې کیږي:



3 - ایترونه د اکسیجن (O_2) په شتون کې په اسانۍ سره په پراکسایدونو بدلون مومي، تولید شوي پراکسایدونه د فیرس (Fe^{2+}) د آیونونو په واسطه د گوگړو د غلیظو تېزابونو په شتون کې بیرته تجزیه او په عادي ایترو تبدیلېږي:





فعالیت



که چیرې 0.2mol ډای ایتایل ایتر ته د HBr له غلیظ تېزابي محلول سره په ټاکلي کچه تعامل ورکړل شي، څه مقدار اړونده الکول به له هغوی څخه ترلاسه شي؟ $(CH_3-CH_2-OH = 46\text{g/mol})$

د ایترونو لاس ته راوړنه

د ایترونو د لاسته راوړنې عمومي طریقه د الکولو د دوو مالیکولونو د دې هایدریشن لاره ده چې د گوگړو تېزاب (د کتلسټ په توګه) په شتون کې ترسره کېږي:




2 - د ویلیم سن لاره

د دې لارې په واسطه کیدای شي چې متناظر او غیر متناظر ایترونه لاسته راوړل شي، د دې لارې کرښه داسې ده چې الکایل هالیدونه له فلزي الکوکسایډونو سره تعامل ورکول کېږي او اړونده ایتر ترلاسه کېږي:



ډای ایتایل ایتر

ډای ایتایل ایتر بې رنگه مایع ده او د بې هوښه کولو خاصیت لري، اور اخیستونکي او د ځانګړې بوی لرونکې ماده ده، ایتر د انسټیزي عمل لري چې د هغه تنفس د جراحي د عمل لاندې ناروغانو د بې هوښۍ لامل کېږي. ډای ایتایل ایتر د عضوي موادو ښه حل کوونکی دی او عضوي مواد په ځان کې حلوي، د ورتس تعامل او د ګرینارډ ښودونکو په جوړولو کې په کارول کېږي، ډای ایتایل ایتر په لابراتوار کې د ایتایل الکولو له دې هایدریشن څخه د اوبو جذبونکي مادې په شتون کې لاسته راوړي:



نوب: ډای ایتایل ایتر قوی چاودیدونکي خاصیت لري او د هوا سره چاودېدونکي تعامل ترسره کوي، د لابراتواري کار د کړنې په وخت کې باید له هغه سره احتیاط وشي.



(8 - 8) شکل: د اېتر سوزیدل په چاودېدونکي توگه

ډای ایتایل اېتر په پخوانیو وختونو کې د بې هوښه کوونکي مادې په توگه کارول کېده. ایترونه الوتونکي مواد دي؛ ځکه په دې موادو کې هایدروجنی اړیکه شتون نه لري. د ایترونو کیمیايي فعالیت ډېر لږ او د عضوي مرکبونو لپاره ښه حل کوونکي دي. ایترونه د الکولونو په شان تعویضي تعاملونه ترسره کوي په هغه صورت کې چې کتلستونه شتون ولري.


د اتم څپرکي لنډیز



• هغه عضوي مرکبونه چې په خپل مالیکولي ترکیب کې د OH -وظیفه یي گروپ ولري، د الکولو په نوم یادېږي.

• د الکولو عمومي فورمول $R-OH$ دی چې R کیدای شي د الکایل پاتې شوني (راپیکل) د نارمل او یا منشعب زنځیر په لرلوسره، الکیل، الکیلینیل (د دوه گونې او یا درې گونې اړیکې لرونکي) د اروماتیک کړۍ او داسې نور وي.

• د گړینارد ښودونکي له الکیلایډونو او کیتونونو سره تعامل کوي چې په پایله کې الکولونه جوړېږي.



• خالص میتایل الکول بې رنگه مایع ده، ځانگړې بوی لري چې د ایتایل الکولو خوند لري او زهري دی، لږ خوړل یې د ړوندوالي لامل او د هغه زیات خوړل د مرگ لامل گرځي.

• که چېرې د الکولو په مالیکولي ترکیب کې د هایدروکسیل یو گروپ شتون ولري، دا ډول الکول د یو قیمتته الکول په نوم یا دوي او که چېرې د الکولو په مالیکولي ترکیب کې د هایدروکسیل څو گروپونه شتون ولري، دا ډول الکول د څو قیمتته الکولونو په نوم یادېږي.

• گلیسرین یو درې قیمتته الکول دی او د OH -درې گروپونه لري چې د گلیسرین سیستماتیک نوم

1, 2, 3-Propanetriol دی، دا مرکب په عادي شرایطو کې مایع او سرېسناک دی چې په اوبو کې په ښه توګه حلېږي او د اوبو د نرمولو مادې په توګه په لګښت رسیږي.

- د ایترونو عمومي فورمول $R-O-R$ او یا $Ar-O-Ar$ دی، دوی هغه مرکبونه دي چې د $(C-O-C)$ واحد لري.
- ایترونه لږ په اوبو کې حلېږي، د ایترونو د ایشیدو ټکي د هغو مالیکولو د لږ قطبیت له کبله د هغو له ایزومېرو الکولو او ایزولوګو الکانو څخه لږ دی.
- د ساده ایترونو کیمیايي فعالیت د الکولو په نسبت لږ دی، د کاربن او اکسیجن اړیکه په ایترونو کې ډیره کلکه ده او د هغې پرې کیدل په ستونزو ترسره کېږي.
- ډای ایتایل اتر (Diethyl ether) په پخوانیو وختونو کې د بې هوشه کوونکي مادې په توګه په کارول کېده.
- ایترونه الوتونکی مواد دي؛ ځکه په دې موادو کې هایډروجنی اړیکه شتون نه لري. د ایترونو کیمیايي فعالیت ډېر لږ او د عضوي مرکبونو لپاره ښه حل کوونکي دي.

د اتم څپرکي تمرین

څلور ځوابه پوښتنې


- 1- الکولونه د هایډروکاربنونو ----- مشتقات دي.
- الف - د نایټروجنی، ب - اکسیجن، ج - سلفر، د - فاسفورس.
- 2- دریمې الکول د هغو الکولو له ډول څخه دي چې د $(-OH)$ گروپ کاربن بې له ----- سره اړیکه ولري.
- الف - د کاربن دوو اتومونو سره، ب - د کاربن له درې اتومونو سره، ج - د کاربن له یو اتوم سره، د - OH له دریو گروپونو سره.
- 3- د زایمیز انزایم گلوکوز په ----- بدلوي.
- الف - الکول، ب - کیتون، ج - الډیهاید، د - تېزاب.
- 4 - د گرینارډ د معرف عمومي فورمول ---- دي.
- الف - $R-Mg$ ، ب - $R-MgX$ ، ج - $R-Mg(OH)$ ، د - $R-Mg(OH)_2$.
- 5 - د الکولو او تېزابو تعامل د ----- تعامل په نوم یادېږي.
- الف - صابون جوړونه، ب - ایسټریفیکیشن، ج - تجزیې تعامل، د - هیڅ یو.
- 6- د الکولو او Na تعامل محصول $R-O-Na$ او ----- څخه عبارت دی.

- الف - H_2 ، ب - $NaOH$ ، ج - الديهایدونه ، د - کیتونونه.
- 7- د لومړني الکولونو د اکسیدیشن د تعامل محصول ----- دی.
- الف - الديهایدونه ، ب - تېزابونه ، ج - کیتونونه ، د - هیکس یو.
- 8- هغه الکولونه چې د هایدروکسیل دوه گروپونه ولري د ----- په نوم یادېږي.
- الف - دویمې الکول ، ب - دوه قیمتې الکول ، ج - گلایکول ، د - ب او ج دواړه.
- 9- سایکلو بیوتانول د ----- جمعي فورمول لرونکی دی.
- الف - $C_6H_{13}OH$ ، ب - C_5H_9OH ، ج - $C_4H_{10}OH$ ، د - C_4H_7OH .
- 10- $C_6H_{13}OH$ د ----- جمعي فورمول دی.
- الف - *Hexanol* ، ب - *CycloHexanol* ، ج - **Heptanol** ، د - *pentanol*.
- 11- دالکولو په نوم اېښودنه کې د کاربېنول گروپ بنسټیز زنځیر نوم د ---- وروستاري باندې پای ته رسېږي.
- الف - *ol* ، ب - *al* ، ج - *ane* ، د - *one*.
- 12- د ---- الکولو په شتون کې د هغوی د ایشیدو درجې د لوړېدو لامل ګرځي.
- الف - و اندروالس قوه ، ب - هایدروجني ، ج - د ډای پول - ډای پول قوه ، د - ټول.
- 13- د ایتلین او د ----- تعامل څخه الکول لاسته راځي:
- الف - القلیو ، ب - $NaOH$ ، ج - اوبو ، د - تېزابونو.
- 14- Iso propyl ether فورمول عبارت دی له:
- الف - $CH_3-CH_2-O-CH_3$ ، ب - $CH_3-\overset{\overset{CH_3}{|}}{CH}-O-CH_2-CH_3$ ، ج - $(CH_3-\overset{\overset{CH_3}{|}}{CH})_2O$ ، د - $(CH_3-CH)_2O$.
- 15 - په الکولي تخمر کې د لاندې موادو کوم یو په الکولو بدلون مومي ؟
- الف - نشایسته ، ب - بوره ، ج - گلکوز ، د - نشایسته او بوره.
- 16- د ایتانول د دوو مالیکولونو له دي هایدریشن څخه لاندې کوم یو مرکب جوړېږي.
- الف - الديهاید ، ب - کیتون ، ج - ډای ایتایل ایتري ، د - تېزاب.
- 17- $(R)_2CHOH$ فورمول د لاندې مرکبونو له کوم یو فورمول دی ؟
- الف - دریمي الکول ، ب - لومړني الکول ، ج - ایتري ، د - هیکس یو.
- 18- $(CH_3)_2CO$ فورمول د کوم لاندې مرکب فورمول دی.

- الف - پای میتایل کیتون، ب - الدیهاید، ج - استون، د - الف اوج ددوارو.
 19- که چیرې الدیهایدونه ارجاع شي، له لاندې مرکبونو څخه به کوم مرکب ترلاسه شي؟
 الف - الکولونه، ب - تېزابونه، ج - ایترونه، د - گلايکولونه.


تشریحي پوښتنې

1- لاندې معادلې بشپړې او توازن کړئ





2 - له 200g، 80% خالص کلیسم کارباید څخه به څومره ایتایل الکول حاصل شي؟ که چیرې په دې تعامل کې 75% خالص ایتایل الکول تر لاسه شوي وي، د کلیسم کار باید مالیکول کتله 64g/mol او د ایتایل الکول 46g/mol ده.

3- د هغو ایترونو فورمولونه ولیکئ چې له لاندې الکولونو سره ایزومیر وي:



4 - د لاندې ایترونو معمولي او سیستماتیک نومونه ولیکئ:



- 5- 0.2mol پای ایتایل اتر ته له HBr غلیظ محلول سره تعامل ورکول شوی دی، څو گرامه الکول او څو گرامه ایتایل بروماید په دې تعامل کې تر لاسه کيږي؟ د ایتایل الکول مالیکولي کتله 46g/mol ده.
 6- د معتبرو کتابونو او ماخذونو څخه په گټه اخیستنې سره د گلیسرین او ایتلین گلايکول د کارولو ځایونه ولیکئ

کوم چې د دې درسي کتاب په متن کې ليکل شوي نه وي.

7- 92% خالص ايتايل الکول په 50g کميت د ايتلين د لاسته راوړنې په موخه په کار وړل شوی دی چې لاسته راغلی محصول 80% ايتلين لري.

الف - څومره الکين به حاصل شوی وي؟

ب - له همدې الکولو څخه به څومره ايتر حاصل شي؟

د ايتايل الکول ماليکولي کتله 46g/mol او ډای ايتايل ايتر 74g/mol ده.

8- د لاندې موادو د تعامل محصول او کيميايي معادلې بشپړې کړئ:

الف - که چيرې مېتايل الکول د $K_2Cr_2O_7$ په H_2SO_4 محلول کې اکسیديشن شوی وي.

ب - که چيرې 2-propanol د $KMnO_4$ په H_2SO_4 محلول کې اکسیديشن شوی وي.


نهم خپرکی

الديهایدونه او کیتونونه

د هایدروکاربنونو اکسیجن لرونکي مرکبونه ډېر دي؛ له دې کبله په بیلا بیلو ټولګیو وېشل شوي دي،
الديهایدونه او کیتونونه هم د هایدروکاربنونو نور اکسیجن لرونکي مشتقات دي چې په صنعت کې
بنسټیز رول لوبوي. هغوی د رنگونو په جوړولو، د ژویو د جسدونو د ساتلو، د ربړ، پلاستیک، د عطر
جوړونې او په نورو برخو کې دکارولو ځایونه لري. دا مرکبونه په دې خپرکي کې مطالعه کېږي او ددې
خپرکي په لوستلو به پوه شئ چې الديهایدونه او کیتونونه څه ډول مرکبونه دي او له کومو سرچینو څخه
لاسته راځي؟ دکومو ځانګړتیاوو لرونکې او په کومو برخو کې کارول کېږي؟


9: الديهيد او کتون (د کاربونیل د گروپ مرکبونه)

د کاربونیل ($C=O$) گروپ په ځانگړو عضوي مرکبونو کې شتون لري چې دې مرکبونو ته يې ځانگړي خواص ورکړي دي، د کاربن او اکسیجن اتومونه په دې گروپ کې دوه گونې اړیکه لري چې یوه يې د پای (π) اړیکه او بله يې د سگما (σ) اړیکه ده چې د کاربن د اتوم SP^2 -hybrid اوربیتال او د اکسیجن د اتوم SP^2 -hybrid اوربیتال د مستقیمې ننوتنې او پوښ څخه منځته راغلي ده. د پای (π) اړیکه د کاربن د $2P$ نه هایبرید شوي اوربیتال او اکسیجن د $2P$ نه هایبرید شوی اوربیتالونو د څنګیز ننوتنې په پای کې منځته راځي. په لاندې شکل کې د کاربونیل وظیفه یي گروپ ځانګړتیاوې وړاندې شوي دي:



(9 - 1) شکل: د کاربونیل په گروپ کې د اړیکو ځانګړتیاوې

د کاربونیل د مرکبونو جوړښت چې عبارت له الديهيدونو او کيتونونو څخه دي، يو بل ته ورته دي، يوازې د کاربونیل د گروپ له کاربن سره د هایډروجن د اتومونو په شمیر کې يو له بل څخه توپیر لري چې د هغوی عمومي فورمولونه په لاندې ډول دي:



په دې فورمولونو کې R او R' عضوي پاتې شوني راديکالونه دي چې کيدای شي، الفاتيک يا اروماتيک وي.


9 - 1: الديهيدونه (Aldehydes)

الديهيدونه د هایډروکاربنونو اکسیجنې مشتقات دي چې د کاربونیل ($C=O$) وظیفه یي گروپ د هایډروکاربنونو يو اتوم هایډروجن يې ځایه کړی دی (په فارم الديهيد کې د کاربونیل د گروپ دواړه اړیکې په استثنایي ډول د هایډروجن له دوو اتومونو سره تړلې دي).

په الديهيدونو کې وظیفه یي گروپ د کاربونیل گروپ دی چې د هغه يو ولانسي الکترن په هایډروجن او دویم ولانسي الکترن يې له عضوي پاتې شونو سره تړل شوی دی، عضوي پاتې شوني کيدای شي، اليفاتيک او يا

اروماتيک وي؛ دبیلګې په ډول: د الديهيدونو عمومي فورمول $R-C(=O)-H$ دی او R کيدای شي چې د C_2H_5 , CH_3 او نور راديکالونه وي.

د اروماتيک الديهيدونو فورمول $Ar-C(=O)-H$ دی چې د هغوی بیلګه کيدای شي بنزالديهيد وړاندې کړای شي:



د اليفاتيک الديهايدونو عمومي فورمول له $C_nH_{2n}O$ څخه عبارت دی:

مثال:

د هغه الديهايد ماليکولي فورمول پيدا کړئ چې په هغه کې د کتلې له کبله 40% کاربن شتون ولري (د کاربن د اتوم کتله 12، هايډروجن 1 او اکسيجن 16 ده)

حل: د الديهايد ماليکولي کتله عبارت ده له: $MC_nH_{2n}O = 12n + 1 \cdot 2n + 16 = 12n + 2n + 16 = 14n + 16$

$$100g \quad \quad \quad 40g, \quad 100g \cdot 12n = (14n + 16) \cdot 40g$$

$$14n + 16 \quad \quad \quad 12n, \quad 12n = \frac{40g(14n + 16)}{100g}$$

$$12n = \frac{2(14n + 16)}{5}, \quad 12n = \frac{28n + 32}{5}, \quad 60n = 28n + 32$$

$$60n - 28n = 32, \quad 32n = 32, \quad n = \frac{32}{32}, \quad n = 1$$

$C_nH_{2n}O = C_1H_{2 \cdot 1}O = CH_2O$ farmaidehyde, پورتنی لاس ته راغلی مرکب فارم الديهايد دی.

فعاليت:









د يو الديهايد کثافت $1.8g/L$ دی، د کوټې په تودوخه کې د هغه يومول $4L$ حجم لري، د هغه فورمول پيدا کړئ (د هايډروجن کتله $1amu$ ، د کاربن کتله $12amu$ او د اکسيجن کتله $16amu$ ده)

9 - 1 - 1: نوم ايښودنه



د الديهايدونو معمولي يا راډيکالي نوم ايښودنه د هغوی د اړوند تېزاب کوم چې د هغه له ارجاع څخه دا الديهايد لاسته راغلی دی، اخېستل شوې ده، داسې چې د *acid* - کلمه په *aldehyde* او د اړوند تېزابونو د نوم د *oic* وروستيايي په (*yl*) بدلون موندلی.

مثال: (Propanoic acid $\longrightarrow$ propylaldehyde)

د ايوپيک په نوم ايښودنه کې د کاربونيل لرونکي ډېر اوږد زنځير په گوته او نمبر وهل کيږي، داسې چې بايد لومړی نمبر د کاربونيل د گروپ کاربن کې وليکل شي. د نمبر وهلو په بنسټ د بنسټيز زنځير د کاربنونو شمېر ټاکل کيږي؛ په دې صورت کې بنسټيز زنځير چې اړوند هايډروکاربن دی، د نوم د وروستي *e* توري پر ځای يې د *al* وروستيايي ليکل کيږي، د معاوضو نوم د بنسټيز زنځير د کاربن له نمبر سره چې په هغه پورې تړلی دی، د نوم ايښودلو په پيل کې د بنسټيز زنځير له نوم څخه مخکې ليکل کيږي، لاندې د الديهايدونو د معمولي او ايوپيک د نوم ايښودنې بيلگې وړاندې شوې دي:




د عددونو د نمبر وهلو سريره چې د کاربونيل د گروپ له کاربن څخه پيل کيږي، په یونا ني تورو γ, β, α او σ باندې هم د کاربونونو اتومونه په بنسټيز زنځير کې چې له دوهم کاربن څخه پيل کيږي، نمبر وهل کيږي، د معاوضو نومونه په همدې اړونده تورو باندې يادېږي؛ د بيلگې په ډول:



خپل ځان وازمويئ

1 - د لاندې مرکبونو نوم ايښودنه وکړئ:




2 - د لاندې مرکبونو جوړښتيز فورمول وليکئ:

a - iso butanal b - 2,3,4 - tri hydroxy butanal c - p - methy benzaldehyde
d - 2 - bromo propanal e - 2,3, - di hydroxy hexanal

9-1-2: د الډهايدونو فزيکي خواص


د الډهايدونو قطبي ماليکولونه د غېر قطبي مرکبونو پر پرتله چې د هغوی ماليکولي کتله يو له بل سره نژدې وي پرته له الکولو څخه د ايشيدو لوړ ټکی لري؛ لکه:



فارم الډهايد د کوټې په تودوخه (25°C) کې د گاز حالت او هغه الډهايدونه چې د کاربن 2-11 اتومه لري، دمايع او له 11 کاربنونو څخه لوړ د جامد حالت لري.

کوچني الډهايدونه د اوبو له ماليکولونو سره هايډروجنې اړيکه جوړوي؛ نو په اوبوکې د حل کيدلو ښه وړتيا لري، د مولې کتلې په زياتوالي د ماليکولونو قطبيت ټيټېږي او د هايډرو کاربنې گروپ اغيزې ډيرېږي، له همدې کبله په اوبوکې د هغوی د حل کيدلو کچه ټيټېږي.

فارم الډهايد او نور الډهايدونه د ايزولوگو الکولونو له فورمولونو څخه دوه اتومه هايډروجن کم لري؛ نو له دې امله د الډهايدونو نوم له هايډروجن پرته الکول (Alcohol dehydrogenation = Aldehyd) څخه اخېستل شوی دی.



(9-2) شکل: په الډهايدونو کې هايډروجنې اړيکې

هغه الديهایدونه چې د کوچنۍ مولې کتلې لرونکي دي، تېز بوی لري او د مولې کتلې په زیاتوالي یې بوی ښه او په زړه پورې وی؛ نو د ښه بوي ورکولو او د خوړو د لاسنه خوند لپاره کارول کېږي. په لاندې جدول کې د ځینو الديهایدونو ځانګړتیاوې لیکل شوي:

(1-9) جدول: ځینو مهمو الديهایدونو ځانګړتیاوې:

نوم	فورمول	$mp(^{\circ}C)$	$bp(^{\circ}C)$	$d_{20}^{\circ}C(g/mL)$	Solubility (g/100gH ₂ O)
Formol dehyde (methanal)	HCHO	-92	-21	0,815	ډیر حل کېږي
Acetaldehyde (ethanal)	CH ₃ CHO	-125	21	0,783	ډیر حل کېږي
Pro pionaldehyde (propanal)	CH ₃ -CH ₂ -CHO	-81	49	0,806	ډیر حل کېږي
n-butyraldehyde (butanal)	CH ₃ (CH ₂) ₂ -CHO	-99	76	0,817	حل کېږي
n-valeraldehyde (pentanal)	CH ₃ (CH ₂) ₃ -CHO	-91,5	102	0,810	لږ حل کېږي
caproaldehyde (hexanal)	CH ₃ -(CH ₂) ₄ -CHO	-51	131	0,833	لږ حل کېږي
benzenecarbaldehyd (benzaldehyde)	C ₆ H ₅ CHO	-26	178	1,42	لږ حل کېږي


9-3-1: د الديهایدونو کیمیاوي خواص


د الديهایدونو کیمیاوي فعالیت له کیتونونو څخه توپیر لري؛ ځکه د الديهاید د کاربونیل په ګروپ کې د هایډروجن او (π) اړیکې شتون د هغوی د ډېر فعالیت لامل شوی دی چې له هایډروجن او نورو مرکبونو سره جمعي تعاملونه ترسره کولی شي، الديهایدونه لاندې ځانګړي تعاملونه ترسره کوي.

- 1 - د کاربونیل ګروپ د جفتو اړیکو پرنسټ جمعي تعاملونه سرته رسوي.
- 2 - د نایتروجن لرونکو بېلابېلو وظیفه یي ګروپونو سره د اکسیجن د اټوم تعویض کېدلو تعامل.
- 3 - د تراکم تعامل (Condensation reaction).
- 4 - د اکسیدیشن او ریدکشن تعاملونه.


1 - د الديهایدونو اکسیدشن

الديهایدونه د قوي اکسیدانتونو؛ لکه: K_2CrO_4 یا $K_2Cr_2O_7$, $KMnO_4$ ، د تېزابونو په شتون کې اکسیدې او په پایله کې کاربوکسلیک اسیدونه جوړېږي:






د تولين (Tollen) تجربه (د ښيښې جيوه): د سپينو زرو د نايټريتو او د امونيا داوبلن محلول مخلوطي بڼه د تولين ښودونکي په نوم يادوي، دا محلول د $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ په بڼه ښکاره کيږي او له هغه څخه د الديهيدونو په اکسيديشن کې گټه اخېستل کيږي، په دې صورت کې د $1 +$ اکسيديشن نمبر لرونکي سپين زر په فلزي سپينو زرو ارجاع کيږي او الديهيدونه د کاربوکسيلېټونو ايونونو په بڼه اکسيدي کيږي:



د تولين ښودونکي له ځينو الديهيدونو سره د تودوخې په شتون او له ځينو نورو الديهيدونو سره په سرې تودوخې کې تعامل کوي، د تعامل محصول سپين زر دي چې د ښيښې د پاسه رسوب او د ښيښې د جيوه کېدو لامل گرځي:





(9-3) شکل: د تولين ازمايښت (Tollen test)

- الف - په پاک بيکر کې د سپينو زرو نايټريت او د امونيا داوبلن محلول شتون
 ب - تاسې کولی شئ د محلول رنګ وگورئ چې د ايتال د اکسيديشن او د بدلون له امله په اسيتيک اسيد باندې منځ ته راځي.
 ج - فلزي سپين زر د ښيښه يي بيکر په ديوال باندې رسوب کوي او هغه جيوه کوي. ټول الديهيدونه دا ډول تعاملونه سرته رسولی شي.

مثال: د تولين د ښودونکي د تعامل معادله د لاندې الديهيدونو سره وليکئ:

الف - فارم الديهيد (form aldehyde) ب - اسيت الديهيد (acet aldehyde)

حل



فعالیت




محاسبه یی کری

د گلایکول او اسیت الیهاید د مخلوطو یو گرام د تولین بنودونکی سره تعامل کری چې 1.08g د سپینوزرو ایونونه ترې لاسته راغلي دي، په دې محلول کې به د اسیت الیهاید کچه خومره وي؟


د فهلنگ آزمایش

فهلنگ بنودونکی محلول قلوي خاصیت لري چې د Cu^{2+} ایونو او دپوتا شیم سودیم تارتاریت له مالګې $(Na_2C_4H_4O_6)$ څخه جوړشوی دی او د کامپلکس په بڼه شتون لري، کله چې د فهلنگ بنودونکی له الیهایدونو سره تعامل وکړي، په کامپلکس کې د Cu^{2+} رنگ د خیره اوبو له رنگ څخه په سور رنګه تور د مسو په یو ولانسه اکساید (Cu_2O) بدلون مومي؛ په دې صورت کې الیهاید په همدې وخت کې په کاربوکسلیت ایون $(R - COO^-)$ بدلیږي:



اروماتیک الیهایدونه یوازې د تولین بنودونکي په واسطه اکسیدي کیږي؛ خو د فهلنگ بنودونکي په واسطه نه اکسیدی کیږي.


که چیرې ایتانل په $21^\circ C$ تودوخه کې د فهلنگ له محلول سره په یو تست تیوپ (ازمایشي نل) کې واچول شي، په دې صورت کې CuO او اسیتیک اسید لاسته راځي:



(9 - 4) شکل: د ایتانل تعامل د فهلنگ بنودونکي سره

له $KMnO_4$ سره د الیهایدونو تعامل

الیهایدونه له پوتاشیم پرمنگانیت سره تعامل کوي په پای کې الیهایدونه په کاربوکسلیک اسیدونو اکسیدي کیږي او Mn^{+7} له اکسیدیشن نمبر څخه په $+2$ اکسیدیشن نمبر پورې اړجاع کیږي:




د الډيهايډونو جمعي تعاملونه


د کاربونیل د ګروپ لرونکو مرکبونو د بنسټیزو تعاملونو څخه یو جمعي تعامل دی، په دې تعاملونو کې د $C=O$ د ګروپ د (π) اړیکه پرې کیږي چې د کاربن اتوم څه نا څه مثبت چارج (δ^+) اود اکسیجن اتوم منفي څه نا څه چارج (δ^-) د خپل الکترونیګاتیویتی پر بنسټ تر لاسه کوي اود وروستیو تعاملونو لاره برابری په پایله کې د کاربن او د اکسیجن اتومونه له نورو اتومونو سره نوې اړیکې تړي او نوي مرکبونه جوړیږي.

له هایډروجن سره د الډيهايډونو جمعي تعاملونه

هایډروجن له الډيهايډونو سره د Ni او Pt د کتلستونو په شتون کې تعامل کوي چې په پایله کې لومړني الکولونه



لاسته راځي:




methanal

methanol

له الکولو سره د الډيهايډونو جمعي تعامل


د انهایډرایټ تېزاب (anhydrous acid) د کتلست په شتون کې، الکولونه له الډيهايډونو سره تعامل کوي، داسې چې د الکواکسي ګروپ ($R-O-$) د کاربونیل ګروپ د کاربن له اتوم سره او H^+ د کاربونیل ګروپ د اکسیجن په اتوم باندې نښلی چې په لومړي پړاو کې هیمې اسیټال (hemiacetal) او په دویم پړاو کې Acetal

منځته راځي:




لومړی پړاو

نمونوي بېلګه:




دویم پړاو





hemiacetal alcohol

acetal




له GCN سره د الډيهايډ جمعي تعامل

د دې تعامل محصول سيانو هايډرینونه دي. HCN زهري گاز دی؛ نو ددې گاز مستقیم تعامل له الډيهايډونو سره اړین نه دی. د CN^- د ایون مالګه چې له فعالو فلزونو؛ لکه: Na او K سره جوړه کړې ده، د H_3PO_4 او H_2SO_4 له غیر عضوي تېزابونو سره تعامل ورکوي او په پایله کې HCN لاسته راوړي چې له جوړېدو وروسته هغه ته له الډيهايډونو سره تعامل ورکوي، سيانو هايډرینونه لاسته راځي:




د ګرینارډ له ښودونکي سره د الډيهايډونو جمعي تعامل

د الډيهايډونو جمعي تعامل د ګرینارډ له ښودونکي سره د الکولونو د لاسته راوړنې لپاره یو ډېر مهم میتود دی چې د دې تعامل په لومړي پړاو کې الکا اکسایډونه (Alikoxides) تولیدیږي. Alkoxides د تېزابو په شتون کې هايډرولیز کیږي:




پولیمیرایزیشن (Polymerization)


د الډيهايډونو ماليکولونه د بیلا بیلو مرکبونو له وظیفه یي ګروپونو سره د پولي میرایزیشن تعامل تر سره کوي او په پایله کې پولي میرونه جوړیږي چې د الډيهايډونو د پولي میرایزیشن په تعامل کې د الډيهايډونو د پای (π) اړیکه پرې کیږي. یو مالیکول د اکسیجن اتوم د بل مالیکول د کاربن له اتوم سره اړیکه جوړوي او د دې تعامل په پایله کې د هغو کریز او خطي زنځیري مرکبونه جوړیږي:



زنځيري پولي مير:





پولي کره ييز پولي مير:



د الیهایدونو پولي مير د الیهایدونو خواص نه لري؛ ځکه په هغوی کې الیهاید گروپ نه شته دی. د پولي مير د ایشیدو ټکی له اړوندو الیهایدونو څخه لوړ دی.

د الیهایدونو د سوزیدلو تعامل (Combustion reaction)

د الیهایدونو د سوزیدلو د تعامل محصول CO_2 ، اوبه او انرژۍ ده، د الیهایدونو د تعامل عمومي معادله په لاندې ډول ده:



فعالیت





د اسیت الیهاید جمعي تعامل له لاندې مرکبونو سره ولیکئ:

الف - اوبه، ب - هایډروجن، ج - میتیل الکول، د - $NaHSO_3$

9 - 1 - 4: د الیهایدونو لاسته راوړنه

1 - د لومړي الکولونو اکسیدیشن: که چیرې لومړنې الکولونه اکسیدیشن شي، الیهایدونه لاسته راځي. د لومړنيو الکولونو د اکسیدیشن منځنۍ حالت تر کاربوکسلیک اسید پورې، الیهایدونه دي، دا تعامل د کتلست په شتون کې ترسره کېږي:





په دې تعامل کې د اکسیدي کوونکي عامل $K_2Cr_2O_7$ دی.

2 - د لومړنيو الکولو دي هایډروجنیشن


که چیرې لومړني الکولونه د کاپر (II) اکساید او کرومیم (III) اکساید له ($CuO \cdot Cr_2O_3$) مخلوط سره چې د کتلست په توګه دنده ترسره کوي، دي هایډروجنیشن شي، الیهایدونه تر لاسه کېږي. د دې تعامل میتود داسې

ده چې د الكولونو پراسونه په $250-300^{\circ}C$ تودوخې كې له كاپر كرومايت څخه تيروي چې د لومړني الكول له هر ماليكول څخه يو ماليكول هايډروجن جلا كيږي. له هغو الكولو څخه چې د كاربنونو د لږو اتومونو لرونكي دي، د CuO د كتلت په شتون كې هم هايډروجن جلا كيږي:



د عضوي تېزابونو د ارجاع كولو په واسطه د الډيهايډونو لاسته راوړنه


كه چيرې عضوي تېزابونه ارجاع شي، په پايله كې الډيهايډونه لاسته راځي، په دې تعامل كې د يو عضوي تېزاب او د فارميك اسيد پراسونه د TiO_2 له كتلت څخه په $300-350^{\circ}C$ تودوخه كې تير وي، په پايله كې الډيهايډونه، CO_2 او H_2O لاسته راځي:



9 - 1 - 5: ځنې مهم الډيهايډونه

فارم الډيهايډ:


د الډيهايډونو لومړنی مركب فارم الډيهايډ دی چې روسي كيميا پوه بوتليروف په واسطه په 1859م. كال كې كشف شو. فارم الډيهايډ بې رنگه گاز دی چې تېز بوی لري، د الډيهايډونو ډېر ساده مركب فارم الډيهايډ يا ميتالن دی چې فارمل هم نومول شوی دی. فارم الډيهايډ هغه ماده ده چې زياتره له اوبو سره د محلول په بڼه د ژونديو موجوداتو د جسدونو د ساتلو په موخه ورڅخه گټه اخېستل كيږي. د لرگيو لوگيو كې هم فارم الډيهايډ شته دی




شكل: (9 - 5) د فارملين محلول

چې يو وژونکی مركب دی. په اوبو كې حل كيږي او د هغه 40% محلول د فارملين په نوم ياد شوی دی چې ډېر استعمال لري، فارم الډيهايډ د ساختماني موادو په صنعت او د كور په وسايلو كې كارول كيږي.

فارم الډيهايډ له آمونيا سره جمعي تعاملونه (پوليميريزېشن) ترسره كوي چې مهم او با ارزښته مركب هگزا ميتلين تترامين (يورو تروپين) جوړوي. يورو تروپين په طبابت كې د تشو ميتازو د نل د مينځلو او پاكولو لپاره او په صنعت كې د سربښ او كنډ د كلكولو او په همدې ترتيب هغه په خوړو كې وړ زياتوي چې د هغه د خرابيدلو څخه مخنيوی كوي.




که چیرې فارم الیهاید ته تودوخه ورکړل شي، سپین کرسټلي حالت ځانته غوره کوي، دا کرسټلونه د تودوخې په 123°C کې ویلې کیږي، په دې پولیمیر کې له 50 تر 100 پورې د الیهایدونو، مونو میرونه شتون لري، تشکیل شوی پولیمیر خطی دی، که چیرې ورته تودوخه ورکړل شي، بیا په فارم الیهاید تجزیه کیږي:




د فارم الديهايد لاسته راوړنه

که چیرې میتانول د گوګړو تېزابو په شتون کې اکسیدایز شي؛ په پایله کې فارم الیهاید لاسته راځي. په لابراتوارو کې له K_2CrO_4 یا $K_2Cr_2O_7$, $KMnO_4$ تېزابي محلول د اکسیدیشن د عامل په توګه کار اخیستل کېږي.





د تعامل د محصول تند او تیز بوی د فارم الديهاید د جوړیدو ښودونکی دی. په صنعت کې فارم الديهاید داسې لاسته راوړل کېږي چې د میتانول او هوا مخلوط له سرو او ډیرو تود مسو څخه تیروي او په پایله کې له میتانول څخه یو مالیکول اوبه جلا کېږي:




2 - اسيت الديهايد


خالص اسیت الیهاید بې رنگه او زهري مایع ده چې په اوبو کې حلېږي، د ایشیدو ټکی یې 21°C دی. له اسیت الیهاید څخه اسیتیک اسید، ایتانول او مصنوعي ربر لاسته راوړی:




اسیت الیہاید دکوتی پہ تودوخه کی دگوگرو تیزابو په شتون کی کره ییز پولی میر (پارا الیہاید) جوړوي چې یو تراي میر دی چې دی مرکب ته پارا الیہاید وایی:



پارا الديهاید د میوې په شان خوند لري او په 124°C کې په ایشیدو راځي چې خوب راوړونکی مرکب دی؛ له دې کبله له هغه څخه په ساینس او طبابت کې د خوب راوړونکي مادې (د مقناطیسي خوب) په توګه ګټه اخېستل کیږي. پارا الديهاید بیرته د ګوګرو تېزابو په شتون کې په اسیت الديهاید تبدیلېږي. میتالديهاید جامده ماده ده او په 122°C کې الوزي چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې عسکرو د خپل ځان د تودولو لپاره د جامد ایتانول په ځای په کارورل چې له اسیت الديهاید تترامیرایزیشن څخه لاس ته راځي:




کله چې اسیت الديهاید ته د قوي القلیو غلیظ محلول په شتون کې د ایشیدو پورې تودوخه ورکړل شي، د هغه مالیکولونه یو له بل سره تړل کیږي چې خطي پولي میرونه منځته راوړي:



9 - 2: کیتونونه (Ketones)


په هغو مرکبونو کې چې د کاربونیل وظیفوي ګروپ د الکیلل د دوو پاتې شونو سره اړیکې ولري، دا ډول مرکبونه د کیتونونو په نوم یادېږي. د کیتونونو عمومي فورمول په هغه صورت کې چې $n = 3$ او یا له هغه کم نه وي دی، هغه الديهایدونه او کیتونونه چې یوشان جمعي فورمول ولري، یو د بل ایزومیر دی؛ د بیلګې په ډول:



9 - 2 - 1: د کیتونونو نوم ایښودنه


1- معمولي نوم ایښودنه

په معمولي نوم ایښودنه کې د R (د الکیلل ګروپونه) یا Ar (د اریل ګروپ) پاتې شونې په جلا ډول (که چېرې سره ورته وي، د ډای کلمه د مختارې په بڼه په هغوي باندې ور زیاتېږي) نومول کیږي او د کیتون کلمه پر هغوی ور زیاتېږي:




خیل خان و ازموئی

د لاندې کیتونونو نوم ایښودنه په معمولي لارې تر سره کړئ:



2- د ایوپک (AUPAC) پر لارې د کیتونونو نوم ایښودنه


د کیتونونو په نوم ایښودنه کې اوږد زنځیر چې د کاربونیل ګروپ په هغه کې نښتی وي، ټاکل کېږي او نمبر وهل یې تر سره کېږي، خو نمبر وهل د زنځیر له هغه خوا څخه پیلېږي چې د کاربونیل ګروپ کوچنی نمبر ځانته غوره کړي؛ په دې صورت کې لومړی د هغه کاربن نمبر کوم چې معاوضه ورسره تړلې ده، لیکل کېږي له نمبرونو څخه وروسته د هغو د معاوضو نوم لیکل کېږي چې له همدې کاربن سره اړیکه لري، بیا د کاربونیل د ګروپ د کاربن نمبر مخکې د اوږد زنځیر له نوم سره لیکل کېږي او د اوږد زنځیر په نامه کې چې د کاربونیل ګروپ لرونکي دي، د اړونده هایډروکاربن د نوم وروستی توری (e) یې په one تعویض کېږي:



فعالیت



د لاندې مرکبونو نومونه د IUPAC په سیستم ونوموئ:



9 - 2 - 2: د کیتونونو فزیکي خواص

د کوچنۍ مولې کتلې لرونکي کیتونونه د مایع په حالت موندل کېږي او هغه کیتونونه چې د 11 او یا له دې شمیر څخه ډېر د کاربن اتومونه ولري، د جامد په حالت موندل کېږي، مایع کیتونونه په اوبو کې حل کېږي او د اوبو له مالیکولونو سره هایدروجنې اړیکه جوړوي، مایع کیتونونه د کیمیاوي رنګونو د حل کوونکو په توګه کارول کېږي. په اوبو کې د کیتونونو حل کیدل د هغوی د مالیکولي کتلې په لوړوالي تیتیري او په زړه پورې بوی لري چې الډیهایدونو ته ورته بوی دی. سره له دې چې د کیتونونو مالیکولونه قطبي دي؛ خو د هغوی کاربونیل ګروپ هایدروجنې اړیکه نه شي ټینګولای؛ ځکه د هغوی په مالیکول کې هایدروجن له اکسیجن سره اړیکه نه لري. د الکایل د ګروپونو د کاربن د اتومونو په زیاتوالي، د هغوی قطبیت تیتیري. هغه کیتونونه چې د هغوی مولې کتله د هایدروکاربنونو او ایترنونو سره یو شان ده، د ایشیدو ټکي پې لوړ دی، خو له یوشان الکولونو څخه یې د اېشېدو ټکي ټیټ دی:


	CH_3		O	OH
Formula	$\text{CH}_3 - \overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CH}}} - \text{CH}_3$	$\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	$\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\underset{ }{\text{C}}} - \text{CH}_3$	$\text{CH}_3 - \overset{\text{OH}}{\underset{ }{\text{CH}}} - \text{CH}_3$
Name	isobutane	ethyl methyl ether	di methyl Ketone	iso propanol
bp	-120°C	$10,8^\circ\text{C}$	56°C	$82,3^\circ\text{C}$

(9 - 2) جدول: د مهمو کیتونونو فزیکي خواص


Name نوم	structure جوړښت	np(°C)	bp(°C)	d20°C (g / mL)	Solability in water (g / 100mL H ₂ O)
Acetone	$\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\underset{ }{\text{C}}} - \text{CH}_3$	-95	56	0,790	زیات حل کېږي
Butanone	$\text{CH}_3 - \text{COCH}_2 - \text{CH}_3$	-86	80	0,805	زیات حلیدونکی
2 - Pentanone	$\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	-78	102	0,812	حلیدونکی
3 - Pentanone	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	-39	102	0,816	حلیدونکی
2 - Hexanone	$\text{CH}_3 - \text{CO} - (\text{CH}_2)_3 - \text{CH}_3$	-57	127	0,830	لږ حلیدونکی
Acetophenone	$\text{CH}_3\text{COC}_6\text{H}_5$	21	202	1,028	نه حل کیدونکی
Benzophenone	$\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CO} - \text{C}_6\text{H}_5$	48	306	1,100	نه حل کیدونکی

9 - 2 - 3: د کیتونونو کیمیاوي خواص


د کیتونونو د کاربونیل په ګروپ کې د هایدروجن اتوم شتون نه لري؛ نو پردې بنسټ د ارجاع د عامل په توګه



فعالیت نه شي تر سره کولی. دا مرکبونه کولی شي په ارجاعي تعاملونو کې د اکسیدیشن د عامل په توګه برخه واخلي. که چیرې کیتونونو ته د قوي اکسیدانتونو په شتون کې زیاته تودوخه ورکړل شي، د هغوی کاربني زنځیر پرې او په پایله کې په عضوي تېزابونو بدلون یا داچې په بشپړه توګه تجزیه کېږي؛ پر دې بنسټ متناظر کیتونونه په دوو بېلابېلو تېزابونو او غیر متناظر کیتونونه په څلورو بېلابېلو تېزابونو تجزیه کېږي:



acetone acetic acid formic acid





2-pentanone acetic acid formic acid propanoic acid butanoic acid

د کیتون د کاربونیل ګروپ د کاربن اټوم او د اکسیجن اټوم د کاربني زنځیر له ماتیدلو وروسته فعالیتږي، سره له دې چې له الډیهایدونو څخه لږ فعالیتږي؛ خو بیا هم جمعي تعاملونه تر سره کولی شي:


1- د هایدروجن سره د کیتونونو جمعي تعامل

کیتونونه له هایدروجن سره د فلزي کتلستونو (Pd, Pt, Ni) په شتون کې تعامل کوي چې په پایله کې دویمي الکولونه جوړېږي. په دې صورت کې کیتونونه ارجاع کېږي:




2- له اوبو سره د کیتونونو جمعي تعامل

که چیرې کیتونونه په اوبو کې حل شي، د کیتونونو هایدرايتي بې ثباته حالت منځته راځي؛ داسې چې د اوبو د هایدروجن اټوم د کاربونیل ګروپ د اکسیجن په اټوم باندې او د اوبو د OH- ګروپ د کاربونیل ګروپ د کاربن په اټوم باندې نښلي، په اوبو کې حل شوی کیتون او هایدرايتي حالت یې په یوه تعادل کې شتون لري:




نوبت: په هغو الکولو کې چې د هایدروکسیل دوه ګروپونه د کاربن له یو اټوم سره اړیکه ولري، بې ثباته دي.



اسیتون

9-2-4: د کیتونونو لاس ته راوړنه:


۱- د دویمي الکولونو له اکسیدیشن څخه کیدای شي چې کیتونونه لاس ته راوړل شي، له اړوند الکول څخه د لاس ته راغلو کیتونونو د ایشیدو ټکي ټیټ دی؛ نو له دې کبله کیتونونه د براسونو په حالت لاسته راځي:



۲- که چېرته دویمي الکول د هایدورجنیشن شي کیتونونه حاصلیږي د دویمي الکولو براس د تودو ($\text{CuO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$) د پاسه تېر شي یو مالیکول هایدروجن د اړوند الکولو څخه جدا او کېون حاصلیږي.



۳- د اوبو او استین د کورنۍ د جمعي تعامل څخه هم کولی شي چې کېتونونه په لاس راوړي. د گوگړو تېزابو د سیمابو د مالګې (HgSO_4) د الکاینونو د پاسه اوبو ورزیاتې شي په نتیجه کې کېتونونه حاصلیږي.




د کیتونونو مرکبونه

اسیتون (Aceton): اسیتون د پروپانون اویا ډای میتیل کیتون په نوم هم یادیږي. دا مرکب بې رنگه مایع ده چې تیزبوی لري او الوتونکي ماده ده، په 56°C کې په ایشیدو راځي، په اوبو، الکولو او ایترونو کې په هر نسبت حل کیږي، د عضوي موادو ښه محلول هم دی. د ورنسو رنګونو، د نوکانو په رنګونو، پلاستیکو، د غوړو په رنګونو او د هغوی د مشتقاتو، د کنډو او لاکو ښه حلونکې ماده ده. اسیتون د هغو وګړو په تشو میتيازو کې شتون لري کوم چې د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي. ددې وګړو تشې میتيازې د اسیتون بوی لري. اسیتون په اوبه رنګه لمبه سوځي او په ستونزو سره اکسیدایز کیږي.


د اسیتون لاسته راوړنه:

1 - د لرگیو تقطیر: د لرگیو تقطیر له ټولو محصولاتو څخه 0.5% یې اسیتون دی چې کیدای شي هغه د تدریجي تقطیر له امله جلا کړای شي.

2 - د لاندې دستگاه په واسطه، کلسیم اسیتیت ته د تودوخې په ورکولو هم کیدای شي، اسیتون لاس ته راوړل شي:



(9-6) شکل: له کلسیم اسیتات څخه د لاس ته راوړلو دستگاه



د نهم خپرکي لنډيز




گروپ په ځانگړو عضوي مرکبونو کې شتون لري چې دې مرکبونه يې ځانگړی خواص ورکړي دی.

- الديهایدونه د هایدروکاربنونو اکسیجني مشتقات دي چې د کاربونیل ($C=O$) وظیفه يې گروپ د هایدروکاربنونو یو اټوم هایدروجن تعویض کړی دی.
- د الديهایدونو معمولي یا راډیکالي نوم ایښودنه د هغوی د اړونده تېزابونو کوم چې د هغه له ارجاع څخه دا الديهاید لاس ته راغلي دي، اخیستل شوې ده، داسې چې د *acid* - کلمه په *aldehyde* او د اړوند تېزابونو د نوم د *oic* وروستاړي په (*yl*) بدلېږي.
- د الديهاید قطبي مالیکولونه د غېر قطبي مرکبونو په نسبت چې د هغوی مالیکولي کتله یو له بل سره نژدې وي (د الکولو په استثنا) د اېشېدو لوړ ټکی لري.
- د الديهایدونو کیمیايي فعالیت له کیتونونو څخه توپیر لري؛ ځکه د الديهاید د کاربونیل په گروپ کې د هایدروجن او د (π) اړیکې شتون د هغوی فعالیت ډېر کړی دی چې له هایدروجن او نورو مرکبونو سره جمعي تعاملونه ترسره کولی شي.
- فارم الديهاید هغه مایع ده چې عموماً له اوبو سره د محلول په بڼه د ژونډیو موجوداتو د جسدونو د ساتلو په غرض ورڅخه گټه اخیستل کېږي او د هغه 40% محلول د فارملین په نوم یاد شوی دی چې ډېر استعمال لري، فارم الديهاید د ساختماني موادو په صنعت او د کور په وسایلو کې کارول کېږي.
- د اسیتیک اسید له ارجاع څخه اسیت الديهاید او د هغه له اکسیدیشن څخه اسیتون لاسته راځي.
- خالص اسیت الديهاید بې رنگه او زهري مایع ده چې په اوبو کې حلېږي، د ایشیدو ټکی يې $21^\circ C$ دی.
- له اسیت الديهاید څخه اسیتیک اسید، ایتانول او مصنوعي ربړ لاسته راوړي.
- د کیتونونو عمومي فورمول په دې صورت کې چې $n=3$ او له دریو څخه کم نه وي صحیح دی ($R-C(=O)-R$ یا $R-C(=O)-R$)، دی، هغه الديهایدونه او کیتونونه چې یوشان جمعي فورمول ولري، یو له بل ایزومیر دي.
- د لومړنیو الکولونو له اکسیدیشن څخه الديهاید او د دویمي الکولونو له اکسیدیشن څخه کیتون لاسته راځي.
- اسیتون د پروپانول اویا ډای میتایل کیتون په نوم هم یادوي. دا مرکب بې رنگه مایع ده چې تیز بوی لري او مفر (فرار کیدونکی) ماده ده، په $56^\circ C$ کې په ایشیدو راځي.
- دلرگیو د تقطیر له مجموعي محصولاتو څخه، 0.5% يې اسیتون دی چې کیدای شي هغه د پرله پسې تقطیر په واسطه جلا کړی شي.

د نهم څپرکي پوښتنې



څلور ځوابه پوښتنې

1. د کاربونیل د وظیفه یي گروپ فورمول ----- دی.
الف - $(C=S)$ ، ب - $(C=O)$ ، ج - $(C-OH)$ ، د - $(COOH)$
2. د الډیهاید او HCN د جمعي تعامل محصول ----- دی.
الف - الډیهاید سیانو هاید رین، ب - سیانو هاید رازین، ج - الف او ب دواړه، د - هیڅ یو
3. پارا اسیت الډیهاید کره ییز مرکب دی چې د تودوخې په واسطه ----- تبدیلېږي.
الف - فارم الډیهاید، ب - اسیت الډیهاید، ج - اسیتون، د - اسیتیک اسید.
4.  د ----- فورمول دی.
الف - ډای فینیل کیتون، ب - نفتالین، ج - انتراسین، د - فینول.
5. د غیر متناظر کیتون له کنلستي تجزیې څخه ----- ډوله تېزابونه جوړېږي.
الف - دوه، ب - څلور، ج - یو، د - درې
6. $R-\overset{O}{\parallel}{C}-R'$ د ----- کیتون فورمول دی.
الف - متناظر، ب - غیر متناظر، ج - الډیهاید، د - اسیتون.
7. $CH_2=CH-CH_2-\overset{O}{\parallel}{C}-H$ د مرکب نوم ----- دی.
الف - 1-butenal، ب - 3-butenal، ج - 1-propenyl aldehyde، د - ب او ج دواړه.
8. د فارمیک اسید او د یو بل عضوي تېزاب د سون د تعامل محصول دی.
الف - CO_2 او H_2O ، ب - H_2O ، CO_2 او الډیهاید ج - $R-\overset{O}{\parallel}{C}-H + CO_2 + H_2O$ ، د - ب او ج سم دي.
9. د گړنارد معرف او الډیهاید د تعامل وروستی محصول دی.
الف - دویمي الکول او $Mg(OH)X$ ، ب - لومړني الکول $Mg(OH)X$
ج - دریمې الکول او $Mg(OH)X$ ، د - هیڅ یو.
10. د الډیهاید د فعالیت لامل جوړښتی دی.
الف - د کاربونیل گروپ، ب - (π) اړیکې، ج - د کاربونیل په گروپ کې H او (π) اړیکه، د - دا ټول.
11. د الډیهایدونو په نوم ایښودنه کې د اړونده الکانونو دنوم پای e توری په- مختاري باندې تعویض کېږي:
الف: one: ب: al: ج: ene: د: ol
12. $C_6H_5-CH_2-\overset{O}{\parallel}{C}-H$ مرکب نوم عبارت دی له:
الف: فینیل ایتانل، ب: فینیل اسیت الډیهاید، ج: الف او ب سم دي، د: بنزالډیهاید.
13. د الکواکسي گروپ عبارت دی له:
الف - $R-H$ ، ب - $RO-$ ، ج - $R-O-R$ ، د - $-O-$.


14. د الډيهايډونو له ارجاع څخه کوم مواد لاسته راځي.
الف: الکان، ب - الکولونه ج - لومړنی الکول د - کیتونونه

تشریحي پوښتنې

1 - دا لاندې معادلې بشپړې کړئ:



2 - دلاندینو الډيهايډونو او کیتونونو نوم ایښودنه د IUPAC پریښت تر سره کړئ:



الف - *butenal* - 3 ب - *2-methyl butanal* ج - *4-nitrobenzen aldehyde*
د - *3,3,3-trichloropropanal*

4 - په STP شرایطو کې 2.464L اکسیجن د یو الډيهايډ له 1.44g پرا سونو سره تعامل کړی دی، د تعامل کوونکي الډيهايډ مالیکولي فورمول به کوم وي؟ (C=12g/mol H=1g/mol O=16g/mol)

5 - کوم الکولونه باید اکسیدي شي، تر څو لاندې مرکبونه حاصل شي؟

الف - *form aldehyde* ب - *2-methyl propanal* ج - *2,2-dimethyl butanal*

6 - کوم ساختماني فورمولونه د $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$ جمعي فورمول لرونکي کیتون ته لیکلی شو؟ هغه رسم کړئ.

7 - که چیرې 0.2mol د یو کیتون له 22.4g HCN سره تعامل کړی وي، د دې کیتون فورمول به کوم وي؟

8 - که چیرې د کیتون 0.2mol د 35.2g NaHSO_3 له مرکب سره تعامل کړی وي، د کیتون مالیکولي کتله به کومه وي؟ (H=1g/mol او O=16g/mol او C=12g/mol)

لسم څپرکی

عضوي تېزابونه (کاربوکسلیک اسید)



د عضوي مرکبونو د اکسیجن لرونکي مشتقاتو څخه مهم یې کاربوکسلیک اسیدونه دي د دې په ترکیب کې د کاربوکسیل (-C(=O)-OH) گروپ شتون لري، دا گروپ د تېزابو د وظیفه یي گروپ په نوم هم یادېږي.


د عضوي تېزابونو؛ لکه: د سرکې تېزاب، د شیدو تېزاب او نورو سره آشنایي لری. د شحمیاتو بنسټیز جز شحمي تېزاب دي. په دې څپرکي کې به د عضوي تېزابونو په اړه معلومات لاسته را وړئ او زده به یې کړئ چې د تېزابونو طبیعي سرچینې کومې دي؟ د انسانانو د ژوند په کومو اړخونو کې کارول کېږي، کوم کیمیايي فعالیتونه لري؟

د دې څپرکي په زده کړې به پورتنیو پوښتنو او هغوی ته ورته پوښتنو ته ځوابونه ورکړل شي.


10_1: عضوي تېزابونه

د کاربوکسیل گروپ (Group Carboxylic)

د کاربوکسیل گروپ ($\text{O}=\text{C}-\text{O}-\text{H}$) د کاربونیل او هایډروکسیل له گروپونو څخه جوړ شوی دی چې زیاتره د COOH - په بڼه لیکل کیږي؛ خو په هغه کې هیڅ کله هایډروجن او د کاربن د اتومونو ترمنځ اړیکه شتون نه لري. دا گروپ کولی شي چې د پروتون ورکونکي په توګه ($\text{Proton} - \text{Donator}$) عمل وکړي او د (COO^-) ایون چې د کاربوکسيلات په نوم یادېږي، بدلون ومومي. په دی انیون کې د اکسیجن دواړه اتومونه یو ډول ارزښت لري؛ ځکه په هغه کې د π الکترونونه د ریزونانس په حالت کې دي:




ټول هغه مرکبونه چې په خپل مالیکولي جوړښت کې د کاربوکسیل گروپ ولري، د کاربوکسلیک اسید د مرکبونو په نوم یادېږي. د فارمیګ اسید په مالیکول کې د اړیکو ځانګړتیاوې چې لاندې لیکل شوې دي، د اکسیجن، هایډروجن او کاربن اتومونه چې په دې مرکب کې شتون لري، د بېلابېلو الکترونیکاتیوټي سره یې د دوی مالیکول قطبي کړی دی:




10_1_1: د عضوي تېزابونو نوم ایښودنه

1_ د عضوي تېزابونو معمولي نوم ایښودنه: د عضوي تېزابونو معمولي نوم ایښودنه د اړوندو تېزابو د سرچینو له لاتینو یا یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده؛ د بیلګې په ډول: *Formic acid* د میږي (*Formica*) د لاتین نوم څخه اخیستل شوی دی چې د سرو میږیو دکالپوتونو (جسد ونو) له تقطیر څخه لاسته راوړل شوی دی، د اسیتیک اسید (*acetic acid*) نوم د سرګی له لاتین نوم (*acetum*) څخه اخیستل شوی دی، د بیوتاریک اسید (*butyric acid*) نوم د کوچو د لاتین نوم (*butyrum*) او د ستیاریک اسید (*stearic acid*) نوم د غوړو له لاتین نوم (*Stear*) څخه اخیستل شوی دی، په همدې ترتیب ټول معمولي نومونه د اړوندو تېزابو د لاسته راوړنې د سرچینې پرنسټ ایښودل شوی دی.

که چیرې په داسې تېزابونو کې بېلابېلې معاوضې شتون ولري؛ نو په دې صورت کې کاربنونه د کاربوکسیل له گروپ سره د اړیکو له کبله د یوناني ژبې په تورو، الفا (α)، بیتا (β)، گاما (γ)، دلتا (δ) او نورو باندې په نښه کېږي، داسې چې د کاربوکسیل په گروپ پورې تړلې کاربن په الفا (α) او په نورو تورو ښودل کېږي؛ د بېلگې په ډول:



γ - hydroxyvaleric acid








α - methyl - β - chlorobutyric acid

(1_10) جدول: د لسو عضوي تېزابونو معمولي نومونه اود هغوی سرچینې


د کاربن شمیر	جوړښت	معمولي نوم	سرچینې
1	HCOOH	فارمیک اسید	میري (لاتین - فارمیکا)
2	CH_3COOH	اسیتیک اسید	سرکه (لاتین - اسیتوم)
3	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$	پروپینیک اسید	شیدې، کوچ او خیدک
4	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{COOH}$	بوتیریک اسید	کوچ (لاتین - بوتیروم)
5	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{COOH}$	والیریک اسید	سنبل د گل رښه (لاتین - والیر)
6	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{COOH}$	کپرویک اسید	اوزه (لاتین - کاپر)
7	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{COOH}$	اینان توییک اسید	د پیچک وړۍ (لاتین - اوننات)
8	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_6\text{COOH}$	کپرلیک اسید	اوزي (لاتین - کاپر)
9	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$	پیلار گونیک اسید	د شمعدانی گل (دافریقایی نبات)
10	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_8\text{COOH}$	کپرک	اوزه (لاتینی - کاپر)

2_د IUPAC په لاره د تېزابونو نوم ایښودنه

د IUPAC په نوم ایښودنه کې اوږد زنځیر چې د کاربوکسیل گروپ لرونکی وي، ټاکل، موندل او نمبر وهل کېږي، نمبر وهل د کاربوکسیل گروپ له کاربن څخه پیل کېږي. په نوم ایښودنه کې لومړی په معاوضو پورې تړلی کاربن نمبر او له هغه څخه وروسته د معاوضو نومونه لیکل کېږي، د نوم په پای کې د کاربوکسیل لرونکې اوږد زنځیر نوم لیکل کېږي. څرنګه چې د اړوند هایډروکاربن (الکان، الکین او الکاین) د نوم وروستی برخې د e توری یې *oic* - په وروستاړي تعویض او د اسید (acid) کلمه پرې ور زیاتېږي؛ د بیلګې په ډول:




که چیرې عضوي تېزابونه په خپل مالیکولي ترکیب کې له یو کاربوکسیل ګروپ څخه ډېر ولري، په دې صورت کې د هغوی د اړوند هایدروکاربن (الکان، الکین، الکاين) د نوم په پای کې *Triolic, dioic* او نور وروستاړي لیکل کېږي او د اسید کلمه پرې زیاتیږي:



مشق او تمرین وکړئ

1 - د لاندې تېزابي مرکبونه نوم ایښودنه په معمولي او د ایویک په سیستماتیکه لاره تر سره کړئ:




2 - د لاندینو تېزابي مرکبونو جوړښتیز فورمولونه ولیکئ:


- | | |
|--|--------------------------------|
| a) 2-methylbutanoic acid | b) 5-aminopentanoic acid |
| c) 2-methyl-3-hydroxybutanoic acid | d) 1.5-pentanedioic acid |
| e) α -methyl- β -chloropropanoic acid | f) α -oxypropionic acid |

10_1_2: د عضوي تېزابونو فزیکي خواص

د مشبوع هایدروکاربنونو درې لومړي یو قیمت ته تېزابونه بې رنگه مایع حالت او تیزبوی لري، د مشبوع هایدروکاربنونو یو قیمت ته تېزابونه چې د کاربن د اتومونو شمېر یې له څلورو تر نهو (9) پورې وي، دکوچو او د بادامو د غوړیو بوی لري، له دې کبله چې مصنوعي کوچ او شیرینی په زړه پورې بوی ولري؛ نو نوموړي تېزابونه په هغو کې ورزیاتوي. د مشبوع هایدروکاربنونو تېزابونه چې له لسو څخه د کاربن ډېر اتومونه ولري، بې بویه دي، هغه تېزابونه چې له 14 څخه تر 22 د کاربن اتومونه په خپل مالیکولي ترکیب کې ولري، په حیواني او نباتي غوړیو کې موندل کېږي؛ نو له دې کبله دشحمي تېزابونو په نوم یادېږي. څرنگه چې د عضوي تېزابونو د دوو مالیکولونو تر منځ دوه هایدروجني اړیکې شتون لري؛ نو د هغوی د مالیکولونو تر منځ د جذب قوه د نورو اکسیجن لرونکو مرکبونو په پرتله چې یوشان کنلې لري، زیاته ده؛ له دې کبله د هغوی د ایشیدو ټکی لوړ دی:




په عضوي تېزابونو کې هایدروجني اړیکه په الکولونو کې هایدروجني اړیکه په اوبو کې هایدروجني اړیکه




شکل: د تېزابونو د دوو ماليکولونو تر منځ هايډروجنې اړيکه (1_10)

جدول: د عضوي تېزابونو ځينې فزيکي خواص او په اوبو کې د هغوی حل (2_10)


ايوپک نوم	معمولی نوم	فورمول	mp(°C)	bp(°C)	په اوبو کې حل کېدل (g/100mL)
Methanoic acid	Formic acid	HCOOH	8,5	100,5	په هر نسبت
Ethanoic acid	Acetic acid	CH ₃ COOH	16,6	118	په هر نسبت
Pr o panoic acid	Pr o pionic acid	CH ₃ CH ₂ COOH	-12,5	141	په هر نسبت
Butan oic acid	n-butyr ic acid	CH ₃ (CH ₂) ₂ COOH	-8	164	په هر نسبت
Pen tan oic acid	n-valer ic acid	CH ₃ (CH ₂) ₃ COOH	-19	187	4,97
Hexanoic acid	Caproic acid	CH ₃ (CH ₂) ₄ COOH	-3	205	1,08
Hep tan oic acid	Enanthoic acid	CH ₃ (CH ₂) ₅ COOH	-10,5	223	0,26
Pr o penoic acid	Acrylic acid	CH ₂ =CHCOOH	-13	141	لږ منحل
benzenecar box - ylic acid	Benzoic acid	C ₆ H ₅ COOH	122	250	0,34
2-hydroxy benzoic acid	Salicylic acid		159	211	0,22
Ethanedioi c acid	Oxalic acid	(COOH) ₂	189	149-160 د الوتنې وړ	15,00

عضوي تېزابونه د ارهينوس له تيوري سره سم په اوبو کې حل او ټوټه کيږي چې د هغوی د تعادل عمومي معادله په لاندې ډول ده:



د تېزابونو د ايوناي زيشن ثابت عبارت دی له:

$$K_a = \frac{[R-COO^-][H_3O^+]}{[R-COOH]}$$



شکل: د عضوي تېزابونو او اوبو د ماليکولونو تر منځ هايډروجنې اړيکه (2_10)

فارمیک اسید له ټولو عضوي تېزابونو څخه د ایونایزیشن ډېر لوړ ثابت لري:



formic acid formate ion

$$K_a = 1.8 \cdot 10^{-4}$$


فعالیت: حل یې کړئ:

د اسیتیک اسید د 0.5molar محلول pH محاسبه کړئ، د هغه $K_a = 1.8 \cdot 10^{-5}$ دی.


10_1_3: د عضوي تېزابونو کیمیايي خواص: د عضوي تېزابونو تعاملونه چې د هغوی په تېزابي گروپ پورې اړه لري؛ په دوو تگلارو ترسره کیږي. یو دا چې د هایډروجن او اکسیجن ($O-H$) تر منځ اړیکه پرې او پروتون (H^+) تولیدیږي. بل دا چې د کاربن او اکسیجن تر منځ اړیکه ($C-O$) پرې او $-OH$ جوړیږي. ځینې وختونه په زنځیري مشبوع هایډروکاربونونو کې تعویضي تعاملونه قطع شوي او د زنځیري غیر مشبوع هایډروکاربونونه د تېزابونو سره جمعی تعامل صورت نیولی شي.

1_ د ($O-H$) اړیکې د پریکړې له امله تعاملونه: که چېرې د $COOH$ د هایډروجن اتوم د H^+ ایون په بڼه جلاشي، په پایله کې د مالګې اینون ترلاسه کیږي چې د تېزاب دنوم $-oic$ وروستاړي په مالګه کې د $-ate$ په وروستاړي تعویض او د $acid$ کلمه په بشپړه توګه ور څخه لرې کیږي؛ دیلګې په ډول: (CH_3COO^-) ایون د استیت په نوم یادېږي.

د مالګو جوړېدل: کاربوکسلیک اسیدونه له فعاله فلزونو سره تعامل کوي، په پایله کې مالګه جوړوي او H_2



caboxylic acid salt



formic acid + sodium $\rightarrow$ sodium formate + hydrogen


مثال:

په ټاکلي (ستندرد) شرایطو کې 24g د مونواسید له مګنیزیم فلز سره تعامل کړی او 4,48L د هایډروجن گاز یې ازاد کړی دی، دکاربوکسلیک اسید مالیکولي فورمول به کوم وي ؟

حل: د ازاد شوي هایډروجن مولونه پیدا کوو:

$$1mol H_2 - 22.4L$$

$$n - 4.48L \quad n = \frac{1mol \cdot 4.48L}{22.4L} = 0.2mol$$



د تعامل معادله په لاندې ډول ده:

$$\frac{2 \text{mol}}{n} - \frac{1 \text{molH}_2}{0.2 \text{mol}} \quad n = \frac{0.2 \text{mol} \cdot 2 \text{mol}}{1 \text{mol}} = 0.4 \text{mol}$$

$$n - 0.2 \text{mol}$$

$$M = \frac{m}{n} = \frac{24 \text{g}}{0.4 \text{mol}}$$

$$M = 60 \text{g} / \text{mol}$$

څرنگه $n = \frac{m}{M}$ دي؛ نولرو چې:

نو ددي تېزابو فورمول عبارت دی له:

$$\text{C}_n \text{H}_{2n+1} \text{COOH} = 12n + 1 \cdot 2n + 1 + 12 + 32 + 1 = 60$$


$$14n = 60 - 46 = 14 \quad n = \frac{14}{14} = 1$$

نو دتېزاب فورمول CH_3COOH دی.

$$n = 1 \quad \text{CH}_3\text{COOH}$$

د عضوي تېزابونو دڅښتنې کیدو تعاملونه

کاربوکسلیک اسیدونه د غیر عضوي تېزابونو په شان له القلیو سره تعامل کوي چې په پایله کې مالګه او اوبه جوړېږي؛ دا چې عضوي تېزابونه کمزوري دي؛ نو د مالګې او اوبو محلول یې د القلیو خواص لري؛ ځکه په اوبو کې هایډرولیز کېږي، چې کمزوری تېزاب او قوي القلي جوړوي:







Oxalic acid

Potassium Oxalate

مشق او تمرین وکړئ

د لاندې تعاملونو معادلې بشپړې کړئ:




2- د C-O اړیکې د پرې کیدو پرنسټ دتېزابونو تعاملونه

که چیرې هایډروکسیل ګروپ (OH-) له کاربوکسیل ګروپ (C(=O)-OH) څخه جلا شي، د هغه پاتې شوني د اسایل ګروپ

(R-C(=O)-) په نوم یادېږي، د کاربوکسیل له ګروپ څخه د OH- ګروپ جلا کیدل د بېلابېلو ګروپونو د منځ ته راتلو لامل

کېږي.




د اسید انهایدرايد جوړيدل

که چیرې عضوي تېزابونه دي هایدریشن شي، اسید انهایدرايدونه جوړېږي. د اسید انهایدرايدونو وظیفوي ګروپ

$$(-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-O-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-)$$



دی چې د اړونده تېزاب د نوم په پای کې یې د انهایدرايد کلمه ورزیاتېږي:



ایستریفیکشن (د ایستر جوړونه)

د ایستریفیکشن په تعامل کې د تېزابونو د $-OH$ ګروپ د الکولونو له H^+ ګروپ سره، اوبه جوړوي اود اسایل ګروپ



($R-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-$) د الکواکساید ګروپ ($R-O-$) سره ایستر تولید وي. دا تعامل د سلفوریک اسید په شتون کې د کتلست په توګه ترسره کېږي:



فعالیت





کوم تېزاب او کوم الکول به یو له بل سره تعامل وکړي ترڅو لاندې ایسترونه جوړ شي؟



د عضوي تېزابونو د ریدکشن تعاملونه



د څو کتلستونو؛ لکه: $LiAlH_4$ یا $NaBH_4$ په شتون کې، د تېزابونو د کاربوکسیل ګروپ ارجاع او په الکولو بدلون مومی:




دعوی تیزابونو لاس ته راوړنه 4_1_10:

1_ د لومړنيو الکولو له اکسیدیشن څخه عضوي تېزابونه لاسته راځي:

که چیرې لومړنی الکول اکسیدیشن شي، دیهاید او د دیهاید له اکسیدیشن څخه عضوي تیرابونه لاسته راځي، په دې تعامل کې د تېزابونو محلولونه د $KMnO_4$ په واسطه اکسیدي کیږي چې دا مرکبونه د اکسیدانتو په توګه کارول کیږي:





په همدې ډول د لږو اګسیدانتونو په شتون کې، بنزایل الکول په بنزویک اسید بدلیږي:





2_ د الكينونو له اكسیدیشن څخه د تېزابونو لاسته راوړنه

که چیرې الکینونه د $KMnO_4$ د القلي له تود محلول سره یو ځای شي، د هغوی د اکسیدیشن تعامل ترسره کیږي چې د الکینونو زنځیر د جوړه اړیکو په برخه کې پرې او په پایله کې د عضوي تېزابونو دوه مالیکولونه لاسته راځي:




3_ د گرینارد ښودونکي د کاربنیشن په واسطه د عضوي تېزابونو لاسته راوړنه

د کاربوکسلیک اسیدونو د لاسته راوړنې له میتودونو څخه یو ښه میتود د ګرینارډ د ښودونکي تعامل د کاربن ډای اکساید سره دی چې د هغوی د تعامل معادله په لاندې ډول ده:





د سرکې تېزاب د لاندې فورمول په وسیله لاس ته راځي:



4_ دکاربوکسیک اسید د مشتقاتو د هایدرولیز په واسطه دکاربوکسیک اسید لاسته راوړنه

ایسترونه د تېزابي کتلستونو په شتون کې هایدرولیز کېږي چې په پایله کې الکول او عضوي تېزاب لاسته راځي:



فعالیت



لاندې تعامل کوونکي مواد او د هغوی د تعامل محصولونه لیکل شوي دي: تا سې يې کیمیاوي معادلې ولیکئ او هغه کتلست مواد چې د تعامل دجهکتیا لامل گرځي، وټاکئ:

- a) $n - \text{pentanol} \longrightarrow n - \text{pentanoic acid}$
- b) $\text{cyclopentane} \longrightarrow \text{cyclopentanoic acid}$
- c) $1,4 - \text{dibromobutane} \longrightarrow 1,4 - \text{hexanedioic acid}$
- d) $\text{ethyl formate} \longrightarrow \text{formic acid}$

10_2: ځینې مهم کاربوکسیک اسیدونه

1_ فارمیک اسید


د فارمیک اسید ساختماني فورمول ($\text{H} - \overset{\text{O}}{\overset{\parallel}{\text{C}}} - \text{OH}$) دی چې ډېر ساده کاربوکسیک اسید دی، د ډېرو حشراتو په لیشه او زهرو کې په ځانگړي توگه په مچيو او مېرینانو کې شتون لري. د هغه نوم هم دمیږي د لاتین نوم (farmica) څخه اخېستل شوی دی.



(10_3) شکل: مچۍ د فارمیک اسید سرچینه

د فارمیک اسید فزیکي خواص



فارمیک اسید په اوبو کې بڼه او په هایدروکاربنونو کې لږ حلېږي، په اوبلنو محلولونو کې په ایونونو ټوټه کېږي:



فارمیک اسید یوه بې رنگه مایع ده، تېز بوی لري، لوگی کوونکی او تخریب کوونکی دی او د ایشیدو ټکی یې 100°C دی.


کیمیایي خواص یې

که چیرې د فارمیک اسید جوړښت $(\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH})$ ته په څیر سره وکتل شي، په اسانۍ سره به پوه شو چې په رښتیا فارمیک اسید له دوو وظیفه یي گروپونو هایدروکسیل OH او بل الیهایډي گروپ $(\text{H}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-)$ څخه چې یو له بل سره یوځای شوي، جوړ شوی دی؛ پر دې بنسټ فارمیک اسید او د هغه مالګې د نورو کاربوکسلیک اسیدونو او د هغوی مالګو پرتله په اسانۍ سره اکسیدایز کېږي، په لومړي پړاو کې یې ثباته کاربونیکی اسید لاس ته راځي او بیا وروسته په CO_2 او H_2O تجزیه کېږي:




(منځنۍ ثبات نه لرونکی حالت)

که چیرې د گوګړو تېزاب د کتلست په توګه وکارول شي، په ټیټه تودوخه کې فارمیک اسید په CO او اوبو تجزیه کېږي:





د فارمیک اسید لاسته راوړنه

1- په ډېره کچه فارمیک اسید د فارم الیهایډ له اکسیدیشن څخه لاسته راوړي:




2- په صنعت کې په لومړي سر کې د لوړ فشار او لوړې تودوخې په شتون کې د فارمیک اسید مالګه د CO او NaOH د تعامل په واسطه لاسته راوړي، بیا وروسته د مالګې ته له H_2SO_4 یا H_3PO_4 سره تعامل ورکوي، په پایله کې فارمیک اسید لاسته راځي:





3_ په لابراتوارونو کې فارمیک اسید د آگزالیک اسید او بلن محلول څخه د تودوخي ورکولو په واسطه د گلیسرینو په شتون کې لاسته راوړي:



فعالیت


د فارمیک اسید لاسته راوړنه

د اړتیاوړ مواد او سامان: بالون، ترمامتر، کاندنسر، ستیند له پايې سره، ایرلین مایر، آگزالیک

اسید، گلیسرین او اوبه.

کړنلاره

د آگزالیک اسید د محلول یوه ټاکلې کچه په یو بالون کې واچوئ، هغه له (4-10) شکل سره سم په ستیند کې ټینگ کړئ، د بالون خوله د دوو سوړیو لرونکي کارکي سرپوښ په واسطه وتړئ، د سرپوښ په یو سوړي کې ترمامتر او په بل سوړي کې یې زنگون کوږی نل کېږدئ، دا نل له کاندنسر سره وتړئ، د کاندنسر وتونکی نل د ایرلین مایر په خولې کې د تعامل دمحصولو دټولولو لپاره کېږدئ، وروسته د بالون دننه محتویاتو ته تودوخه ورکړئ، به دې کړنه کې خپلې لیدنې او د تعامل معادله ولیکئ.



(4_10) شکل: د فارمیک اسید لاس ته راوړنه

د فارمیک اسید کارول


فارمیک اسید د الډیهایډونو په شان د عفوني ضد (بدبوي ضد) ښه خواص لري، د هغه لږه کچه په شاتو (عسل) کې شتون لري چې د هغه له خوساکیدو او ورسیدلو څخه مخنیوی کوي. له فارمیک اسید څخه د حیواناتو د جسدونو (کالپوتونو) په ساتلو اود څرمنې په صنعت کې ګټه اخېستل کېږي چې په عمومي ډول فارمیک اسید د سرو او پلاستیک د تولید د لومړنیو موادو په توګه په کاروړل کېږي.

2_ اسیتیک اسید

د اسیتیک اسید شرح فورمول $CH_3 - \overset{O}{\parallel} C - OH$ دی چې له مهمو عضوي تېزابونو څخه شمېرل کېږي. په سر کې له 4-6% غلظت سره شته دی، د سرکې خوند او بوی لري. د هغه نوم هم د سرکې له لاتین نوم (acetum) څخه اخیستل شوی دی. په $16.7^\circ C$ تودوخه کې جامد حالت لري او د یخ په بڼه لیدل کېږي؛ نو له دې کبله د سرکې جامد تېزاب د جامد ایتانویک اسید په نوم یاد شوی دی.



د اسیتیک اسید فزیکي خواص

د سرکې خالص تېزاب بې رنگه کرسټلونه لري، د تودوخې په $67.7^\circ C$ کې ویلي کېږي او له تودوخې په $118^\circ C$ کې په اېشېدو راځي، په اوبو کې حل کېږي؛ د ایونایزیشن درجه یې ډېره ښکته او د 3% په شاوخوا کې ده:




د اسیتیک اسید کیمیايي خواص

اسیتیک اسید د نورو عضوي تېزابونو په شان تېزابي خواص ښيي، د فلزونو او القلیو سره تعامل کوي چې مالګه جوړوي؛ د بیلګې په ډول: له سوډیم سره د لاندې معادلې سره سم تعامل کوي د سوډیم اسیتات مالګه جوړوي:




د اسیتیک اسید لاسته راوړنه

1_ اسیتیک اسید د انزایم په شتون کې د ایتانول له کټلستي اکسیدیشن څخه لاسته راوړل کېږي، د سرکې تېزاب د میوو، لکه: د انگورو او دمنو له اوبو څخه هم په لاس راوړل کېږي چې هغه ته د طبیعي سرکې تېزاب وایي:




2_ د سرکې تېزاب د فارمیک اسید پر خلاف په اسانۍ نه اکسیدایز کېږي؛ نو له دې امله د اسیتات مالګې ته له H_2SO_4 سره تعامل ورکوي او اسیتیک اسید لاسته راوړي. په پخوانیو وختونو کې اسیتیک اسید یې له لرګیو څخه داسې لاسته راوړل چې لرګي یې د هوا په نشتوالي کې په مایع تبدیلول، د لرګیو په مایع کې شامل اسیتیک اسید یې CaO په واسطه په $(CH_3 - \overset{O}{\parallel} C - O)_2Ca$ بدلون ورکوي، له دې کړنې څخه وروسته به یې جلا کول، لاسته راغلي اسیتات مالګې ته به یې تودوخه ورکوله او له لاندې شکل سره سم به یې په اسیتیک اسید تبدیلوله:




(10-5) شکل: د تودوخې په واسطه له سوډیم اسیتات څخه د اسیتیک اسید لاسته راوړنه

په دې تعامل کې میتانول او استیون هم تولیدیږي چې هغوی براس کیږي. د H_2SO_4 په زیاتوالي سره 99.5% د سرکې خالص تېزاب لاسته راوړي:



3_ په صنعت کې د سرکې تېزاب داسې لاسته راوړي چې په استیلین باندې اوبه اچوي او په پایله کې استیلین اکسیدایز او اسیتیک اسید جوړیږي:



مشق او تمرین وکړئ



په ټاکلو (ستندرد) شرایطو کې به خومره د هایدروجن گاز له 150g اسیتیک اسید محلول او مگنیزم سره تعامل وکړي؟
دا محلول 18% دی.

د اسیتیک اسید کارول

د سرکې تېزاب د مومو، کنډو اوتیلو ښه حلکونکی دی. د هغه له مالګې څخه ارزښت لرونکي عضوي مرکبونه تر لاسه کیږي؛ دیلګې په ډول: میتان له سودیم اسیتیت څخه او استیون له کلسیم اسیتیت څخه لاسته راوړل کیږي. المونیم اسیتیت د رنگونو د جلا ورکونکو موادو په توګه، د کاغذ د جلا لپاره، د ټوکرانو د جلا لپاره اوبه دوا جوړونه کې د انټي سپتیک مادې او د اسهال ضد دوا په توګه کارول کیږي. سلولوز اسیتیت چې د سرکې د تېزابو له مشتقاتو څخه دی، د لاکو، نه ماتیدونکو ښینو، د روغنی (غوړو) درنګونو د جلا او د تارونو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخېستل کیږي؛ په همدې توګه د رېر جوړونې لومړنۍ مواد هم دی.

3_ اګزالیک اسید (Oxalic acid)


اګزالیک اسید د تنباکو په پانو، رومي بادنجانو، نعنای او مارچوبه کې موندل کیږي، د هغه نوم هم د رومي بادنجان له لایتین نوم (Oxolic) څخه اخېستل شوی دی.

اګزالیک اسید سپینه بلوري جامده ماده ده چې په $157^\circ C$ تودوخه فرار کوي دا مرکب زهري دی او د هغه کلسیمي مالګه په پښتورگو کې رسوب کوي. د کیمیايي خواصو له کبله دوه قیمته عضوي فعال تېزاب دی، دا مرکب سودیم فارمیت ته د تودوخې ورکولو په واسطه لاسته راځي:



4_ مالونیک اسید (Malonic acid)


مالونیک اسید یې لومړی ځل د ملیک اسید (د منې تېزاب $\text{HOOC}-\overset{\text{OH}}{\text{CH}}-\text{COOH}$) له اکسیدیشن څخه لاسته راوړی دی؛ نو ځکه یې نوم د همدې تېزاب له نامه څخه اخیستل شوی دی، دامرکب یې رنگه مایع ده او په 136°C کې په ایشیدو راځي، په اوبو او الکولو کې حل کیږي، که چیرې مالونیک اسید ته له 140°C څخه زیاته تودوخه ورکړل شي، اسیتیک اسید ورڅخه لاسته راځي:



مالونیک اسید

اسیتیک اسید

که چیرې سیانو اسیتیک اسید هایدرولیز شي، مالونیک اسید لاس ته راځي:



سیانو اسیتیک اسید

مالونیک اسید

5_ شحمي تېزابونه

د شحمي اسیدونو لومړی مرکب، بیوتاریک اسید دی چې دکاربن څلور اتومونه لري او د هغه فورمول $(\text{C}_3\text{H}_7 - \text{COOH})$ دی شحمي اسیدونه په مشبوع او غیر مشبوع تېزابونو ویشل شوي دي:

الف_ مشبوع شحمي تېزابونه

1_ پالمیتیک اسید $(\text{C}_{15}\text{H}_{31} - \text{COOH})$

پالمیتیک اسید سپینه بلوري جامده ماده ده چې په 63°C کې ویلې کیږي، د حیواني وازدې او نباتي تیلو څخه لاسته راځي په اوبو کې نه حلېږي، په الکولو او ایټروکې حل کیږي.



(6_10) شکل: شمع د ستیاریک او پالمیتیک اسید مخلوط _ نارایل د پالمیتیک اسید سرچینه

2_ ستیاریک اسید $(\text{C}_{17}\text{H}_{35} - \text{COOH})$


ستیاریک اسید (Stearic acid) کرسټلي جامد حالت لري چې د هغه د ویلې کیدو درجه 70°C ده، په تودو الکولو او عادي ایټرونو کې حلېږي، د شحمي معمولي تېزابونو له ډلې څخه دی، په حیواني او نباتي شحمي گلیسرایدونو کې شتون لري. پالمیتیک اسید او ستیاریک اسید یو له بل سره په جامده بڼه گډ وي او شمع جوړوي.

ب. غیر مشبوع شحمي تېزابونه

د شحمياتو په ماليکولونو کې د کاربن - کاربن داتومونو ترمنځ دوه گونې اړیکه شته ده چې دا ډول شحميات دمايع حالت لري او د مشبوع شحمياتو په ترتيبه بې ثباته دي چې د هايډروجنيشن په واسطه په جامد و مومو بدلېږي، دا ډول شحميات له غیر مشبوع شحمي اسيد ونوڅخه لاسته راځي چې لاندې مطالعه کيږي:

اوليک اسيد: $(C_{17}H_{33} - COOH)$

اوليک اسيد په خالص ډول د گليسرايدونو په شکل د زيتون، بادام، پنبه دانې او لمرگلي په تيلو کې موندل کيږي چې په مايع حالت کې بې رنگه، بې بوږه او بې خونده ماده ده، د تودوخې په $13^\circ C$ کې ويلې کيږي، د ټولوشحمي تېزابونو $\frac{1}{3}$ برخه چې د غوا په شيدو، رنگونو، د مينځلو موادو او نور جوړ کړي دي د ستياړيک اسيد د ارجاع څخه جوړ شوی دی:



د لسم څپرکي لنډيز

- د عضوي مرکبونو له اکسيجن لرونکي مشتقاتو څخه مهم مشتقونه له کاربوکسليک اسيدونو څخه عبارت دي چې د دې مرکبونو په ترکيب کې د کاربوکسيل وظيفه يې گروپ $(-C(=O)-OH)$ شتون لري.
- د مشبوع هايډروکاربونونو درې لومړي يو قيمته تېزابونه بې رنگه مايع ده او تېزبوی لري، د مشبوع هايډروکاربونونو يو قيمته تېزابونه چې د کاربن داتومونو شمېر يې له څلورو څخه تر 9 پورې وي، د کوچو او بادامو د غوړيو بوي لري.
- د عضوي تېزابونو تعاملونه چې د هغوي تېزابي گروپ پورې اړه لري؛ په دوو ميتودونو ترسره کيږي: يوداچې د هايډروجن او اکسيجن تر منځ اړیکه $(O-H)$ پرې او پروتون (H^+) جوړيږي؛ بل داچې د کاربن او اکسيجن ترمنځ اړیکه $(C-O)$ پرې او OH - لاسته راځي:
- که چيرې لومړني الکولونه اکسيديشن شي، الډهايد او د الډهايدونو له اکسيديشن څخه عضوي تېزابونه لاسته راځي.
- د استرifikasiشن په تعامل کې د تېزابونو OH - گروپ د الکولونو د H^+ گروپ سره اوبه جوړوي او د اساييل گروپ $(R-C(=O)-)$ د الکوکسايډ گروپ $(R-O-)$ سره ايسټر توليد وي.
- فارميک اسيد د الډهايدونو په شان د عفوني ضد بڼه خواص لري، د هغه لږه کچه په شاتو کې شتون لري چې د هغه له خسا کيدو او ورستيدلو څخه مخنيوي کوي. له فارميک اسيد څخه د حيواناتو د جسدونو په ساتلو او د خرمې په صنعت کې گټه اخېستل کيږي.
- د سرکې تېزاب د مومو، کنډو او تيلو بڼه حل کوونکی دی. د هغه له مالگو څخه ارزښت لرونکي عضوي مرکبونه تر لاسه کيږي.
- د شحمي اسيدونو لومړی مرکب، بيوتاريک اسيد دی چې د کاربن څلور اتومونه لري او د هغه فورمول $(C_4H_7 - COOH)$ دی، شحمي اسيدونه په مشبوع او غیر مشبوع ويشل شوي دي:

د لسم څپرکي پوښتنې څلور ځوابه پوښتنې

1_ د عضوي تېزابونو د ماليکولونو تر منځ هايډروجنې اړيکه د الکولونو په نسبت..... ده

الف_ کلکه، ب_ سسته، ج_ يوشان، د_ هېڅ يو.

2_ د پالميتيک اسيد فورمول ----- دی:

الف - $C_{15}H_{31}COOH$ ب - C_3H_7COOH ج - $C_{17}H_{35}COOH$ د - $C_{17}H_{33}COOH$

3_ لاندې کوم فورمول به کاربوکسليک اسيد ولري ؟ که چېرې د هغه په جوړښت کې %40.68 کاربن،

%54.234 اکسيجن او %5.06 هايډروجن شتون ولري؟

الف - $HCOOH$ ، ب - CH_3COOH ، ج - $HOOC(CH_2)_2COOH$ ، د - $COOH$

4_ د $CH_3 - \underset{\substack{| \\ CH_3}}{CH} - \underset{\substack{| \\ NH_2}}{CH} - \underset{\substack{| \\ OH}}{CH} - COOH$ مرکب سم نوم عبارت دی له:

الف - 1,2 - dihydroxy - 3 - a min o - 4 - methylpentan ol

ب - 2 - hydroxy - 3 - a min o - 4 - methylpentan oicacid

ج - 1 - hydroxy - 2 - a min o - 3 - methylpentan oicacid

د - 1,2 - dihydroxy - 3 - a min o - 4 - methylpentan oicacid

5_ د فارميک اسيد $10^{-2} m$ محلول د کوم pH لرونکی دی ؟ $K_a = 10^{-4}$

الف _ 2، ب _ 3، ج _ 4، د _ 5.

6_ له لاندې مرکبونو څخه د کوم يوه د اېشېدوټکي لوړ دی؟

الف - $CH_3CH_2CH_2CH_3$ ، ب - CH_3COOH ، ج - CH_3CH_2COOH

د - $HOOC - CH_2CH_2CH_3COOH$

7_ له لاندې مرکبونو څخه کوم يو کيتو اسيد دی؟




الف - $HO - \underset{\substack{| \\ OH}}{C} = OOH$ ب - $O = \underset{\substack{| \\ H}}{C} - OH$ ج - $CH_3 - \underset{\substack{|| \\ O}}{C} - \underset{\substack{|| \\ O}}{C} - OH$ د - هېڅ يو

8_ لاندی کوم کميت د ايسټرونو ماليکولي کتله را ښيي ؟ که چېرې د هغه په جوړېدو کې 60g کاربوکسليک

اسيد او 46g الکولو تعامل کړی وی:


الف _ 60، ب _ 124، ج _ 106، د _ 98.


9_ دلاندې تعاملونو څخه کوم يو د ايسټرifikasiشن د تعامل له ډلې څخه دی؟



الف_ لومړي تعامل ب_ دوهم تعامل ج_ دريم تعامل د_ هېڅ يو.



10_ د 2,2 - di methylpropanoic acid فورمول عبارت دی له:





تشریحي پوښتنې

- 1- د $C_5H_{10}O_2$ فورمول لرونکي کاربوکسلیک اسید نوم، جوړښتیز فورمول او ټولې ایزو میري پې ولیکئ.
- 2- د کاربوکسلیک اسیدونو عمومي فورمول کوم دی؟ د کاربوکسلیک اسید، الډیهایډ او کیتون تر منځ توپیرونه ولیکئ.
- 3- دلاندې تېزابونو د IUPAC نومونه او د هغوی فورمولونه ولیکئ:
- الف- Oxalic acid، ب- Adipic acid، ج- Malonic acid.
- 4- د بنزوایک اسید د تعامل معادله د لاندې موادو سره ولیکئ:
- الف- Na، ب- Ca، ج- CH_3-OH ، د- Br_2
- 5- د لاندې عضوي تېزابونو مالیکولی او د جوړښت فورمولونه ولیکئ:
- الف- 2-oxypropanoic acid، ب- 2,3-di methylbutanoic acid، ج- 2-bromopentanoic acid
- 6- شحمي تېزابونه څه شی دي؟ ولې په دې نوم یادېږي؟ روښانه پې کړئ.
- 7- له لاندې تېزابونو څخه کوم یو د شحمي تېزابونو له ډلې څخه دي؟ معلومات ورکړئ.
- الف- CH_3COOH ، ب- C_2H_5COOH ، ج- C_3H_7COOH ، د- $C_{15}H_{31}COOH$
- 8- د کاربوکسلیک اسید د یو اساسه تېزاب په ترکیب کې 55.8% کاربن، 7% هایدروجن او 37.2% اکسیجن شته دی، د دې تېزاب فورمول ولیکئ.
- 9- روښانه پې کړئ چې ولې کاربوکسلیک اسیدونه په اوبو کې له الکولونو څخه ډېر زیات حل کېږي؟
- 10- دلاندینو اسیدونو نومونه د IUPAC په تگ لاره ولیکئ:



الف- ستیاریک اسید، ب- ستریک اسید، ج- اډیپیک اسید، د- هیڅ یو




امینونه Amines



دهایدروکاربنونو د اکسیجن لرونکو مشتقاتو سربېره د دې مرکبونو نور مشتقات هم شته چې د هغوی له ډلې څخه نایټروجنی مشتقات دي، دهایدروکاربنونو د نایټروجن لرونکو مشتقاتو ترڅنګ د هغوی یو ډول پې امینونه دي چې د امین دگروپ لرونکي دي اود امونیايي مشتقاتو په نوم هم یې دېرې؛ یعنې د NH_3 یو، دوه یا درې د هایدروجن اتومونه د هایدروکاربنونو دگروپونو په واسطه تعویض شوي دي او یا دا چې د هایدروکاربنونو د هایدروجنونو یو یا څو اتومونه د امین دگروپ په واسطه پې ځایه شوي دي. په دې څپرکي کې به د امینونو په اړه معلومات تر لاسه کړئ او زده به پې کړئ چې امینونه له کوم ډول مرکبونو څخه دي او د کومو خواصو لرونکي دي؟ څرنگه لاس ته راځي او د هغوی طبیعي سرچینې کوم مواد دي؟ په کومو حیاتي او صنعتي برخو کې کارول کېږي؟

1_11: د امینونو جوړښت او ډلبندي

دامینونو وظیفوي گروپ NH_2 - دی چې د امینو (Amino) په نوم یادېږي، د دې گروپ د نایتروجن اتوم د SP^3 هایبرید حالت لري چې دکاربن یو اتوم د یو یا څو اتومونو سره اړیکې لري، که چېرې د څو عضوي معاوضو سره اړیکې ولري، د امینونو ډولونه تر لاسه کېږي چې د لومړني، دویمي او دریمي امینونو په نامه یادېږي، لومړني امینونه هغه امینونه دي چې د امونیا د نایتروجن اتوم د هایډروکاربنونو دکاربن له یوه اتوم سره اړیکه لري. دویمي امینونه له هغو امینونو څخه عبارت دي چې د امونیا د نایتروجن اتوم د هایډروکاربنونو له دوو گروپونو سره اړیکه لري. دریمي امینونه هغه امینونه دي چې د هغوی د امونیا د نایتروجن اتوم د هایډروکاربنونو له درې اتومونو سره اړیکې لري، د دې امینونو عمومي فورمولونه په لاندې ډول دي:







ammonia

Primary amine

Secondary amine

tertiary amine

R کیدای شي چې د الکایل یا اریل پاتې شوني وي؛ د امینونو د ډلو بیلگې په لاندې ډول دي:




ammonia


methyllamine

di methyl amine

tritmethyll amine




(1_11) شکل د امونیا مودل، لومړني، دویمي او دریمي، امینونه (له کینې خوا څخه ښي لورته)



(2_11) شکل د امونیا جوړښت

عضوي رادیکالونه چې د امینونو په جوړښت کې د نایتروجن له اتوم سره اړیکه لري، څلورمخیزو ته نژدې جوړښت لري؛ ځکه د څلور مخیزو جوړښتیو زاویه 109.5° اود امونیا زاویه 107.3° ده، د امینونو مالیکول د هندسي هرم (pyramid) جوړښت لري:

که چیرې د امین گروپ د مشبوع او یا غیر مشبوع زنځیري هایدروکاربنونو د کاربن د اتومونو د هایدروجن اتومونه تعویض کړي، دا ډول امینونه د الیفاتیک په نوم او که د اروماتو له کړيو سره اړیکه ولري، د اروماتیکو امینونو په نوم یادېږي.




مثال: د لاندې مرکبونو د جوړښت فورمولونه ولیکئ:

2 - aminopentane - b dimethyl ethyl amine - a


methyl ethyliso propyl amine - d 1.4 - diamino - 1.4 - butanediol - c

حل:



اضافي معلومات:

هتروسکلیت امینونه هم شته چې په کاربنی کړيو کې یې نایتروجن شتون لري او مهم مرکبونه د دوی عبارت له پایرولیدین، پایریدین او پایرولونو څخه دي چې دهغوی دجوړښت فورمولونه عبارت دي له:



مورفین، کوکابین او نیکوتین د امینونو ډولونه دی چې په کوکنارو (افین) او تنباکو کې شته چې د هغوي دجوړښت فورمولونه په لاندې ډول دي:

د 500 ډولو په شاوخوا کې بیا لویځي الکولویډونه (Alkaloide) پیژندل شوي دي چې د مورفین اصلي الکولویډ په افین کې شته، نایتروجن لرونکي مرکب الکولویډ القلي دي، له دې مرکب څخه پخوا به د درد د ارامولو لپاره کار اخیستل کیده او د درد د ارامولو ساده مرکب دی چې پرته د بې هوشۍ د مریض درد د ارامولو لامل ګرځي، د امریکا د خپل منځي جنگونو په بهیر کې د زخمیانو د دردونو د تسکین لپاره له مورفین څخه ګټه اخیستل کیده. مورفین ځینې نورې ستونزې را منځ ته کوي چې د وینې فشار ټیټوي او د ناروغانو دمړینې لامل ګرځي او هم د روږدېدلو لامل ګرځي؛ له دې کبله د هغه د ځینو نورو ستونزو د لږوالي په موخه له هغه څخه هیروین لاسته راوړل کیږي چې هیروین ځینې نورې ستونزې لري؛ خو خطرناک روږدي کوونکي دي، دهغوی پریښودل د روږدو وګړو لپاره ستونزمن دی. کوکاین او نور نشه راوړونکي توکي ټول نایتروجن لرونکي مرکبونه دي.



(3_11) شکل: کوکنار د مورفین او هیروین سرچینه

1_1_11: د امینونو نوم ایښودنه

څرنگه چې په تېرو لوستونو کې وړاندې شول، امینونه د کاربن د اتومونو د زنځیر له کبله او د هغوی اړیکه د نایتروجن له اتوم سره په درې ډولو ویشل شوي چې لومړني امین ($R-NH_2$)، دویمي امین ($R-\bar{N}-R$) او دریمي امین ($R-\bar{N}-R$) دي، د امینونو څلورم ډول د څلور وجهي ایون په بڼه $[R_4N^+]$ دی چې د هغې بیلګې کیدای شي تترا میتایل امونیم ($Tetramethyl amonium$)، $[(CH_3)_4N^+]$ وړاندې شي، د R پاتې شوني کیدای شي الفاتیک، سکلیک او یا اروماتیک وي.

د امینونو په نوم ایښودنه کې په نایتروجن باندې نسبتي پاتې شوني د yl له وروستاري سره د نوم په پیل کې دهغوی


د نوم د لومړي توري د انگرېزي ژبې د الفبا دمخکيوالي په پام کې نيولو سره سم ليکل کيږي او بيا وروسته د امين (amine) کلمه ورزياتيږي، د بيلگې په ډول:

د $(C_2H_5)_2N - C_3H_7$ جمعي فورمول لرونکي مرکب نوم چې د هغه د جوړښت فورمول په لاندې ډول




Di ethyl propylamine

په ځينو برخو کې د امينونو په نوم ايښودنه کې کيدای شي چې د مرکبونو د ماليکول د کاربن د اتومونو نمبر وهنه تر سره شي؛ د بيلگې په ډول:




1 - Methyl. 1 - Penthyl amine

لومړني امينونه د ايوپيک IUPAC په سيستم کې په دوو لارو نوم ايښودنه کيږي چې له الکايال امين (alkylamine)



(Aniline)






امينو الکان (Amino alkane) څخه عبارت دي، د بيلگې په ډول:



2 - methyl propyl amine


خپل ځان ازماينست کړئ

د لاندې مرکبونو نوم ايښودنه ترسره کړئ:




د دويمې او دريمې امينونو نوم ايښودنه داسې ترسره کيږي چې د الکان اوږد زنځير د اصلي زنځير په توگه او الکايال منل کيږي او نورې پاټې شوني چې له نايټروجن سره اړيکې لري، د معاوضو په توگه منل شوي دي او داسې نوم ايښودنه يې ترسره کيږي چې د نايټروجن سمبول (N) د معاوضو د نوم له يادوني څخه مخکې ليکل کيږي، د نايټروجن د سمبول او معاوضو د نوم تر منځ د (-) علامه ليکي، که چيرې دواړه معاوضې يوشان وي؛ نو


په دې صورت کې $N - N$ او دډای کلمه چې د دوو په معنا ده، دمعاضو له نوم څخه مخکې لیکل کېږي او د هغه د نوم د e توری یې د a mine په کلمې تعویضیږي، کله چې اوږد (اصلي) زنځیر څو معاضې ولري؛ یعنې ښاخ لرونکی وي، د اړوندو هایدروکاربنونو اوږد زنځیر نمبر وهل کېږي او نمبر وهل د امین (a mine) له ګروپ لرونکي کاربن څخه پیل کېږي، د هایدروکاربن د نوم او د امین له کلمې څخه تر مخه دمعاضو نوم او دهغوي د اړونده کاربن نمبر لیکل کېږي:



N - N - di methyl ethan amine



N - methyl- 2 - methylpropanamine






N - ethyl- N - phenyl- 3 - methyl butanamine




N - N - diethylamine

ځان وازمويئ


دلاندې مرکبونو نومونه ولیکئ:



که چیرې د NH_2 - ګروپ د نورو وظیفوي ګروپونو؛ لکه: د الکولونو، الیهایدونو، اسیدونو او داسې نورو وظیفه یي ګروپونو سره په یوه هایدروکاربن مرکب کې شتون ولري، په دې صورت کې د دې ګروپ نوم د اړوند کاربن له نمبر سره د امینو a mine په نامه یاد او د اړوندو الکولو، الیهایدونو او تېزابونو د نومونو په سر کې لیکل کېږي:





2- amino ethanol



2- amino propanoic acid

خپل ځان وازمويئ


د لاندنيو مرکبونو نوم ايښودنه وکړئ:






11_1_2: د امينو نو فزيکي خواص

هغه امينونه چې کوچنۍ ماليکولي کتله لري (ميتايل امين، ډاي ميتايل امين، تري ميتايل امين او ايتايل امين) د گاز په حالت موندل کېږي، امينونه چې د کاربن د ډيرو شمېرو اتومونو لرونکي دي، تر $\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{NH}_2$ پورې د مايع په حالت موندل کېږي او له $\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{NH}_2$ مرکب څخه لوړ د کاربن د اتومونو لرونکي امينونه جامد حالت لري. د کوچنيو امينونو بوی امونيا او خوسا شوو کبانو ته ورته دی.

لومړني او دويمې امينونه له امونيا سره ورته خواص لري او د ماليکولونو تر منځ يې هايډروجنې اړيکې شتون لري د هغوی ماليکولونه قطبي دي. د کب (ماهي) بوی ته ورته دي. له دې کبله د امينونو د ايشيدو ټکی د هغو هايډروکاربنونو په نسبت چې له دې امينونو سره د کاربن او هايډروجن عين شمېر اتومونه لري، لوړ دی او هم له دريمي امينونو څخه لوړ دي. لومړني او دويمې امينونه په اوبو کې ښه حل کېږي، په داسې حال کې چې دريمي امينونه په اوبو کې په اسانۍ سره نه حل کېږي، همدا رنگه د کاربن د اتومونو د شمير په زياتوالي د هغوی حل کيدل په اوبو کې ټيټېږي:




د اوبو او امينونو تر منځ هايډروجنې اړيکې په امينونو کې هايډروجنې اړيکې




دريمي امينونه هم کولی شي چې له اوبو سره هايډروجنې اړيکه جوړه کړي؛ ځکه د نايټروجن اتوم ($\ddot{\text{N}}$) د ازاد جوړه الکترونونو لرونکی دی او دا جوړه الکترونونه د اوبو له ماليکولونو سره د اړيکو د جوړېدو لامل گرځي؛ دا چې په دريمي امين کې د هايډروجن او نايټروجن تر منځ اړيکه ($\text{N} - \text{H}$) نه شته؛ نو پردې بنسټ د دريمي

امینونو مالیکولونه په خپل منځ کې هایدروجنی اړیکه نه شي جوړولای:




د امینونو د اېشېدو ټکي د هغوی د ایزو لوگو هایدروکاربنونو او ایترونو په پرتله لوړ او له ایزولوگو الکولونو او تېزابونو څخه ټیټ دی، لامل یې دا دی چې په هایدروکاربنونو او ایترونو کې هایدروجنی اړیکه نه شته او د هغوی د مالیکولونو تر منځ د جذب قوه لږه ده، د الکولونو او تېزابونو د مالیکولونو تر منځ هایدروجنی اړیکه شتون لري او په دې مرکبونو کې د اکسیجن اټوم د هایدروجن له اټوم سره اړیکه ($O-H$) لري چې دا اړیکه د اکسیجن د قوي الکترونیګاتیویتی له کبله د نایتروجن او هایدروجن له اړیکې څخه ډیره قطبي ده او د هغوی هایدروجنی اړیکه هم قوي ده:



Diethyleter

bp = 54.6°C



Di methyla min e

bp = 55°C



1 - butyla min e

bp = 1.18°C




n - bu tan e

0.5°C




n - pen tan e

bp = 36.1°C



propanoic acid

bp = 141.1°C



butan oic acid

bp = 163.5°C

(1-11) جدول: د بنسټیزو امینونو فزیکي خواص


Name	structur	mp by (°C)	bp by (°C)	solubility (g/100L H ₂ O)	Kb	density d_4^{20} Relative
methylamine	CH ₃ NH ₂	-94	-6	زیات حل کیږي	4-4.10 ⁻⁴	0,769(at - 79°C)
ethylamine	CH ₃ -CH ₂ NH ₂	-81	17	زیات حل کیږي	4-7.10 ⁻⁴	-
propylamine	CH ₃ CH ₂ -CH ₂ NH ₂	-83	49	زیات حل کیږي	4.10 ⁻⁴	-
dimethylamine	(CH ₃) ₂ NH	-92	7	لږ حل کیږي	5.10 ⁻⁴	0,680(at - O°C)
trimethylamine	(CH ₃) ₃ N	-117	3	لږ حل کیږي	6.10 ⁻⁵	-
aniline	C ₆ H ₅ NH ₂	-6	184	حل کیږي	4-2.10 ⁻¹⁰	-
methylaniline	C ₆ H ₅ NHCH ₃	-	196	-	-	0,989
dimethylaniline	C ₆ H ₅ N(CH ₃) ₂	2,5	194	-	-	0,956
diphenylaniline	(C ₆ H ₅) ₂ NH	54	302	-	-	1,158

هغه امینونه چې دکاربن شمېر یې له یوه څخه تر پنځو اټومونو پورې وي، په او بوکې په هر نسبت حل کیږي


او هغه امینونه چې د هغوی دکاربن د اتومونو شمیر شپږ او له شپږو څخه لوړ وي، په او بو کې لږ حل کېږي.

11_1_3: د امینونو کیمیايي خواص



امینونه له تېزابونو سره تعامل کوي، مالګې جوړوي:




د الکایل امونیم کلوراید مالګه د هایډروکساید او الکوآکسایدونو (OH^- او OR^-) څخه کمزوری القلي خاصیت لري او د اوبو په نسبت هم کمزوری قلوي خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي، لاندې سلسلې ته څیر شئ:



لاندې کیمیايي تعامل د امینونو القلي خواص ښيي:




له پورتنیو معادلو سره سم د امونیم تشکیل شوې مالګه، د قوي القلي او تودوخې په شتون کې بیرته په امینونو، غیر عضوي مالګې او اوبو تجزیه کېږي:




د امینونو الکالیشن

امینونه له الکلونو سره تعامل کوي، د امینونو بېلابېل مرکبونه جوړوي:



د امینونو د اسایلیشن تعامل



امینونه له اسایل سره تعامل کوي، امایډونه جوړوي چې تعامل یې په درې پړاونو کې ترسره کېږي:



مشق او تمرین وکړئ

1 - د میتیل امین 500 ملي لیتر 0.1m مولره او بلن محلول به دکوم pH لرونکی وي؟
که چیرې $K_b = 5.10^{-4}$ وي.




2 - لاندې معادلې بشپړې کړئ:




4_1_11: د امینونو لاسته راوړنه

د الکایلشن د عملیې په واسطه د امینونو لاسته راوړنه


دا لاره له هغو لارو څخه ده چې دویمي امینونونه له لومړنیو امینونو او دریمي امینونو له دویمي امینونو څخه ترلاسه کیږي، داسې چې الکایل هلايدونو ته له امونیا سره تعامل ورکوي، لومړني، دویمي او دریمي امینونه لاسته راوړي.




امونیا له الکایل هلايدونو سره تعامل کوي، لومړني امینونه جوړوي:




لومړني، دویمي او دریمي امینونه کېدای شي چې د امونیا له الکایلشن څخه لاسته راوړل شي؛ داسې چې الکایل هلايدونو ته له امونیا سره تعامل ورکوي، لومړنی امین لاسته راځي، خو که چیرې د الکایل هلايدونو نسبت لوړ شي، په پایله کې دویمي او دریمي امینونه هم لاسته راځي. که دریمي امین ته هم له الکایل هلايدونو سره تعامل ورکړل شي، د کوار ترنري مالګه لاسته راځي:




مثال



همدارنگه که چیرې د نتریل مرکبونه د کتلتونو په شتون کې هایدروجنشن شي، امینونونه ترلاسه کېږي:






د اروماتیکي لومړنیو امینونو د لاسته راوړلو ډیره ښه لاره د اړونده نایټرو مرکبونو ارجاع کول دي، د نایټرو مرکبونه کیدای شي د اروماتیک د الکتروفيلي له نایټرو کیدلو تعامل څخه لاسته راوړل شي، د نایټرو گروپ کیدای شي د کتلتونو په شتون کې د هایدروجن یا کیمیايي ارجاع کوونکو عاملو په واسطه په اسانۍ سره ارجاع شي:



مشق او تمرین وکړئ



لاندې معادلې بشپړې کړئ



11_1_5: مهم امینونه

1_ میتایل امین


که چیرې میتانول ته د تودوخې په $400^0 C$ او د Al_2O_3 کتلست په شتون کې له امونیا سره تعامل ورکړل شي، میتایل




همدا رنگه کیدای شي، ډای میتایل امین او ترای میتایل امین هم په لاس راوړل شي، له ډای میتایل امین څخه د موادو په حل کولو کې ګټه اخیستل کیږي.

2_ انیلین یا بنزین امین (Aniline or Benzene amine)


انیلین له اروماتیکو مهمو امینونو څخه دی چې د کمزورو قلوبو خاصیت لري او د سایکلو هگزان امین په پرتله یو میلیون ځله کمزوری دی، د هغه فورمول په لاندې ډول دی:



په صنعت کې د انیلینکو ($C_{16}H_{10}O_2N_2$) د رنگ مهمه سرچینه انیلین دی او دا رنگ داسې لاسته راوړل کیږي چې انیلین ته له کلورو استیک اسید سره تعامل ورکوي او په پایله کې انیلینګو لاسته راځي:




د انیلینګو څخه بېلابېل رنگونه جوړوي؛ له دې امله هغه د بنسټیز رنگ په نوم یاد وي. انیلین د برومین له اوبو سره تعامل کوي، ترای بروموانیلین جوړوي:




2_11: امایدونه (Amides)

لومړني او دویمي امینونونه له تېزابونو سره (الکولو ته ورته) تعامل کوي، داسې مرکبونه جوړوي چې د امایدونو په نوم یادېږي؛ د بیلګې په ډول:




امایدونه هم په طبیعت کې شته او هم دستتیز په پایله کې په مصنوعي توګه له لومړنیو توکو څخه لاسته راځي، د فزیکي تګ لارو په واسطه، (د بیلګې په ډول: جذبې سپکتر) د وظیفه یي ګروپونو د جوړښت څېړنه ټاکي چې د نایتروجن او د کاربونیل د وظیفه یي ګروپ تر منځ ټولې اړیکې په یوه سطحه کې شتون لري او دهغوی د مسطح والي لامل د π الکترونونو د (C-O) تر منځ اړیکې د نایتروجن د اتوم د ازادو الکترونونو پر کړنې پورې اړه لري چې سره یو ځای د څلورو الکترونونو د نه ځای پرځای شوي الکتروني ورېځې د درې واړو اتومونو (N, O, C) د پاسه جوړېږي او دې عمل ته د نایتروجن د اتوم ازادو جوړو الکترونونو اړکې دي او په همدې دلیل دی چې امایدونه په اولین محلول کې دومره قلوي خاصیت له ځان څخه نه ښکاره کوي، د دې نه ځای پرځای شوې اړیکې امایدونونه کیمیايي ثبات وربخښلی دی چې له القلیو، نړیو تېزابونو او یو سره قوی والی رانښيي:



شکل: د نایتروجن له کاربونیل ګروپ سره داریکو مسطح والی (4_11)


2_11_1: د امایدونو نوم ایښودنه او لاسته راوړنه

امایدونه د IUPAC پر بنسټ داسې نومول کېږي چې د تېزاب د جوړونکو الکانونو د تېزابونو د نوم oic وروستاړي په امایدونو کې د اماید amide په کلمه تعویض کېږي او د اسید کلمه نه لیکل کېږي؛ د بیلګې په ډول:




Butan amide


د $\text{R} - \text{C}(=\text{O}) - \text{NH}_2$ عمومي فورمول لرونکو امایدونو د لاسته راوړلو لپاره کیدای شي چې د کاربوکسلیک اسید




مرکبونه نیغ په نیغه له امونیا سره تعامل وکړي، په پایله کې امونیم کاربوکسلات لاس ته راځي:




که چیرې لاسته راغلی کاربوکسلات ته تودوخه ورکړل شي، په پایله کې له هغو څخه یومالیکول او به جلا او غښتلی اماید لاسته راځي:




په پورتنیو تعاملونو کې د امایدونو لاسته راوړنه ډیره ورو او دهغوی محصولات لږ دي؛ له دې کبله نور میتودونه د امایدونو د لاسته راوړنې لپاره په کار وړل شوي دي؛ د بېلګې په ډول: دبنزایل کلوراید او امونیا د تعامل په پایله کې امایدونه لاسته راځي، داسې چې په یوه فلاسک کې د امونیا محلول اچوي او دا محلول دیځو اوبو په یو ډک لوبښي کې ږدي، بیا په دې محلول باندې په څاڅکو، څاڅکو بنزایل کلوراید ورزیاتوي چې په پایله کې بنزاماید لاسته راځي او په فلاسک کې ښکته کیني یعنې رسوب کوي:




لاسته راغلی HCl په فلاسک کې له اضافي امونیا سره تعامل کوي او NH_4Cl جوړېږي:



د امونیا غلیظ محلول



شکل: (5_11) د بنز اماید لاسته راوړنه





د یوولسم څپرکي لنډیز

* دامینونو وظیفه یي گروپ NH_2 دی چې د امینو د گروپ (Amino) په نوم یادېږي، د دې گروپ د نایتروجن اتوم د SP^3 هایبرید حالت لري.

* لومړني امینونه هغه امینونه دي چې د امونیا د نایتروجن اتوم د هایډروکاربنونو د کاربن له یوه اتوم سره اړیکه لري.

* دویمي امینونه له هغه امینونو څخه عبارت دي چې د امونیا د نایتروجن اتوم د هایډروکاربنونو له دوو گروپونو سره اړیکه لري.

* دریمي امینونه هغه امینونو دي چې د هغوی د امونیا د نایتروجن اتوم د هایډروکاربنونو له درې اتومونو سره اړیکې لري.

* عضوي رادیکالونه چې د امینونو په جوړښت کې د نایتروجن له اتوم سره اړیکه لري، څلورمخیزو ته نژدې جوړښت لري؛ ځکه د څلور مخیزو جوړښتیزو زاویه 109.5^0 او د امونیا زاویه 107.3^0 ده.

* د امینونو په نوم ایښودنه کې په نایتروجن باندې نښتي پاتې شوني د yl د وروستاري سره د نوم په پیل کې دهغوي د نوم د لومړي توري د انگریزي ژبې د الفبا د مخکيوالي په پام کې نیولو سره سم لیکل کېږي او بیا وروسته د امین (amine) کلمه ورزیاتېږي. * که چېرې د امین گروپ د مشبوع او یا غیر مشبوع زنځیري هایډروکاربنونو د کاربن د اتومونو د هایډروجن اتومونه تعویض کړي، دا ډول امینونه د ایلفاتیک په نوم او که د اروماتو له کړيو سره اړیکه ولري، د اروماتیکو امینونو په نوم یادېږي.

* دامینونو د اېشېدو ټکي د هغوی د ایزو لوگ هایډروکاربنونو او ایترونو په پرتله لوړ او له ایزولوگو الکولونو او تېزابونو څخه ټیټ دی، لامل یې دا دی چې په هایډروکاربنونو او ایترونو کې هایډروجنی اړیکه نه شته او د هغوی د مالیکولونو تر منځ د جذب قوه لږه ده.

* که چېرې میتانول په $400^0 C$ تودوخه کې او د Al_2O_3 کتلست په شتون کې له امونیا سره تعامل ورکړل شي، میتایل امین لاسته راځي. * انیلین داروماتیکو امینونو له مهمو مرکبونو څخه دي چې د کمزورو قلوبو خاصیت لري او د سایکلو هگزان امین په پرتله یو میلیون ځله کمزور دی.

* امایډونه د IUPAC پر بنسټ داسې نومول کېږي چې د تېزاب د جوړونکو الکانونو د تېزابو د نوم Oic وروستاري په امایډونو کې د امایډ (amide) په کلمه تعویض کېږي او د اسید کلمه نه لیکل کېږي.

د یوولسم څپرکي پوښتنې

څلور ځوابه پوښتنې

1- د امینونو وظیفه یي گروپ له..... څخه عبارت دی.

الف - NH_2 ، ب - NH ، ج - NH_3 ، د - NH_4^+ .

2- فورمول له ----- مرکب فورمول دي.



الف - تالوین، ب - اندیگو، ج - انیلین، د - الډیهایدونه.

3- له لاندې مرکبونو څخه کوم یو یې دقلوي خاصیت لري؟

الف - $CH_3 - NH_2$ ، ب - $CH_3 - OH$ ، ج - NH_3 ، د - الف اوج دواړه.

4- $CH_3 - \overset{H}{\underset{CH_3}{C}} - NH_2$ د مرکب اوبلن محلول د لاندې کومو خاصیتونو لرونکی دی؟

الف - $pH > 7$ ، ب - د جستو سره تعامل کوي هایډروجن ازادوي، ج - دقلوي خاصیت لري، د - الف اوج سم دي.

5- له لاندې مرکبونو څخه کوم یو لومړنی امین دی؟

الف - $CH_3 - NH_2$ ، ب - $CH_3 - CH_2 - NH_2$ ، ج - $CH_3 - \overset{CH_3}{CH} - NH_2$ ، د - ټول سم دي.

6- که چیرې د امین کتله 45amu وي، له لاندینو پاتې شونو څخه به کومه یوه په هغې پورې اړه ولري؟

الف - *methyl*، ب - *ethyl*، ج - *propyl*، د - *isopropyl* - *Aryl*

7- د امینونو د ایشیدو ټکي دهغوی د ایزو لوگ هایدر و کاربنونو او ایترونو پرتله... او له ایزو لوگو الکولونو او تیزابونو څخه... دی:

الف - لوړ، ټیټ ب - ښکته، ښکته ج - نژدې، مساوي د - هیڅ یو.

8- د ایتایل امین او HCl له تعامل څخه لاندې کوم مرکب حاصلیږي؟

الف - پروپایل امین ب - پروپایل امونیم کلوراید ج - ایتایل امین کلوراید د - ایتایل امونیم کلوراید.

9- $\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{NHCH}_2 - \text{CH}_3$ فورمول لرونکي مرکب په..... نوم یاد یږي؟




الف - امید ب - ایتایل اسیت امید ج - ایستر د - کیتون

10- له لاندې مرکبونو څخه کوم یو دویمي امین نه دی؟

الف - $\text{H}_3\text{C} - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ ب - $\text{H}_3\text{C} - \text{NH}_2$ ج - $\text{H}_3\text{C} - \text{NH} - \text{CH}_3$ د - $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NHCH}_3$

تشریحي پوښتنې

1- د لاندې مرکبونو نوم ایښودنه وکړئ او دهغوی ډولونه وټاکئ:



2- د لاندې امینونو ساختماني فورمولونه ولیکئ:

الف - *cyclopropyl amine* ب - *dimethylethyl amine* ج - *ethylhexyl amine*

3- د نایتروجن سلنه به *cyclopropylamine* په مرکب کې څومره وي؟

$\text{Cl}: 35.5\text{g/mol}$, $\text{O}: 16\text{g/mol}$, $\text{H}: 1\text{g/mol}$, $\text{C}: 12\text{g/mol}$, $\text{N}: 14\text{g/mol}$

4- 3.4g امونیا له 20.2g ، $\text{CH}_3 - \text{Cl}$ مرکب سره تعامل کړی چې امین یې جوړکړی دی، دغوښتل شوي مرکب فورمول

او نوم یې ولیکئ. $\text{O}: 16\text{g/mol}$, $\text{H}: 1\text{g/mol}$, $\text{C}: 12\text{g/mol}$, $\text{N}: 14\text{g/mol}$

5- د امینونو او امیدونو ترمنځ څه توپیر دی، په دې اړه لازم معلومات وړاندې کړئ؟


6- د *propylamine* مرکب په 0.25molar محلول کې د هایډروجن د ایون غلظت $[H^+] = 10^{-12}$ سره مساوی

دی، دهغه k_b تر لاسه کړئ.

7- په څلورم امین کې 65.75% کاربن، 19.18% نایتروجن او 15.07% هایډروجن دکتلی له کبله شتون لري دهغه

مالیکولي فورمول ترلاسه کړئ.

8- د لاندې امیدونو نومونه ولیکئ:



9- 5.95g امونیا له اسیت کلوراید ($\text{CH}_3 - \text{COCl}$) سره تعامل کړی دی، څومره اسیت امید حاصل شوی دی؟

10- امین په اولین محلول کې له خپل ځان څخه القلي خاصیت ښکاره کوي، ولې؟ سره له دلایلو معلومات وړاندې کړئ.

دولسم څپرکی

طبيعي پولي ميرونه



هغه ماليکولونه چې د څو کوچنيو ماليکولونو له يوځای کېدو څخه جوړ شوي دي، د پولي مير په نامه او هغه کوچني ماليکولونه چې پولي ميرونه جوړوي، د مونوميرونو په نوم يا ديري. پولي ميرونه په دوو ډلو ویشل شوي دي چې طبيعي پولي ميرونه او مصنوعي پولي ميرونه دي. په دې څپرکي کې د طبيعي پولي ميرونو په اړه معلومات وړاندې کيږي او په راتلونکي څپرکي کې به د مصنوعي پولي ميرونو په هکله معلومات وړاندې شي.

د طبيعي پولي ميرونو تر سرليک لاندې هغه مرکبونه څېړل کيږي چې طبيعي بنسټ لري او پروټينونه، نوکليويک اسيدونه، امينو اسيدونه، انزايمنونه، نشايسته، سلولوز، وريښم او طبيعي ورېښم دي چې په دې څپرکي کې به يې ځينې ځانگړتياوي مطالعه کړي.

د دې څپرکي په لوستلو به پوه شئ، چې دا مرکبونه کوم جوړښت او خواص لري او په ورځني ژوند کې کوم رول لوبوي؟

12_1: د طبيعي پولي ميرونو ډلبندي

پولي ميرونه هغه مرکبونه دي چې د هغوی مالیکولونه د څوکوچنیو مالیکولونو د نښتلو له امله جوړ شوي دي، کوچني مالیکولونه چې پولي ميرونه جوړوي، د مونو ميرونو په نوم یادېږي. پولي ميرونه کیدای شي، له یو ډول مونو ميرونو او یا له بیلا بیلو مونو ميرونو څخه جوړ شوي وي. پولي ميرونه چې د یو ډول مونو ميرونو څخه جوړ شوي دي، د هومو پولي مير په نوم یا دېري او پولي ميرونه چې له بیلا بیلو مونو ميرونو څخه جوړ شوي وي، د کوپولي ميرونو په نوم یادېږي.

پولي ميرونه په دوو ډلو ویشل شوي دي چې له طبيعي پولي ميرونو او مصنوعي پولي ميرونو څخه عبارت دي، طبيعي پولي ميرونه له څو قیمتته قندونو (نشایسته او سلولوز)، پروتینونو، نو کلیک اسیدونو، انزایمونو، ورېښمو او طبيعي رېږ څخه عبارت دي چې لاندې یې لولو:

12_1_1: قندونه


کاربو هایدريتونه د ژوندانه مهم مرکبونه دي چې زموږ د ورځني ژوند په بیلا بیلو برخو کې په کار وړل کېږي. دکورونو ورونه، موبل (میز او چوکۍ)، خوراکي مواد، کالي او نور توکي له کاربو هایدريتونو څخه جوړ شوي دي. کاربو هایدريتونه په طبیعت کې ډېر موندل کېږي او په ټولو ژونديو جسمونو کې شتون لري چې د ژویو او له هغې ډلې څخه د انسانانو د خوړو مواد دي.

کاربو هایدريتونه زیاتره د شنو نباتاتو په واسطه جوړېږي چې د نباتاتو د پامو شنه ماده د لمر د رڼا په شتون کې د هوا کاربن ډای اکساید او هغه اوبه چې د ریښو له لارې یې جذب شوي دي، په گلوکوز تبدیلوي، دا عملیه د فوتو سنتیز په نامه یادېږي:



(۱۲_۱) شکل: نباتات د گلوکوز او اکسیجن تولید کوونکی توکي

د لمر رڼا / کلوروفیل





په رښتیا چې نباتات طبیعي لابراتوارونه دي او د خوړو مواد جوړوي. په پورتنۍ معادله کې لیدل کیږي چې په نباتاتو کې د کلوروفیل د شنبې مادې په مرسته د گلوکوز د جوړیدو عملیه ترسره کیږي او اکسیجن هم تولیدیږي، ټول ژوي اکسیجن تنفس کوي، اکسیجن د کاربوهایدریتونو او د خوړو نورو توکو د اکسیدیشن لپاره په کار وړي چې د ژونديو په ارګانیزم کې انرژي ازاد وي:



د فوتو سنتیز عملیه او د ژویو د تنفس عملیه دوی معکوسې عملیې دي؛ په دې دوو عملیو کې د کاربن ډای اکساید او اکسیجن د کچې توازن کنټرولېږي.


2_1_12: د کاربوهایدریتونو جوړښت او نوم ایښودنه

کاربوهایدریتونه د کاربن د هایدریتونو په نوم هم یا دوي، څرنګه چې د هغوی ساده فورمول $\text{C}_n(\text{H}_2\text{O})_n$ یا $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_n$ دی؛ پردې بنسټ د اوبو لرونکي کاربن په بڼه لیدل کیږي. د دې ډلې مرکبونه گلوکوز $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (چې د الډیهایډي ګروپ لرونکی دی)، فرکتوز $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (د کیتوني ګروپ لرونکی دی) اونور دي چې په مېووکې شتون لري. د دې دواړو قندونو مشرح فورمولونه عبارت دي له:




(2_12) شکل: الف_ ځمکنی توت د فرکتوز سرچینه، ب_ انگور د گلوکوز سرچینه، ج_ شات د مونو سکرایډونو سرچینه

د عمومي فورمولونو په پام کې نیولو سره، ډېر ساده کاربو هایدريت، فارم الديهيد (CH_2O) دي، نوڅکه کېدای شي چې کاربو هایدريتونه د فارم الديهيد پولي میرونه وي؛ د بیلگې په ډول:




د پیرانوز او فورانوز بڼې

گلوکوز د الکولو او الديهيدو د وظیفه یې گروپونو لرونکی دی او لږ څه لوړ، د کېږدو او کړۍ کېدو وړ زنجیر لري چې کولی شي یو کپز هیمي اسیټال جوړ کړي، دا کړۍ له شپږو اتومونو سره، د گلوکوز پیرانوز په نوم یا ډیري؛ څکه د پیران په نوم کره یز ایتر ته ورته دی، د پیران فورمول په لاندې ډول دی:



د پیران کړۍ

فرکتوز هم د محلول په حالت کې، 70% د کره یز هیمي اسیټال بڼه لري او د پیرانوز کړۍ ته ورته شپږ اتومونه لري؛ خو 30% یې د پنځه اتومي کړۍ په بڼه دی؛ دا چې فوران ته ورته دی؛ نو د فورانوز (Furanose) په نوم یاد یږي او په ټاکلي ډول کړۍ یز فرکتوز د فرکتوز فورانوز په نوم یا ډیري، لاندې شکل فوران بڼې:



د فوران کړۍ

پیچلي کاربو هایدريتونه چې په هغوی کې گلوکوز او فرکتوز دواړه شتون ولري؛ د خو قیمتته قندونو (پولي سکرایدونو) (Polysaccharides) په نوم یا ډیري، د هغوی له ډلې څخه یوه هم بوره (Sacarose) ده چې د دوه قیمتته قندونو (disaccharides) په نوم یا ډیري، چې د یو مالیکول گلوکوز پیرانوز او د یوه مالیکول فرکتوز فورانوز د یوځای کیدو او د یو مالیکول اوبو په ایستلو سره لاسته راځي. دا هر واحد د مونو سکرایدونو (Monosacride) په نوم یا ډیري، مونو سکرایدونه یو له بل سره یوځای کیږي، اولیگو سکرایدونه جوړوي:

مثال: دلاندي کاربو هايديتونو نوم ايسودنه وکړئ:

حل:


a) aldo pentose b) Keto pentose C) aldohexose d) Keto hexose e) Ketotetrose

12_1_3: د کاربو هايديتونو ډ لېندي


کاربو هايديتونه په دوو ډلو وېشل شوي دي چې له ساده او پيچلو څخه عبارت دي.

1_ مونو سکرايدونه

ساده قندونه (Simple sugars) يا مونو سکرايدونه (Monosacharides) د کاربو هايديتونو هغه ډول دي چې نه هايډروليز کيږي او د هغوی په ماليکولونو کې د کاربن د اتومونو شمير له 3 څخه تر 9 اتومونو پورې رسيږي. مونو سکرايدونه چې په خوراکي توکو کې شته، د هکسوز (Hexoses) په نوم




یادېږي. گلوکوز ډېر ساده مونو سکراید دی چې په ژوندیو اورگانیزمونو کې د انرژي د تولید او د میتابولیزم په عملیه کې بنسټیز رول لوبوي، دا مرکبونه په ځیگر (ینه) او نسجونو کې ذخیره کېږي او د هغوی مهمې سرچینې انگور او شات دي، مونو سکرایدونه سپین رنگه کرسټالي مرکبونه دي او خوږ خوند لري، له اوبو سره هایډروجنی اړیکه ترې؛ نو ځکه حل کیدونکی دي، هایډروکاربنونه په ایترونو کې نه حلېږي. گلوکوز، فرکتوز او مانوز مهم مونو سکرایدونه دي چې د هغوی مالیکولي فورمول $C_6H_{12}O_6$ دي او یو د بل ایزومیر دي.



د الدوز مونوسکرایدونه په خپل مالیکولي ترکیب کې څلور نه برابر شوی کاربنونه لري چې په (*) علامې سره ټاکل شوي دي. دا مرکبونه په جامد حالت کې د روښنایي عمل لرونکی دي. گلوکوز چې دالډو هکسوز په نوم هم یې دېږي، د څلور نه برابر شویو کاربنونو لرونکی دی او د هغه نه برابر شوی کاربنونه په پام کې نیولوسره، د دې مرکبونو د روښنایي ایزومیري په لاندې ډول محاسبه کېږي:

$$2^n = 2^4 = 16 \text{ د الدو هکسوز د ایزومیرونو شمېر}$$

په پورتنۍ معادله کې n د نه برابر شوو کاربنونو شمېر ښیي. مونو سکرایدونه کېدای شي چې کړۍ یز یا زنځیري مالیکولونه ولري، د زنځیري مونو سکرایدونو د هایډرولیز په پایله کې کړۍ یز مونوسکرایدونه لاس راځي چې په دې حالت کې د هغوی نه برابر شوو کاربنونو شمیر له څلورو اتومونو څخه پنځو اتومونو ته زیاتېږي، د مونو سکرایدونو د کړۍ په جوړیدو کې د نه برابر شوو کاربنونو داتومونو د زیاتوالي عملیه د هیمي اسیتال په نوم یې دېږي، د گلوکوز د مالیکول د کړۍ یز جوړښت جوړیدل گورو:





الف - که چېرې ډي - گلوکوز (D - glucose) په اوبو کې حل شي، د هغه کریز گلوکوز لاسته راځي.

ب - په α -D-glucose کې د OH- گروپونه د کریز په لومړي او څلورم کاربن کې د Cis په حالت کې شتون لري او یوازې د لومړي کاربن د OH گروپ، اکزیال (axial) دي او نور اکواتریال (aquatrial) دي.

ج - په β -D-glucose کې د OH- گروپونه د کریز په لومړي او څلورم کاربن کې د اکواتریال (aquatrial) په حالت کې دي.

د مونو سکرایدونو اسکلیت بندي

څرنگه چې د ټولو هایډروکاربنونو د کاربن اتومونه د تاویدو وړ دي؛ له دې کبله پوهانو معیاري میتودونه د کاربوهایډریتونو د سټریو شمیې د ښودنې لپاره په کار وړي دي، نو یو له دې میتودونو څخه د فیشر میتود دی چې د تاویدلو د مرکز د ښودلو لپاره یې د یوې سطحې د مخ څخه ګټه اخیستل کیږي. په تیرو لوستونو کې مو مطالعه کړل چې له څلور مخو کاربنونو څخه یو اتوم د فیشر په ښودنه کې په دوو پرې کړو خطونو سره ښودل کیږي، افقي خطونه د مخ د بهرنۍ سطحې د اړیکو ښودونکي او عمودي خطونه د مخ د شا اړیکو ښودونکي دي، د پرې کړې سره سم د کاربونیل د گروپ کاربن د فیشر د فورمول په پاسنۍ برخې او یا هغې ته نژدې لیکل کیږي، پردې بنسټ R- گلیسر الډیهایډ چې ډېر ساده مونو سکراید دی، په لاندې شکل کې لیدل کیږي:




(12_3) شکل: د فیشر بنودنه د گلیسرایدونو لپاره

د یادولو وړ ده دا چې د فیشر بنودنه کیدای شي د هغه د جوړښت له بدلون پرته، د 180° درجو په کچه (پرته له 90° یا 270° درجو څخه) د سطحی پر مخ تاو شي:



[R] - گلیسر ال دیهاید


هغه کاربوهایدریتونه چې د تاویدلو څلور مرکزونه ولري، داسې ښودل کیږي چې د تاویدلو مرکز ونه یو د بل له پاسه شتون لري او د کاربونیل د گروپ کاربن د هغوی د پاسه او یا لاندې ښودل کیږي؛ د بیلگې په ډول: گلوکوز د تاویدلو څلور مرکزونه لري چې د فیشر په بنودنه کې یو د بل له پاسه شتون لري، خو دا تصوري بنودنه د مالیکولونو د سم جوړښت چې کور تاو چې پیچ وي، معلومات نه ورکوي:



فعالیت



د گلیسر الدیهایدونو فیشری بنوده چې لاندې لیکل شوي، کوم یو یې د یو انانتومیر بیانوونکی دی؟




D او L قندونه

گلیسر الدیهایدونه (Glyceraldehyde) ډېر ساده الدوزنه دي چې د تاویدلو یو مرکز لري او د دوو انانتومیرو شکلونو لرونکي (اښه وي تصویر) دي چې د ښي لور تصویر یې په طبیعت کې زیات موندل کېږي؛ یعنې که چیرې د طبیعي گلیسر الدیهایدونو یوه نمونه په یو پولارومتر کې کښودل شي، رڼا پولارایز کېږي او د ساعت د عقربې سره سم تاوېږي چې په مثبت (+) علامه ښودل کېږي. دا چې د C_2 اسکلیټ په (+) گلیسر الدیهایدونو کې په (R) ښودل شوی؛ نو دا گلیسر الدیهاید د D- گلیسر الدیهاید په نوم هم یادېږي، (D له Dextrorotatory څخه اخېستل شوی دی چې ښي خوا ته د تاویدلو په معنا ده) د هغې بل انانتیومتر؛ یعنې (L) _ گلیسر الدیهاید د L- گلیسر الدیهاید په نوم یاد وي (L له levorotatory کلمې څخه اخېستل شوی دی چې کښي خوا ته د تاویدلو په معنا دی).

د مونو سکرایدونو کیمیاوي خواص


۱- د مونو سکرایدونو اکسیدشن

د الدوزو مونو سکرایدونه د فېلنگ او تولین د محلولونو په شتون کې اکسیدي کېږي او د هغوی د کاربونیل په گروپ کې اکسیدیشن ترسره کېږي:




په دې تعامل کې سور رنگی رسوب کېدونکې ماده جوړېږي چې له دې تعامل څخه د وینو د شکرې د کچې په ټاکلو کې ګټه اخیستل کېږي، لږ څه یوریا د فېلنگ له محلول سره مخلوط وي چې دا مخلوط بیا پرویني زیات وي، په دې صورت کې سور رنگه رسوب جوړېږي چې په وینه کې د شکرې شتون ټاکي.

د کیتوز مونو سکرایډونه د فېلنگ او تولین د ښودونکو په واسطه په جامد حالت کې اکسیدي او په تېزاب نه تبدیلېږي؛ نو د محلول په حالت کې له نوموړو ښودونکو سره تعامل کوي، د هغوی کیتوني ګروپ د کاربوکسیل په ګروپ بدلون مومي، خو لومړی د کیتون ګروپ په الډیهایدی ګروپ او بیا د هغوی الډیهایدی ګروپ د کاربوکسیلیک اسید په ګروپ تبدیلېږي:




د برومین د اوبو په واسطه د مونو سکرایډونو اکسیدیشن

د برومین اوبه د الډوزونو الډیهایدی ګروپ اکسیدي کوي او د کاربوکسیل په ګروپ یې تبدیل او الډونیک اسید جوړوي:




د نایتریک اسید په واسطه د مونو سکرایډونو اکسیدیشن

نایتریک اسید د برومین د اوبو په نسبت ډېر قوي اکسیدي کوونکی دی چې د الډیهاید ($\text{C}=\text{O}-\text{H}$) او الکولي CH_2OH ګروپ اکسیدي کوي او په کاربوکسیلیک اسید یې تبدیلوي:



مثال:

یو الدوز چې عمومي فورمول یې $C_nH_{2n}O_n$ دی، 36g یې د تولین له ښودونکي سره تعامل کړی او 43.2g سپینو زرو ته یې رسوب ورکړی، د دې الدوز مالیکولي فورمول به کوم وي؟ د کاربن اتومي کتله $12g/mol$ ، د هایدروجن اتومي کتله $1g/mol$ ، د اکسیجن اتومي کتله $16g/mol$ او د سپینو زرو اتومي کتله $108g/mol$ ده.


حل:

$$C_nH_{2n}O_n = 12n + 2n \cdot 1 + 16n = 30ng/mol$$

$$30n \text{ g aldose} - 216gAg$$

$$36g \text{ aldose} - 43.2gAg$$


$$n = \frac{36g \cdot 216g}{30g \cdot 43.2g} = 6$$

**فعالیت**


500g د گلوکوز 1.2% کتلوي محلول نمونه د فهلنگ له ښودونکي محلول سره تعامل ورکړ شوی دی، خومره Cu_2O به رسوب کړی وي؟ د Cu_2O مالیکولي کتله 143 او د گلوکوز $C_6H_{12}O_6$ مالیکولي کتله 180 ده.

د مونو سکرایدونو ارجاع کول

د مونو سکرایدونو کیتوني او الډیهایدی گروپونه د د قوي ارجاع کوونکو په واسطه ارجاع کیږي؛ د بیلگې په ډول: که چېرې د $D-C_6H_{12}O_6$ د $NaBH_4$ او یا د H_2 په واسطه د کتلست په شتون کې ارجاع شي، $D-glucitol$ (Sorbitol) لاس ته راځي:



مثال: د $(aketo\ pentose)D-ribose$ د محصول تعامل د تولین او $NaBH_4$ سره به کوم وي؟



فعالیت



د $(D-ribose\ ketopentose)$ تعامل محصول د تولین دښودونکي او د $NaBH_4$ سره به څه وي؟

2_ ډای سکرایډونه


د مونو سکرایډونو د دوو مالیکولونو د یو ځای کیدو، تراکم او له دی هایډریشن څخه د ډای سکرایډونو مالیکول لاسته راځي چې د دوو مونو سکرایډونو تر منځ یو اکسیجني پول تړل کیږي.

د ډای سکرایډونو عمومي خواص



- 1_ د ډای سکرایډونو عمومي فورمول $C_{12}H_{22}O_{11}$ دی.
- 2_ ډای سکرایډونه سپین رنگ لري او خوند یې خوږ دی.
- 3_ د ټولو ډای سکرایډونو مالیکولونه ښي خوا ته تاوېږي او نور پولاریزیشن کوي.
- 4_ ډای سکرایډونه هایډرولیز کیږي او د هغوی د هایډرولیز په پایله کې مونو سکرایډونه لاسته راځي.
- 5_ د مهمو ډای سکرایډونو څخه یوه بوره ده او نور مهم ډای سکرایډونه لکتوز، مالتوز او سلیبوز دي.

سکروز (بوره)

بوره د یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکتوز د نښلېدو له امله لاسته راځي:



دا دواړه نوموړي هکسوزونه د گلايکوسايد (glycoside) اړيکې په واسطه چې د گلوکوز د لومړي کاربن (C-1) او د فرکتوز د دويم کاربن (C-2) سره تړل کيږي، نښتي دي. بوره په ډيره کچه په نباتاتو؛ لکه: لبلبو او گنيو کې موندل کيږي چې د اکسترکشن په ميتود له هغوی څخه خالصه بوره په لاس راوړل کيږي. بوره په اوبو کې په اسانۍ سره حل کيږي؛ خو په الکولو کې ډيره لږه حل کيږي. کله چې بوره هضم شي؛ په دې صورت کې په ځيگر کې گلوکوز او فرکتوز جوړ او وروسته له جوړيدو څخه په وينه کې جذبېږي:



څرنگه چې سکروز د کاربونيل گروپ نه لري؛ له دې کبله د فهلنگ او تولين له ښودونکو سره تعامل نه کوي او د ارجاعي ځانگړتيا هم نه لري.



(12-4) شکل: د سکروز ویلې کیدل او د شیریني جوړېدل

فعالیت

په یورین کې د شکرې د کچې ټاکل

زیاتې عضوي مالګې په خپل جوړښت کې د الډیهایدونو او کیتونونو ګروپونه لري؛ له دې کبله هغوی ډېر لږ کولی شي چې فلزي ایونونه؛ لکه: Cu^{2+} , Hg^{2+} , Bi^{3+} او Ag^+ جوړ کړي. کله چې دا مالګې په کاربوکسلېک اسید اکسیدایز کېږي، دا معلومات په وینه او یورین کې د شکرې د کچې د ټاکلو لپاره بېلابېل میتودونه په کار ورل کېږي؛ خو مهم میتود د فېلنګ د ښودونکي کارول دي (هغه ماده چې د کیمیايي تعامل لپاره کارول کېږي، په ځانګړې توګه د دې د پوهیدلو لپاره ده چې د نظر وړ ماده کې موکوم نور مواد هم شته). په دې هکله د کار لاره په لاندې ډول ده:

- 1_ په یو تست تیوب کې د فېلنګ په محلول باندې د 70% په کچه CuSO_4 محلول ورزیاد کړئ.
- 2_ د جوړ شوي فېلنګ محلول له مساوي کچې سره سم، د سودیم پوتاشیم تارتاریت او سودیم هایډروکساید محلول کچه (له اوبو سره د 100 mL ملي لیټرو په اندازه جوړ کړي) په یو تست تیوب کې یې واچوئ.
- 3_ محلولونه یو په بل کې تر هغه وخته پورې حل کړئ چې د اوبو په شان تیاره رنګ یې ولیدل شي.

- 4_ بیا له دې څخه وروسته محلول وښوروئ (د اوبو د رنګ په شان تیاره رنګ باید ولیدل شي، که چیرې ونه لیدل شي، نو تست تیوب پاک نه دی)

5_ نو یورین یا دوینی سیروم باید په لاس راغلي محلول کې واچول شي (د یورین کچه باید له ښودونکي څخه زیات نه وي) که چیرې یورین یا سیروم شکره ولري، نو سور اویا ژېړ رنګه رسوب په تست تیوب کې جوړېږي.


په وینه کې د گلوکوز نورماله کچه له 80mg څخه تر 120mg په شاوخوا کې ده. د سوځیدلو توقف او په وینه کې د گلوکوز فعالیت د انسولین د هارمون فعالیت پورې اړه لري.




(5_12) شکل: د شکرې د اندازې موندل په وینه کې

لکتوز (lactose)

لکتوز د شیدو په قند هم مشهور دی، دا قند د تي لرونکو ژویو په شیدو کې شته چې د انسانانو شیدې 6% او د غوا وشدې 4% له لکتوز څخه جوړې شوي دي:





د لکتوز جوړښت په لاندې ډول دی:



(6_12) شکل: شیدې د لکتوز سرچینه:

مالتوز (Maltose)


مالتوز د ډای سکرایدنو هغه ډول دی چې د اوربشو په دانو او نورو نباتاتو کې موندل کېږي. دا قند کیدای شي چې له نشایستې او گلايکوجن څخه د امایلاز (Amylase) انزایم د کړنې په واسطه لاسته راوړل شي. دا قند په $102 - 103^{\circ}C$ تودوخه کې ویلې کېږي چې د څښلو او د خوراکي موادو په تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. په مالتوز کې الډیهایدی ګروپ شته؛ له دې کبله د فهلنگ محلول ارجاع کولی شي او د برومین د اوبو په شتون کې په مالتونیک اسید (moltonic acid) تبدیلېږي. که چیرې مالتوز د تېزابونو په شتون کې هایدرولیز شي، په ګلوکوز بدلیږي:



سلیویوز (cellobiose)


د سلولوز د قسمي هایدرولیز په پایله کې، سلیویوز جوړېږي، که چیرې هایدرولیز ته دوام ورکړل شي، په پای کې دوه مالیکوله ګلوکوز لاسته راځي. سلیویوز د مالتوز په شان دی او یو د بل هندسي ایزومیر

دي، په ځينې هيوادونو کې لږگيو ته له گرموتېز ابونو سره تودوخه ورکوي، په پايله کې سليويوز لاسته راوړي چې له هغه څخه د ژويو د خوړو لپاره گټه اخيستل کيږي. که چېرې سليويوز هايډروليز شي، دوه ماليکوله گلوکوز لاسته راځي:




2_2_12: پولي سکرایډونه (Polysacarides)


پولي سکرایډونه د پیرانونز گلوکوز د واحدونو یو له بل سره د یوځای کېدو او د هغوی د دې هایډریشن په پایله کې جوړیږي. نشایسته هم له دې مرکبونو څخه ده چې د ښاخ لرونکي جوړښت له کبله د هضم کیدو وړتیا لري؛ خو سلولوز هم چې د پولي سکرایډونو له زنځیر څخه د اوږدو رینو په بڼه لاسته راغلي دي؛ نو څرنگه چې دا رینې د هایډروجنی اړیکو په واسطه یو له بل سره یوځای شوي دي، کلکه ماده ده، چې د هضم وړنه ده. د نباتاتو تنه، رینې او ښاخونه له سلولوز څخه جوړې شوې دي:



د دې قندونو د پیژندگلۍ او له نورو مرکبونو څخه د دې مرکب د بیلولو لپاره د فېلنگ له ښودونکي څخه کار اخېستل کيږي کوم چې له گلوکوز سره سور رسوب جوړوي:



فرکتوز هم د گلوکوز په شان اکسیدي کيږي؛ خو د هغه هایډروکسیل گروپ اکسیدیشن کيږي، د هغه ډاکسیدیشن یوه برخه په لاندې ډول ده:




عمومي خواص


- 1_ د پولي سکرایدونو عمومي فورمول له $(C_6H_{10}O_5)_n$ څخه عبارت دی.
- 2_ د نباتاتو په تخمونو او نیغونو کې پیداکېږي.
- 3_ پولي سکرایدونه هغه مواد دي چې د کرسټال کیدو وړتیا نه لري او بې خونده دي. دا مرکبونه په اوبو او الکولو کې نه حل کېږي؛ که چېرې هایډرولیز شي، په مونو سکرایدونو بدلیږي: مهم پولي سکرایدونه له نشایستې (Starch)، گلايکوجن (Glycogen)، سلولوز (Cellulose) او دکستین (Dextrin) څخه عبارت دي.

نشایسته (Starch)

د پولي سکرایدونو له مهمو مرکبونو څخه یوه هم نشایسته ده چې د گلوکوز د مالیکولونو د ترکیب د گلايکوسایډي اړیکې پر بنسټ جوړېږي، جوار، کچالو، وریجې، د نباتاتو تخمونه او ریښې د نشایستې مهمې سرچینې دي. نشایسته د خواړو ښه سرچینه ده چې د هغې هر مالیکول د گلوکوز له زرگونو مالیکولونو څخه جوړ شوی دي، د فورمول یوه برخه یې په لاندې ډول ده:



څرنگه چې وویل شو، نشایسته په اوبو کې نه حل کېږي؛ که چېرې له اوبو سره یوځای تودوخه ورکړل شي، د هغوی هایډرولیز ترسره کېږي او په یو قیمت قندونو ټوټه کېږي. نشایسته د فېلنگ ښودونکي ارجاع کوي او که چېرې له ایوډین سره یوځای شي اوبه رنگه محلول جوړوي. دا چې په دې مرکب کې د $-OH$ گروپونه زیات شتون لري؛ نو د اوبو ښه جذبونکي دی، د تودوخې د ورکولو په پایله کې د نشایستې هایډرولیز ترسره کېږي او د هایډرولیز محصول یې گلوکوز دی:






(7_12) شکل: الف کچالو د نشایستې سرچینه

ب - ډوډۍ د نشایستې سرچینه

گلايکوجن (Glycogen)

گلايکوجن حیواني نشایسته ده چې د حیواناتو په ځیگر کې شته او د حیوانات د انرژي د ذخیرې په توگه رول لوبوي. هغه دخوړو کاربو هایدريتونه چې په انرژي تبدیل شوي نه وي، په ځیگر کې په گلايکوجن تبدیل او ټولېږي، د گلوکوز د واحدونو شمیر په گلايکوجن کې سل زرو عددونو ته رسیږي. د گلايکوجن د پیچلیو جوړښتونو یوه برخه د $4',1$ او $6',1$ له یوځای کیدو سره په لاندې ډوله ده:





(8_12) شکل: د گلايکوجن د پیچلي جوړښت یوه برخه د او د یوځای کیدو سره $4',1$ او $6',1$.

سلولوز (Cellulose)

له مهمو پولي سکرایدونو څخه یو هم سلولوز دی چې د گلوکوز د مالیکولونو د یو ځای والي په واسطه اود گلايکوزید اړیکې پر بنسټ جوړ شوی دی او د 350 مونو میرونو واحدونه لري، د هغه مالیکولي کتله 500000 ته رسیږي. د سلولوز کچه په طبیعت کې ډیره زیاته ده، د نباتاتو د حجرو د یوال له دې مرکب څخه جوړ شوی دی. د سلولوز مهمې سرچینې لرگي، وابنه، کتان او کنف دي. سلولوز امورف (Amorph) ماده ده چې په اوبو کې نه حل کیږي، دا مرکب د نورو پولي سکرایدونو پر خلاف له تېزابونو او القلیو سره له ځانه کلکوالی ښيي،

خو د تودوخې او لوړ فشار په شتون کې د نړيو تېزابونو په واسطه هايډروليز کيږي او په گلوکوز بدليږي:



(شکل: 9_12) لرگي د سلولوز د پولي ميرونو ډول

2_12: پروټينونه


پروټينونه د طبيعي پولي ميرونو له ډولونو څخه دي چې د انسانانو اورگانيزم يې تر 15% جوړ کړی دی او په بدن کې ډيرې دندې ترسره کوي. رشتوي پروټينونه (fibres proteins) د بدن د پوستکي او نسجونو بنسټيزې اجزا وې دی او نور پروټينونه په ميعاتو او وينه کې هم شتون لري چې حجرونه د اکسيجن، شحمياتو او نورو موادو د ليرلو لامل شوي دي او د ميتابوليزم په عمليې کې برخه اخلي؛ همدارنگه هارمونونه؛ لکه: انسولين او انزايمونه د پروټينونو له ډولونو څخه دي. پروټينونه د خوراكي توکو بنسټيزې اجزا وې دي، ډېر خوراكي مواد پروټين لري، سره غوښه، سابه، حبوبات؛ لکه: نخود او لوبيا له پروټينونو څخه ډک دي. د خوړو موادو پروټينونه د اورگانيزم او د هاضمي سيستم کې په کوچنيو اجزاوو؛ يعنې په امينواسيدونو ټوټه کيږي او دا امينواسيدونه په حجرو کې بيرته د بدن د اعضاو په اړنيو پروټينونو تبديليږي؛ څرنگه چې د پروټينونو بنسټيزې اجزاوې، امينواسيدونه دي؛ پردې بنسټ د امينواسيدونو په هکله بايد معلومات وړاندې شي:

3_12: امينواسيدونه (Amino acides)


که چيرې د کاربوکسليک اسيدونو د کاربنونو يو او يا څو د هايډروجن اټومه د NH_2 - (امين) په واسطه بې ځايه شي، د هغوی اړوند امينو اسيدونه لاسته راځي؛ د بيلگې په ډول: $\text{NH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$ امينو اسيدونو يو ډول دی چې د امين د گروپ په واسطه د اسيتيک اسيد د ميتايل د پاتې شوني يو اټوم هايډروجن د بې ځايه کېدو په پايله کې لاسته راغلی دی.

د امینواسیدونو نوم ایښودنه


سره له دې چې د حیاتي کیمیا پوهانو د امینواسیدونو لپاره مروجي (Trivial) نومونه ټاکلي دي؛ خو کیدای شي چې د امینواسیدونو نوم ایښودنه په سیستماتیک ډول هم ترسره شي، د ځینو امینواسیدونو مروجي نومونه په لاندې ډول دي:




د دغو دوو امینواسیدونو نړیواله نوم ایښودنه له لاندې لیکنې سره سم ترسره کیږي: دا چې الانین له Propanoic acide څخه ترلاسه شوی دی او د NH_2 -گروپ په دویم نمبر کاربن کې ځای لري. (د کاربوکسیل د گروپ کاربن باید تل ډېر کوچنی نمبر ځانته غوره کړي) پردې بنسټ د الانین سیستماتیک نوم عبارت دی له:






د یادولو وړده چې د COOH -گروپ یې تل د زنځیر په یوه څوکه کې ځای لري. د کاربن اټوم چې د COOH -له کاربن سره اړیکه لري، د الفا، بل کاربن د بیټا (β) او همدارنګه د گاما γ په نوم، نومول شوي دي:



هغه امینواسیدونه چې د NH_2 -گروپ یې د الفا α په کاربن نښتي وي، د α - amin oacides په نوم یادېږي او که چیرې د بیټا β په کاربن نښتي وي د β - amin oacides په نوم یا ډیرې او که د γ په کاربن باندې ځای ولري د γ - امینواسید (γ - amin oacides) په نوم یادېږي:




3 - methyl 2 - aminobutan oicacide
(α -Valine)




د امینو اسیدونو خواص



د امینو اسیدونو په ترکیب کې د NH_2 او COOH - د ګروپونو د شتون له کبله دا مرکبونه امفوتریکې ځانګړتیاوې لري؛ یعنې هم تېزابي خواص او هم قلوي خواص له ځانه ښيي. له ګلا سین سره د سودیم هایدروکساید تعامل په لاندې ډول ګورو:



په تېزابي محیط کې امینو اسیدونه په لاندې ډول لیدل کېږي:







امینو اسیدونه په جامد حالت کې د دوه قطبي ایون په بڼه ځان ښکاره کوي، داسې چې د هغوی د کاربوکسیل ګروپ د کاربوکسلیت د ایون په بڼه (COO^-) او هغوی د امین ګروپ د امونیم (NH_3^+) د ایون په بڼه ښکاره شوي دي چې د امفي ایون (Amph ion) یا سویتر ایون (Zwitter ion) په نوم یادېږي:



(10_12) شکل: کب د پروتین مهمه سرچینه


(1_12) جدول: 20 مهم بيولوژيكي امينو اسيدونه

نوم	معمولي نوم	سمبول	فورمول
گلاسين	Glycine	Gly	$\begin{array}{c} H - \text{C} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$
الانين	Alanine	Ala	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$
والين	Valine	Val	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH} - \text{COOH} \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{NH}_2 \end{array}$
ليوسين	Leucine	Leu	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \quad \text{NH}_2 \end{array}$
ايزوليوسين	Isoleucine	Ile	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH} - \text{COOH} \\ \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \quad \text{NH}_2 \end{array}$
سيرين	Serine	Ser	$\begin{array}{c} \text{HO} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$
تيرونين	Threonine	Thr	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{C} - \text{H} - \text{CH} - \text{COOH} \\ \quad \quad \\ \text{OH} \quad \quad \text{NH}_2 \end{array}$
سستين	Cysteine	Cys	$\begin{array}{c} \text{HS} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$
ميٿونين	Methionine	Met	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{S} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$
اسپارٽيڪ اسيد	aspartic acid	asp	$\begin{array}{c} \text{HOOC} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$
اسپارژين	Asparagine	Asn	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N} - \text{CO} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$

گلو تا میک اسید	Acidglutamiqae	Clu	$\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$
گلو تامين	Glutamin	Cln	$\text{H}_2\text{N}-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$
ليسين	Lysine	Lys	$\text{H}_2\text{N}-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$
ارژينين	Arginine	Arg	$\text{H}_2\text{N}-\underset{\text{NH}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{NH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$
فينيل الاتين	Phenylalanine	Phe	
تيروزين	Tyrosine	Tyr	$\text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$
تريپتوفان	Tryptophane	Try	
هيسيتدين	Histidine	His	
پروولين	Proline	Pro	

12_2_2: پولي پېتايدونه او پروتينونه

پروتينونه د مشخصو ساختماني واحدونو لرونکي دي چې له امينو اسيدونو څخه عبارت دي. د ټولو ژونديو موجوداتو پروتينونه له امينو اسيدونو څخه جوړ شوي دي. د پروتينونو په جوړښت کې له شلو (20) څخه ډېر امينو اسيدونه برخه لري او د پېچلو پولي ميرونو له ډلو څخه دي؛ نايلون هم د پولي ميرونو د ډولونو څخه دی؛ خو د هغه په ترکيب کې يوازې يو ډول مونو مير برخه لري. د انسانانو د بدن ارگانونه د پنځلس ډولو امينو اسيدونو د جوړولو وړتيا لري، ترڅو د هغوی په واسطه خپل ژوند ته دوام ورکړي؛ له دې کبله د بنسټيزو امينو اسيدونو په نوم يا ډيرې. هغه ماليکولونه چې څه نا څه له دوو امينو اسيدونو څخه جوړ شوي دي، د پېتايد په نوم يا ډيرې:



د $\text{CO} - \text{NH}$ اړيکه د پېتايدې اړيکې په نوم او وروستني امينو اسيد د پاتې شوو موادو او يا (Residue) په نوم يادوي، د پېتايدونو زنځير له سل گونو څخه له ډيرو وروستيو بناخ لرونکو څخه جوړ شوی دی او د پېتايدې اړيکو په واسطه يې نظم تر لاسه کړی دی، دپولي پېتايد زنځير چې پاتې شونې ونه لري، داوليگو اسيد په نامه يادېږي، د پولي پېتايدې هغه امينو اسيدونه چې د هغو په سرونو کې COOH - دوه گروپونه شتون ولري، په اولنو محلولونو کې لوړ تېزابي خاصيت لري چې بيلگه يې د (12_1) جدول په پام کې نيولو سره کيدای شي اسپارتيک اسيد او گلوتاميك اسيد وپانډې شي، که د COOH - گروپ په اميد $\overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}} - \text{NH}_2$ گروپ تبديل شي، دا امينو اسيد په اسپاراकिन او گلوتامين تبديليږي.

که چيرې د NH_2 - گروپونه له COOH - گروپونو څخه زيات وي، دا ډول امينو اسيدونه د قلوي امينو اسيدونو په نوم يادېږي چې په اولنو محلولونو کې قلوي pH لرونکي دي، د ارژين امينو اسيد په ځانگړي توگه د انسانانو په سپرم او د مذکرو ماهيانو په تناسلي سپين رنگه مايع کې شتون لري. سيسټين (Cysteine) د سلفر لرونکو امينو اسيدونو له ډولونو څخه دی چې د هغه زنځير په $\text{S} - \text{H}$ پای ته رسېږي او مېټيونين (Methionine) د سلفر لرونکو امينو اسيد و بل امينو اسيد دی چې په هغه کې سلفر د $\text{S} - \text{CH}_3$ - وظيفه يې گروپ په بڼه شتون لري، دا امينو اسيد په ژونديو موجوداتو کې د بدن د اعضاوو د اکسيدېشن او ريډکشن کړنه کنټرول او بنسټيز رول لوبوي چې د هغه ځای نور امينو اسيدونه


نیولی نه شي. زیات امینواسیدونه الیفاتیکی کاریني زنځیرونه لري؛ خو د میتایل الانین، تایروزین او دتریتوفان امینو اسیدونه له یوې اروماتیکی هستې څخه جوړشوي دي چې د هغوی پېژندنه د نایتریک اسید په واسطه شونې ده. دا امینو اسیدونه نایتریک اسید سره تعویضي تعاملونه تر سره کوي او د نایترو مرکبونه جوړوي؛ نو له همدې کبله ده چې که لاسونه د نایتریک اسید په واسطه ککړ شي، په پایله کې د لاسونو د پوستکي رنگ ژړپړي. که چیرې د چرکانو د هګیو سپین هایدرولیز شي، اروماتیک امینو اسیدونه لاسته راځي.

په پروتینونو باندې د پیپتایدونو تبدیلول

د یو ډای پیپتاید د COOH - گروپ د نوي امینو اسیدونو له NH_2 - گروپ سره تعامل کوي، په ترای پیپتاید بدلون مومي او بیا هم د هغه د زنځیر په پای کې د COOH - گروپ شتون لري چې هغه هم په خپل وار سره د نوروامینو اسیدونو له NH_2 - گروپ سره تعامل کوي او په پایله کې پیپتایدونه په پروتینونو تبدیلېږي. که چیرې داسې مالیکولونه له پنځه ډیرشو څخه لږ امینو اسیدونه ولري، بیا هم د پیپتایدونو په نوم یا ډیري او که له دې شمیر څخه لږ وي، د پروتین په نوم یا ډیري. ځینې پروتینونه هم شته چې له شپږ ویشت زرو (26000) څخه زیات امینو اسیدونه لري او مالیکولي کتله یې 40000 g/mol ده. په رښتیا چې پروتینونه مکرو مالیکولونه دي او دیو پروتین لومړنی جوړښت د هغوی دجوړوونکو امینو اسیدونو او د هغه تنظیم په واسطه چې امینواسیدونه یې یو له بل سره تړلي دي، ټاکل کېږي؛ د بیلګې په ډول: دیو ترای پیپتاید جوړیدل چې د درې امینو اسیدونو الانین، سیرین او سیستین څخه جوړ شوي دي، په پام کې ونیسئ چې په شپږو لارو یو له بل سره یو ځای کېږي:


Ala	Ser	Cys	Ala	Cys	Ser
Ser	Cys	Ala	Ser	Ala	Cys
Cys	Ala	Ser	Cys	Ser	Ala

د دې درې پروتینونو جوړښت په بشپړه توګه یو له بل څخه توپیر لري (سره له دې چې د هغوی لومړني مواد سره یوشان دي)، د فزیکي او کیمیايي بیلابیل خواص لري، د دې ساده نمونې په پام کې نیولو سره کیدای شي، وویل شي چې: د طبیعت شل فعال بیولوژیکي امینو اسیدونه توانیدلي دي چې یو شمیر زیات پروتینونه یې جوړکړي، د هغوی شمیر د حیواناتو او نباتاتو په عالم کې 10^{12} پورې اټکل شوی دی.



(11_12) شکل: د پروتینونو بڼه

دا لاندې تعامل د الانین او گلاسین د ډای پروتینونو جوړیدل ټاکي:




4_12: ډای اکسي رايبوز نوکليوټيک اسيد (D.N.A) او رايبوز نوکليوټيک اسيد (R.N.A)


ډير پيچلی عضوي ماليکول ډای اکسي رايبوز نوکليوټيک اسيد (D.N.A) دی چې د ژوندي اورگانيزم د

ټولو حجرو په هستو کې شتون لري او د بېلابېلو پروټینونو د تولید او جنیټیکي خبرتیاوو د لېږلو (وراثت) لپاره له یونسل څخه بل نسل ته، دنده تر سره کوي. د انسانانو د D.N.A مالیکول ډېر لوی دی او د هغه اوږد والی له هستې څخه د وتلو وروسته دوه مترو ته رسېږي. د رایبوزنو کلیک اسید (R.N.A) مالیکول د D.N.A په مالیکول ته ورته دی؛ خو له هغه څخه کوچنی دی. دا مالیکولي ټول شوی ارثي خبرتیاوې چې د D.N.A په واسطه ټولېږي، له هستې څخه بهر ته لیږي.

د D.N.A جوړښت د پیژندلو ډیره ښه لاره ده هغه د لومړنیو موادو د جوړښت د څېړنو لاره ده. D.N.A له هغو پولي میرونو څخه دی چې په هغه کې د رایبوز د قند بدل شوي مالیکولونه د فورانوز تکراري واحدونو په جوړښت کې شامل دي، د رایبوز بدل شوی جوړښت چې فورانوز ورته ویل کېږي، د اکسیجن د هغه اټوم له لرې کولو څخه چې له کاربن سره اړیکه لري، عبارت دی. په دې حالت کې رایبوز په دې اکسي رایبوز مالیکول تبدیلېږي چې د هغه فورمول په لاندې ډول دی:



(b)




(a)

رایبوز Ribos



ډاکسي ریبوز Deoxyribose

په D.N.A کې مونومیر دي اکسي رایبوز دی. د هغه په لومړي نمبر کاربن کې نایټروجن لرونکي القلي نښتي دي چې د کو ولانټ اړیکه یې جوړه کړې ده، (په دې ډول القلیو کې نایټروجن خپل ازاد الکترونونه له لاسه ورکوي) دا القلي مرکبونه عبارت دي له:






څرنگه چې لیدل کېږي، دلته القلي پنځه ډوله دي، څلور ډوله یې په D.N.A کې شتون لري او د I، G، A او

له Cy څخه عبارت دي چې ډي آکسي رايبوزنوکلئوټيک اسيد د لومړني کاربن سره اړيکه لري:



د پورتنی تعامل له تر سره کیدو څخه وروسته، د فاسفوریک اسيد تعامل له ډي آکسي رايبوز نوکلېک اسيد سره ترسره کېږي چې د DNA د مالیکول سکلیټ جوړوي، په لاندې فورمول کې د پولي نوکلئوټيک اسيد د زنځير يوه برخه وړاندې شوې ده چې په هغه کې د ايسټر د هر فاسفیت اړيکه له 3 او 5 کاربن سره په منظمه بڼه تکرار شوې ده:







د دولسم څپرکي لنډيز:

* هغه ماليکولونه چې د څوکوچنيو ماليکولونو له یوځای کیدو څخه جوړ شوي دي، دپولي مير په نامه او هغه کوچني ماليکولونه چې پولي ميرونه جوړوي، د مونومرونو (Monomers) په نوم يا ديري.

* کاربو هایدريتونه د ژوندانه مهم مرکبونه دي چې زموږ د ورځني ژوند په بيلا بيلو برخوکې په کار وړل کيږي.

* کاربو هایدريتونه د کاربن د هایدريتونو په نوم هم يا دوي، څرنگه چې د هغوی ساده فارمول $C_n(H_2O)_n$ يا $C_nH_{2n}O_n$ دی؛ پردی بنسټ د اوبو لرونکي کاربن په بڼه ليدل کيږي. گلوکوز د الکولو او الديهيدو د وظيفه يي گروپونو لرونکي دي او لږ څه لوړ او د کږيدو اوکړۍ کېدو زنځير لري.

* کاربو هایدريتونه په دوو ډلو ویشل شوي دي چې له ساده او پيچلو کاربو هایدريتونو څخه عبارت دي. ساده قندونه (Simple sugars) د مونو سکرايدونو (Monosaccharides) په نامه يادېږي.

* د مونو سکرايدونو د دوو ماليکولونو د اتحاد، تراکم او له دي هایدريشن څخه د ډاي سکرايدونو ماليکول لاس ته راځي چې د دوو مونو سکرايدونو تر منځ يو اکسيجن پل تړل کيږي. د ډاي سکرايدونو عمومي فورمول $C_{12}H_{22}O_{11}$ دی.

* پولي سکرايدونه د پيرانوز گلوکوز د واحدونو يو له بل سره ديوځاي کېدو او د هغوی د ډي هایدريشن په پايله کې جوړېږي چې بيلگي نشايسته او سلولوز دي.

* پروتينونه د پولي ميرونو له طبيعي ډولونو څخه دي چې د انسانانو اورگانيزم يې تر 15% جوړ کړی دی او په بدن کې ډيرې دندې ترسره کوي.

* که چيرې د کاربوکسليک اسيدونو د کاربنونو يو او يا څو د هایدروجن اتومه د NH_2 - (امين) په واسطه بې ځايه شي، د هغوی اړوند امينو اسيدونه لاسته راځي.

* د امينو اسيدونو په ترکيب کې د NH_2 - او $COOH$ - گروپونو د شتون له کبله دا مرکبونه امفو تريک ځانگړتياوې لري، يعنې هم تيزابي خواص او هم قلوي خواص له ځانه وړسي.

* د پروتينونو په جوړښت کې له شلو (20) څخه ډېر امينو اسيدونه برخه لري او د پيچلو پولي ميرونو له ډلو څخه دي.

* که چيرې ماليکولونه له 35 څخه لږ امينو اسيدونه ولري، بياهم د پپتايدونو په نوم يا ديري او که له دې شمېر څخه لوړ وي، د پروتين په نوم يا ديري.

* ډېر پيچلي عضوي ماليکولونه د ((ډاي اکسي رايبوز نوکليويک اسيد D.N.A)) دي چې د ژوندي اورگانيزم د ټولو حجرو په هستو کې شتون لري او له بيلا بيلو پروتينونو د توليد او جيتيکي خبرتياوو د ليرلو (وراثت) لپاره له يونسلم څخه بل نسل ته دنده تر سره کوي.

* د رايبوزنو کليک اسيد (R.N.A) ماليکول د D.N.A ماليکول ته ورته دی؛ خو له هغه څخه کوچنی دی. دا ماليکول ټولې شوي ارثي خبرتياوې چې د D.N.A په واسطه ټولېږي، له هستې څخه بهر ته ليري.


د دولسم څپرکي تمرين:

- 1- کوم شيان چې په کور کې ونی که چيري کاربو هایدريتونه په هغوې کې شتون لري، د هغوی ديو شمير نومونه واخلئ.
- 2- کوم کاربو هایدريتونه د انسانانو په ژوندانه کې مهم دي؟ د هغوی نومونه واخلئ.
- 3- کوم کاربو هایدريتونه په خپله شاوخوا محيط کې گوري؟ د هغوی نومونه واخلئ.
- 4- د فوتو سنتيز معادله په صحيح بڼه وليکئ او د هغې د لومړنيو موادو نومونه واخلئ.
- 5- کاربو هایدريتونه د کومو وظيفه يي گروپونو پر بنسټ يو له بل څخه توپير کيږي؟ په دې اړه معلومات وړاندې کړئ.
- 6- کوم اکسيدايز کوونکي کيدای شي چې د کاربو هایدريتونو د اکسيدايز لپاره وکارول شي، تر څو کاربوکسليک اسيد په لاس راوړل شي؟ په دې اړه معلومات وړاندې کړئ.
- 7- د امينو اسيدونو او پروتينونو عمومي فورمول وليکئ او په اړه يې رڼا واچوئ.


- 8_ د امینو اسیدونو او پروتین ترمنځ توپیر څه شی دی؟ په دې اړه څېړنې وکړئ.
- 9_ څو مهم امینو اسیدونه چې د ژونديو موجوداتو په اورگانیزم کې شته دي، نومونه یې واخلي.
- 10_ د الانین د امفي ایون بڼه ولیکئ.

څلور ځوابه پوښتنې

- 1_ کاربو هایدريتونه د..... مرکبونه دي چې الديهائيدي یا کيتوني گروپ لري:
- الف - ایستر ب - ایتر ج - پولي ایستر د - پولي الکولونه
- 2_ له لاندې فورمولونه کوم یو کاربو هایدريتونه راښيي؟



- الف- یوازې III ب- یوازې II ج- I د- I او II ه- ټول
- 3_ د گلوکوز تعامل د خمیر مایې په شتون کې په لاندې ډول دی:



څومره ایتایل الکول به له 6% ، 90g گلوکوز څخه حاصل شي؟

- الف 13.8 ، ب 18.4 ، ج 23 د 32.2

4_ د مونو سکرایدونو په فورمول کې کوم گروپونه شته؟

- الف- الديهاید ب- کيتوني ج- هایدروکسيل د- ټول

5_ د رایبوز نوکلېک اسید (R.N.A) د..... مالیکول ته ورته دی؛ خو د هغه په نسبت کوچنی دی:

- الف- D.N.A ب- ATP ج- الف او ب دواړه د- هېڅ یو

6_ د $\text{CH}_3 - \underset{\text{NH}_2}{\text{CH}} - \text{COOH}$ نوم عبارت دی له:

- الف- Alanine ب- الانین ج- الف او ب دواړه د- هېڅ یو

7_ پروتینونه د ټاکلو جوړښتیز واحد لرونکي دي چې..... څخه عبارت دي.

- الف- امیدونو ب- اولیگو اسیدونه ج- امینو اسیدونه د- امونیا

8_ شمیر بیالوجیکي فعال امینو اسیدونه کولی شي چې ډېر زیات امینو اسیدونو جوړ کړي.

- الف- 100 ب- 20 ج- 16 د- 10^{12}

9_ د پروتینونو ټاکلی شمیر چې د طبیعت فعاله بیالوژیکي امینو اسیدونه یې څخه جوړ شوي دي شمیرې..... دی.

- الف- 10^{12} ب- 110 ج- 20000 د- 400000

10_ د مونو سکرایدونو په مالیکولونو کې د کاربن د اتومونو شمیر له..... تر..... دي:

- الف- 20 څخه تر 30 ب- 20 څخه تر 40 ج- 3 څخه تر 9 د- 10 څخه تر 20 پورې.

11_ د یو ډای پیپتاید د COOH - گروپ د نورو امینو اسیدونو له NH_2 - گروپ سره تعامل کوي او په.....

- تبدیلېږي. الف- ترای پیپتاید ب- پیپتاید ج- امینو اسید د- هېڅ یو

12_ د امینو اسیدونو په ترکیب کې د NH_2 - او COOH - گروپونو د شتون له کبله ده چې دا مرکبونه د.....

- خاصیت لري: الف- دوه گوني ب- تېزابي او قلوي ج- امفوتریک د- ټول ځوابونه صحیح دي.


ديارلسم خپرکی مصنوعي پولي ميرونه



په دې خپرکي کې لولو چې مصنوعي پولي ميرونه کوم دي او څرنگه کيدای شي چې پولي ميرونه په مصنوعي ډول لاسته راوړل شي؟ مهم مصنوعي پولي ميرونه کوم دي؟ له مصنوعي پولي ميرونو څخه په کومو برخو کې گټه واخيستل شي؟ په دې خپرکي کې به د متراکم شوو او جمعي پولي ميرونو په اړه معلومات لاسته راوړو، د ژوندانه په چاروکې د هغوی د کارولو ځايونو په هکله معلومات حاصل کړو.

1_13: جمعي پولي ميرونه


که چيرې د پولي ميرونو واحدونه (مونو مير) یو له بل سره یو ځای شي، داسې پولي ميرونه لاسته راځي چې د جمعي پولي ميرونو له ډولونو څخه دي (1_13) جدول جمعي پولي ميرونه، مونو ميرونه او د هغوی د کارولو ځایونه ښيي. پولي ميرونه هغه توکي دي چې له داسې مونو ميرونو څخه جوړ شوي دي کوم چې د هغوی د ماليکول په جوړښت کې د جوړونکو عناصرونو اتومونو تر منځ دوه گونې اړیکه شتون لري او دا دوه گونې اړیکه د پولي میرازیشن (Polymerization) د عملیې په واسطه په یوه گونې اړیکه بدلون مومي:




کارول	ډپولیمیر نوم	د پولي مير فورمول	نوم او د مونومیر فورمولونه
پایپ، پلاستيکي بوتلونه	پولي ایتیلین	$-(\text{CH}_2 - \text{CH}_2)_n -$	$\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ Ethylene
فرشونه، پلاستيکي بوتلونه	پولي پروپیلین	$-\left(\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} \right)_n -$	$\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$ propylene
پایپ، سیرامک، ډکوپو فرش، کالي	پولي وینایل کلوراید	$-\left(\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH} \\ \\ \text{Cl} \end{array} \right)_n -$	$\text{CH}_2 = \text{CHCl}$ Vinylchloride
قالین او د اوبدلو دستگاه	پولي اکریل نایتریل (PAN)	$-\left(\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH} \\ \\ \text{CN} \end{array} \right)_n -$	$\text{CH}_2 = \text{CH}$ CN Acrylnryl
ناسوز پوښونه	پولي تترافلورو میتیلین	$-(\text{CF}_2 - \text{CF}_2)_n -$	$\text{CF}_2 = \text{CF}_2$
بطري او دکور وسایل	پولي میتایل میتا اکرلټ	$-(\text{CH}_2 - \text{C}(\text{CH}_3)\text{COOCH}_3)_n -$	$\text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{COOCH}_3$ Methylmethagrilat
دتودوخې نه تیروونکي، د لویو سامانونه، مصنوعي ربړ،	پولي بیوتادین او پولي سټیرین (SBR)	$-(\text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_2)_n -$ 	$\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH} = \text{CH}_2$ Butadiene $\text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)$  Styrene

13_1_1: پولي ايتيلين


که چيرې د ايتيلين ماليکولونه د تودوخې په 250°C او په $1000 - 3000\text{atm}$ فشار او د عضوي پر اکسايډونو په شتون کې پولي ميرازيشن شي، پولي ايتيلين (Polyethylene) لاسته راځي، د هغوی د تعامل ميخانيکيت داسې دی چې عضوي پر اکسايډونو $(\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{R})$ ته تودوخه ورکوي چې په پايله کې په دوه راډيکالونو باندې چې په $2\text{R}\cdot$ ښودل کېږي، بدلون مومي:




نوموړي راډيکالونه د ايتيلين له ماليکول سره تعامل کوي، په پايله کې نوي راډيکالونه په لاندې ډول تر لاسه کېږي:




له پورتنیو ډولونو سره سم لاسته راغلو راډيکالونه په وروستيو پړاوونو کې د ايتيلين له بل ماليکول سره تعامل کوي او دا عمليه پرله پسې دوام مومي:




د ايتيلين د مونومير د پولي ميرازيشن معادله په لاندې ډول ليکل کېږي:




په دې فورمول کې د n قيمت ډېر لوی دی چې سلگونو ته رسېږي. پولي ايتيلين د هومولوگو پولي ميرو (Homo polymer) يو ډول دی چې له يوشان مونومير څخه جوړ شوی دی؛ نور هوموپولي ميرونه عبارت له پولي وينایل کلورايد، پولي تترا فلورايد او پولي ستيارين څخه دي چې د راډيکالونو تعاملونو پر بنسټ جوړېږي، د هغوی عمومي فورمولونه په لاندې ډول دی:




Polystyrene



poly vinyl chloride(PVC)




poly tetrafluoride ethylene
(Teflon)



د پولي ايتيلين او دنسلول شوو پولي ميرونو بېلابېل شکونه

په لاندې شکل کې د پولي ايتيلين بېلابېلې بڼې ښودل شوي دي چې د هغوی له ډلې څخه پولي ايتيلين لوړ کثافت (High-density poly ethylene) لري او په HDPE ښودل شوی دی، دا پولي مير اوږد زنځير لري او لوړ کثافت لري؛ له دې کبله يې ماليکولونه يو له بل د پاسه په نښتې بڼه شتون لري او تړلی دی، دا پولي مير د شودو او جوسو په پلاستيکي قطيو جوړولو کې په کار وړل کېږي؛ ځکه دا پولي مير (HDPE) کلک دی. د پولي ايتيلين بل ډول د LDPE (Low-density poly ethylene) په نوم ياديږي چې ټيټ کثافت او ښاخ لرونکی (انشعابي) زنځير لري چې د هغه کثافت د HDPE له کثافت څخه ټيټ دی، دا پولي مير د پلاستيکي کڅوړو په جوړولو کې په کار وړل کېږي.




شکل: 1_13 له بيلا بيلو کثافت لرونکو پولي ايتيلينونو څخه جوړ شوي لوبښي

يو بل ډول پولي ايتيلين هم شته چې د کراس لينکيد پولي ايتيلين (Cross-linked polyethylene) په نوم ياديږي او په CPE ښودل کېږي، دا پولي ايتيلين داسې جوړېږي چې له دوو څنگ پر څنگ ماليکولونو څخه د هايډروجن يو، يو اتوم جلا کېږي؛ بيا دا دوه ماليکولونه يو له بل سره يوځای کېږي، له دې دوو يوځای شوو ماليکولونو څخه لاسته راغلی پولي مير د تړلي پولي مير په نوم يا ديږي او د HDPE د پولي مير په نسبت ډېر کلک دی چې له هغه څخه کلک او غښتلي شيان جوړوي.

13_1_2: رېپر

د طبيعي مهمو پولي ميرونو څخه يو هم رېپر دی چې د ايزوپرين (Isoprene) د مونومير د راډيکالي تعامل په پايله کې لاس ته راځي، د ايزوپرين دوه ډوله پولي ميرونه شته چې د هغوی د ايزوميرونو پورې تړلي دي او هغه عبارت له سيس او ترانس (cis and trans) ايزوميري څخه دي چې په لاندې ډول لاسته راځي:




د پولي ميراييزيشن په عمليه کې دواړه ايزوميري سيس او ترانس (cis and trans) په مخلوطي بڼه لاسته راځي، طبيعي رېپر د سيس ايزوميري پولي مير دی چې د هيواله ونې څخه لاسته راځي. طبيعي رېپر نښلېدونکې ماده ده چې د هغه ارجاعي وړتيا لږه ده، د همدې لامل له کبله په فابريکو کې له هغه څخه دومره گټه نه اخيستل کېږي.




شکل: د هيوالونه، د طبيعي رېپر سرچينه (2_13)

کله چې طبيعي رېپر ته له سلفر سره تعامل ورکړل شي؛ نو د هغه کيفيت لوړېږي او کلک رېپر لاسته راځي او دوام يې زياتېږي چې دا تعامل د (Vulcanisation) (هغه تعامل دی چې د موادو ترمنځ اړيکې زياتوي او د موادو د نښلېدو ځانگړتيا ټيټوي؛ خو کلکوالی او ټينگوالی يې ډيروي) په نوم يا دوي:



لومړي ځل امريکايي عالم چارلس گوداير (Charles Goodyear) په 1839م. کال کې Vulcanisation عملیه په طبيعي رېر باندې ترسره کړه چې نښلیدونکي او ماتېدونکي طبيعي رېر ته يې بدلون ورکړ او په کلک او غښتلي رېر يې تبديل کړ، د لاسته راغلي رېر خواص، د هغه سلفرو مقدار پورې اړه لري کوم چې په ایزوپرين کې ور زیاتيږي، که چېرې د ورزیات شوي سلفر کچه له 1% څخه تر 5% پورې وي؛ نو لاسته راغلی رېر نرم وي چې له هغه څخه په دست کشو، د ټایرونو دننه ټیوب او نورو ځايو کې کارول کېږي. که چېرې د سلفر کچه د 30% پورې وي، ددې رېر کلکوالي ډېر دی او له هغه څخه د موټرو د ټایرونو په جوړولو کې ګټه اخېستل کېږي



په 1920ز. کال کې الماني عالم کارل زایګلر (Karl ziegler) لومړی ځل مصنوعي رېر د پولي میرایزېشن تعامل پرېنست د پطروليم له بیوتاداین څخه په لاس راوړ، لاسته راغلی رېر يې په Bu Na وښود، دلته Bu د بیوتاداین او Na له سوډیم څخه نماینده کي کوي کوم چې په دې تعامل کې د کتلست په توګه کارول شوی دی:



1,3-butadiene


polybutadiene

د بیوتاداین د پولي میر په لاسته راوړلو سره د موټرونو دجوړولو صنعت پرمختګ وکړ چې ټایرونه او د موټرو دننه او باندنيو سامانونو په جوړولو کې له همدې رېر څخه کار اخیستل کېږي. پولي ستیارين - بیوتاداین (Styrene-butadiene) بل مصنوعي رېر دی چې په (SBR) ښودل شوی دی، یو ګو پولي میر دی، دا رېر له دوو بېلابېلو مونو میرونو څخه جوړ شوی دی:



(3_13) شکل: پولي ستیارين بیوتاداین (PolyStyrene-butadiene)



نیوپرین د مصنوعي ربر بل ډول دی چې د طبیعي ربر په ځای له هغه څخه گټه اخیستل کیږي، داربر د 2-کلوروپوتادین (2-chlorobutadiene) له پولي میرایزیشن څخه لاسته راځي او مونومیر یې ایزوپرین ته ورته دي؛ خو د ایزوپرین د میتایل پاتې شوني په کلوروپرین کې په کلورین تعویض شوي دي، د هغوی فورمولونه په لاندې ډول دي:



Isoprene

2-chlorobutadiene



په دې مونومیر کې د کلورین شتون د غوړیو او عضوي محلولونو پر مقابل کې د هغه د کلکوالي د زیاتیدو لامل گرځیدلی دی، د هغه پولي میرایزیشن په لاندې ډول دي:



(4_13) شکل: د موټرونو په تایرونو کې مصنوعي ربر

2_1_13: پولي ستیارین

که د ایتیلین د هایډروجن یو اټوم د بنزین په کړۍ باندې تعویض شي، د ستیارین مونومیر لاسته راځي چې فورمول یې په لاندې ډول دی:




Styrene


د ستیارین له پولي میرایزیشن څخه پولي ستیارین لاسته راځي چې په لاندې ډول ښودل کیږي:

Styrene

Poly styrene



پلاستيکونه له پولي ستیارین څخه جوړ شوي دي، پلاستيکي لوبښي او د کور د اړتیا نور توکي له دې پولي میر څخه جوړ شوي دي.



(5_13) شکل: د پولي ستیارین څخه جوړ شوي لوبښي

2_13: متراکم شوي پولي میرونه (Condensation Polymers)


هغه پولي میرونه چې په تیرو لوستونو کې مطالعه شول، د جمعي پولي میرونو له ډولونو څخه دي، په هغوی کې د مونو میرونو ټولې برخې پرته د کمښت شاملې دي؛ خو په متراکم شوو پولي میرونو کې د مونو میرونو ځینې برخې ونډه نه لري، دا جلا شوې برخې په عمومي توګه اوبه دي چې د تراکم د عملیې (Condensation) په واسطه منځ ته راځي.

متراکم شوی پولي میرونه د هغو پولي میرونو له ډولونو څخه دي چې د ترکیبي تعاملونو په واسطه جوړېږي، د دې پولي میرونو مونو میرونه، دوه وظیفه یي ګروپونه لري چې هر مونو میر د همدغو ګروپونو له لارې له دوو نورو مونو میرونو سره اړیکې جوړوي.

متراکم شوي پولي میرونه د کopoly میرونو له ډولونو څخه دي (کو پولي میر د هغو پولي میرونو له ډول څخه دي چې له دوو یا څو بیلا بیلو مونو میرونو څخه جوړ شوي دي).

1-2_13: پولي ایسترونه


پولي ایسترونه؛ لکه دکرون (Dacron) د متراکم شوو پولي میرونو له ډولونو څخه دي چې د ایتیلین ګلايکول او فتالیک اسید له تراکم څخه له لاندې معادلې سره سم لاسته راغلي دي:



(6_13) شکل: د پولي ایسترونو تارونه

د ایتیلین ګلايکول د هایډروکسیل ګروپ د تري فتالیک اسید د کاربوکسیل له ګروپونو سره تعامل کوي، اوږده زنځیرونه یې د ایستري اړیکو له درلودلو سره جوړېږي دي، پولي ایتیلین فتالیک په بیلا بیلو برخو کې کارول کېږي، د ټاپرونو، قلمونو او بوتلونو په جوړولو کې په کار وړل شوي او هم د هغو کالیو تارونه چې اوتو کولوته اړتیا نه لري، ترې جوړ شوي دي، لاندې شکلونه نوموړي تارونه ښيي:

پولې میرونو څخه جوړ شي، د زړه والونه هم له مصنوعي پولې میرونو څخه جوړ شوي دي، د انسانانو د بدن بیلا بیل غړي: لکه غوږونه، لاسونه، پښې او د انسانانو د بدن نور غړي په دې وروستیو کې د همدغو مصنوعي پولې میرونو څخه جوړ شوي دي له بدن څخه د بیګانه مواد لږیکول، ډیره لویه ستونزه یی انجینرانو او دیزاینرانو ته ورپېښه کړې ده؛ ځکه د انسانانو ځان په سیستم کی بیګانه مواد د ننه نه منی پردي مواد او هغه لري کوي چې مصنوعي غړي هم له همدې پرديو موادو څخه جوړ شوي او طبیعي غړي هغوی ته د تهاجمي موادو په سترګه گوري او لرې کوي یې، هغه مواد د بدن د مصنوعي غړو د جوړلو لپاره مناسب دي چې د دې سیستمونو دلرې کولو دحالت دچمتوالي لامل ونه شي او د هغوی سره روغه جوړه وکړلای شي د مصنوعي توکو لرونکو اعضاو لویه ستونزه داده چې دهغوي همدا برخه د وینې د پرن کیدو لامل گرځي او د وینې عادي بهیر گډوډ وي، د وینې د بهیر چټکتیا په پیوند شوي مصنوعي دیزاین شوي برخه کې ډېر مهم دی، د وینې د غیر نورمالې چټکتیا په دې برخه کې د وینې د پرن کیدو لامل کیږي. د اصلي غړو د برخې او د مصنوعي نښتلي برخې ډېره ښکاره ستونزه، د مصنوعي نښتل شو او د طبیعي برخې دنسجونو تر منځ د اړیکو تړل دي. هغه توکی چې د خوړو په توګه بدن ته وردننه کیږي، د طبیعي نسجونو د یوې برخې د هغوی رشتوي نسجونو د ودې لامل کیږي کوم چی مصنوعي نښلول شوې برخې ته نژدې وي، دا برخه کلکه او ماتېدونکې وي چې د درد رامنځته کېدو، پړسیدو او د طبیعي نسجونو د شړېدو لامل گرځي. هغه مصنوعي پولې میر چې په طبابت کې ډېر په کار وړل کیږي، د سلیکان له رېر څخه عبارت دی چې د (Silastic) په نوم یادېږي او د پولې میر فورمول یې په لاندی ډول دي.



Polydimethylsilotane

هغه غشاوې چې د Polydimethylsilotane څخه جوړې شوي دي، د مصنوعي پوستکي په توګه د سوزیدو د قربانیانو د درملنې لپاره په کار وړل کېږي. د وینې مصنوعي رنگونه د دکرون یا تیفلان (Teflon) له پولې ایستر څخه جوړ شوي دي، په دې اړه د مصنوعي پولې میرونو په لوست کې معلومات وړاندې شوي دي. د پولې وینایل د پلاستیکونو (پولي ایتیلین پلاستیکونو) څخه د اوبو پایپونو په جوړولو، د دیوالونو پوښولو، د دروازو او کر کېو د چوکاټونو په جوړولو، د تودوخې نه تیروونکو او د برېښنايي سامانونو او موادو په پوښولو کې ترې ګټه اخېستل کیږي. له مصنوعي پولې میرونو څخه د الوتکو په د ننه برخو کې ګټه اخېستل کیږي، خو د الوتکو په وزرو کې هم له مصنوعي پولې میرونو څخه چې ترکیبی لږ وزن لري او د کمپوزیټ (Composite) په نوم یادېږي، کار اخېستل کیږي. په اوسنۍ پېړۍ کې د ټایر لرونکو ماشینونو پرزي له مصنوعي پولې میرو څخه جوړې شوي او ددې امکان شته چې په نژدې را تلونکي پېړۍ کې د موټرونو اسکلپټ هم د کلک پلاستیک چې له کمپوزیټ موادو څخه جوړېږي، په راتلونکو وختونو کې به د برېښنا د هادي پلاستیکو څخه د ماشینونو سپکې بترۍ جوړې شي.

د دې امکان هم شته چې په 21 م. پېړۍ کې یوشمېر داسې پولې میرونه ترکیب شي، کوم چې د ډیرو د حیرانتیاوړ وي، د فوتو سنتیز (photosynthesis) عملې په پایله کې زموږ د اړتیا وړ غذايي مواد او اکسیجن لاسته راځي چې په دې موادو کې د لمر انرژي زیرمه او له هغې څخه په ورځنیو حیاتي کیمیاوي تعاملونو کې ګټه اخېستل کیږي. په دې وروستیو پېړیو کې کوښښ شوی چې ترڅو داسې پولې میرونه دیزاین کړي چې د لمر انرژي په نیغه کیمیايي ګټه ورې انرژي تبدیله کړای شي، دیادولو وړ ده داچې زیات مصنوعي پولې میرونه د پترولیم او له طبیعي گاز څخه لاسته راځي چې بنایي د 21 م. پېړۍ تر بای پورې د هغو ټولې زیرمې په لګښت ورسېږي، پوهان کوښښ کوي، ترڅو یې ځای ناستي یې ومومي او له هغو څخه د ګټې اخېستلو زمینه برابره کړي.

13_4: د مصنوعي پولي ميرونو په واسطه د هستوگنې د چاپيريال ککړتيا

پولي ميرونه د هغوی له ډلې څخه پلاستيکونه د هستوگنې د چاپيريال د ککړتيا لامل گرځيدلي دي. په امريکا کې پلاستيکونو د جامدو کثافتاتو د ډيرانونو 20% حجم جوړ کړی دی. او په عمومي ډول يې په پرمختللو هېوادونو کې 90% د جامدو کثافتاتو د ډيرانونو حجم جوړ کړی دی چې لويه ستونزه يې رامنځ ته کړې ده؛ ځکه دا کوټونه په ځمکه کې ښخ شوي او ډېر ځای يې نيولی چې په ځمکې کې د ځای دکموالي لامل گرځيدلي دي. پلاستيکونه له کلکو موادو جوړ دي چې په ډيره موده کې هم نه پوټه کيږي که چيرې دوی لرې واچول شي، له منځه نه ځي: پارکونه، د پلولاړې، لوبې لارې، سيندونه او حتی سمندرونه بندوي چې په سمندرونو کې سمندري ژويو ته حياتي ستونزه رامنځ ته کوي:



(13_9) شکل: د پلاستيکونو ډيران

(13_8) شکل: په سمندرونو کې د پلاستيکونو اچول او سمندري ژويو ته د هغوی زيان

په عمومي ډول پلاستيکونه په دوه ډوله دي چې يو ډول يې بکټرياوو په واسطه پوټه کيږي او د (Biodegradable) په نوم ياديږي، دا پلاستيکونه د نشايستې له پولي ميرونو څخه جوړ شوي دي.

دويم ډول پلاستيک د بکټرياو په واسطه نه پوټه کيږي او د (Nonbiodegradable) په نوم يا ديږي. دې ډول پلاستيکونو د اوسېدلو په چاپيريال کې د پام وړ ستونزې رامنځته کړي دي، دا ډول پلاستيکونه له منځه نه ځي، خو پارکونه، د پلو لارې، لوبي لارې، سيندونه او حتی سمندرونه بندوي چې په سمندرونو کې د ژوندانه ستونزې رامنځ ته کوي او د تل لپاره هم پاتې کيږي چې د دوی بېلگې کيدای شي پولي ايتيلين، پولي اکريليت، پولي ستيارين، تفلان او پولي بيوتا داین وړاندې شي. د مصنوعي پولي ميرونو له کبله د رامنځ ته شوې ستونزې د لرې کيدو لپاره، هغوی ته له سره دوران ورکوي او بيا ترې گټه اخېستل کېږي چې ورڅخه پلاستيکونه جوړوي. له پلاستيکونو څخه راپيدا شوو ستونزو د حل بله لاره دا ده چې هغوی سوزول کيږي او د هغوی د تودوخې څخه انرژي لاسته راځي، خو د پلاستيکونو او رېرونو سوزول د پام وړ نورې ستونزې رامنځ ته کوي، هغه دا چې زهري مواد، د کاربن ډای اکسايډ گاز (CO_2)، کاربن مونواکسايډ (CO)، سلفر ډای اکسايډ (SO_2) او هايډروجن کلورايد (HCl) توليد وي چې د هوا دککړتيا لامل گرځي. ددې ستونزې دحل يوازينی لاره دا ده چې بايد له هغو ډولو پلاستيکو څخه گټه واخېستل شي کوم چې د بکټرياوو په واسطه پوټه کيدلای شي.

د پلاستيکونو سوداگري

د پلاستيکو د کوټونو سوداگري د استوگنې د ساتلو له کبله خورا ډېر اهميت لري، دا چې پلاستيکونه له نفتي موادو څخه جوړ شوي دي، د نفتو بېرته جوړونه ستونزمنه ده؛ نو د پلاستيکو سوداگري او بېرته جوړښت يې د نفتو شتون ته مرسته کوي. ډيرې د سوداگري او د پلاستيکونو د بيا کارولو لارې شته دي چې يوه يې د هغوی

ټوټې، ټوټې کول او د هغوی د بېلابېلو ډولونو مخلوط کول دي؛ په دې لارې پلاستيکونه وروسته له مینځلو بیا وچوي او له نورو توکو سره یې مخلوط وي چې له هغوی څخه د پلاستيکو پانې په لاس راوړي. د غیر الکولي مشروباتو پلاستيکي بوتلونه، وروسته له مینځلو ټوټه، ټوټه کوي او له هغوی څخه د پلاستيکي لوبڼو په جوړولو کې گټه اخلي. همدارنگه د بېلابېلو مرکبونو د پلاستيکونو د مخلوطونو له ډولونو له ټوټه، ټوټه کولو څخه وروسته څوکی، میزونه، گلدانې، سطلونه او نور لوښي جوړوي.

فکرو کړئ

1_ د څښلو شربتونو د اخیستلو په وخت کې به تاسې د خپلو کور، د څښلو لپاره لاندیني کوم ډول بوتلونه (الف او یا که ب) وټاکئ؟


(10_13) شکل: د څښلو بوتلونه د بېلابېلو کتلو سره

2_ که چېرې پلاستيکونه په لاندې طریقه له منځه یوسو، کومې ستونزې به په پای کې ولری؟
الف_ سوځول ب_ د خاورو لاندې کول.

3_ د څښلو د شربتونو د بوتلونو جوړولو یوه فابریکه د څښلو د شربتونو د بوتلونو کتله یې له 68 گرامو څخه 51 گرامو ته راټیټوي، ستاسې په خیال د فابریکې د کار کوونکو دا کړنه څه گټې به د څښلو د شربتونو د بوتلونو د جوړولو کارخانې ته، اخیستونکو ته همدارنگه کیمیايي سرچینو او د استوگنې ځایونو ته و لري؟

د هوا ککړتیاوې او تېزابي بارانونه

د سوزولو معدني توکي؛ لکه: نفت، د ډبرو سکاره او نور د هوا د ککړتیا سرچینې دي. د مصنوعي او طبیعي بیلابیلو پولي میرونو له سوزیدلو له امله د هوا په اتموسفیر کې بېلابېل گازونه ازادېږي چې د هوا د ککړتیا لامل گرځي، له دې ازادو شویو گازونو څخه ځینې یې د باران له څاڅکو سره مخلوط کیږي او د تېزابي بارانونو د وریدو لامل گرځي، دا گازونه عبارت له SO_2 او د نایتروجن اکسایدونه (NO_x) دي، دا گازونه له هوا څخه درانه دي، ځمکې ته ښکته راځي. دا گازونه ډېر زیات د هغوتولیدي فابریکو څخه ازادېږي، کوم چې لوړ لوگي وتونکي نلونه لري چې د باران د اوریدو په موده د باران څاڅکو سره حل او د بېلابېلو تېزابونو د جوړیدو لامل گرځي، جوړشوي تېزابونه د ځمکې د مخ د تخریبونو لامل گرځي، نباتاتو او حیواناتو ته تاوان رسوي؛ د بیلگې په ډول: کاربن ډای اکساید، د سلفر او نایتروجن اکسایدونه له لاندې معادلو سره سم د باران له اوبو سره تعامل کوي او تېزابونه جوړوي:



دا جوړ شوي تېزابونه اوبوته یوځای او په ویالو، سیندونو او سمندرونو کې بهیري چې د اوبو په دننه کې حیواناتو او نباتاتو ته زیان رسوي، تر دې کچې چې د هغوی د مړینې لامل گرځي. په لاندې شکل کې لیدل کیږي چې د تېزابي بارانونو اوریدل د کرنیزو خاورو په معدني موادو باندې اغیزه کوي او په مالګو یې تبدیلوي، دا مالګې په اوبو کې حلېږي او له اوبو سره یوځای د ځمکو په ژورو برخو کې ښکته ځي چې د نباتاتو د اړتیا وړ مواد کم او له منځه ځي. په تېزابي اوبو کې د اټک پودر اچوي چې په دې صورت کې تېزابونه خنثی او اړونده pH لاسته راځي:



(11_13) شکل: د اسکاندیناویا تېزابي سیند کې د چوڼي د ډبرو د پوډرو په واسطه د هغه د تېزابونو خنثی کول

فکروکړئ

په نړۍ کې د SO_2 د تولید سطحه د لوړیدو په حال کې ده، لاندې جدول د SO_2 د تولید د سطحې بدلونونه په درې لویو وچو کې ښيي، ستاسو په خیال زموږ د گران هیواد لپاره دا کچې څه پېښې رامنځ ته کولی شي او هم په 2010 م. کال کې د وړاند وینې پر بنسټ د SO_2 د کچې د لږوالي لپاره د کومو لارو وړاندیز کوئ؟ (2_13) جدول د نړۍ په درې لویو وچو کې د SO_2 د تولید سطحه په میلیون ټن

کال	1980	1990	1995	2000	2010
اروپا	59	49	31	26	18
امریکا	24	20	16	15	14
آسیا	15	34	40	53	79

د ککړتیاوو مخنیوی

د موادو د سوزیدلو پر ځای د انرژي د لاسته راوړلو په موخه سمې لارې لټول؛ د بیلګې په ډول: د لمر له انرژي څخه ګټه اخیستنه، د SO_2 د جوړوونکو موادو د سوزولو کموالی، ککړتیاو د کنترول لګښت برابرول، د ککړتیاوو مخنیوی کوي.



د دیار لسم څپرکي لنډیز

* که چیرې د پولی میرونو واحدونه (مونو میر) یو له بل سره یوځای شي، داسې پولی میرونه لاس ته راځي چې د جمعي پولی میرونو له ډولونو څخه دي.

* مونو میرونه هغه مواد دي چې د هغوی د مالیکول په جوړښت کې د جوړوونکو عناصرونو اتومونو تر منځ دوه گونې اړیکه شتون لري او دا دوه گونې اړیکه د پولی میرازیشن (Polymerization) د عملي په واسطه په یوه گوني اړیکه بدلون مومي:

* که چیرې د ایتیلین مالیکولونه د تودوخې په 250°C او په $1000 - 3000\text{atm}$ فشار او د عضوي پر اکسایدونو په شتون کې پولی میرازیشن شي، پولی ایتیلین (Polyethylene) لاسته راځي.

* له طبیعي مهمو پولی میرونو څخه یو هم ربر دی چې د ایزوپرين (Isoprene) د مونو میر د رادیکالي تعامل په بهیر کې لاسته راځي، د ایزوپرين دوه ډوله پولی میرونه شته چې د هغوی د ایزومیرونو پورې تړلي دي او هغه عبارت د سیس او ترانس (cis and trans) ایزومیري دي.

* په متراکم شوو پولی میرونو کې د مونومیرونو ځینې برخې سهم نه لري، دا جلا شوې برخې په عمومي توګه اوبه دي چې د تراکم د عملي (Condensation) له امله منځ ته راځي.

* پولی ایسترونه؛ لکه دکرون (Dacron) د متراکم شوو پولی میرونو له ډولونو څخه دي چې د ایتیلین گلایکول او فتالیک اسید له تراکم څخه لاسته راغلی دی.

* پولی امایډونه د متراکم شوو پولی میرونو ډول دی چې د هغوی په مالیکولونو کې امایډي اړیکه شتون لري، د دې ډول پولی میرونو بڼه بیلګه د 6, 6- نیلون (6,6-nylon) دی.

* په ننني طبابت کې د انسانانو د بدن ځینې غړي چې خپلې دندې نه شي تر سره کولی او له کاره لویدلې وي، له مصنوعي غړو څخه چې له پولی میرونو څخه جوړ شوي وي، ګټه اخېستل کېږي.

* له مصنوعي پولی میرونو څخه د الوتکو په دنده برخو کې ګټه اخېستل کېږي، خو د الوتکو په وزرو کې هم له مصنوعي پولی میرونو څخه چې ترکیبي لږ وزن لري او د کمپوزیت (Composite) به

نوم یادېږي، کار اخېستل کېږي.

* د دې امکان هم شته چې په 21 م. پېړۍ کې يوشمېر داسې پولي ميرونه ترکيب شي، کوم چې د ډيرې حيرانتيا وړ وي، د فوتو سنتيز (Photosynthesis) عمليې په پايله کې زمونږ د اړتيا وړ خوړو مواد او اکسيجن لاسته راځي چې په دې موادو کې د لمر انرژي ذخيره او له هغې څخه په ورځنيو حياتي کيميايي تعاملونو کې گټه اخېستل کېږي. په دې وروستيو پېړيو کې کوشنېش شوی چې داسې پولي ميرونه ديزاين کړي چې د لمر انرژي نېغ په نېغه په کيميايي گټې لرونکي انرژي تبديله کړای شي.

د ديارلسم څپرکي پوښتنې:

څلور ځوابه پوښتنې

1- که چېرې د..... د پولي ميرونو واحد يوله بل سره يو ځای شي پولي ميرونه حاصلېږي چې د..... پولي ميرونو ډول دی.

الف- جمعي، مونومير ب- جمعي، ډای مير ج- متراکم شوی مونوميرونه د- هېڅ يو.

2- پولي ميرونه هغه مواد دي چې له..... څخه جوړ شوی دي.

الف- ډای ميرونو ب- تراي ميرونو ج- مونو ميرونو د- ترا ميرونو.

3- د پولي ايتيلين فورمول عبارت دی له:

الف: $-(CH_2 - CH_2)_n$ - ب: $CH_2 = CH_2$ ج: $CH_2 = CH - CH_3$ د- هېڅ يو

4- لوړ کثافت لرونکي پولي ايتيلين (High-density poly ethylene) په..... ښودل کېږي.

الف- LDPE ب- CPE ج- الف او ب دواړه د- HDPE

5- طبيعي رېږ د..... د رايکالي مونو ميرونو له تعامل څخه لاسته راځي:

الف- ايزوپرين ب- Isoprene ج- الف او ب دواړه د- مونومير ايتيلين

6- د سلفر او طبيعي رېږ تعامل د..... تعامل په نوم يادېږي.

الف- ايزومېرايزيشن ب- Vulcanisation ج- جمعي د- پولي ميراييزيشن

7- نيوپرين د مصنوعي رېږ يو بل ډول دی چې له..... پولي ميراييزيشن څخه لاسته راځي.

الف- $2-chlorbuta\ diene$ ب- کلورو بیوتا دای یین ج- 2- کلورو بیوتا دای یین

د- الف اوج دواړه

8- د پلاسکو لوبښی او د کورنور د اړتیا مواد له..... څخه جوړ شوي دي:

الف- بولي ایتیلین ب- پلاستیکونه ج- بولي ستیارین د- پولي امایدونه

9- متراکم شوي پولي میرونه د هغو پولي میرونو ډولونه دي چې د..... تعاملونو په واسطه جوړېږي.

الف- ترکیبی ب- جمعي ج- د سون د- جلاکیدلو

10- په پولي امایدونو او د هغوی په مالیکولونو کې (.....) اړیکه شته ده:

الف- امایدي اړیکه ب- $\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{O} \\ | \quad || \\ \text{N} - \text{C} \end{array}$ ج- الف او ب دواړه د- هیڅ یو

11- په متراکم شوو پولي میرونو کې د..... ځینې برخې شاملې نه دي:

الف- مالیکول ب- اتوم ج- مرکب د- مونومیر

12- مصنوعي پولي میرونه چې په طبابت کې ډېر په کار ورل کېږي، عبارت له..... څخه دي،

الف- Silastic ب- د سلیکان رېر ج- الف او ب دواړه د- هیڅ یو

13- د وینې مصنوعي رنگونه له..... څخه جوړ شوي دي.

الف- بولي ایستر، دکرون، ب- تفلان ج- Teflon د- ټول ځوابونه سم دي

14- د طیارو په وزرونو کې ترکیبي کم وزن لرونکي پولي میرونه له..... څخه گټه اخلي.

الف- کمپوزیټ ب- (Composite) ج- الف او ب دواړه د- هیڅ یو

15- د ټیپ، ویدیو او نورو په جوړلو کې له لاندې پولي میرونو څخه کوم یو په کار ورل کېږي ؟

الف- میلر ب- Mylar ج- نیلون 6,6 د- الف او ب

16- دکرون (Dacron) د متراکم شوو پولي میرونو له ډولونو څخه دي چې د..... تراکم له امله ترلاسه شوي

دي:

الف- ایتیلین گلایکول ب- فتالیک اسید ج- الف او ب دواړه د- ایتیلین

تشریحي پوښتنې:

- 1_ د پولي میرایزیشن (Polymerization) عملیه روښانه او د دوه گونې اړیکې بدلون په یو گونې اړیکه تشریح کړئ.
- 2_ د ایزوپرین دوه ډوله پولي میرونه چې د هغو له ایزو میرونو پورې اړه لري، تشریح کړئ.
- 3_ د ستیارین له پولي میرایزیشن څخه کوم پولي میر ترلاسه کیږي؟ په دې اړوند معلومات وړاندې کړئ.
- 4_ د کرون (Dacron) کوم ډول پولي میر دی؟ د کومو مونومیرونو له تراکم څخه لاسته راځي؟ د هغه د پولي میرایزیشن معادله ولیکئ.
- 5_ د Poly di methylsilotane او د هغه د استعمال د ځایونو په اړه معلومات وړاندې کړئ.
- 6_ د مصنوعي پولي میرونو او په ننني عصر کې د هغو د رول په هکله په صنعت کې او د راتلونکو موادو په جوړولو او دهغو د کارولو په هکله لازم معلومات وړاندې کړئ.
- 7_ پولي ایسترونه؛ لکه د کرون (Dacron) کوم ډول پولي میر دي؟ په دې اړه معلومات ورکړئ.
- 8_ د طبیعي او مصنوعي ربړ ترمنځ توپیر د بیلگو په وړاندې کولو سره روښانه کړئ.
- 9_ د پولي ایتیلینو بېلابېل شکلونه روښانه او د هغوی د کارولو ځایونه د بیلگو په واسطه څرگند کړئ.
- 10_ کوم پولي میرونه د استوگنې د ځایونو د لایزېټې ککړتیاوو لامل ګرځي؟ په دې هکله معلومات وړاندې کړئ.

اخځليکونه:

- 1- K. Peter, C.Vollhardt, Organic Chemistry, Fourth Edition ,2003, US
- 2- Ovorak, Schmutu.a. von der Chemier 2, 1996 by E.DORNER GmbH, 1010 wien, Austria.
- 3- Pribas, Hagenauer, Markl, Zadrazil Chemie,aktuell , 1. Auflage, 2006, Austria.
- 4- Dr. Franz Neufingerl, Otto Urban, Dr. Martina viehhauser, Chemie 2
- 5- Franz Neufingerl, Chemie istuberall 4, 2006 westermann wien,im Verlag E. DORNER GmbH, Austria.
- 6- ZANBAK YAYINLARI, Hydrocarbons, 2006, Chemistry series.
- 7- ZANBAK YAYINLARI, Oxygen and Nitrogen Containing, organic Compounds,2005 , chemistry series.
- 8- KOYZ and TREICHEL, Chemistry and Chemical Reactivity, fourth Edition, 1999, USA.
- 9- Williams S.Seese, G. William Daub, Basic Chemistry, Fifth Edition, 1988, USA.
- 10- HOLT, RINEHART and WINSTON, MODERN Chmistry, 2002, USA.
- 11- Raymond Chang, General Chemistry, Third Edition, 2003, USA.
- 12- David E. Goldberg, Fundamentals of Chemistry, Ghird Edition, 2001, USA.
- 13- Steven S. Zumdahl, Chemistry, Third Edition, 1993, USA.
- ۱۴- شیمی (۲) و آزمایشگاه، منصور عابدینی و دیگران، وزارت آموزش و پرورش، سال دوم دبیرستان، ۱۳۸۵ تهران.
- ۱۵- کیمیای عمومی. مولف: پوهندوی دیپلوم انجنیر عبدالمحمد عزیز، د کابل پوهنتون، ۱۳۸۷ کال.

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library