






$x=0, 1, 2, 3$

Function:
 $y = x^3$

$y=0, 1, 8, 27$

Ketabton.com





ملي سرود

دا عزت د هر افغان دی
هر بچی یې قهرمان دی
د بلوڅو د ازبکو
د ترکمنو د تاجکو
پامیریان، نورستانیان
هم ایماق، هم پشه پان
لکه لمر پر شنه آسمان
لکه زړه وي جاویدان
وایوالله اکبر وایوالله اکبر

دا وطن افغانستان دی
کور د سولې کور د تورې
دا وطن د ټولو کور دی
د پښتون او هزاره وو
ورسره عرب، گوجر دي
براهوي دي، قزلباش دي
دا هیواد به تل ځلیري
په سینه کې د آسیا به
نوم د حق مودی رهبر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رياضي
لسم
تولگی

۱۳۹۸
هـ . ش .

د کتاب ځانگړتیاوې

مضمون: ریاضي

مؤلفین: د تعلیمي نصاب د ریاضیاتو د پیاوړتیا د درسي کتابونو مؤلفین

ادیت کوونکي: د پښتو ژبې د ادیت د پیاوړتیا د غړي

ټولگی: لسم

د متن ژبه: پښتو

انکشاف ورکوونکي: د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف لوی ریاست

خپروونکي: د پوهنې وزارت د اړیکو او عامه پوهاوي ریاست

د چاپ کال: ۱۳۹۸ هجري شمسي

د چاپ ځای: کابل

چاپ خونه:

برېښنالیک پته: curriculum@moe.gov.af

د درسي کتابونو د چاپ، وېش او پلورلو حق د افغانستان اسلامي جمهوریت د پوهنې

وزارت سره محفوظ دی. په بازار کې یې پلورل او پېرودل منع دي. له سرغړوونکو سره

قانوني چلند کېږي.

د پوهنې د وزیر پیغام

اقرأ باسم ربك

د لوی او ښوونکي خدای ﷻ شکر په ځای کوو، چې موږ ته یې ژوند رابښلی، او د لوست او لیک له نعمت څخه یې برخمن کړي یو، او د الله تعالی پر وروستي پیغمبر محمد مصطفی ﷺ چې الهي لومړنی پیغام ورته (لوستل) و، درود وایو.

څرنگه چې ټولو ته ښکاره ده ۱۳۹۷ هجري لمريز کال د پوهنې د کال په نامه ونومول شو، له دې امله به د گران هېواد ښوونیز نظام، د ژورو بدلونونو شاهد وي. ښوونکی، زده کوونکی، کتاب، ښوونځی، اداره او د والدينو شوراگانې د هېواد د پوهنیز نظام سپرگوني بنسټیز عناصر بلل کيږي، چې د هېواد د ښوونې او روزنې په پراختیا او پرمختیا کې مهم رول لري. په داسې مهم وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت د مشرتابه مقام، د هېواد په ښوونیز نظام کې د ودې او پراختیا په لور بنسټیزو بدلونونو ته ژمن دی.

له همدې امله د ښوونیز نصاب اصلاح او پراختیا، د پوهنې وزارت له مهمو لومړیتوبونو څخه دي. همدارنگه په ښوونځيو، مدرسو او ټولو دولتي او خصوصي ښوونیزو تاسیساتو کې، د درسي کتابونو محتوا، کیفیت او توزیع ته پاملرنه د پوهنې وزارت د چارو په سر کې ځای لري. موږ په دې باور یو، چې د باکیفیته درسي کتابونو له شتون پرته، د ښوونې او روزنې اساسي اهدافو ته رسېدلی نشو.

پورتنيو موخو ته د رسېدو او د اغېزناک ښوونیز نظام د رامنځته کولو لپاره، د راتلونکي نسل د روزونکو په توگه، د هېواد له ټولو زړه سواندو ښوونکو، استادانو او مسلکي مدیرانو څخه په درناوي هیله کوم، چې د هېواد بچیانو ته دې د درسي کتابونو په تدریس، او د محتوا په لېږدولو کې، هېڅ ډول هڅه او هاند ونه سېموي، او د یوه فعال او په ديني، ملي او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه کې، زیار او کوښښ وکړي. هره ورځ د ژمنې په نوي کولو او د مسؤلیت په درک سره، په دې نیت لوست پیل کړي، چې د نن ورځې گران زده کوونکي به سبا د یوه پرمختللي افغانستان معماران، او د ټولنې متمدن او گټور اوسېدونکي وي.

همدا راز له خوږو زده کوونکو څخه، چې د هېواد ارزښتناکه پانگه ده، غوښتنه لرم، څو له هر فرصت څخه گټه پورته کړي، او د زده کړې په پروسه کې د څیرکو او فعالو گډونوالو په توگه، او ښوونکو ته په درناوي سره، له تدریس څخه ښه او اغېزناکه استفاده وکړي.

په پای کې د ښوونې او روزنې له ټولو پوهانو او د ښوونیز نصاب له مسلکي همکارانو څخه، چې د دې کتاب په لیکلو او چمتو کولو کې یې نه سترې کېدونکې هلې ځلې کړې دي، مننه کوم، او د لوی خدای ﷻ له دربار څخه دوی ته په دې سپیڅلې او انسان جوړوونکې هڅې کې بریا غواړم.


د معیاري او پرمختللي ښوونیز نظام او د داسې ودان افغانستان په هیله چې وگړي یې خپلواک، پوه او سوکاله وي.

د پوهنې وزیر

دکتور محمد میرویس بلخي


مخ	فهرست	عنوان
۳		لومړۍ څپرکۍ (پولینوم)
		الجبري افادې، د پولینوم درجه او د پولینوم ډولونه، د پولینوم د قیمت او پولینوم د ضربونو د مجموعی پیدا کول، د پولینوم څلور گوني عملیې
		د باقي مانده قضیه، فکتور قضیه او ترکیبي وېش
		د څپرکي لنډیز او پوښتنې
۵۳		دویم څپرکۍ: رابطه
		مرتبې جوړې او کارتیزي نښې مستوي، د کارتیزي ضرب حاصل او گراف یې
		رابطه او معکوسه رابطه.
		معادله رابطه.
		د څپرکي لنډیز او پوښتنې
۶۹		درېم څپرکۍ: تابع
		د تابع د لیکلو طریقه او د یوې تابع د قیمت پیدا کول، د تابع د تعریف د ساحې پیدا کول، د یوې تابع گراف او د گراف له مخې
		د یوې تابع پېژندنه، د گراف له مخې د یوې تابع د تعریف او د قیمتونو د ناحیو او د تابع قیمتونو پیدا کول، ځینې خاصې تابع گانې او گرافونه یې. مترایدې او متناقصې تابع گانې، جفتې او طاقې تابع گانې
		د گرافونو انتقال (عمودي انتقال، افقي انتقال او د عمودي او افقي انتقالونو ترکیب، د تابع گانو عملیې
		د تابع گانو ترکیب، معکوسه تابع، یو په یو تابع، د تابع او د هغې د معکوسي تابع گراف، پولینومي تابع گانې (لومړۍ او دویمه درجه تابع گانې) او گرافونه یې
		ناطقې تابع گانې او گراف یې (عمودي، افقي او مایل مجانبونه)
		د څپرکي لنډیز او پوښتنې
۱۴۹		څلورم څپرکۍ: مثلثاتي تابع گانې
		زاویه او د زاوې د اندازه کولو واحدونه، د یوې زاوې معیاري حالت او کوټر مینل زاوې
		مثلثاتي تابع گانې او د ځینو خاصو زاویو مثلثاتي نسبتونه
		د $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ او 360° زاویو مثلثاتي نسبتونه
		د یوې حاده زاوې او د نورو زاویو د مثلثاتي نسبتونو په منځ کې اړیکې
		د مثلثاتي تابع گانو گراف
		د څپرکي لنډیز او پوښتنې
۲۲۳		پنځم څپرکۍ: د مثلثاتو تطبیقات
		د مرکبو زاویو د مثلثاتي نسبتونه، د دوو زاویو د مجموعې او تفاضل مثلثاتي فورمولونه
		د α زاوې د مثلثاتي نسبتونو له مخې د 2α او 3α زاویو د مثلثاتي نسبتونو پیدا کول، د زاویو د مثلثاتي نسبتونو د مجموعې او تفاضل بدلول، د زاویو د مثلثاتي نسبتونو د ضرب د حاصل په شکل،

- عنوان** **فهرست** **مخ**
- د زاویو د مثلثاتي نسبتونو د ضرب د حاصل بدلول په جمع یا یې په تفاضل باندې، د قوس اوږدوالی، د یوې دایرې قطاع او مساحت یې، د دایرې قطعه او مساحت، د مثلث مساحت د دوو ضلعو او ددې دوو ضلعو ترمنځ د زاویې له جنسه، د مثلث مساحت د مثلث د دریو ضلعوله جنسه (د هیرون فورمول) د یوه مثلث د محیطي او محاطي دایرو شعاع گانې د څپرکي لنډیز او پوښتنې
- شپږم څپرکی: مختلط عددونه** ۲۷۷
- موهومي عددونه او د موهومي عددونو څلورگونې عملیې
د مختلطو عددونو د جمعې او تفریق عملیې
د مختلطو عددونو ضرب، د یو مختلط عدد مزدوج، د مختلط عدد ضربی معکوس
د مختلطو عددونو وېش
د مختلطو عددونو په ساحه کې د دویمې درجې یو مجهوله معادلو حل
د څپرکي لنډیز او پوښتنې
- اووم څپرکی تحلیلي هندسه** ۳۰۵
- د وضعیه کمیاتو سیستم او د دوو نقطو ترمنځ فاصله
د هغې نقطې د وضعیه کمیاتو پیدا کول چې یو قطعه خط په یوه نسبت باندې وېشي
د یوه مستقیم خط میل
د یوه مستقیم خط معادله (د یو مستقیم خط معیاري معادله، دهغه مستقیم خط معادله چې میل او یوه نقطه یې معلومه وي، د دې نقطې یې معلومې وي. له محورونو سره یې د تقاطع نقطې معلومې وي، د مستقیم خط نورمال معادله او د مستقیم خط عمومي معادله)
د یوه مستقیم خط د عمومي معادلې بدلول، د مستقیم خط د معادلو په نورو شکلونو باندې.
د یوې نقطې فاصله له یوه مستقیم خط څخه، د دوو موازي خطونو ترمنځ فاصله
دایره او د دایرې معادله، د یوه مستقیم خط حالتونه له یوې دایرې سره، د مماس معادله او د مماس اوږدوالی
د مثلث د مساحت پیدا کول چې د راسونو وضعیه کمیات یې معلوم وي.
د څپرکي لنډیز او پوښتنې
- اتم څپرکی احصائیه** ۳۵۹
- د فریکونسي څو ضلعي گراف، د ساقې او پانې گراف، ربعي (څلورمې)، صندوقچه یي گراف، د نارمل منحني د مرکزي ټاکوونکو پرته کول، ربعي انحراف، واریانس، معیاري انحراف، د څپرکي لنډیز او پوښتنې
- نهم څپرکی د ریاضي منطق** ۳۹۱
- د شهودي درک استدلال، تمثيلي استدلال، استقرایي استدلال، د ریاضي د استقرا استدلال، استنتاجي استدلال، د مثال د نفی کولو استدلال، غیر مستقیم ثبوت، د ریاضي منطق او د بیان استنتاج، د څپرکي لنډیز او پوښتنې



لومړۍ څپرکۍ
پولینوم
(Polynome) پولینوم
یا (Polynomial)

$$\begin{aligned}& (3x^2 + 5x + 2) + (5x + 6) \\&= 3x^2 + 5x + 2 + 5x + 6 \\&= 3x^2 + 5x + 5x + 6 + 2 \\&= 3x^2 + 10x + 8\end{aligned}$$





الجبري افادې

(Algebraic Expressions)

ایا ویلای شئ چې په $\frac{x^4-1}{x^2}$ ،

او $\sqrt{y^2+1}$ الجبري افادو کې کومه یوه ناطقه او کومه یوه غیر ناطقه

الجبري افاده ده؟

متحول او ثابت (variable and constant): متحول یو سمبول (Symbol) دی چې

د یوه غیر خالي سټ د هر عنصر په ځای وضع کېږي. یا یو تورې چې قیمتونه یې تغیر کوي د مثال په ډول که $A = \{x / x \in \mathbb{N} \text{ او } x \leq 10\}$ وي.

نو د A په سټ کې x له یوه څخه تر 10 پورې د طبیعي عددونو قیمتونه اخیستلای شي. x ، ته متحول (Variable) وایي. عموماً متحولونه د انګلیسي ژبې د کوچنیو تورو، لکه: x, y, z او نورو په واسطه ښودل کېږي.

د یوه عدد قیمت تغیر نه کوي، لکه: د 4 عدد هیڅکله له 5 یا 3 او یا کوم بل عدد سره مساوي کېدای نه شي، نو ټول حقیقي عددونه ثابت (Constants) دي.

د حقیقي عددونو سربیره د انګلیسي ژبې توري، لکه: $a, b, c, \dots$ او نور هم د ثابتو پر ځای کارول کېږي.

الجبري افاده (Algebraic Expression): کېدای شي الجبري افاده له یوه ثابت، یو

متحول او یا د ثابتو او متحولونو له ترکیب څخه جوړه شوې وي. د الجبري افادو لاندې مثالونه وګورئ.

$5\sqrt{x}$ ، $4x+5$ ، $\sqrt{3}x$ ، x^2-x+1 ، x ، -12 ، 12 او داسې نور.

په $3x^2$ الجبري افاده کې 3 ته ضریب (Coefficient) وایي. په $y - \frac{1}{2}$ کې د $-\frac{1}{2}$ عدد او په x کې (1) ضریب دی. $3x^5y^5 - 15x^5y^5$ مشابه حدونه (Liketerms) دي چې مشابه متحولونه او مساوي توانونه لري، خو عددي ضریبونه یې سره توپیر لري.

د الجبري افادو ډولونه: الجبري افادې په درو ډولونو دي.

1- پولینومي الجبري افادې (Polynomial algebraic expressions)

پولینوم: هغه یوه یا څو حده الجبري افاده چې د تورو توانونه یې د مکملو عددونو په سټ کې شامل وي، پولینوم نومېږي او $x^3 - x + 1$ ، $2x^2 + x - 1$ ، $x - 1$ ، 12 پولینومونه دي، خو $x^{-2} + x - 1$ ، $\frac{1}{x} + x$ او $x^3 + \sqrt{x} + \frac{y}{x^2}$ پولینومونه نه دي یا د پولینوم مشخصې دا دي:

- د ټولو متحولونو توانونه یې مکمل عددونه وي.

- په مخرج کې متحول ونه لري.

- متحول تر جذر لاندې نه وي.

لومړی مثال: په لاندې راکړل شوو الجبري افادو کې کوم یو پولینوم او کوم یو یې پولینوم نه دي؟

$$\text{e) } x^{-3} + x^2, \text{ d) } x^{\frac{1}{2}}, \text{ c) } \frac{1}{y^2} - \frac{2}{x^3}, \text{ b) } 2\sqrt{x}, \text{ a) } \sqrt{2x}$$

$$\text{i) } 6a^2 - 4a, \text{ h) } 88, \text{ g) } 9x^2 - \frac{7}{x^2}, \text{ f) } 8p^2 + p^{2.2}$$

حل: a, h او i پولینومونه دي، خو b, c, d, e, f او g پولینومونه نه دي. په یاد ولرئ چې هر پولینوم، یوه ناطقه الجبري افاده ده، خو هره ناطقه الجبري افاده پولینوم نه دی. د مثال په ډول:

$$x^3 + \frac{y}{x^2} + \frac{y}{x} + y^3$$

یوه ناطقه الجبري افاده ده، خو پولینوم نه دی.

12 هم یو پولینوم دی، ځکه چې: $12 = 12x^0$ دی او صفر هم د مکملو عددونو په سټ کې شامل دی، خو $5\sqrt{x}$ او $\frac{5}{x^3}$ پولینومونه نه دي، ځکه $5\sqrt{x} = 5x^{\frac{1}{2}}$ ، $\frac{5}{x^3} = 5x^{-3}$ چې $\frac{1}{2}$ او -3

د مکملو عددونو په سټ کې شامل نه دي.

پولینوم د یو توري په واسطه، لکه: P ښودل کېږي، یو پولینوم چې له یو متحول څخه جوړ شوی وي عمومي شکل یې په لاندې ډول دی چې د معیاري شکل په نامه یادېږي.

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0$$

n یو مکمل عدد او $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$ ضریبونه دي چې حقیقي عددونه دي. که $a_n \neq 0$ وي، نو n د پولینوم درجه ده.

فعالیت

له $8\sqrt{x}$ ، $2x^3 - x^2$ ، $\frac{3}{x^2} + \frac{5}{x} + 6$ ، x ، $\frac{1}{x}$ ، $\sqrt{8x^3}$ ، $-8x^2$ الجبري افادو څخه کومه یوه یې پولینوم دی او کومه یوه پولینوم نه دی؟

دویم مثال: د $P(x) = -5x^3 + x^2 - x + 12$ په پولینوم کې، $a_2 = 1$ ، $a_n = -5$ ، $n = 3$ او د $11x^2 - 1$ په پولینوم کې، $a_1 = 0$ ، $a_n = 11$ ، $n = 2$ او $a_0 = 12$ دی. $a_0 = -1$ دی.

2- ناطقه الجبري افاده (Rational algebraic expression):

که یوه الجبري افاده د $\frac{p}{q}$ ($q \neq 0$) په شکل ولیکلای شو چې p او q پولینومونه وي. داسې الجبري افادې ته ناطقه الجبري افاده وایي. د مثال په ډول $x^2 - \frac{1}{x^2}$ چې د $\frac{x^4 - 1}{x^2}$ په شکل یې هم لیکلای شو چې یو متحول لري یوه ناطقه الجبري افاده ده. څرنگه چې هرې الجبري افادې ته یو مخرج ورکولای شو، نو $(x^2 - 1)$ هم یوه ناطقه الجبري افاده ده، ځکه چې $\frac{x^2 - 1}{1}$ دی.

3- غیر ناطقه الجبري افاده (Irrational algebraic expression):

داسې يوې الجبري افادې ته چې د دوو پولینومونو د خارج قسمت په بڼه يې نه شولیکلای، غیر ناطقه

الجبري افاده ده، لکه: $\sqrt{xy}$ ، $\frac{1}{\sqrt{x^2+5}}$ او $\sqrt{y^2+1}$ د غیر ناطقو الجبري افادو مثالونه دي.

یوه الجبري افاده کېدای شي چې ناطقه، غیر ناطقه او یا پولینومي الجبري افاده وي. پولینوم هغه یو یا څو حده الجبري افاده ده چې د تورو توانونه یې د مکملو عددونو په سټ کې شامل وي.

پوښتنې

1- په لاندې الجبري افادو کې کومه یوه ناطقه، غیر ناطقه او پولینومي الجبري افاده ده؟


$$\frac{1}{x}, \sqrt{x} - \frac{1}{2}, \frac{3x^2}{2}, \frac{m+3}{6}, x + \frac{1}{x}, 3x^2 + \frac{xy}{2} \text{ او } 13$$

2- په لاندې الجبري افادو کې کومه یوه یې یو پولینوم او کومه یوه یې پولینوم نه دی؟

$$\frac{1}{7}x^3 - x, -20a^3b + 28ab^4, 3x^2 + \frac{xy}{2}, -0.03, 3x, 8x^{-8}, 8\sqrt{x}, \frac{1}{x} - \frac{x^2}{5}$$

3. د $Px^4 - ax^3 + bx^2 + cx + d$ په پولینوم کې، a_1, a_2, a_3, a_n او a_0 وښیاست.

4. د $P(x) = \frac{x^3}{2} - 2x^2 - 1$ په پولینوم کې، a_1, a_2, a_3 او a_0 وښیاست.



د پولینوم درجه او د پولینوم ډولونه

آیا ویلای شئ چې د:

$$12y^5x^3 + x^4y^3 - 2x^3 - x^2 - x$$

12 د پولینومونو درجې څو دي؟

مونوم عدد، یو متحول یا د یو عدد او یو یا څو متحولینو د ضرب حاصل دی. $16x$ یا $3x$ ته مونوم یا (Monomial) (یو حده) الجبري افاده وایي. $x - 4$ یا $ab - y$ ته باینوم (Binome) یا (Binomial) (دوه حده) الجبري افاده وایي او د $2x^3 - x - 1$ الجبري

افاده ترینوم (Trinomial) (درې حده) الجبري افاده ده او $\sqrt{2x} - \frac{1}{y} + 1$ الجبري افادې ته مولتینوم (Multinomial) وایي. په یوه پولینوم کې مونومونه د پولینوم د حدونو په نامه یادېږي او هر مونوم یو پولینوم دی.

ځینې وختونه پولینوم له یو، دوه، درې او څو متحولونو څخه جوړ شوی وي. د $2x^3 - 8x^2 + 7x + 11$ پولینوم د یو متحول، $2x^3 - 3y$ پولینوم د دوه متحولونو او $x + y + z$ د دریو متحولونو لرونکی پولینوم دی چې په لاندې جدول کې ښودل شوي دي.

متحول	مونوم (یو حده)	باینوم (دوه حده)	ترینوم (درې حده)
یو متحول	$5x^3$	$5y^2 + 3y$	$3x^2 + 2x - 4$
دوه متحولونه	$7x^2y$	$7x^2 - 4y^3$	$6x^2 + 5x - 3y^2$
درې متحولونه	$4xyz^2$	$8a^2b + 4c$	$3a^2b^2 + 6c^2 - z^5a$

یادونه: باید پام مو وي چې $\frac{5}{x}$, $2\sqrt{xy}$ او y^{-3} هریو یې مونوم نه دی.

فعالیت

د $ax^2 + bx + c$ ، $2x - y$ ، 15 ، $-3x$ او $4x^2 - 4y$ الجبري افادو کې مونوم، باینوم او ترینوم وښیاست.

د یوه پولینوم درجه (Degree of a Polynome): که پولینوم له یوه توري څخه جوړ شوی وي، د هغه توري لوړ توان د پولینوم درجه ده، لکه: د $-x^3 + 2x + 1 + x^5$ د پولینوم درجه 5 ده. که پولینوم له ډېرو تورو څخه جوړ شوی وي، د زیات توان لرونکي مونوم درجه د پولینوم درجه ده، لکه: د $2x^2y^3 - 5xy^5 + x^3y$ د پولینوم درجه 6 ده، $(1 + 5 = 6)$ او دا پولینوم نظر x ته دریمه درجه او نظر y ته پنځمه درجه پولینوم دی. که د یوه پولینوم درجه یوه وي، خطي پولینوم (Liner Polynome) او که د پولینوم درجه دوه وي، دویمه درجه پولینوم (Quadratic Polynome) او که درجه یې درې وي، دریمه درجه پولینوم (Cubic Polynomial) ورته وایي. او هم د $3x^2$ مونوم دویمه درجه، د $3x^2y^3$ مونوم درجه 5 او د 12 مونوم درجه صفرده. داسې پولینوم ته ثابت پولینوم وایي، ځکه چې $12 = 12x^0$

ثابت پولینوم: هغه پولینوم دی چې درجه یې صفر وي. یا هغه پولینوم دی چې د ټولو متحولونو ضریبونه یې صفر وي.

لومړی مثال: د m او n قیمتونه پیدا کړئ، که $(2m - 4)x^2 + (5 - n)x + 13$ یو ثابت پولینوم وي.

حل: څرنګه چې دا یو ثابت پولینوم دی، نو د هر حد د متحول ضریب یې صفر دی.

$$\begin{aligned} 2m - 4 &= 0 & 5 - n &= 0 & \text{نو:} \\ 2m &= 4 & n &= 5 \\ m &= 2 \end{aligned}$$

صفری پولینوم (Zero Polynome): که د ثابت پولینوم ثابت حد صفر وي، داسې پولینوم ته صفری پولینوم وایي، لکه: $P(x) = 0$ ، د صفری پولینوم درجه تعریف شوې نه ده.

دویم مثال: د a قیمت پیدا کړئ که چېرې $(b-4)x^3 - (2c+6)x + (a-b+c)$ یوصفري پولینوم وي.

حل: په صفري پولینوم کې هر حد صفر وي، نو:

$$\begin{array}{lll} b-4=0 & 2c+6=0 & a-b+c=0 \\ b=4 & 2c=-6 & a-4-3=0 \\ & c=-3 & a=7 \end{array}$$

دریم مثال: د $P(x) = x^2 - 1 + 3x^5$ ، $g(x) = 2xy^2 - x^2y^3$ او $h(x) = \sqrt{3}$ د پولینومونو درجې پیدا کړئ.

حل: د $P(x)$ د پولینوم درجه 5 د $g(x)$ د پولینوم درجه هم 5 ده ، $(n=5)$ خو د $h(x)$ د پولینوم درجه صفر ده.

فعالیت

د هر پولینوم درجه خو ده؟ او هم د دې پولینومونو درجې نظر هر توري ته پیدا کړئ.
 $x^2 - x^3 + 2x + 5x^5$ ، $x-1$ ، 15 ، $2m^3n^2 - 3mn^3 - mn$

مکمل او ناقص پولینومونه: مکمل پولینوم هغه پولینوم دی چې له لورې توان څخه تر ثابت عدد پورې ټول حدونه ولري $x^2 - 1$ ، $x^3 + 1 + 2x - x^2$ ، $x-1$ او 51 مکمل پولینومونه دي، خو $x^2 - 1$ او $x^3 + x + 1$ ناقص پولینومونه دي. موږ کولای شو دا ناقص پولینومونه د مکملو پولینومو په شکل ولیکو، لکه: $x^2 - 1 = x^2 + 0 \cdot x - 1$ او $x^3 + x - 1 = x^3 + 0 \cdot x^2 + x - 1$

منظم او غیر منظم پولینومونه: د $2x^3 - 3x^2 + 4x - 1$ یا $3x^4 - x + 1 + x^3 + x^2$ پولینوم یو غیر منظم پولینوم دی. کولای شو چې یو غیر منظم پولینوم د منظم پولینوم په شکل ولیکو، لکه: همدا پولینوم په دوه ډوله د منظم پولینوم په شکل لیکلای شو. $3x^4 + x^3 + x^2 - x + 1$ یا $1 - x + x^2 + x^3 + 3x^4$

نزولي او صعودي پولینومونه

(Descending and ascending Polynomes)

که یو پولینوم د متحول له لورې توان څخه ټیټ توان ته ترتیب شوی وي، نزولي او که له ټیټ توان څخه لورې توان ته ترتیب شوی وي، صعودي ترتیب ورته وایي.

د مثال په ډول $x^4 + 3x^3 + x^2 + x + 1$ په نزولي ترتیب او د $x^4 + 3x^3 + x^2 + x + 1$ پولینوم په صعودي ترتیب لیکل شوی دی.

که یو پولینوم له دوو یا څو تورو څخه جوړ شوی وي، نو موږ کولای شو نظر هر توري ته یې په صعودي یا نزولي ډول ترتیب کړو، لکه: د $x^3y + 3x^2y^2 + 2xy^3 - 5y^4$ پولینوم نظر x ته په نزولي ډول او نظر y ته په صعودي ډول ترتیب شوی دی.

فعالیت

دا پولینومونه په صعودي ډول ترتیب کړئ:

$$4x - 5 + 6x^2 + 8x^3, \quad 2y^2 - 4y + 3 - 3y^4 + y^3, \quad 2a^3 - 5 + 4a^4 + a^5 + 3a^2 + a$$

څلورم مثال: د $P(y) = 4xy^4 - 3x^3y^2 + 2x^2y^3 + x^4 + y^5$ پولینوم نظر y ته په صعودي ترتیب ولیکئ:

$$P(y) = x^4 - 3x^3y^2 + 2x^2y^3 + 4xy^4 + y^5$$

حل

معادل پولینومونه: هغه پولینومونه دي چې یو متحول ولري او د مشابه حدونو ضربونه یې سره مساوي وي.


پنځم مثال: که د $x^2 + 3x + 2$ او $m(x-1)^2 + n(x-1) + P$ پولینومونه سره معادل وي، د n, m او p قیمتونه پیدا کړئ.

حل

$$m(x^2 - 2x + 1) + nx - n + p = x^2 + 3x + 2$$

$$mx^2 - 2mx + m + nx - n + p = x^2 + 3x + 2$$

$$mx^2 + (-2m + n)x + (m - n + p) = 1x^2 + 3x + 2$$



په نتیجه کې:

$$m = 1$$

$$-2m + n = 3 \quad \Rightarrow n = 5$$

$$m - n + p = 2 \quad \Rightarrow p = 6$$

متجانس پولینومونه (Homogence Polynomes): چې د ټولو حدونو توانونه یې سره

مساوي وي، لکه: $2x^2 + y^2 - z^2$ یو متجانس پولینوم دی.

شپږم مثال: که د $3x^2y + 5x^mz - 7y^{n-3}z^2$ پولینوم متجانس وي، د m او n قیمتونه پیدا کړئ.

حل:

$$m + 1 = 2 + 1 \quad n - 3 + 2 = m + 1$$

$$m = 2 \quad n - 1 = m + 1$$

$$n - 1 = 2 + 1$$

$$n = 4$$

که پولینوم له یوه توري څخه جوړ شوی وي، د دې توري لوړ توان د پولینوم درجه ده او که پولینوم له ډېرو تورو څخه جوړ شوی وي، د لوړ توان لرونکي مونوم درجه د دې پولینوم درجه ده. هغه پولینومونه چې یو متحول ولري او د مشابه حدونو ضربونه یې سره مساوي وي، د معادلو پولینومونو په نامه یادېږي او هغه پولینوم چې د ټولو حدونو توانونه یې سره مساوي وي، متجانس پولینوم دی.

پوښتنې

1- په لاندې افادو کې مونوم، باينوم او ترينوم وښايست او درجې يې پيدا کړئ.

$$\frac{1}{2}x^2y^5, \quad x^2 - y + 4, \quad x - 1$$

$$x - x^2 - x^3, \quad 12x, \quad -12$$

2- په لاندې پولينومونو کې مکمل او ناقص پولينومونه وښايست او بيا ناقص پولينومونه د مکملو پولينومونو په شکل وليکئ.

$$x, \quad x + 1, \quad x^2 - 1, \\ 2x^2 - 2x - 2, \quad 15, \quad x^3 + x - 1$$


3- لومړی د لاندې پولينومونو درجې پيدا کړئ او بيا يې په نزولي ډول ترتيب کړئ.

$$4x - 5 + 6x^2 + 8x^3 \\ 2y^2 - 4y + 3 - 3y^4 + y^3 \\ 1 - x^3 + x^2 + 2x^4 - x^5 + x$$

4- که $P(x-1)^2 + n(x+3) + c = 2x^2 - x + 22$ وي د n, p او c قيمتونه پيدا کړئ.

5- د a, b او c قيمتونه پيدا کړئ که $P(x) = 7x^4 - (2a-3)x^3 + 5x - (c-3)$ او $Q(x) = (3b+4)x^4 + 2x^3 + 5x$ معادل پولينومونه وي.

6- که $5xy^2 + 8x^p z - 3y^{m-3} z^2$ يو متجانس پولينوم وي، د m او p قيمتونه پيدا کړئ.



د پولینوم د قیمت او د پولینوم د ضریبونو د مجموعې پیدا کول

آیا ویلای شئ د $x = -1$ لپاره د

$$P(x) = x^3 - x^2 - x - 1$$

پولینوم قیمت

څو دی؟ یا $P(-1) = ?$

که په یوه پولینوم کې د متحول پر ځای یو حقیقي عدد (د متحول خاص قیمت) وضع کړو، یو حقیقي عدد په لاس راځي چې دا حقیقي عدد ددې پولینوم قیمت دی. د $x = 2$ لپاره د $P(x) = 3x + 2$ پولینوم قیمت $P(2) = 3 \cdot 2 + 2 = 8$ دی.

لومړی مثال: د $P(x) = 2x^2 - 7x + 1$ پولینوم قیمتونه د $P(5)$ ، $P(-1)$ او $P(0)$ لپاره پیدا کړئ.
حل:

$$P(5) = 2 \cdot 5^2 - 7(5) + 1 = 50 - 35 + 1 = 16$$

$$P(0) = 1$$

$$P(-1) = 2(-1)^2 - 7(-1) + 1 = 2 + 7 + 1 = 10$$

فعالیت

د $P(x) = x^5 - x^3 - x - 1$ پولینوم لپاره $P(0)$ ، $P(-1)$ او $P(1)$ پیدا کړئ.

دویم مثال: که $P(x) = 16x^3 - 8x^2 + \frac{3}{4}$ وي، نو $P(-\frac{1}{4})$ پیدا کړئ.
حل:

$$\begin{aligned} P(-\frac{1}{4}) &= 16(-\frac{1}{4})^3 - 8(-\frac{1}{4})^2 + \frac{3}{4} = 16(-\frac{1}{64}) - 8(\frac{1}{16}) + \frac{3}{4} \\ &= -\frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{-1-2+3}{4} = \frac{-3+3}{4} = \frac{0}{4} = 0 \end{aligned}$$

دریم مثال: لکه: څرنګه چې پوهېږئ د دایرې محیط (Circumference) د

$$C = 2\pi r \quad \text{له فورمول څخه لاس ته راځي چې که چېرې } \pi = \frac{22}{7} \text{ او د دایرې شعاع } r = 3\frac{1}{2} \text{ cm} \text{ وي، نو د دې دایرې محیط (C) پیدا کړئ.}$$

$$C = 2\pi r = 2 \cdot \frac{22}{7} \cdot 3\frac{1}{2} \text{ cm} = 22 \text{ cm}$$

څلورم مثال: که a, b, c او c د مثلث د ضلعو اوږدوالی او P د مثلث د محیط نیمایي وي یعنې

$$p = \frac{a+b+c}{2}, \text{ د مثلث مساحت د دې فورمول په واسطه لاس ته راځي.}$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

که په یوه مثلث کې د ضلعو اوږدوالی $a = 9 \text{ cm}$, $b = 12 \text{ cm}$ او $c = 15 \text{ cm}$ وي، ددې مثلث مساحت پیدا کړئ.

حل

$$p = \frac{a+b+c}{2} = \frac{9+12+15}{2} = \frac{36}{2} = 18 \text{ cm}$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{18(18-9)(18-12)(18-15)} \\ = \sqrt{18 \cdot 9 \cdot 6 \cdot 3} = \sqrt{2 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3} = \sqrt{2^2 \cdot 3^2 \cdot 9^2} = 2 \cdot 3 \cdot 9 = 54 \text{ cm}^2$$

فعالیت

د استوانې حجم د $V = \pi r^2 h$ له فورمول څخه لاس ته راځي چې V د استوانې حجم، r د قاعدې شعاع او h د استوانې لوړوالی دی. که د یوې استوانې $r = 5 \text{ cm}$ او $h = 2 \text{ cm}$ وي، ددې استوانې حجم پیدا کړئ.

د پولینوم د ضریبونو د مجموعې پیدا کول:

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \text{ وي، د ضریبونو مجموعه یې } a_n + a_{n-1} + \dots + a_1 + a_0 \text{ ده.}$$

پنځم مثال: د $p(x) = 2x^3 + 5x^2 - 3x + 1$ پولینوم د ضریبونو مجموعه په لاس راوړئ.

حل: $p(1) = 2 \cdot 1^3 + 5 \cdot 1^2 - 3 \cdot 1 + 1 = 2 + 5 - 3 + 1 = 5$ پیدا کوو:

که پولینوم له څو تورو څخه جوړ شوی وي، د هر توري پر ځای یو (1) وضع کوو، لکه: د $x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$ د ضریبونو د مجموعې د پیدا کولو لپاره د x او y پر ځای یو (1) وضع کوو:

$$1^4 + 4 \cdot 1^3 \cdot 1 + 6 \cdot 1^2 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot 1^3 + 1^4 = 1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16$$

شپږم مثال: د $(x - 3y)^4$ د ضریبونو مجموعه پیدا کړئ.

حل:

$$(1 - 3 \cdot 1)^4 = (1 - 3)^4 = (-2)^4 = 16$$

اووم مثال: د $(7x^2 - 5x - 1)^{600} (2x^3 - 1)^{17} (x + 2)^4$ د ضریبونو مجموعه په لاس

راوړئ.

حل:

$$(7 \cdot 1^2 - 5 \cdot 1 - 1)^{600} (2 \cdot 1^3 - 1)^{17} (1 + 2)^4 = (1)^{600} (1)^{17} (3)^4 = 81$$

اتم مثال: که ددې توپ شعاع 6cm وي، ددې توپ حجم پیدا کړئ.



حل:


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \pi (6\text{cm})^3 = \frac{4}{3} \pi (216\text{cm}^3) = 288\pi\text{cm}^3$$

د x د راکړل شوي قیمت لپاره د $P(x)$ په پولینوم کې د x پر ځای راکړل شوی قیمت وضع کوو، د پولینوم قیمت په لاس راځي که په یوه پولینوم کې د توري (متحول) پر ځای یو وضع شي د پولینوم د ضریبونو مجموعه په لاس راځي.

پوښتنې

1. که $p(x) = -x^4 - x^3 - x^2 - x - 1$ وي $p(-1)$ او $p(\frac{1}{2})$ پیدا کړئ.
2. د $p(x) = kx^3 - x^2 + 3x - 1$ په پولینوم کې که $p(2) = 17$ وي د k قیمت پیدا کړئ.
3. که د $mx^2 - 2x + 1$ د ضربونو مجموعه 18 وي د m قیمت پیدا کړئ.
4. د $x = -\frac{1}{2}$ لپاره د $p(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ پولینوم قیمت پیدا کړئ.
5. د $A = x^2 - 4x + 4$ □ $B = -4x^3 + 10x^2$ □ $C = -x + 3x^4 - 6x^3$ او $D = x^2 + 4x - 4$ په پولینومونو کې د $x = 4$ لپاره د کوم پولینوم قیمت له 100 څخه زیات دی؟
 a) C b) D c) A d) B
6. په لاندې پولینومونو کې د $x = 5$ لپاره د کوم پولینوم قیمت تر ټولو زیات دی؟
 a) $x^2 - 2x + 6$
 b) $3x^4 + 6x + 12$
 c) $-x^3 - 40x - 300$
 d) $x^5 - 120x^4 + 10$
7. که $p(x) = x^4 - x^3 - x^2 - x - 1$ وي، $p(-1)$ ، $p(0)$ ، $p(\frac{1}{2})$ او $p(-\frac{1}{2})$ پیدا کړئ.
8. د $x = 2$ لپاره د $\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{8}x^3 + \frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{8}x + \frac{7}{8}$ پولینوم قیمت پیدا کړئ.

د پولینوم څلورگوني عمليې



$$3W-4$$



$$W+2$$

که د مربع هره ضلع $3W-4$ او د متساوي الاضلاع مثلث هره ضلع $W+2$ وي، يوه الجبري افاده وليکئ چې د دواړو شکلونو محيط ښکاره کړي.

که $A = 8x^2 - 2x + 3$ او $B = 9x - 5$ وي، $A+B$ او $A-B$ پيدا کړئ.

1 د جمعې عمليه: مشابه حدونه (Like terms) يوله بل سره جمع کېږي او هم مشابه حدونه يوله بله تفریق کېږي، دا دواړه عمليې په افقي او عمودي ډول سر ته رسيدلای شي.

لومړی مثال: که $A = -3cd^2 - 2cd + 5$ او $B = 9cd - 7cd^2 - 5$ وي $A+B$ پيدا کړئ.

حل:

$$\begin{aligned} A+B &= (-3cd^2 - 2cd + 5) + (9cd - 7cd^2 - 5) \\ &= -3cd^2 - 2cd + 5 + 9cd - 7cd^2 - 5 = -10cd^2 + 7cd \end{aligned}$$

فعاليت

که $A = ab^2 + 3a$ ، $B = 2ab^2 + 3a - 2$ او $C = 2a + 4$ وي، د دې درې واړو پولینومونو د جمعې حاصل پيدا کړئ. ($A+B+C=?$)

دویم مثال: جمع یې کړئ که: $B = 3x - 5 - 2x^2$ ، $A = 1 + 2x + 3x^2$

او $C = x^2 - 5x + 4$ او هم که

او $B = a^3b^2 - 2a^2b^3 + 4b - 4$ ، $A = a^4b - 2a^3b^2 - 3a^2b^3 - 4c - 2b$

وي. $C = a^4b + a^3b^2 - 2c$

حل: لومړی پولینومونه په منظم ډول لیکو او بیا مشابه حدونه سره جمع کوو.

$$\begin{array}{r}
 3x^2 + 2x + 1 \\
 -2x^2 + 3x - 5 \\
 + \quad x^2 - 5x + 4 \\
 \hline
 2x^2
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 a^4b - 2a^3b^2 - 3a^2b^3 - 4c - 2b \\
 a^3b^2 - 2a^2b^3 + 4b - 4 \\
 a^4b + a^3b^2 - 2c \\
 \hline
 2a^4b - 5a^2b^3 - 6c + 2b - 4
 \end{array}$$

2- **د تفریق عملیه:** د تفریق په عملیه کې د مفروق جمعې معکوس له مفروق منه سره جمع

کوو. یا په بل عبارت د مفروق علامې تغیروو او له مفروق منه سره یې جمع کوو.

لومړۍ مثال: د B پولینوم د A له پولینوم څخه تفریق کړئ، که $A = -x^3 + x^2 + x - 7$

او $B = -x^3 + x^2 + 4x + 3$ وی او هم که $A = 2b^2 - 2c^2 - 2d^2 - 2e^2$

او $B = b^2 - 3c^2 - 3d^2 - 3e^2 - f^2$ وي.

حل:

$$\begin{array}{r}
 A = -x^3 + x^2 + x - 7 \\
 -B = \mp x^3 \pm x^2 \pm 4x \pm 3 \\
 \hline
 A - B = \quad \quad -3x - 10
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 A = 2b^2 - 2c^2 - 2d^2 - 2e^2 \\
 B = \pm b^2 \mp 3c^2 \mp 3d^2 \mp 3e^2 \mp f^2 \\
 \hline
 A - B = b^2 + c^2 + d^2 + e^2 + f^2
 \end{array}$$

یا

$$\begin{aligned}
 & -x^3 + x^2 + x - 7 - (-x^3 + x^2 + 4x + 3) \\
 & = -x^3 + x^2 + x - 7 + x^3 - x^2 - 4x - 3 \\
 & = -3x - 10
 \end{aligned}$$

باید په یاد ولرو چې د یو پولینوم د ساده کولو لپاره مشابه حدونه (Like terms) سره جمع یا تفریقوو. د مثال په ډول

- a) $x^2 + 6x^4 - 8 + 9x^2 + 2x^4 - 6x^2 = 8x^4 + 4x^2 - 8$
- b) $3x - x - 1 + 3 - 2x = 2$
- c) $2x^2 - x - x^2 - x - 2 = x^2 - 2x - 2$
- d) $6xy - xy - x - y + 2x = 5xy + x - y$
- e) $mn - 4 + mn - 5 = 2mn - 9$

فعالیت

په لاندې پولینومونو کې مشابه حدونه (Like terms) وښیاست.

$$-t + 5t^2 - 6t^2 + 6t - 3$$

$$9rs - 2r^2s^2 + 4r^2s^2 + 3rs - 7$$

$$3p - 4p^2 + 6p + 10p^2$$

$$2fg + f^2g - fg^2 - 2fg + 3f^2g + 5fg^2$$

دویم مثال: د $a^4 + 2a^3b - 3ab^3 + a^2b^2$ له پولینوم سره کوم پولینوم جمع کړو چې د جمعې حاصل یې $2a^4 - 3a^3b - 3ab^3 - b^4 + a^2b^2$ شي؟
حل:

$$2a^4 - 3a^3b + a^2b^2 - 3ab^3 - b^4$$

$$-a^4 \pm 2a^3b \pm a^2b^2 \mp 3ab^3$$

$$a^4 - 5a^3b$$

$$-b^4$$

فعالیت

د $4x + 6 - 2x^2$ او $3x^2 - x^3 - 3$ پولینومونو مجموعه د $x^3 + x^2 - 2x$ او $-2x^3 + 3x - 7$ پولینومونو له مجموعې څخه تفریق کړئ.

دریم مثال: تفریق یې کړئ.

$$202x^4y - 303x^3y^2 - 101x^2y^3 - 404xy^4 - 505y^5$$

$$-101x^4y \mp 303x^3y^2 \pm 101x^2y^3 \mp 404xy^4 \pm 505y^5$$

$$101x^4y \quad -202x^2y^3 \quad -1010y^5$$

$$3ax - 5bx - 8cx - 11dx$$

$$\pm 3ax \mp 5bx \mp 8cx \mp 11dx$$

$$0$$

څلورم مثال: مشابه حدونه (Like terms) سره جمع او ساده یې کړئ.

$$20 - k - k - 10 - 6 - k^2 = -k^2 - 2k + 4$$

$$8 - 10 + x - 7 + x = 2x - 9$$

$$y^2 - 1 + y^2 - 1 = 2y^2 - 2$$

$$ab + a - b - a = ab - b$$

$$4b^3 - 2b^2 - 2 + b - 4b^3 + b^2 + b^2 - b + 2 = 0$$

$$x^2 - 5x - 2x^2 + 5 = -x^2 - 5x + 5$$

باید په یاد ولرو چې که P, Q او R پولینومونه وي، نو

$$P + Q = Q + P \text{ (د جمعې د عملیې تبدیلی خاصیت)}$$

$$P + (Q + R) = (P + Q) + R \text{ (د جمعې د عملیې اتحادي خاصیت)}$$

$$P(Q + R) = PQ + PR \text{ (د ضرب توزیعی خاصیت پر جمع باندې)}$$

$$(Q + R)P = QP + RP$$

یا

د پولینومونو د جمعې او تفریق په عملیو کې مشابه حدونه سره جمع او یا یو له بله تفریق کېږي د پولینومونو د جمعې په عملیه کې د تبدیلی او اتحادي خاصیتونه صدق کوي او د تفریق په عملیه کې د مفروق جمعې معکوس له مفروق منه سره جمع کېږي او د ضرب توزیعی قانون پر جمع باندې په پولینومونو کې هم صدق کوي.

پوښتنې

1. د دوو پولینومونو مجموعه $x^2 + 2x - y^2$ ده، که یو پولینوم $x^2 - 2xy + 3$ وي، بل پولینوم پیدا کړئ.

2. د $3x^4 + 5x^3 + 2x^2 - x + 1$ پولینوم له $4x^4 + 2x^2 + x^3 - x + 1$ پولینوم څخه تفریق کړئ.

3. د $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ ، پولینوم څخه د $a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$ پولینوم تفریق کړئ.

4. که $A = a^3 + 2a^2 - 6a + 7$ ، $B = a^3 + 2a + 5$ او $C = 2a^3 - a^2 + 2a - 8$ وي

ددې درې واړو پولینومونو مجموعه پیدا کړئ. ($A + B + C = ?$)

5. د $(ab^2 + 3a) + (2ab^2 + 3a - 2) + (2a + 4)$ افادې د جمعې حاصل مساوي دی، په:

$$a) -3ab^2 + 8a + 2 \quad b) 3ab^2 + 8a \quad c) 3ab^2 + 8a + 2$$


6. جمع یې کړئ.

$$(3a^2b^2 + 2a^2 - 5ab) + (-3ab + a^2 - 2) + (1 + 6ab)$$

7. که دوه الوتکې له یوه هوايي ډگر څخه یو د بل مخالف لورې ته والوزي، که 2 ساعتونه وروسته د

یوې الوتکې واټن له هوايي ډگر څخه $x^2 + 2x + 400$ میله وي او دبلې الوتکې واټن له هوايي ډگر

څخه $3x^2 - 50x + 100$ میله وي، ددې دواړو الوتکو تر منځ واټن (فاصله) پیدا کړئ.



د پولینومونو ضرب

د هغه مکعب حجم به څومره وي چې هره

ضلع یې $(x+1)$ سانتی متره وي؟

د مونوم ضرب په مونوم کې: که د $3r^2s^3$ مونوم د $5r^4s^5$ په مونوم کې ضرب کړو، د ضرب حاصل یې $(3r^2s^3)(5r^4s^5) = 15r^6s^8$ کېږي.

فعالیت

د $(-30a^2b)(-5ab)$ او $(-\frac{1}{3}x)(-x)$ سره ضرب کړئ. $(7x^2y)(-3x^4yz^8)$

لومړی مثال: د لاندې مونومونو د ضرب حاصل پیدا کړئ.

$$\frac{1}{4}(4)^2\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{16}{4}\right)\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{16}{16} = 1$$

$$(-2a)^3(-2a)^2 = -32a^5$$

$$x(x^m) = x^{m+1} = x^{1+m}$$

$$\left(\frac{5}{2}mn\right)\left(\frac{5}{2}mn\right)\left(\frac{5}{2}mn\right) = \frac{125}{8}m^3n^3$$

$$(-a^b)(-a) = a^{b+1} = a^{1+b}$$

$$(0.01p)(0.01p) = 0.0001p^2$$

$$(0.1x^2)(0.1x^2) = 0.01x^4$$

$$(-5y^a)(5y) = -25y^{a+1}$$

$$(-4s^2t^2)(2st^3) = -8s^3t^5$$

$$-a^{2x}(-2a) = 2a^{2x+1}$$

$$\left(-\frac{1}{2}a\right)\left(-\frac{1}{2}a\right) = \frac{1}{4}a^2$$

$$(-0.1)(-0.1)(-0.1) = -0.001$$

$$(-mn)(-mn^2) = m^2n^3$$

د مونوم ضرب په پولینوم کې:

دویم مثال: د ضرب لاندې حاصل لاس ته راوړئ.

$$x^3(x - x^2y^4) = x^4 - x^5y^4$$

$$(2m^2n^3)(1 - 4mn^4) = 2m^2n^3 - 8m^3n^7$$

$$-3b(5b^4 - 8b + 12) = -15b^5 + 24b^2 - 36b$$

$$-4s^2t^2(5s^2t + 6st - 2s^2t^2) = -20s^4t^3 - 24s^3t^3 + 8s^4t^4$$

فعالیت

د هغه مکعب حجم پیدا کړئ چې اوږدوالی یې، $2x$ ، سوري یې x او لوړوالی یې $x+2$ وي.


د پولینوم ضرب په پولینوم کې:

دریم مثال: a : د $(x-4)(x-5)$ د ضرب حاصل لاس ته راوړئ.

حل: $(x-4)(x-5) = x^2 - 5x - 4x + 20 = x^2 - 9x + 20$

	x	-4
x	x^2	$-4x$
-5	$-5x$	20

$$b) (a+b)(a+b)(a+b) = (a+b)(a^2 + 2ab + b^2) = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$



c : که $P(x) = x^3 + 2x$ او $Q(x) = 2x^2 - x + 1$ وي. $P(x) \cdot Q(x)$ پیدا کړئ.

$$P(x) \cdot Q(x) = (x^3 + 2x) \cdot (2x^2 - x + 1)$$

$$= x^3 \cdot 2x^2 + x^3(-x) + x^3 \cdot 1 + 2x \cdot 2x^2 + 2x(-x) + 2x \cdot 1$$

$$= 2x^5 - x^4 + x^3 + 4x^3 - 2x^2 + 2x = 2x^5 - x^4 + 5x^3 - 2x^2 + 2x$$

خلورم مثال: لاندې افادې د $a^3 + b^3$ او $a^3 - b^3$ مطابقونو په مرسته ضرب کړئ.

حل

$$\begin{aligned} \text{a) } (x^m + y^n)(x^{2m} - x^m y^n + y^{2n}) &= (x^m + y^n)[(x^m)^2 - (x^m)(y^n) + (y^n)^2] \\ &= (x^m)^3 + (y^n)^3 = x^{3m} + y^{3n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } (\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})(x + \sqrt{xy} + y)(x - \sqrt{xy} + y) \\ &= (\sqrt{x} - \sqrt{y})(x + \sqrt{xy} + y)(\sqrt{x} + \sqrt{y})(x - \sqrt{xy} + y) \\ &= [(\sqrt{x})^3 - (\sqrt{y})^3][(\sqrt{x})^3 + (\sqrt{y})^3] = [(\sqrt{x})^3]^2 - [(\sqrt{y})^3]^2 \\ &= (x^{\frac{3}{2}})^2 - (y^{\frac{3}{2}})^2 = x^3 - y^3 \end{aligned}$$

په یاد ولرئ چې که P, Q, R او پولینومونه وي

$$P \cdot Q = Q \cdot P \quad (\text{د ضرب د تبدیلی خاصیت})$$

$$P \cdot (Q \cdot R) = (P \cdot Q) \cdot R \quad (\text{د ضرب اتحادی خاصیت})$$

فعالیت


په کې وڅېړئ. $P(x) = 2x^2 - x - 1$ او $Q(x) = 4x - 8$ وي، د ضرب د تبدیلی او اتحادی خاصیتونه

په لاندې جدول کې د هندسی شکلونو مساحت (Area) پیدا کړئ.

هندسي شکلونه	راکړ شوی اوږدوالی	مساحت
مستطیل	اوږدوالی یې $n + 5$ او سور یې $n - 4$	$n^2 + n - 20$
مستطیل	اوږدوالی یې $3y + 3$ او سور یې $2y - 1$	$6y^2 + 3y - 3$
مثلث	قاعدې یې $2b - 5$ او لوړوالی یې $b^2 + 2$	$b^3 - \frac{5}{2}b^2 + 2b - 5$
مربع	هره ضلع یې $m + 13$ ده	$m^2 + 26m + 169$
مربع	هره ضلع یې $2g - 4$ ده	$4g^2 - 16g + 16$
دایره	شعاع یې $3c + 2$ ده	$(9c^2 + 12c + 4)\pi$

فعالیت

د $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac)$ د ضرب حاصل په لاس راوړئ.



پوښتنه: د يوه حوض څلورو خواوو ته له سمتهو څخه پخه شوې لاره ده، که د دې لارې سور x متره وي او د حوض اوږدوالی او سور په ترتيب سره $50m$ او $25m$ وي د لارې مساحت معلوم کړئ.

حل: د لارې او حوض مجموعي مساحت

$$A = (25 + 2x)(50 + 2x) = 1250 + 150x + 4x^2$$

د حوض مساحت: $(25m)(50m) = 1250m^2$

د لارې مساحت: $1250 + 150x + 4x^2 - 1250 = 4x^2 + 150x$

پولینومونو په ضرب کې کېدای شي، مونوم په مونوم کې، مونوم په پولینوم کې او یا پولینوم په پولینوم کې ضرب کړو او د ضرب په عملیه کې د تبدیلی، اتحادي او د ضرب توزیعي خاصیت په جمع باندې هم صدق کوي.

پوښتنې

1. ضرب یې کړئ: $(4x^2y^2z)(-5xy^3z^2)$ ، $-2xy(2x^2 + 2y^2 - 2)$

2. یو بکس چې لوړوالی یې x انچه، اوږدوالی یې $(x+1)$ او سور یې $2x-4$ انچه دی، که

لوړوالی یې 3 انچه وي، د دې بکس حجم مساوي دی، په:

a) $40in^3$ b) $24in^3$ c) $48in^3$ d) $20in^3$

3. د $(\frac{a^p}{a^{-q}})^{p-q}(\frac{a^q}{a^{-r}})^{q-r}(\frac{a^r}{a^{-p}})^{r-p}$ د ضرب حاصل مساوي دی، په:

a) 1 b) -1 c) صفر d) درې واړه سم نه دي



د پولینوم وېش پر مونوم

آیا د

$$\frac{4m^2}{n}, \quad \frac{1}{\frac{a}{\frac{1}{b}}}, \quad \frac{3mn^2}{-mn}, \quad \frac{-x^2}{x}$$

$$\frac{14x^5}{2x^2} \text{ د وېش حاصل په لاس او د } \frac{-n^a}{n^b}$$

راوړلای شئ؟ (هیڅ یو مخرګ له صفر سره مساوي نه دی).

د مونوم وېش پر مونوم (Dividing monomial by monomial):

لومړی مثال: وېې وېشئ:

$$\frac{36a^5b^5c^7}{12a^4bc^3} = 3ab^4c^4, \quad \frac{6x^9y^3}{4x^6y^2} = \frac{3}{2}x^3y, \quad \frac{-a^2}{-a^x} = a^{2-x}, \quad \frac{-n^a}{n^b} = -n^{a-b}$$

د پولینوم وېش پر مونوم:

$$(x^4 + 5x^3 - 7x^2) \div x^2$$

$$\frac{x^4 + 5x^3 - 7x^2}{x^2} = \frac{x^4}{x^2} + \frac{5x^3}{x^2} - \frac{7x^2}{x^2} = x^2 + 5x - 7 \quad (x^2 \neq 0)$$

دویم مثال: وېې وېشئ.

$$\frac{x^8y^2 - x^4y^6 - 4x^3y^9}{x^3y} = x^5y - xy^5 - 4y^8 \quad (x^3y \neq 0)$$

$$\frac{r^6s^2 - r^5s - 4r^3s^4}{r^2s} = r^4s - r^3 - 4rs^3 \quad (r^2s \neq 0)$$

فعالیت

د وېش حاصل په لاس راوړئ. (مخروجونه خلاف د صفر دي)

$$a: \frac{27x^6y^{13} - 18x^{12}y^8}{9x^3y^8}$$

$$b: \frac{x^2}{y^2 - 1} \div \frac{x^2}{y - 1}$$

$$c: \frac{10b^3c^7}{6b^2c^7}$$

د پولینوم وېش پر پولینوم: څه وخت چې یو پولینوم پر بل پولینوم وېشو، مقسوم

(Dividend) او مقسوم علیه (Divisor) دواړه باید په منظم ډول ترتیب شي.

دریم مثال: د $(13x + 2x^4 + 12 + 3x^3 - 4x^2) \div (3 + x^2 - 2x)$ د وېش حاصل په

لاس راوړئ.

$$\begin{array}{r|l}
 2x^4 + 3x^3 - 4x^2 + 13x + 12 & x^2 - 2x + 3 \\
 \underline{\pm 2x^4 \mp 4x^3 \pm 6x^2} & 2x^2 + 7x + 4 \\
 7x^3 - 10x^2 + 13x & \\
 \underline{\pm 7x^3 \mp 14x^2 \pm 21x} & \\
 4x^2 - 8x + 12 & \\
 \underline{\pm 4x^2 \mp 8x \pm 12} & \\
 0 &
 \end{array}$$

فعالیت

د $(a^5 + b^5) \div (a + b)$ د وېش حاصل په لاس راوړئ.

څلورم مثال: د وېش حاصل یې پیدا کړئ $(x^3 - 19x - 30) \div (x + 3)$.

حل:

$$\begin{array}{r|l}
 x^3 & -19x - 30 & x + 3 \\
 \underline{x^3 \pm 3x^2} & & x^2 - 3x - 10 \\
 -3x^2 - 19x & & \\
 \underline{\mp 3x^2 \mp 9x} & & \\
 -10x - 30 & & \\
 \underline{\mp 10x \mp 30} & & \\
 0 & &
 \end{array}$$

پنځم مثال: د $4x^3 - 10x^2 + 12x + 6$ له پولینوم سره کوم عدد جمع کړو چې په $(2x + 1)$

پوره ووېشل شي؟

حل

$$\begin{array}{r}
 4x^3 - 10x^2 + 12x + 6 \quad 2x + 1 \\
 \underline{4x^3 \pm 2x^2} \qquad \qquad 2x^2 - 6x + 9 \\
 -12x^2 + 12x \qquad \qquad \underline{\hspace{2cm}} \\
 \mp 12x^2 \mp 6x \qquad \qquad \underline{\hspace{2cm}} \\
 18x + 6 \\
 \underline{-18x \pm 9} \\
 -3
 \end{array}$$

په نتیجه کې که له پورتنی پولینوم سره 3 جمع کړو، نو په $(2x+1)$ پوره د وېشلو وړ دی. باید پام مو وي، د وېش عملیې ته به تر هغو پورې دوام ورکوو چې پاتې (باقی مانده) صفر او یا د باقی مانده درجه د مقسوم علیه له درجې څخه د یو په اندازه کمه شي.

فعالیت

د دوو پولینومونو د ضرب حاصل $6y^3 - 11y^2 + 6y - 1$ دی. که یو پولینوم $3y^2 - 4y + 1$ وي، بل پولینوم پیدا کړئ.

شپږم مثال: د x په کوم قیمت $12x^4 + 3x^3 - 13x^2 + x + 5$ پولینوم پر $3x^2 - 1$ باندي پوره وېشل کېږي؟

حل

$$\begin{array}{r}
 12x^4 + 3x^3 - 13x^2 + x + 5 \quad 3x^2 - 1 \\
 \underline{12x^4 \qquad \mp 4x^2} \qquad \qquad 4x^2 + x - 3 \\
 3x^3 - 9x^2 + \quad x \qquad \qquad \underline{\hspace{2cm}} \\
 \underline{3x^3 \qquad \mp \quad x} \\
 -9x^2 + 2x + 5 \\
 \mp 9x^2 \qquad \pm 3 \\
 \underline{\hspace{2cm}} \\
 2x + 2
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 2x + 2 = 0 \\
 2x = -2 \\
 x = -1
 \end{array}$$

نو د $x = -1$ لپاره پورتنی پولینوم پر $3x^2 - 1$ پوره وېشل کېږي.

د پولینومونو په وېش کې کېدای شي چې مونوم پر مونوم، پولینوم پر مونوم او یا پولینوم پر پولینوم ووېشو. لومړی باید مقسوم او مقسوم علیه په نزولي ډول ترتیب شي او د وېش عملیې ته تر هغه پورې دوام ورکوو، تر څو د پاتې (باقي) درجه د مقسوم علیه له درجې څخه د یو په اندازه کمه شي.

پوښتنې

1. د P په کوم قیمت $3x^3 - 7x^2 - 9x + p$ پولینوم پر $x - 13$ پوره وېشل کېږي؟

2. د وېش حاصل یې پیدا کړئ.

$$(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc) \div (a + b + c)$$

$$(x^2 + x - 6) \div (x - 2)$$

$$(x^5 - y^5) \div (x - y)$$

$$\frac{j^5k^2 - 3j^8k^4}{2j^4k}$$

$$\frac{12x^5 + 9x^4 + 15x^2}{3x^3}$$

$$\frac{27a^6b^{13} - 18a^{12}b^8}{9a^3b^8}$$

$$(x^3 - a^3) \div (x^2 - ax + a^2)$$

$$(9x^4 + 2x^2 + 7x + 2) \div (3x + 2)$$

$$(8x^3 + 27y^3) \div (2x + 3y)$$

$$(7x - 12 + 2x^4 - 8x^3 - x^2) \div (2x^2 + 5)$$

د باقي مانده قضيه (Remainder Theorem)

$$\begin{array}{r}
 2x + 1 \\
 x-3 \overline{) 2x^2 - 5x - 1} \\
 \underline{-(2x^2 - 6x)} \\
 0 + 1x - 1 \\
 \underline{-(x - 3)} \\
 0 + 2 \text{ پاتې}
 \end{array}$$

آيا د وېش د عملېې له سرته رسولو پرته ويلای شئ چې که د $x^3 - 6x^2 - x - 6$ پولينوم په $x - 4$ ووېشو پاتې (باقي) به څو وي؟

که د $P(x)$ پولينوم په $x - a$ ووېشل شي باقي (پاتې) د $P(a)$ سره مساوي ده. يا $R = P(a)$
لومړی مثال: که د $P(x) = 2x^2 + 3x + 4$ پولينوم پر $(x + 3)$ ووېشل شي، نو باقي (Remainder) له $P(-3)$ سره مساوي ده.

$$P(-3) = 2(-3)^2 + 3(-3) + 4 = 13$$

حل:

اوس يې ازمايو او د وېش عملیه سرته رسوو.

$$\begin{array}{r|l}
 2x^2 + 3x + 4 & x + 3 \\
 \underline{2x^2 + 6x} & 2x - 3 \\
 -3x + 4 & \\
 \underline{+3x + 9} & \\
 13 &
 \end{array}$$

قضيه: که د $P(x)$ پولينوم په $(x - a)$ ووېشو، نو باقي يا پاتې $R = P(a)$ ده.
ثبوت: که د $P(x)$ پولينوم په $(x - a)$ ، ووېشو او خارج قسمت $Q(x)$ او پاتې R وي، نو لرو چې:

$$P(x) = Q(x)(x - a) + R \quad x - a = 0$$

$$P(a) = Q(a)(a - a) + R \quad x = a$$

$$P(a) = R$$

دويم مثال: که د $2x^3 - x^2 - 7$ پولينوم پر $(x - 2)$ ووېشل شي، پاتې به څو وي؟

حل:

$$P(2) = 2(2)^3 - (2)^2 - 7 = 16 - 4 - 7 = 5$$

$$R = 5$$

فعالیت

د پورتنۍ قضیې په مرسته یې پاتې (باقي مانده) پیدا کړئ.

• که $x^3 - x^2 - 226x + 1410$ پر $(x+17)$ ووېشل شي.

• که $x^3 - 2x^2 + 3x + 5$ پر $(x-4)$ ووېشل شي.

• که $x^3 + 18x^2 + 164x + 199$ پر $(x+8)$ ووېشل شي.

دریم مثال: که د $5x^2 + x - 9$ پولینوم پر $(x + \frac{1}{2})$ ووېشل شي، د وېش د عملیې له سرته

رسولو څخه پرته وویاست چې څو پاتې کېږي؟

حل

$$P(-\frac{1}{2}) = 5(-\frac{1}{2})^2 - \frac{1}{2} - 9$$

$$x + \frac{1}{2} = 0$$

$$= 5(\frac{1}{4}) - \frac{1}{2} - 9 = \frac{5}{4} - \frac{1}{2} - 9 = \frac{5 - 2 - 36}{4} = -\frac{33}{4}$$

$$x = -\frac{1}{2}$$

څلورم مثال: که د $P(y) = 10y^3 + 7y^2 - y - 11$ پولینوم پر $(2y+1)$ ووېشو، د وېش

د عملیې له سرته رسولو پرته یې پاتې (باقي) پیدا کړئ.

حل

$$P(-\frac{1}{2}) = 10(-\frac{1}{2})^3 + 7(-\frac{1}{2})^2 - (-\frac{1}{2}) - 11$$

$$2y + 1 = 0 \Rightarrow 2y = -1$$

$$P(-\frac{1}{2}) = 10(-\frac{1}{8}) + 7(\frac{1}{4}) + \frac{1}{2} - 11$$

$$\Rightarrow y = -\frac{1}{2}$$

$$= -\frac{5}{4} + \frac{7}{4} + \frac{1}{2} - 11 = \frac{-5 + 7 + 2 - 44}{4} = \frac{-40}{4} = -10$$

$$R = -10$$

فعالیت

د 4 مثال په پوښتنه کې د وېش عملیه سرته ورسوئ او باقي یې په لاس راوړئ.

پنځم مثال: که د $4x^4 + 12x^3 - 13x^2 - 33x + 18$ پولینوم پر $(x + 4)$ ووېشل شي،

باقي یې پیدا کړئ.

حل:

$$\begin{aligned} P(-4) &= 4(-4)^4 + 12(-4)^3 - 13(-4)^2 - 33(-4) + 18 \\ &= 1024 - 768 - 208 + 132 + 18 = 1174 - 976 = 198 \end{aligned}$$

اوس د وېش عملیه سرته رسوو.

$$\begin{array}{r|l} 4x^4 + 12x^3 - 13x^2 - 33x + 18 & x + 4 \\ -4x^4 \pm 16x^3 & 4x^3 - 4x^2 + 3x - 45 \\ \hline -4x^3 - 13x^2 & \\ \mp 4x^3 \mp 16x^2 & \\ \hline 3x^2 - 33x & \\ \pm 3x^2 \pm 12x & \\ \hline -45x + 18 & \\ \mp 45x \mp 180 & \\ \hline 198 & \end{array}$$

که د $P(x)$ پولینوم پر $P(x-a)$ ووېشل شي، د وېش د عملیې له سرته رسولو پرته یې د باقي مانده

قضیې (Remainder Theorem) په مرسته باقي پیدا کولای شو چې باقي مانده (R) له (a)

P سره مساوي ده.

پوښتنې

1. د باقي مانده قضیې (Remainder theorem) په مرسته یې باقي (پاتې) پیدا کړئ.

$$(5x^3 - x^2 + 4x + 1) \div (x - 3) \quad , \quad (6p^3 + 2p^2 - p + 20) \div (p - \frac{1}{2})$$

$$(6x^2 + 15) \div (4x + 9) \quad , \quad (4y^2 - y - 6) \div (y - 1.6)$$

2. د باقي مانده قضیې په مرسته وویاست چې د k په کوم قیمت د $5x^3 - k^2x^2 + 3kx - 6$

پولینوم پر $(x + 2)$ ووېشل شي، ترڅو -44 باقي شي؟

3. د k په کوم قیمت که د $2k^2y^4 - ky^2 + 1$ پولینوم، پر $(y - \frac{1}{2})$ ووېشل شي، ترڅو 2 باقي شي؟

4. که چېرې $m^2x^4 - 10x^2 + 2$ پولینوم پر $(x - 1)$ ووېشو او باقي 17 وي، د m قیمت به څو وي؟

د فکتور قضیه (The Factor Theorem)

$$(x^5 + 1) \div (x + 1)$$

$$P(-1) = [(-1)^5 + 1] \\ = -1 + 1 = 0$$

آیا $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 2$ د $(x - 1)$ یو فکتور دی؟

که د $P(x)$ پولینوم پر $(x - a)$ ووېشل شي او $P(a) = 0$ شي، نو $x - a$ ددې پولینوم یو فکتور دی.

ثبوت: د باقي مانده قضیې په اساس $R = P(a)$ دی، نو که د $P(x)$ پولینوم پر $(x - a)$ ووېشل شي او د وېش حاصل (خارج قسمت) یې $Q(x)$ وي، نو لرو چې: $P(x) = Q(x)(x - a) + R$ که $R = 0$ وي، نو: $P(x) = Q(x)(x - a)$

لیدل کېږي چې $(x - a)$ د $P(x)$ پولینوم یو فکتور دی. او یا که $(x - a)$ د $P(x)$ د پولینوم یو فکتور وي، نو $P(a) = 0$ دی.

لومړی مثال: وښایست چې $(x - 2)$ د $P(x) = x^3 + 3x^2 + 4x - 28$ د پولینوم یو فکتور دی.

حل

$$P(x) = x^3 + 3x^2 + 4x - 28$$

$$x - 2 = 0$$

$$P(2) = 2^3 + 3(2)^2 + 4 \cdot 2 - 28 = 8 + 3(4) + 8 - 28 = 0$$

$$x = 2$$

څرنگه چې R یا $P(2) = 0$ دی، نو $(x - 2)$ د $P(x)$ د پولینوم یو فکتور دی.

فعالیت

د وېش د عملیې له سرته رسولو پرته، د فکتور د قضیې په مرسته وښایست چې $x - 1$ د $P(x) = 2x^3 - 13x^2 + 26x - 15$ پولینوم یو فکتور دی.

دویم مثال: د فکتور د قضیې په مرسته وښایست چې $(x - 2)$ د $P(x) = x^5 - 32$ پولینوم یو فکتور دی.

حل

$$P(x) = x^5 - 32$$

$$P(2) = 2^5 - 32 = 32 - 32 = 0$$

څرنگه چې $R = P(2) = 0$ ده، نو $(x-2)$ د $x^5 - 32$ پولینوم یو فکتور دی.

دریم مثال: وښیاست چې $(x+1)$ د $P(x) = 2x^3 + 5x^2 + 7x + 4$ پولینوم یو فکتور دی.

$$\text{حل: } P(-1) = 2(-1)^3 + 5(-1)^2 + 7(-1) + 4 = -2 + 5 - 7 + 4 = 0$$

څرنگه چې R یا $P(-1)$ له صفر سره مساوي دی، نو $(x-1)$ د دې پولینوم یو فکتور دی.

څلورم مثال: د k په کوم قیمت، $(x-1)$ د $P(x) = 2x^4 - 3x^3 - x - 2k$ پولینوم یو فکتور دی؟

حل

$$P(1) = 2(1)^4 - 3(1)^3 - 1 - 2k = 2 - 3 - 1 - 2k = -2 - 2k$$

$$-2 - 2k = 0$$

$$-2k = 2$$

$$k = -1$$

د $k = -1$ لپاره باقي ماته صفر کېږي، نو $x-1$ د دې پولینوم یو فکتور دی.

فعالیت

د فکتور د قضیې په مرسته وښیاست چې آیا د کینې خوا دوه حدې (باینومونه) د اړوندو پولینومونو فکتورونه دي او که نه؟

$$(x-6) : (x^6 - 36x^3 + 1296)$$

$$(y+5) : (y^3 + 125)$$

$$(x + \frac{1}{2}) : (20x^3 + 7x + 6)$$

$$(x - \frac{1}{2}) : (x^3 - \frac{1}{8})$$

$$(x - 0.1) : (10x^3 - 11x^2 + 1)$$

$$(x + 2) : (x^5 + 32)$$

د فکتور د قضیې معکوس (Converse of Factor Theorem):

که $(x-a)$ د $P(x)$ پولینوم یو فکتور وي، نو $P(a) = 0$ دی او د a عدد $P(x) = 0$ پولینومي معادلې یو جذر (Root) دی.

لومړی مثال: که $(x-2)$ د $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ پولینوم یو فکتور وي، نو

وښیاست چې $P(2) = 0$ دی او 2 د $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ معادلې یو جذر دی.
حل: که 2 د $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ معادلې یو جذر وي، نو $(x - 2)$ ددې پولینوم یو فکتور دی $P(2) = 0$.

$$P(2) = 2^3 - 6(2)^2 + 11(2) - 6 = 8 - 24 + 22 - 6 = 0$$

دویم مثال: که -2 د $x^3 + 4x^2 + kx + 8 = 0$ معادلې یو جذر وي، د k قیمت پیدا کړئ.
حل:

$$(-2)^3 + 4(-2)^2 + k(-2) + 8 = 0$$

$$-8 + 16 + k(-2) + 8 = 0$$

$$-2k = -8 + 8 - 16$$

$$k = 8$$

دریم مثال: وښیاست چې 3 د $x^3 - 6x^2 + 5x + 12 = 0$ پولینومي معادلې یو جذر دی.
حل:

$$(3)^3 - 6(3)^2 + 5(3) + 12 = 0$$

$$27 - 54 + 15 + 12 = 0$$

$$54 - 54 = 0$$

$$0 = 0$$

نو لیدل کېږي چې 3 ددې پولینومي معادلې یو جذر دی.

فعالیت

وښیاست چې 2 د $x^3 - 4x^2 + 5x - 2 = 0$ معادلې یو جذر دی.

څلورم مثال: د k د کوم قیمت لپاره 3 د $2x^4 - 6x^3 - 7x^2 + kx - 15 = 0$ معادلې یو جذر دی؟

حل:

$$2(3)^4 - 6(3)^3 - 7(3)^2 + 3k - 15 = 2(81) - 6(27) - 7(9) + 3k - 15 = 0$$

$$162 - 162 - 63 + 3k - 15 = 0$$

$$3k = 15 + 63 + 162 - 162 = 78$$

$$3k = 78$$

$$k = 26$$

که $(x-a)$ د $P(x)$ پولینوم یو فکتور وي، نو $P(a) = 0$ دی او که د $P(x)$ په پولینوم کې $P(a) = 0$ شی نو $(x-a)$ د $P(x)$ پولینوم یو فکتور دی.

پوښتنې

1- د k د کوم قیمت لپاره $(x-2)$ د $P(x) = 2x^4 - x^3 + kx^2 + kx - 12$ پولینوم یو فکتور دی؟

2- آیا $(x+3)$ د $P(x) = x^5 - x^3 + 27x^2 - 27$ پولینوم یو فکتور دی؟

3- د فکتور د قضیې په مرسته وښیاست چې $(x+7)$ د $P(x) = x^3 + 8x^2 + 8x + 7$ د پولینوم یو فکتور دی، که نه؟

4- د وېش د عملیې د سرته رسولو پرته وښیاست چې آیا $(y-7)$ د

$P(y) = y^4 + 2y^3 - 6y^2 - 14y - 7$ پولینوم یو فکتور دی که نه؟

5- وښیاست چې آیا $(m + \frac{1}{2})$ د $P(x) = 2m^2 + 4m - 2$ پولینوم یو فکتور دی که نه؟


6- د $x^3 + x^2 - 10x + 8$ پولینوم د فکتور د قضیې په مرسته تجزیه کړئ.

7- که $(x-1)$ او $(x+1)$ د $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + 2$ د پولینوم فکتورونه وي، د a او b قیمتونه پیدا کړئ.

8- د k ، د کوم قیمت لپاره $(x-5)$ د $Q(x) = x^3 - 5x^2 - 16x + k$ پولینوم یو فکتور دی؟

9- د k د کوم قیمت لپاره (-1) ، د $x^3 - 9x^2 + 14x + k = 0$ پولینومي معادلې یو جذر دی؟

ترکيبي وېش (Synthetic Division)



آيا د وېش عمليې له سرته رسولو پرته، د وېش حاصل او باقي پيدا كولاى شي.
كه د $P(x) = 2x^3 + 3x^2 - x^2 - 5$ پولينوم پر $(x-2)$ ووېشل شي؟

د $P(x)$ پولينوم پر $(x-a)$ ، د وېشلو لپاره تركيبي وېش (Horner's Method) يوه لنډه طريقه ده چې په عمومي ډول د دې هدفونو لپاره ترې كار اخيستل كېږي.
1- د x د مختلفو قيمتونو لپاره د $P(x)$ پولينوم د قيمت پيدا كول.
2- د $P(x) = 0$ معادلې د ناطق جذر د پيدا كولو لپاره.
3- د الجبري افادو د تجزيې لپاره.

لومړی مثال: كه د $P(x) = 4x^4 + 12x^3 - 13x^2 - 33x + 18$ پولينوم پر $(x+4)$ باندې ووېشو د وېش د عمليې له سرته رسولو پرته د تركيبي وېش (تقسيم) په مرسته يې د وېش حاصل (Quotient) او باقي مانده (Remainder) پيدا كړئ.

حل:

لومړۍ كړبنه	4	12	-13	-33	18	-4	$x+4=0$
دويمه كړبنه		-16	16	-12	180		$x=-4$

درېمه كړبنه	4	-4	3	-45	198
-------------	---	----	---	-----	-----

چې د وېش حاصل (خارج قسمت) يې $4x^3 - 4x^2 + 3x - 45$ او پاتې يا باقي مانده يې 198 ده، په دې معنا چې: $P(x) = (x+4)(4x^3 - 4x^2 + 3x - 45) + 198$
پورتنۍ عمليه په لاندې پړاوونو كې ښودلای شو.
د لومړۍ كړبنې عددونه د مقسوم ضريبونه دي چې نظر د x توان ته په نزولي ډول ترتيب شوي دي.
1. د 4 عدد له لومړۍ كړبنې څخه درېمې كړبنې ته رابنځته شوی دی.

2. 4 په (-4) کې ضرب شوی دی چې (-16) کېږي او (-16) د 12 د عدد لاندې په دویمه کرښه کې لیکل شوی دی.

3. د 12 او (-16) د جمعې حاصل چې (-4) کېږي، په دریمه کرښه کې لیکو.

4. د (-4) عدد په (-4) کې ضربوو چې 16 کېږي او د (-13) لاندې یې په دویمه کرښه کې لیکو.

5. د 16 او (-13) د جمعې حاصل چې 3 کېږي، په دریمه کرښه کې لیکل شوی دی.

6. د 3 او (-4) د ضرب حاصل چې (-12) کېږي، د (-33) لاندې په دویمه کرښه کې لیکل شوی دی.

7. د (-33) او (-12) د جمعې حاصل چې (-45) کېږي، په دریمه کرښه کې لیکو.

8. د (-45) او (-4) د ضرب حاصل چې 180 کېږي، تر 18 لاندې په دویمه کرښه لیکل شوی دی.

9. د 180 او 18 د جمعې حاصل 198 په دریمه کرښه کې دی، 198 باقی مانده دی او $4x^3 - 4x^2 + 3x - 45$ د وېش حاصل دی.

$$Q(x) = 4x^3 - 4x^2 + 3x - 45 \text{ او } R = 198$$

$$P(x) = (4x^3 - 4x^2 + 3x - 45)(x + 4) + 198$$

پاتې + (د وېش حاصل) X (مقسوم علیه) = مقسوم

فعالیت

د وېش عمليې د سرته رسولو په مرسته د پورتنۍ پوښتنې د وېش حاصل او باقی مانده پیدا کړئ.

دویم مثال: د ترکیبي وېش او د وېش د عمليې د سرته رسولو په مرسته یې د وېش حاصل او باقی مانده پیدا کړئ.

$$(4x^4 - 5x^2 + 2x - 3) \div (x - 2)$$

په یاد ولرئ کوم حدونه چې موجود نه وي، د هغوی د ضریبونو پر ځای صفر لیکو یا په بل عبارت پولینوم د مکمل پولینوم په شکل په نزولي ډول ترتیبوو.

4	0	-5	2	-3	2
	8	16	22	48	
4	8	11	24	45	

اوس د وېش عملیه سرته رسوو:

$$\begin{array}{r}
 4x^4 \quad -5x^2 + 2x - 3 \\
 -4x^4 \mp 8x^3 \\
 \hline
 8x^3 - 5x^2 \\
 -8x^3 \mp 16x^2 \\
 \hline
 11x^2 + 2x \\
 -11x^2 \mp 22x \\
 \hline
 24x - 3 \\
 -24x \mp 48 \\
 \hline
 45
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 x - 2 \\
 \hline
 4x^3 + 8x^2 + 11x + 24
 \end{array}$$

د وېش حاصل $4x^3 + 8x^2 + 11x + 24$ او باقي (45) ده.

دریم مثال: $(x^5 - x^3 + 27x^2 - 28) \div (x + 3)$ د ترکیبي وېش په مرسته یې د وېش حاصل او پاتې (باقي) پیدا کړئ.

$$\begin{array}{r}
 x^5 - x^3 + 27x^2 - 28 = x^5 - 0 \cdot x^4 - x^3 + 27x^2 + 0 \cdot x - 28 \\
 \begin{array}{r}
 1 \quad 0 \quad -1 \quad 27 \quad 0 \quad -28 \\
 -3 \quad 9 \quad -24 \quad -9 \quad 27 \\
 \hline
 1 \quad -3 \quad 8 \quad 3 \quad -9 \quad -1
 \end{array}
 \end{array}$$

د وېش حاصل (خارج قسمت) یې $x^4 - 3x^3 + 8x^2 + 3x - 9$ او پاتې (باقي مانده) عبارت له (-1) څخه دی.

څلورم مثال: د $(2t^3 - 7t^2 - 2t + 14) \div (2t - 3)$ د وېش حاصل (خارج قسمت) او پاتې (باقي) پیدا کړئ.

$$\begin{array}{r}
 2 \quad -7 \quad -2 \quad 14 \\
 3 \quad -6 \quad -12 \\
 \hline
 2 \quad -4 \quad -8 \quad 2
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 \frac{3}{2} \\
 \hline
 \frac{2t-3}{2} = t - \frac{3}{2} \\
 t - \frac{3}{2} = 0 \\
 t = \frac{3}{2}
 \end{array}$$

نو $2t^2 - 4t - 8$ د وېش حاصل نه دی، بلکې د وېش حاصل $(t^2 - 2t - 4)$ دی. (مقسوم او مقسوم علیه دواړه په 2 وېشل شوي دي).

پنځم مثال: د ترکیبي وېش (Synthetic division) په مرسته د وېش حاصل (quotient) او پاتې پې (remainder) پیدا کړئ.
 $(4V^3 - 2V^2 + 5) \div (V - 5)$

$$\begin{array}{r|rrrr} 4 & -2 & 0 & 5 & \\ & 20 & 90 & 450 & \\ \hline 4 & 18 & 90 & 455 & \end{array}$$

نو $Q(x) = 4v^2 + 18v + 90$ او $R = 455$ ده.

فعالیت

د ترکیبي وېش په مرسته یې د وېش حاصل او پاتې پیدا کړئ.
 $(x^5 + 6x^3 - 5x^4 + 5x - 15) \div (x - 3)$

که د $P(x)$ پولینوم پر $(x-a)$ باندې ووېشو، نو مقسوم د مکمل نزولي پولینوم په شکل ترتیبوو او د ترکیبي وېش په مرسته یې د وېش د عملیې له سرته رسولو پرته د وېش حاصل او باقی مانده لاس ته راوړلای شو چې د وېش د حاصل درجه د یوه په اندازه د مقسوم علیه له درجې څخه کمه ده.

پوښتنې

1- د ترکیبي وېش په مرسته یې د وېش حاصل او باقی مانده پیدا کړئ.

$$(10x^2 + 2x + 1) \div (x + 1) \qquad (2x^3 - 7x^2 - 2x + 12) \div (2x - 3)$$

$$(5x^3 - 3x + 7) \div (x + 4) \qquad (6x^2 + 15) \div (4x + 9)$$

$$(6p^3 + 2p^2 - p + 20) \div \left(p - \frac{1}{2}\right)$$

2- د ترکیبي وېش په مرسته یې پاتې (باقي مانده) او د وېش حاصل پیدا کړئ.

$$(y^5 - 17y^3 - 9) \div (y - 3) \qquad , \qquad (4x^3 - 2x^2 + 5) \div (x - 5)$$

$$(x^3 + 8x^2 + 8x + 7) \div (x + 7)$$

د ترکیبي وېش په مرسته د پولینوم د فکتور او د پولینوم د قیمت پیدا کول

$$\begin{array}{r}
 1 + 2 - 5 - 6 \\
 - 1 - 1 + 6 \\
 \hline
 1 \quad 1 - 6 \quad 0
 \end{array}
 \quad \boxed{-1}$$

آیا د ترکیبي وېش په مرسته ویلای شئ چې

$$(x+3) \text{ د } x^3 + 9x^2 + 27x + 27$$

پولینوم یو فکتور دی؟

لومړی مثال: د ترکیبي وېش په مرسته وښایست چې $(x-1)$ د

$$P(x) = 2x^4 - x^3 - x^2 + x - 1$$

پولینوم یو فکتور دی.

$$\begin{array}{r|rrrrr}
 2 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\
 & 2 & 1 & 0 & 1 & \\
 \hline
 2 & 1 & 0 & 1 & 0 &
 \end{array}$$

څرنګه چې $R = 0$ دی، نو $(x-1)$ ددې پولینوم یو فکتور دی. یا دا چې:

$$2x^4 - x^3 - x^2 + x - 1 = (x-1)(2x^3 + x^2 + 1)$$

یا د باقي مانده قضیې په مرسته:

$$P(1) = 2 \cdot 1^4 - 1^3 - 1^2 + 1 - 1 = 2 - 1 - 1 + 1 - 1 = 0$$

دویم مثال: آیا $(x+10)$ د $x^3 + 3x^2 - 150$ پولینوم یو فکتور دی او که نه؟

$$\begin{array}{r|rrrr}
 1 & 3 & 0 & -150 & \\
 & -10 & 70 & -700 & \\
 \hline
 1 & -7 & 70 & -850 &
 \end{array}$$

څرنګه چې $R = -850$ دی ($R \neq 0$)، نو $(x+10)$ د $x^3 + 3x^2 - 150$ پولینوم فکتور نه دی.

دریم مثال: که $P(x) = 3x^3 - 12x^2 + 25 + 5x$ وی، د $x = 2$ لپاره د ترکیبي وېش په مرسته ددې پولینوم قیمت پیدا کړئ.

حل: لومړۍ پولینوم په نزولي ډول ترتیبوو.

$$P(x) = 3x^3 - 12x^2 + 5x + 25$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 3 & -12 & 5 & 25 & \\ & 6 & -12 & -14 & \\ \hline 3 & -6 & -7 & 11 & \end{array}$$

نو: $P(2) = 11$ دی.

فعالیت

د ترکیبي وېش په مرسته د $P(x) = x^3 - x^2 + 10x + 5$ پولینوم قیمت د $x = 1$ او $x = 3$ لپاره پیدا کړئ.

څلورم مثال: د ترکیبي وېش په مرسته وښیاست چې $(r - 4)$ د $r^4 - 256$ یو فکتور دی.

$$r^4 - 256 = r^4 + 0 \cdot r^3 + 0 \cdot r^2 + 0 \cdot r - 256$$

حل:

$$r - 4 = 0$$

$$r = 4$$

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 0 & 0 & 0 & -256 & \\ & 4 & 16 & 64 & 256 & \\ \hline 1 & 4 & 16 & 64 & 0 & \end{array}$$

$$Q(x) = r^3 + 4r^2 + 16r + 64$$

$$R = 0$$

نو $(r - 4)$ د $r^4 - 256$ یو فکتور دی.

د ترکیبي وېش په مرسته د یوې معادلې د جذرونو پیدا کول:

پنځم مثال: که د (1) عدد د $x^3 + 4x^2 + x - 6 = 0$ معادلې یو جذر وي، د ترکیبي وېش په مرسته یې نور جذرونه پیدا کړئ.

حل:

$$\begin{array}{cccc|c}
 1 & 4 & 1 & -6 & \\
 & 1 & 5 & 6 & 1 \\
 \hline
 1 & 5 & 6 & 0 &
 \end{array}$$

نود وېش حاصل يې $x^2 + 5x + 6$ دی.

$$x^3 + 4x^2 + x - 6 = (x - 1)(x^2 + 5x + 6)$$

$$x^2 + 5x + 6 = 0$$

$$(x + 3)(x + 2) = 0$$

$$x = -3 \quad x = -2$$

د دې معادلې دوه نور جذرونه -2 او -3 دي.

د ترکیبي وېش په مرسته د پولینوم فکتور، د پولینوم قیمت او د پولینومي معادلې جذر پیدا کولای شو، که چېرې د $P(x)$ پولینوم په $(x - a)$ ووېشو او $(R = 0)$ وی، نو $(x - a)$ د دې پولینوم یو فکتور دی او د (a) عدد د $P(x) = 0$ پولینومي معادلې یو جذر دی.

پوښتنې

1- د ترکیبي وېش په مرسته وښیاست چې $(x + \frac{1}{2})$ د $20x^3 + 7x + 6$ پولینوم یو فکتور دی

او $(x + 1)$ د $x^4 - 2x^2 + x + 2$ پولینوم یو فکتور دی.

2- آیا $(x - 0, 1)$ د $10x^3 - 11x^2 + 1$ د پولینوم یو فکتور دی؟ ولې؟

3- د ترکیبي وېش په مرسته د $y^3 - 6y^2 + y - 6$ پولینوم قیمت د $y = 6$ لپاره پیدا کړئ.

4- که (1) د $x^3 + x^2 - 10x + 8 = 0$ معادلې یو جذر وي، د ترکیبي وېش په مرسته یې نور جذرونه پیدا کړئ.

5- که د (-2) عدد د $x^3 + 4x^2 + kx + 8 = 0$ معادلې یو جذر وي، د ترکیبي وېش په مرسته د k قیمت پیدا کړئ؟

د څپرکي لنډيز

- الجبري افادې په درې ډوله دي (ناطقه الجبري افاده، غیر ناطقه الجبري افاده، پولینومي الجبري افاده).
- هغه حدونه چې متحولونه او درجې یې سره مساوي وي، مشابه حدونه (Like terms) نومېږي، لکه: $3x^2$ او $5x^2$ یا $4x^2y^2$ او $-6x^2y^2$ - مشابه حدونه دي.
- پولینوم هغه یو یا څو حده الجبري افاده ده چې د حروفو توانونه یې د مکملو عددونو په سټ کې شامل وي.
- د یوه پولینوم درجه چې له یوه توري (متحول) څخه جوړ شوی وي، د هغه توري له لوړ توان څخه عبارت ده او که له یوه څخه د زیاتو تورو څخه جوړ شوی وي، د زیات توان لرونکي مونوم درجه ددې پولینوم درجه ده.
- د یوه حد عددي فکتور (Numerical Factor) ته ضریب وايي، لکه: په $3x^2$ کې 3 د x^2 ضریب دی.
- ټول ثابت عددونه پولینومونه دي چې ثابت پولینومونه نومېږي او درجه یې صفر ده، د صفري پولینوم درجه تعریف شوې نه ده.
- هغه پولینومونه چې یو متحول ولري او د مشابه حدونو ضریبونه یې سره مساوي وي، د معادلو پولینومونو په نوم یادېږي.
- د متحول په راکړ شوي قیمت کې د یوه پولینوم قیمت هغه عدد دی چې په پولینوم کې د متحول د راکړل شوي قیمت له وضع کېدو څخه په لاس راځي.
- هغه پولینومونه چې د متحول له لوړ توان څخه تر ثابت عدده پورې، ټول حدونه په کې موجود وي، مکمل پولینوم او که یو یا څو حدونه، ونه لري، د ناقص پولینوم په نوم یادېږي.
- که د یوه پولینوم متحول له ټیټ توان څخه تر لوړ توان پورې ترتیب شي، منظم صعودي او که له لوړ توان څخه تر ټیټ توان پورې ترتیب شي، منظم نزولي پولینوم نومېږي.
- د پولینوم د جمعې په عملیه کې مشابه حدونه (Like terms) یو له بل سره جمع کېږي، د تفریق

- په عملیه کې د مفروق علامې ته تغیر ورکولو او نوره عملیه د جمعې د عملیې په شان سرته رسول کېږي (د مفروق جمعي معکوس له مفروق منه سره جمع کېږي).
- د پولینومونو د جمعې او ضرب په عملیو کې د تبدیلی او اتحادي خاصیتونه او هم د ضرب توزیعي خاصیت پر جمع باندې صدق کوي.
 - د ضرب په عملیه کې کولای شو، مونوم په مونوم کې، مونوم په پولینوم کې او یا پولینوم په پولینوم کې ضرب کړو.
 - په همدې ډول کولای شو، د وېش په عملیه کې مونوم پر مونوم، پولینوم پر مونوم یا پولینوم پر پولینوم باندې ووېشو.
 - که د $P(x)$ پولینوم پر $(x - a)$ ووېشو د باقی مانده قضیې په اساس پاتې (باقي) له $P(a)$ سره مساوي ده.
 - که د $P(x)$ پولینوم پر $(x - a)$ ووېشو او باقی صفر شي، نو $(x - a)$ د $P(x)$ د پولینوم یو فکتور دی.
 - د فکتور د معکوسې قضیې په اساس که $(x - c)$ د $M(x)$ پولینوم یو فکتور وي، نو $P(c) = 0$ او د c عدد د $M(x) = 0$ پولینومي معادلې یو جذر دی.
 - د ترکیبي وېش په مرسته کولای شو چې که $P(x)$ پولینوم پر $(x - a)$ ووېشو، د وېش حاصل او باقی لاس ته راوړو او هم د ترکیبي وېش په مرسته د متحول په راکړ شوي قیمت کې د $P(x)$ د پولینوم قیمت پیدا کولای شو.
 - د ترکیبي وېش په مرسته $P(x) = 0$ د پولینومي معادلې جذرونه پیدا کولای شو.
 - د باقی مانده قضیې په مرسته الجبري افاده هم تجزیه کولای شو.

د څپرکي پوښتنې:

1- د k قیمت په داسې حال کې پیدا کړئ چې:

a: که $(x+5)$ د $P(x) = x^3 + kx + 125$ پولینوم یو فکتور وي.

b: که $(x-1)$ د $Q(x) = 2x^4 - 3x^3 - x - 2k$ پولینوم یو فکتور وي.

c: که $(x-2)$ د $P(x) = x^3 + 3x^2 - x + k$ پولینوم یو فکتور وي.

2- د ترکیبي وېش په مرسته یې د وېش حاصل (Quotient) او پاتې (Remainder) پیدا کړئ.

$$(x^5 + 4x^4 + x^2 - 3x - 28) \div (x + 4), \quad (5x^4 - 6x^2 + 3x - 4) \div (x + 4)$$

$$(30x^3 - 20x^2 - 100x + 1000) \div (x - 10), \quad (10x^2 - 31x + 24) \div (x - \frac{3}{2})$$

3- د فکتور د قضیې په مرسته وښایست چې $(x-1)$ د $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 2$ پولینوم یو فکتور دی.

4- د فکتور د قضیې په مرسته وښایست چې $(x - \frac{1}{2})$ د $P(x) = x^3 - \frac{1}{8}$ پولینوم یو فکتور دی.

5- د ترکیبي وېش په مرسته د $x = -\frac{1}{2}$ لپاره د $P(x) = 5x^2 + x - 9$ پولینوم قیمت پیدا کړئ.

6- د ترکیبي وېش په مرسته د $x = 3$ لپاره د $k(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x + 1$ پولینوم قیمت پیدا کړئ.

7- د ترکیبي وېش په مرسته وښایست چې د 3 عدد د $x^3 - 3x^2 + x - 3 = 0$ پولینومي معادلې یو حل (جذر) دی.

8- د فکتور د قضیې په مرسته وښایست چې د 1 او 2 عددونه د $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ معادلې حلونه (جذرونه) دي.

9- د ترکیبي وېش په مرسته د k قیمت پیدا کړئ چې که $(x+3)$ د

$$P(x) = 3x^3 + kx^2 - 22x + 24$$

10- د ترکیبي وېش په مرسته یې د وېش حاصل او باقی پیدا کړئ.

$$(4x^4 - 5x^2 + 2x - 3) \div (x - 2) \quad (x^3 - x^2 - 14x + 11) \div (x - 4)$$

$$(7x^4 + 41x^2 - 6) \div (x + 6) \quad (5x^3 - 3x + 7) \div (x + 4)$$

11- د b او c قیمتونه په داسې حال کې پیدا کړئ چې که $P(x) = x^4 + 6x^3 - 20x^2 + bx + c$

پولینوم پر $x^2 - 3x + 2$ ووېشو، باقي صفر شي.

12- د m قیمت په داسې حال کې پیدا کړئ چې که $k(x) = 2x^3 + 5x^2 - mx + 4$

پولینوم پر $(x^2 + 2x - 1)$ ووېشو او باقي صفر شي.

13- که $k = 3a(x - 1)^2 - a(x - 1) - 4$ او $L = 16 + b(x - 1) - 3b(x - 1)^2$ وي

$Kb + La$ پیدا کړئ.

14- د x په کوم قیمت د $P(x) = 12x^4 + 3x^3 - 13x^2 + x + 5$ پولینوم پر $(3x^2 - 1)$

پوره وېشل کېږي؟

15- د P د کوم قیمت لپاره د $K(x) = 3x^3 - 7x^2 - 9x + P$ پولینوم پر $(x - 13)$ پوره

د وېشلو وړ دی؟

16- که د $P(x) = 2x^3 - x^2 + 3x - 1$ پولینوم پر $(2x + 1)$ ووېشل شي، د وېش د عملیې

د سرته رسولو پرته ویلای شئ چې پاتې (باقي مانده) به څومره وي؟

a) -3 b) $-\frac{3}{2}$ c) 3 d) $\frac{7}{2}$

17- د m قیمت به څو وي، که د $P(x) = 5x^2 + 6x - 7$ پولینوم پر $(x + m)$ ووېشل شي

تر څو باقي مانده (1) شي؟

a) 2 b) $\frac{-4}{5}$ c) -4 d) a او b سم دي

18- که د $P(x) = x^3 + 3x^2 - 5x - 8$ پولینوم، پر $(x + 3)$ ووېشل شي د وېش د عملیې

له سرته رسولو پرته وویاست چې باقي څومره ده؟

a) صفر b) 13 c) -23 d) 7

19- که چېرې $x = 4$ ، $y = -3$ او $z = 2$ وي، د لاندې الجبري افادو قیمت پیدا کړئ.

$$a : x^2yz + zxy^2 + 3xyz^2 \qquad b : \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}y^2 + \frac{1}{4}Z^2$$

20 - د x د راکړل شوو قیمتونو لپاره د ترکیبي وېش په مرسته د لاندې پولینومو قیمتونه پیدا کړئ.

$$P(x) = 2x^3 + 3x^2 - 2x + 5, \quad x = 2$$

$$P(x) = 3x^3 + 4x^2 - 5x + 6, \quad x = -1$$

$$P(x) = 2x^4 - 5x^3 + 4x - 1, \quad x = 1$$

$$P(x) = 4x^4 + 6x^3 + x^2 + x - 3, \quad x = -2$$

21 - د لاندې معادلو یو، یو جذر راکړل شوی دی، د ترکیبي وېش په مرسته یې نور جذرونه پیدا کړئ.

$$x^3 - 3x^2 + x - 3 = 0 \quad \text{یو جذر یې (3) دی.}$$

$$x^3 - 5x^2 + 7x + 13 = 0 \quad \text{یو جذر یې (-1) دی.}$$

$$x^4 - 5x^2 + 4 = 0 \quad \text{یو جذر یې (-1) دی.}$$

$$x^4 - x^3 - 9x^2 - 11x - 4 = 0 \quad \text{یو جذر یې (-1) دی.}$$

22 - که $P(x) = 0$ وي، د دې پولینوم درجه څو ده؟

تعریف شوې نه دی d) صفر c) -1 b) 1 a)

23 - د هغه مستطیل له مساحت څخه چې بعدونه یې $(x+5)$ او $(x+2)$ وي، د هغه مستطیل مساحت تفریق کړئ چې بعدونه یې $(x+3)$ او $(x+1)$ وي.

24 - که $A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ او $a = 13$, $b = 5$, $c = 12$ او $p = \frac{a+b+c}{2}$ وي، د A قیمت پیدا کړئ.

25 - که $(x-1)^3$ او $x^3 + ax^2 + bx + c$ معادل پولینومونه وي، د b قیمت مساوي دی په:

a) 1 b) 3 c) -3 d) -1

26 - د $(a - \frac{2}{a-1}) (a \div \frac{a+1}{a-1})$ افادې حاصل مساوي دی په:

$$a) a(a+1) \quad b) a(a-2) \quad c) \frac{a-2}{a} \quad d) \frac{a-1}{a}$$

د ضرب حاصل مساوي دی په: $(\sqrt{x} + \sqrt{y})(\sqrt{x} - \sqrt{y})(x+y)$

$$a) x^2 - y^2 \quad b) x^2 + y^2 \quad c) 2x^2 - y \quad d) x - y$$

28 - لاندې پولینومونه په نزولي ډول (Descending Order) ترتیب او هم وویاست چې درجې یې څو دي؟

$$a) -5x^2 + 3x^5 + 9 \quad b) -x^2 + xy^2z^3 - x^5 \quad c) 3$$

29 - د $Q(x) = x^2 + 3x - 5$ په پولینوم کې $Q(-1)$ مساوي دی، په:

$$a) 7 \quad b) -7 \quad c) 1 \quad d) -1$$

30 - که $P(x) = x^2 - 2x + 3$ او $Q(x) = 2x^2 + 3x - 1$ وي، د لاندې افادو قیمتونه پیدا کړئ.

$$P(x) - Q(x) \quad P(0) + Q(0) \quad P(1) - Q(-1)$$

$$P(x) - P(x) \quad [P(x) + Q(x)] + p(x)$$

31 - لاندې پولینومونه نظر y ته په نزولي ډول ترتیب کړئ.

$$4x^2y - 3xy^2 + x^3 + y^3 \quad 4xy^3 - 3x^3y + 2x^2y^2 + x^4 + y^4$$

32 - په لاندې الجبري افادو کې پولینومونه، ناطقې الجبري افادې او غیر ناطقې الجبري افادې په نښه کړئ.

$$13, \quad \sqrt{2}x, \quad 0, \quad \frac{3x^2}{2}, \quad \sqrt{x} - \frac{1}{x}, \quad y^2 - \frac{1}{y^2}$$

33 - د $(1 + 2x + 3x^2) + (3x - 5 - 2x^2) + (-x^2 - 5x + 4)$ افادې حاصل مساوي دی په:

$$a) 1 \quad b) \text{ صفر} \quad c) -1 \quad d) 2$$

34 - د دوو الجبري افادو د ضرب حاصل $(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc)$ دی. که یوه افاده یې $(a + b + c)$ وي، بله افاده پیدا کړئ.

35 - د وېش حاصل يې پيدا کړئ.

$$\begin{array}{ll} (12x^4 + 3x^3 - 13x^2 + x + 5) \div (3x^2 - 1) & (a^3 + b^3) \div (a + b) \\ (4x^3 - 10x^2 + 12x + 6) \div (2x + 1) & (a^5 - b^5) \div (a - b) \\ \frac{x^{a-2}}{x} & \frac{-m^a}{m^b} \end{array}$$

36 - ضرب يې کړئ.


$$\begin{array}{ll} (a^{2x} - 2)(a^{2x} - 2) & (\frac{1}{4}x + \frac{1}{2})(\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}) \\ (e^x + 1)(e^x - 1) & (m^2 - 2n^2)(2m^2 - n^2) \\ (0.1x^2)(0.1x^2)(0.1x^2) & (2\frac{1}{2}mn)(2\frac{1}{2}mn)(2\frac{1}{2}mn) \end{array}$$

37 - لومړی لاندې افادې ساده او بيا يې جمع کړئ.

$$\begin{array}{ll} (a - 1) + 1 - (a - 1) - 3 & -(10mn - m) - (m^2 + m) + m^2 \\ (y^2 - 1) + (y^2 - 1) & [-4(a - b) - 5] + [(2a + b) - (a - b)] \\ 10[-\{(x^2 - 1) + 5\} - x(x - 2)] & 10(x + 1) - (x + 1) - 3(x + 2) \\ mn - 4 + mn - 5 & \end{array}$$

38 - دکومې لاندینې راکړل شوي یو حده درجه صفر ده؟


$$\begin{array}{lll} \text{a) } x & \text{b) } \sqrt{2} x & \text{c) } \sqrt{2} \end{array}$$



دویم خیرکی رابطه

$$\begin{array}{c} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_n \\ \mathbf{S} \end{array} \times \begin{array}{c} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_n \\ \mathbf{S} \end{array} = \begin{array}{c} (s_1, s_2) \\ (s_2, s_2) \\ \vdots \\ (s_n, s_n) \\ \mathbf{R} \end{array}$$

مرتبې جوړې او کارټيزيني مستوي



- د (a, b) مرتبه جوړه په کوم حالت کې د (c, d) له مرتبې جوړې سره مساوي کېدای شي؟
- آیا د (a, b) مرتبه جوړه د (b, a) له مرتبې جوړې سره مساوي ده؟

که a او b د یوه سټ او یا د مختلفو ستونو عناصرو وي او a ته لومړنی عنصر او b ته دویم عنصر ووايو، نو (a, b) ته مرتبه جوړه وايي او (b, a) هم یو مرتبه جوړه ده، خو $(a, b) \neq (b, a)$ د (a, b) مرتبه جوړه په هغه صورت کې د (c, d) له مرتبې جوړې سره مساوي کېدای شي چې $a=c$ او $b=d$ وي.

لومړی مثال: که $(x-2, y+1) = (1, 3)$ وي د x او y قیمتونه پیدا کړئ.

$$y+1=3$$

$$\boxed{y=2}$$

$$x-2=1$$

$$\boxed{x=3}$$


فعالیت

که $(a+1, 2b-3) = (0, -1)$ وي، د a او b قیمتونه پیدا کړئ.


کارټيزيني مستوي (Cartesian Plane)

دوه، عمود او افقي خطونه رسم کړئ او د تقاطع ټکي ته یې مبدأ (Origin) وایي، افقي خط ته د X محور او عمود خط ته د Y محور وایي. د $X'OX$ او د $Y'OY$ سره وېش، هغه مستوي چې دا محورونه په کې واقع دي د کارټيزيني مستوي په نامه یادېږي. دواړه محورونه مستوي په څلورو برخو وېشي چې هرې برخې ته یې ربع (ناحیه) (Quadrant) وایي.

وايي، د ساعت د عقربې د حرکت په مخالف جهت (Anti clockwise) په ترتيب سره لومړنۍ دويمه، دريمه او څلورمه ربع ده، لکه: څنگه چې په شکل کې ليدل کېږي.




په دې مستوي کې د P د نقطې موقعيت د (x, y) د حقيقي عددونو د مرتبې جوړې په واسطه داسې ښودل کېږي چې د P د نقطې افقي فاصله د Y له محور څخه x او د P د نقطې عمودي فاصله د x له محور څخه y ده.




که د P نقطه د Y د محور ښي خواته واقع وي، د x قيمت مثبت دی او که د Y د محور کښي خواته واقع وي، د x قيمت منفي دی او که د P نقطه د Y پر محور پرته وي $x = 0$ دی.

همدارنگه که د P نقطه د X له محور څخه پورته واقع وي، د y قيمت مثبت او که د X له محور څخه لاندې واقع وي د y قيمت منفي دی. $(y < 0)$ او که د p نقطه د X پر محور پرته وي، $y = 0$ کېږي، په لنډ ډول په شکل کې ښودل شوي دي




چې x او y ته کارټيزيني مختصات (Cartesian Coordinates) وايي چې په $P(x, y)$ کې لومړنۍ عنصر x ته فاصله (abscissa) او دویم عنصر y ته ترتیب (Ordinate) وايي چې د مختصاتو مبدا $(0, 0)$ ده، څرګنده ده چې د حقيقي عددونو (x, y) د هرې مرتبې جوړې لپاره په مستوي کې يوه نقطه او د مستوي د هرې نقطې لپاره د حقيقي عددونو يوه جوړه شته دی.

دویم مثال: د $M(-6, 0)$, $N(5, 0)$, $T(0, 2)$, $K(-2, 4)$, $P(-3, -5)$ نقطې د وضعيه کمياتو په مستوي کې وټاکئ.



درېم مثال: د هرې نقطې لپاره چې په لاندې شکل کې ښودل شوي دي، اړونده مرتبه جوړه وليکئ.



فعاليت

د $(2, -1)$, $(-1, 2)$, $(-2, -1)$, $(2, 1)$, $(2, 0)$ او $(0, 1)$ نقطې د وضعيه کمياتو په سيستم کې وټاکئ.

پوښتنې

1 - که د P د نقطې فاصله مثبت او ترتیب یې منفي وي، د P نقطه په کومه ربع کې واقع ده؟

2 - که د یوه شکل څلور رأسونه $A(3,3)$, $B(-3,3)$, $C(-3,-3)$ او $D(3,-3)$ وي، دا کوم ډول هندسي شکل دی؟


3 - د وضعیه کمیاتو په مستوي کې هغه مثلث چې رأسونه یې $A(2,0)$, $B(0,2)$ او $C(0,0)$ وي رسم کړئ او وویاست چې دا کوم ډول مثلث دی؟

4 - د $P_3(1,5)$, $P_2(-3,2)$, $P_1(2,-3)$ نقطې د وضعیه کمیاتو په سیستم کې وټاکئ.

5 - وویاست چې لاندې مرتبې جوړې په کومه ربع کې واقع دي؟

- | | | |
|------------------------------|---|--------------------|
| $(1,5)$ | , | $(-5,1)$ |
| $(-4,-6)$ | , | $(4,-5)$ |
| $(-\frac{1}{2},-2)$ | , | $(-\frac{1}{2},2)$ |
| $(2\frac{1}{2},\frac{1}{4})$ | , | $(2,0)$ |
| $(0,-1)$ | | |

د کارټیزي ضرب حاصل او گراف يې



آيا په مخامخ شکل کې $A \times B$ ښودلای
شي؟

فعاليت

که $A = \{1, 2, 3\}$ او $B = \{4, 5\}$ وي:

- $A \times B$ پيدا کړئ.
- د $A \times B$ د عناصرو شمېر پيدا کړئ.
- آيا $A \times B = B \times A$ دی؟
- آيا $A \times A$ او $B \times B$ پيدا کولای شي؟

که A او B دوه غیر خالي سټونه وي، $(A \times B)$ په لاندې ډول تعریف شوي دي:

$$A \times B = \{(x, y) | x \in A \wedge y \in B\}$$

په دې معنا چې د A او B د ضرب حاصل $(A \times B)$ داسې یو سټ دی چې عناصر یې د (x, y)

د هغه مرتبو جوړو سټ دی چې x د A د سټ او y د B د سټ عنصر وي، که $A \neq B$ وي نو:

$A \times B \neq B \times A$ دي که د A د سټ د عناصرو شمېر m او د B د سټ د عناصرو شمېر n

وي، د $A \times B$ د عناصرو شمېر له $(m \times n)$ څخه عبارت دی.

لومړی مثال: که $A = \{0, 1, 2\}$ او $B = \{3, 4\}$ وي $A \times B$ ، $B \times A$ او $A \times A$ پيدا کړئ.

حل

$$A \times B = \{0, 1, 2\} \times \{3, 4\} = \{(0, 3), (0, 4), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}$$

$$B \times A = \{3, 4\} \times \{0, 1, 2\} = \{(3, 0), (3, 1), (3, 2), (4, 0), (4, 1), (4, 2)\}$$

$$A \times A = \{0, 1, 2\} \times \{0, 1, 2\} = \{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 1), (2, 2)\}$$

فعالیت

که $A = \{-4, -1, 0\}$ او $B = \{1, 4\}$ وي $A \times A, A \times B$ او $B \times B$ پيدا کړئ.

دویم مثال: که $IN = \{1, 2, 3, \dots\}$ او $L = \{0\}$ وي، نو $IN \times L$ پيدا کړئ.

حل:

$$IN \times L = \{(1, 0), (2, 0), (3, 0), (4, 0), \dots\} = \{(x, 0) / x \in IN\}$$

درېم مثال: که $IN = \{1, 2, 3, \dots\}$ او $W = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ وي $W \times N$ پيدا کړئ.

حل:

$$W \times IN = \{(0, 1), (0, 2), (0, 3), \dots, (1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (2, 1), (2, 2), \dots, \}$$

$$= \{(x, y) / x \in W \wedge y \in IN\}$$

د کارټيزني حاصل ضرب گراف: (Graph of Cartesian Product)


کولای شو چې د کارټيزني ضرب حاصل د وضعيه کمياتو په مستوي کې هم وښودلای شو.

څلورم مثال: که $A = \{1, 2, 3\}$ او $B = \{4, 5\}$ وي $A \times B$ پيدا کړئ او د وضعيه کمياتو په

مستوي کې يې وښايست.

حل:

$$A \times B = \{(1, 4), (1, 5), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5)\}$$




د X پر محور د $1, 2, 3$ عددونه او د Y پر محور د 4 او 5 عددونه ټاکو له $1, 2$ او 3 څخه عمود خطونه او له 4 او 5 څخه افقي خطونه رسموو، ددې دواړو خطونو د تقاطع نقطې د $A \times B$ مرتبې جوړې ښکاره کوي.


پنجم مثال: که $A = \{1, 2\}$ او $B = \{2, 3, 4\}$ وي $A \times B$ او $B \times A$ پیدا کړئ او په شکل کې بې وښایست.

$$A \times B = \{1, 2\} \times \{2, 3, 4\} = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4)\}$$

$$B \times A = \{2, 3, 4\} \times \{1, 2\} = \{(2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2)\}$$



$A \times B$




$B \times A$

شپږم مثال: که $A = \{x / x \in \mathbb{R}, 0 \leq x \leq 3 = [0, 3]\}$ او $B = \{y / y \in \mathbb{R}, 0 \leq y \leq 2 = [0, 2]\}$ وي $A \times B$ په شکل کې بې وښایست.

حل

$$A \times B = \{(x, y) / 0 \leq x \leq 3 \wedge 0 \leq y \leq 2\}$$



فعالیت

که چېرې $A = \{1, 2\}$ او $B = \{3, 4\}$ وي $A \times B$ پیدا او په شکل کې بې وښایست.

پوښتنې

1 - که:

i) $B = \{2,4\}$

$$A = \{-1,1,3\}$$

ii) $B = \{2,3\}$

$$A = \{-1,1\}$$

وي $A \times B$ پیدا او په شکل کې یې وښیاست.

2 - د لومړۍ پوښتنې د ستونو لپاره $B \times A$ پیدا او په شکل کې یې وښیاست.

3 - که $A = \{1,2,3\}$ وي $A \times A$ پیدا کړئ.

4 - که $A = \{2,4,6\}$ او $B = \{1,3,5\}$ وي $A \times B, B \times A, A \times A$ او $B \times B$ پیدا کړئ



رابطه (Relation)

عطا الله د عزت الله ورور دی

(عطا الله R عزت الله)

ورورولي هم يوه رابطه ده.

یو سټ چې د شیانو او مفهومونو له مرتبو جوړو څخه جوړ شوی وي، له یوې رابطې څخه عبارت دی. یا که A او B دوه غیر خالي سټونه (non empty sets) وي، نو د $A \times B$ هر فرعي سټ له A څخه په B کې یوه رابطه ده، که $(a, b) \in R$ وي، ویل کېږي چې a له b سره رابطه لري او د (aRb) په شکل لیکل کېږي.

که R له A څخه په B کې یوه رابطه وي، نو $R \subset A \times B$ ده او که R د $A \times A$ یو فرعي سټ وي، نو R په A کې یوه رابطه ده.

لومړی مثال: که $A = \{x, y\}$ او $B = \{1, 2\}$ وي، $A \times B$ پیدا کړئ، او له A څخه په B کې څلور رابطې ولیکئ.

حل

$$A \times B = \{(x, 1), (x, 2), (y, 1), (y, 2)\}$$

$$R_1 = \{(x, 1), (x, 2)\}$$

$$R_2 = \{(y, 1)\}$$

$$R_3 = \{(y, 2)\}$$

$$R_4 = \{(x, 1), (y, 1)\}$$

چې د $A \times B$ د عناصرو شمېر څلور او د $A \times B$ د ټولو فرعي سټونو شمېر $2^4 = 16$ دی، نو له A څخه په B کې د ټولو رابطو شمېر 16 دي.

دویم مثال: که $A = \{1, 3, 5, \dots, 19\}$ چې د A د سټ د عناصرو شمېر 10 دی او $B = \{2, 4, 6\}$

وي چې د B د عناصرو شمېر (3) دی، د $A \times B$ د عناصرو شمېر (ټولې مرتبې جوړې)

$10 \times 3 = 30$ دي او له A څخه په B کې د ټولو رابطو شمېر 2^{30} دی.

پام مووي چې: ϕ او $A \times B$ هم په فرعي ستونو کې شامل دی.

درېم مثال: که $A = \{1, 2, 3\}$ او $B = \{a, b\}$ وي له A څخه په B کې (3) رابطې وليکئ.

حل:

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$$

درې رابطې عبارت دي له:

$$R_1 = \{(1, a), (1, b), (2, a), (3, a), (3, b)\}$$

$$R_2 = \{(1, b), (2, a), (3, a), (3, b)\}$$

$$R_3 = \{(2, a), (2, b), (3, a)\}$$

فعالیت

که $R = \{(x, y) / x + y = 5\}$ په $A = \{1, 2, 3, 4\}$ کې یوه رابطه وي، د R عناصر وليکئ.

څلورم مثال: که $R = \{(x, y) / x - y = 2\}$ په $A = \{1, 2, 3, 4\}$ کې یوه رابطه وي، د R عناصر وليکئ.

حل: $R = \{(3, 1), (4, 2)\}$ ده.

د رابطې د تعریف ساحه (Domain) او د قیمتونو ساحه (Range) یې:

پوهېږو چې که R له A څخه په B کې یوه رابطه وي، نو $R \subseteq A \times B$ ده، په دې معنا چې R یو سټ دی چې عناصر یې د (x, y) مرتبې جوړې دي چې $x \in A$ او $y \in B$ ده.

د R د تعریف ساحه د مرتبو جوړو لومړني عناصر دي چې په Dom_R سره ښودل کېږي. همدارنگه د R د قیمتونو ساحه (Range) د مرتبو جوړو دویمي عناصر دي، په Range_R سره ښودل کېږي.

لومړی مثال: که $A = \{1, 2\}$ او $B = \{x, y\}$ وي او له A څخه په B کې یوه رابطه وي، لومړی د دې رابطې عناصر ولېکئ، بیا د رابطې د تعریف ساحه (Dom_R) او د قیمتونو ساحه (Range_R) یې وليکئ.

حل

$$R = \{(1, x), (2, x), (1, y), (2, y)\}$$


$$\text{Dom}_R = \{1, 2\} \quad \text{Range}_R = \{x, y\}$$

دويم مثال: که د $R = \{(x, y) / x^2 + y^2 = 13\}$ رابطه د $A = \{-3, -2, 1, 2, 3\}$ په سټ کې تعريف شوي وي، لومړی د (R) عناصر د مرتبو جوړو په شکل وليکئ، (Dom_R) او (Range_R) پيدا کړئ او بيا يې گراف رسم کړئ.

$$R = \{(-3, -2), (-3, 2), (-2, -3), (-2, 3), (2, -3), (2, 3), (3, -2), (3, 2)\}$$

$$\text{Dom}_R = \{-3, -2, 2, 3\}$$

$$\text{Range}_R = \{-3, -2, 2, 3\}$$

**فعاليت**

که $R = \{(x, y) / y = 2x\}$ وي او د R د تعريف ناحیه $\{0, 4, 8\}$ وي، د R د قيمتونو ناحیه معلومه کړئ.

معکوسه رابطه (Inverse of a Relation)

که R له A څخه په B کې يوه رابطه وي، د R معکوس چې په R^{-1} سره ښودل کېږي او له

$$R^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in R\}$$

څخه عبارت ده:

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow (y, x) \in R^{-1}$$

د R د تعريف ساحه د R^{-1} د قيمتونو ساحه او د R^{-1} د تعريف ساحه د R د قيمتونو له ساحې څخه عبارت ده.

مثال: که $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$ د طبيعي عددونو په سټ کې يوه رابطه وي، د R د رابطې

معکوسه رابطه يا R^{-1} پيدا کړئ.

$$R^{-1} = \{(2, 1), (3, 2), (4, 3)\}$$

حل:

معادله رابطه (Equivalent Relation): د R رابطه د A په سټ کې يوه معادله رابطه ده، که درې لاندنې خاصیتونه ولري:

1- انعکاسي خاصیت (Reflexive Property): د هر عنصر $x \in A$ لپاره $(x, x) \in R$ وي يا $\forall x \in A \Rightarrow (x, x) \in R$

2- تناظري خاصیت (Symmetric Property): که $(x, y) \in R$ په R کې شامله وي، نو $(y, x) \in R$ هم په R کې شامله وي يا: $\forall (x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$

3 - انتقالي خاصیت (Transitive Property): که $(x, y) \in R$ او هم $(y, z) \in R$ وي په نتیجه کې $(x, z) \in R$ مرتبه جوړه هم په R کې شامله وي يا:

$$(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$$

مثال: د مساوات رابطه د حقيقي عددونو په سټ کې يوه معادله رابطه ده:

1- په حقيقي عددونو کې د هر x لپاره $x=x$ دی، $5=5$ (انعکاسي خاصیت)

2- د هر $x, y \in \mathbb{R}$ لپاره که $x=y$ وي، نو $y=x$ ده (تناظري خاصیت)

3- د هر $x, y, z \in \mathbb{R}$ لپاره که $x=y$ او $y=z$ وي په نتیجه کې $x=z$ دی (انتقالي خاصیت)

پوښتنې

1- که $A = \{1, 2\}$ او $B = \{0, 4, 6\}$ وي.

له A څخه په B کې درې رابطې وليکئ.

له B څخه په A کې څلور رابطې وليکئ.

په A کې څلور رابطې وليکئ.

2- که $A = \{1, 2, 3, 4\}$ او $B = \{1, 3, 5\}$ وي او $R = \{(x, y) | y < x\}$ ، له A څخه په B کې يوه رابطه وي، د R عناصر وليکئ.

3- که $R = \{(x, y) | y + 1 = 2x^2\}$ د طبيعي عددونو په سټ کې يوه رابطه وي او د تعريف ساحه يې ټول طبيعي عددونو وي، د قيمتونو ساحه (Range) يې پيدا کړئ.

دڅپرکي لنډيز

- (a, b) : چې دليکلو ترتيب په کې اهميت لري، مرتبه جوړه نومېږي چې a ته لومړنۍ مختصه او b ته دويمه مختصه وايي، په عمومي ډول $(a, b) \neq (b, a)$
- د (a, b) او (c, d) دوه مرتبې جوړې په داسې حال کې سره مساوي دي چې $a = c$ او $b = d$ وي.

- **د کارټيزيني ضرب حاصل**: د A او B دسټونو کارټيزيني ضرب چې په $A \times B$ سره ښودل کېږي په دې ډول تعريف شوي دي: $A \times B = \{(x, y) | x \in A \wedge y \in B\}$
- که د A سټ د عناصرو شمېر په m او د B د سټ د عناصرو شمېر په n سره وښايو، د $A \times B$ د عناصرو شمېر $m \times n$ دی.

- کولای شو چې د A او B ، دسټونو ضرب $(A \times B)$ د وضعيه کمياتو په مستوي کې وښايو.

- **رابطه**: د $A \times B$ هر فرعي سټ له A څخه په B کې د R يوه رابطه ده.
- $R \subset A \times A$ او که $R \subset A \times A$ وي، نو په دې صورت کې R په A کې يوه رابطه ده.

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow x R y$$

- که د A سټ د عناصرو شمېر په n سره وښايو، د A د فرعي سټونو شمېر 2^n دی.
- که د A سټ د عناصرو شمېر په m او د B دسټ د عناصرو شمېر په n سره وښايو له A څخه په B کې د رابطو شمېر $2^{m \times n}$ دی
- که R له A څخه په B کې يوه رابطه وي، د R د تعريف ساحه (Dom_R) د مرتبو جوړو د لومړنيو عناصرو سټ او د قيمتونو ساحه ($Range_R$) يې دمرتبو جوړو د دويمو عناصرو سټ دی.

- **معکوسه رابطه**: که R له A څخه په B کې يوه رابطه وي، د R معکوسه رابطه په R^{-1} سره ښودل کېږي چې:

$$R^{-1} = \{(y, x) | (x, y) \in R\}$$

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow (y, x) \in R^{-1}$$


- ښکاره خبره ده چې R^{-1} د تعريف ساحه د R د قيمتونو له ساحې سره او د R^{-1} د قيمتونو ساحه د R د تعريف له ساحې سره مساوي ده.

- **معادله رابطه**: د R د A په سټ کې يوه معادله رابطه ده که چېرې لاندې درې خاصيتونه ولري.

- 1- انعکاسي خاصيت.
- 2- تناظري خاصيت.
- 3- انتقالي خاصيت.

دڅپرکي پوښتنې

- 1- که $A = \{1, 3, 5\}$ او $B = \{2, 4, 6\}$ وي $A \times B$, $B \times A$ او $A \times A$ پيدا کړئ.
- 2- که $A = \{1, 2, 3\}$ او $B = \{0, 1\}$ وي $A \times B$ په شکل کې وښايست.
- 3- که $(x - 2y, 2x + y) = (3, 1)$ وي د x او y قيمتونه پيدا کړئ.
- 4- په $A = \{1, 3, 5\}$ کې د R رابطه داسې په لاس راوړئ چې R د مساوات رابطه وي.
- 5- که $A = \{a, b\}$ وي د A^2 عناصر وليکئ.
- 6- که د $R = \{(x, y) | y = x^2\}$ رابطه د حقيقي عددونو په سټ کې تعريف شوي وي د R رابطې گراف رسم کړئ.
- 7- که $R = \{(x, y) | y^2 = x\}$ رابطه د حقيقي عددونو په سټ کې تعريف شوي وي د R د رابطې گراف رسم کړئ.
- 8- که $R = \{(1, -1), (2, -2), (3, -3)\}$ وي د R^{-1} د تعريف او قيمتونو ساحې وټاکئ.
- 9- که $R = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5)\}$ وي د R او R^{-1} د تعريف او قيمتونو ساحې وټاکئ.
- 10- که $A = \{3, 6, 12\}$ او $B = \{-1, 0\}$ وي په A کې د رابطو شمېر او له A څخه په B کې درابطو شمېر پيدا کړئ.
- 11- که د $(4a + 1, 2b + a)$ او $(5, 3a - 4b)$ دوه مرتبي جوړي سره مساوي وي د a او b قيمتونه پيدا کړئ.
- 12- که $A = \{a, b, c\}$ او $B = \{x, y\}$ وي $A \times B$ او $B \times A$ پيدا کړئ.



دریم خیرکی تابع

$x=0, 1, 2, 3$




Function:
 $y = x^3$



$y=0, 1, 8, 27$

تابع (function)



آيا تابع او رابطه يو له بله سره توپير لري؟

فعاليت

- آيا هره تابع يوه رابطه ده او هره رابطه يوه تابع ده؟
- آيا د مرتبو جوړو هر سټ يوه تابع ده؟
- آيا کولای شئ چې يوې تابع ته د يو ماشين په شان فکر وکړئ؟

د لومړي ځل لپاره د تابع مفهوم د يوه الماني رياضي پوه ليبنز (Leibniz)، (1646–1716) له خوا معرفي شوه.

تابع يوه رابطه يا يوه قاعده ده چې يو کميت ته د بل کميت سره اړيکه ورکوي، د تابع د مفهوم د ښه پوهيدو لپاره لاندې مثالونه تر غور لاندې ونيسئ.

1 - د يوې مربع مساحت (A) د مربع په ضلعې (x) پورې اړه لري. هغه معادله چې د مربع مساحت ته د مربع په ضلعې پورې اړيکه ورکوي له $A = x^2$ څخه عبارت ده.

x د مربع ضلع	1	2	3	4	5	...
A د مربع مساحت	1	4	9	16	25	...

يا په بل عبارت د مربع مساحت د مربع د ضلعې تابع دی يا $A = f(x)$

2 - د نړۍ د نفوسو شمېر (P) په وخت (t) پورې اړه لري، لکه: څرنگه چې په لاندې جدول کې ليدل کېږي په تقريبي ډول د نړۍ د نفوسو شمېر د ميليون په حساب ښودل شوی دی.

کال (t)	1900	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1980	1990	2000
نفوس په ميليون (P)	1650	1750	1860	2070	2300	2560	3040	3710	4450	5280	6080

لیدل کېږي چې نفوس (Population) یا P د وخت (t) تابع ده یا $p = f(t)$

3 - د دایرې مساحت (A) ، د دایرې په شعاع (r) پورې اړه لري ($A = \pi r^2$)


4 - د کرې حجم (V) د کرې په شعاع (r) پورې اړه لري چې د $V = \frac{4}{3} \pi r^3$ د معادلې په واسطه ښودل کېږي.

له پورتنیو مثالونو څخه دا نتیجه اخیستل کېږي چې د تابع په مفهوم کې اړیکه مرکزي حیثیت لري د مثال په ډول د هر انسان عمر له یوه عدد سره اړیکه لري، په یوه مغازه کې هر جنس له یوه ټاکلي قیمت سره اړیکه لري، هر موټر د یوې ټاکلې شمېرې جوازسېر پورې اړه لري او د هر عدد مکعب، یو عدد دی ($2^3 = 8$ ، $3^3 = 27$).

په پورتنیو مثالونو کې لیدل کېږي چې مساحت (A)، نفوس (P) او حجم (V) د مربع ضلعې (X)، وخت (t) او د کرې شعاع (r) تابع دي چې مساحت، نفوس او حجم هر یوه ته مربوط (مقید) متحول (dependent Variable) او د مربع ضلعې، د کرې شعاع او د وخت کمیتونو ته ازاد متحول یا مستقل متحول (Independent Variable) وایي کولای شو چې تابع داسې تعریف کړو:

تعریف

تابع د دوو ستونو تر منځ یوه داسې رابطه یا قاعده ده چې د لومړني سټ هر عنصر یوازې او یوازې د دویم سټ له یو عنصر سره اړیکه ولري چې لومړنۍ سټ د تعریف د ناحیې (Domain) او دویم سټ د قیمتونو د ناحیې (Range) په نوم یادېږي.



یا تابع د هغه مرتبو جوړو سټ دی چې لومړني عناصر یې تکرار شوي نه وي. که $S = \{(1, 4)(2, 3)(3, 2)(4, 3)(5, 4)\}$ وي، نو د S رابطه د یوې تابع ښودونکي ده، ځکه چې د مرتبو جوړو لومړني عناصر یې تکرار شوي نه دي.

$$\text{Domain}(s) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$\text{Range}(s) = \{2, 3, 4\}$$

فعالیت

که $T = \{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (2, 4), (1, 5)\}$ وي آیا T یوه تابع بنیسي؟

لومړی مثال: په لاندې جدولونو کې کوم یو، یوه تابع ښکاره کوي؟

(جدول I)	(جدول II)	(جدول III)
Domain Range	Domain Range	Domain Range
د عدد مکعب (عدد)	د عدد مربع (عدد)	د عدد مربع جذر (عدد)
-2 → 8	-2 → 4	0 → 0
-1 → -1	-1 → 1	1 → 1
0 → 0	0 → 0	1 → -1
1 → 1	1 → 1	4 → 2
2 → 8	2 → 4	4 → -2
		9 → 3
		9 → -3

I او II جدولونه تابع ښکاره کوي، لیکن III جدول تابع نه ښکاره کوي، ځکه چې د لومړنۍ سټ یا (Domain) یو عنصر د دویم سټ (Range) له دوو عناصرو سره اړیکه لري، یا په بل عبارت د مرتبو جوړو لومړني عناصر تکرار شوي دي چې مرتبې جوړې یې:


$(1, 1), (1, -1), (2, 2), (2, -2), (3, 3), (3, -3), (4, 4), (4, -4), (0, 0), (9, 3), (9, -3)$ دي او یا دا چې د لومړنۍ سټ د یو عنصر لپاره په دویم سټ کې دوه تصویرونه (Images) موجود دي، ډېره ښه به دا وي چې یوې تابع ته د یو ماشین فکر وکړو، کوم شکل چې د څپرکې په لومړۍ مخ کې راکړل شوی دی، خام مواد یا ورودی (input) یا Domain او خروجي output یا $f(x)$ Range په نامه یادېږي. که A او B د حقیقي عددونو سټونه وي له A څخه B ته هره تابع د حقیقي تابع په نامه یادېږي. پام مو وي چې: $Range \subseteq codomain$ دی.

دویم مثال: که $f = \{(1, 2), (-5, 2m-10), (-5, 3m)\}$ د یوې تابع ښودونکي وي، د m قیمت پیدا کړئ.



حل: څرنگه چې $-5 = -5$ دي، نو باید $3m = 2m - 10$ سره وي، په نتیجه کې $m = -10$

کېږي په دې معنا ددې لپاره چې f یوه تابع وي، باید $m = -10$ وي.

درېم مثال: له لاندېنږو دیاگرامونو څخه کوم یو یې یوه تابع بنیسي؟



(a)



حل: د a او b دیاگرامونه تابع ښیي، لیکن د c دیاگرام د یوې تابع ښودونکي نه دی. تابع د X او Y د دوو ستونزو ترمنځ یوه داسې رابطه ده چې د X د سټ یا (Domain) هر عنصر یوازې د Y د سټ (Range) د یو عنصر سره اړیکه لري چې X ته ازاد متحول او Y ته مقید (مربوط) متحول وایي یا تابع د هغه مرتبو جوړو سټ دی چې لومړني عناصر یې تکرار شوي نه وي.

پوښتنې

1

<u>Domain</u>	<u>Range</u>
-1	1
0	2
1	3

2

<u>Domain</u>	<u>Range</u>
2	1
4	3
6	5

3

<u>Domain</u>	<u>Range</u>
1	3
3	5
5	7
	9

4

<u>Domain</u>	<u>Range</u>
-1	0
-2	5
-3	8

5

<u>Domain</u>	<u>Range</u>
-1	3
0	3
1	3
2	3


6

<u>Domain</u>	<u>Range</u>
2	8
3	8
4	9
5	9

1 - د مخامخ جدولونو څخه کوم یو یې د تابع ښودونکي دی؟

2 - د لاندې مرتبو جوړولو له ستونزو څخه کومه یوه یې یوه تابع ښیي؟ د تعریف ساحه (Domain) او د قیمتونو ساحه (Range) یې تعین کړئ.

- 1- $\{(2,4), (3,6), (4,8), (5,10)\}$
- 2- $\{(-1,4), (0,3), (1,2), (2,1)\}$
- 3- $\{(10,-10), (5,-5), (0,0), (5,5), (10,10)\}$
- 4- $\{(-10,10), (-5,5), (0,0), (5,5), (10,10)\}$
- 5- $\{(0,11), (1,1), (2,1), (3,2), (4,2), (5,2)\}$
- 6- $\{(1,1), (2,1), (3,1), (1,2), (2,2), (3,2)\}$



د تابع د لیکلو طریقه او د یوې تابع د قیمت پیدا کول

- څه وخت یوه معادله د یوې تابع ښکارندویه ده؟
- یوه رابطه څه وخت یوه تابع ښیي؟
- یو جدول څه وخت یوه تابع ښیي؟

د لومړي ځل لپاره سویسي ریاضي پوه اویولر (1707-1783) (Euler) دا عبارت چې x د y تابع ده، د $y = f(x)$ مساوات په شکل وښوده چې $f(x)$ د x لپاره د y یا $f(x)$ د تابع قیمت دی. که f له A څخه B ته یوه تابع وي، په لاندې ډول ښودل کېږي چې

$$f : A \rightarrow B$$

$$y = f(x) \quad \text{یا}$$

په شکل کې x له (input) او $f(x)$ له (output) څخه عبارت دی، تابع گانې د h, g, f او نورو تورو په واسطه ښودل کېږي.

تابع عموماً په 4 طریقو ښودل کېږي.

- 1 - د عبارتونو (جملو) په واسطه (Verbally)
- 2 - د یوه جدول په واسطه یا عددي (Numerically)
- 3 - مشاهده وي: د گراف په واسطه (Visually)
- 4 - د یو واضح فورمول یا معادلې په واسطه یا په الجبري ډول (Algebraically)

فعالیت

که $f(x)$ او $g(x)$ په جدولونو کې په لاندې ډول راکړل شوي وي، د x په راکړل شوو قیمتونو کې ددې تابع گانو قیمت پیدا کړئ. یا په بل عبارت د تابع د تعریف ساحه (Domain) درکړل شوي ده، د تابع اړونده قیمتونه (Range) یې پیدا کړئ.

$$f(x) = \frac{1}{2}x - 4$$

x=	-1	-2	0	2	4
f(x)=	?	?	?	?	?

$$g(x) = x^3 - 1$$

x=	0	-1	1	2
g(x)=	?	?	?	?

لومړی مثال: که $f(x) = x^2 + 3x - 2$ وي $f(2)$ ، $f(0)$ ، $f(-3)$ او $f(a)$ پیدا کړئ.
حل:

د تابع قیمتونه	تابع (Rule)	د تعریف ساحه
8	$f(2) = 2^2 + 3 \cdot 2 - 2 = 4 + 6 - 2$	2
-2	$f(0) = 0^2 + 3 \cdot 0 - 2 = -2$	0
-2	$f(-3) = (-3)^2 + 3(-3) - 2 = 9 - 9 - 2$	-3
$a^2 + 3a - 2$	$f(a) = a^2 + 3a - 2$	a

یا $f(2) = 8$ ، $f(0) = -2$ ، $f(-3) = -2$ ، $f(a) = a^2 + 3a - 2$
دویم مثال: که $f(x) = x^2 + 3x + 5$ وي، $f(-x)$ ، $f(x+3)$ او $f(2)$ پیدا کړئ.
حل:

$$f(2) = 2^2 + 3 \cdot 2 + 5 = 4 + 6 + 5 = 15$$

$$f(x+3) = (x+3)^2 + 3(x+3) + 5 = x^2 + 6x + 9 + 3x + 9 + 5 = x^2 + 9x + 23$$

$$f(-x) = (-x)^2 + 3(-x) + 5 = x^2 - 3x + 5$$

فعالیت

که $g(x) = x^2 - 2x + 7$ وي $g(-x)$ ، $g(x+4)$ او $g(-5)$ پیدا کړئ.

درېم مثال: که $h(x) = 3 - 2x$ او $f(x) = 2x + 6$ وي $f(-1)$ ، $h(6)$ او $f(-1) + h(6)$ پیدا کړئ.

حل:

$$f(-1) = 2(-1) + 6 = -2 + 6 = 4$$

$$h(6) = 3 - 2 \cdot 6 = 3 - 12 = -9$$

$$f(-1) + f(3) = 4 + 2 \cdot 3 + 6 = 4 + 12 = 16$$

خاورم مثال: که $f(x) = ax^2 - bx + 1$ او $f(3) = 10, f(1) = 0$ وي د a او b قيمتونه پيدا کړئ.

حل:

$$10 = 9a - 3b + 1, \quad 0 = a - b + 1$$

$$10 = 9a - 3b + 1$$

$$0 = 9a - 3b + 1$$

$$10 = 6a - 2$$

$$10 = 18 - 3b + 1$$

$$12 = 6a$$

$$3b = 19 - 10$$

$$a = 2$$

$$3b = 9$$

$$b = 3$$

پنځم مثال: له لاندېنيو معادلو څخه کومه يوه يې يوه تابع ښيي؟

$$a: \quad x^2 + y = 4$$

$$b: \quad x^2 + y^2 = 4$$

حل: هغه وخت يوه معادله يوه تابع ښيي چې د x د هر قيمت لپاره د y يو قيمت موجود شي.

$$a: \quad x^2 + y = 4 \Rightarrow y = 4 - x^2$$

د x د هر قيمت لپاره y يو قيمت لري، د مثال په ډول که $x = 1$ وي، $y = 4 - 1^2 = 3$ ، نو $y = 4 - x^2$ يوه تابع ده.

$$b: \quad x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow y = \pm\sqrt{4 - x^2}$$

د x د يوه قيمت لپاره y دوه قيمتونه لري، نو y يوه تابع نه ده.

د مثال په ډول که $x = 1$ وي، $y = \pm\sqrt{3}$ يا $(1, \sqrt{3})$ او $(1, -\sqrt{3})$ چې لومړني عناصر يې تکرار شوي دي.

فعالیت

وښیاست چې د $y - x^2 = 1$ او د $x^3 - y = 2$ معادلې د تابع ښودونکي دي او د $x^2 + y^2 = 4$ معادله د یوې تابع ښودونکي نه ده.

یوه تابع د $y = f(x)$ په شکل لیکل کېږي، د تابع د قیمت د پیدا کولو لپاره د x قیمت د تابع په معادله کې وضع کوو، د تابع قیمت په لاس راځي او یوه معادله هغه وخت د یوې تابع ښکارندویه وي چې د هر x لپاره یو y وجود ولري.

پوښتنې

1- که $g(x) = x^2 + x - 2$ او $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$ وي $g(2) - g(-3)$ ، $f(-2)$ ،

او $\frac{f(0) \cdot g(-2)}{f(-3)}$ پیدا کړئ.

2- که $f(x) = x^2 - x$ او $g(x) = \sqrt{x+4}$ وي. $f(-2)$ ، $g(0)$ او $f(x-1)$ پیدا کړئ.


3- که $g(x) = 3\sqrt{x}$ او $h(x) = 1 + 4x$ وي $h(16)$ ، $h(-3)$ او $g(-4)$ پیدا کړئ.

4- $f(x) = \frac{15}{x-3} - 4$ ، $g(x) = 16 + 3x - x^2$ او $h(x) = \sqrt{25 - x^2}$ وي $f(6)$ ، $g(-7)$ ،

او $f(0) + g(4) - h(-3)$ پیدا کړئ.

5- که $g(x) = \sqrt{x+40} - 2$ وي $g(12)$ ، $g(5)$ ، $g(4)$ ، $g(0)$ او $g(-2)$ پیدا کړئ.

6- آیا د $x^2 + xy = 1$ معادله یوه تابع ښیي؟



د یوې تابع د تعریف د ساحې پیدا کول

آیا کېدای شي چې د هرې تابع د تعریف ساحه ټول حقيقي عددونه وي؟

فعالیت

- د x کوم قیمتونه د تابع د تعریف په ساحه کې شامل وي؟
- د $f(x) = \frac{1}{x-4}$ تابع د تعریف ساحه وټاکئ.
- آیا $g(x) = 3\sqrt{x}$ تابع د تعریف په ساحه کې $x = -4$ شامل دی؟

د یوې تابع د تعریف په ساحه (Domain) کې د x ټول هغه قیمتونه شامل وي چې تابع په هغه قیمتونو کې تعریف شوي وي یا د تابع قیمت یو حقيقي عدد وي.

لومړی مثال: د لاندې تابع گانو د تعریف ساحه (Domain) وټاکئ.

$$f(x) = \frac{1}{x-3}$$

$$h(x) = x^2 - 7x$$

$$K(x) = \frac{6x}{x^2 - 9}$$

$$g(x) = \sqrt{x}$$

$$R(x) = \sqrt{3x+12}$$

حل:

- د $f(x) = \frac{1}{x-3}$ تابع په $x = 3$ کې تعریف شوي نه ده، ځکه چې $x = 3$ لپاره د تابع مخرغ صفر کېږي یا د $x = 3$ لپاره د تابع قیمت یو حقيقي عدد نه دی نو:

$$\text{Dom } f = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 3\}$$

- د $g(x) = \sqrt{x}$ په تابع کې ددې لپاره چې د تابع قیمت یو حقيقي عدد (Real number)

وي، بايد $x \geq 0$ نو، $Dom\ g = \{x \in IR / x \geq 0\}$ يا $dom\ g = [0, \infty)$ وي،
 • $h(x) = x^2 - 7x$ په تابع کې، څرنگه چې د x د هر قيمت لپاره د $h(x)$ تابع تعريف شوي ده، نو: (د حقيقي عددونو سټ) $Dom\ h = IR = (-\infty, \infty)$

• د $k(x) = \frac{6x}{x^2 - 9}$ يا $k(x) = \frac{6x}{(x-3)(x+3)}$ تابع د تعريف ساحه عبارت ده له:
 $Dom\ k(x) = \{x \in IR / x \neq 3, x \neq -3\}$
 • د $R(x) = \sqrt{3x+12}$ په تابع کې بايد $3x+12 \geq 0$ وي، نو $x \geq -4$ کېږي.
 $Dom\ R = \{x \in IR / x \geq -4\} = [-4, \infty)$

فعاليت

د لاندې تابع گانو د تعريف ساحه (Domain) پيدا کړئ.

$$f(x) = x^2 + 3x - 17, \quad g(x) = \frac{5x}{x^2 - 49}, \quad h(x) = \sqrt{9x - 27}$$

دویم مثال: د $y = \sqrt{x-3}$ د تابع د تعريف ساحه پيدا کړئ.

$$x-3 \geq 0 \Rightarrow x \geq 3$$

$$Dom\ y = \{x \in IR / x \geq 3\} = [3, \infty)$$

درېم مثال: د لاندې تابع گانو د تعريف ساحه پيدا کړئ.

$$f(x) = \sqrt{x-2} \quad Dom\ f = \{x / x \geq 2\} \quad \text{يا} \quad [2, \infty]$$

$$g(x) = \frac{2x+3}{x-4} \quad dom\ g = IR - \{4\} \quad \text{يا} \quad (-\infty, 4) \cup (4, \infty)$$





$$dom\ g = \{x \in IR / x \neq 4\} \quad \text{يا د سټ په شکل:}$$

$$h(x) = \sqrt{x^2 - 2x - 3}$$

$$Dom\ h = \{x / x \leq -1 \text{ يا } x \geq 3\} \quad \text{يا} \quad (-\infty, -1] \cup [3, \infty)$$

د یوې تابع گراف او د گراف له مخې د یوې تابع پېژندنه (Graph of a function and vertical line test)

په راکړل شوو شکلونو کې کوم گراف د یوې تابع گراف دی؟



فعالیت


- د y له محور سره یو موازي خط رسم کړئ.
- وگورئ چې دا خط د تابع گراف په څو نقطو کې قطع کوي؟
- که دا خط گراف په یوه نقطه کې قطع کړي آیا دا گراف به د یوې تابع گراف وي؟
- که دا خط، گراف له یوې نقطې څخه په زیاتو نقطو کې قطع کړي آیا دا گراف به د یوې تابع گراف وي؟

که $f(x)$ یوه حقیقي تابع وي، د $f(x)$ د تابع گراف د $(x, f(x))$ د هغه مرتبو جوړو سټ دی چې د $y=f(x)$ په معادله کې صدق وکړي.

یا د یوې تابع گراف د XOY د مستوي د هغو نقطو سټ دی چې $\{(x, y) / y = f(x)\}$ صدق کړي او $x \in \text{dom } f(x)$ وي.

لومړي مثال: د $y = f(x) = 2x + 1$ تابع گراف رسم کړئ.

input	تابع	output	مرتبې جوړې
x	$2x + 1$	$y = f(x)$	(x, y)
0	$2(0) + 1$	1	$(0, 1)$
2	$2(2) + 1$	5	$(2, 5)$
-2	$2(-2) + 1$	-3	$(-2, -3)$



دویم مثال: د $f(x) = x^2 + 1$ او $y = -1$ تابع گانو گراف رسم کړئ.

د تعریف او د قیمتونو ساحې یې هم پیدا کړئ.

حل:

$$f(x) = x^2 + 1$$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
f(x)	10	5	2	1	2	5	10

د $(-3, 10)$, $(-2, 5)$, $(-1, 2)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 5)$, $(3, 10)$ مرتبو جوړو په نظر کې نیولو سره د تابع گراف رسم کړئ:

$$f(-3) = (-3)^2 + 1 = 9 + 1 = 10$$

$$f(-2) = (-2)^2 + 1 = 4 + 1 = 5$$

$$f(-1) = (-1)^2 + 1 = 1 + 1 = 2$$

$$f(0) = 0^2 + 1 = 0 + 1 = 1$$


$$f(1) = 1^2 + 1 = 2$$


$$f(2) = 2^2 + 1 = 5$$

$$f(3) = 3^2 + 1 = 10$$

$$\text{Dom } f = (-\infty, \infty)$$

$$\text{Range } f = (1, \infty)$$





$$f(x) = -1$$

Input	Output	مرتبہ جوړه
x	$y = f(x)$	(x, y)
-2	-1	$(-2, -1)$
0	-1	$(0, -1)$
3	-1	$(3, -1)$


$$\text{Dom } y = \mathbb{R}$$

$$\text{Range } y = -1$$

فعالیت

د $f(x) = x^2 - 4$ تابع گراف رسم کړئ.

دریم مثال: د $y = f(x) = x^3$ تابع گراف رسم کړئ.




$$f(x) = x^3$$

x	2	1	0	-1	-2
$y = f(x)$	8	1	0	-1	-8

که یو عمودي خط (د y له محور سره موازي) یو گراف یوازې په یوه نقطه کې قطع کړي، نو دا گراف د یوې تابع گراف دی او که له یوې نقطې څخه یې په زیاتو نقطو کې قطع کړي، نو دا گراف د یوې تابع گراف نه دی.

څلورم مثال: په لاندې راکړل شوو گرافونو کې لیدل کېږي چې b او c د تابع گانو گرافونه دي، ځکه چې عمود خط یې گرافونه په یوه نقطه کې قطع کړي دي، لیکن a او d گرافونه د تابع گرافونه نه دي، ځکه چې عمودي خط گرافونه له یوې څخه په زیاتو نقطو (دوو نقطو) کې قطع کړي دي یا د یوه x لپاره د y یا $f(x)$ دوه قیمتونه وجود لري، نو د a او d گرافونه د تابع گرافونه نه دي.



د تابع د تعریف په ناحیه domain کې هغه عددونه شامل وي چې تابع په کې تعریف شوي وي یا د تابع قیمت یو حقیقي عدد وي. د یوې تابع گراف د XOY په مستوي کې د S د نقطو سټ دی، په دې ډول چې $S = \{(x, y) | y = f(x)\}$ چې x د تابع د تعریف په ساحه کې شامل وي، که د y له محور سره موازي خط گراف یوازې په یوه نقطه کې قطع کړي، دا گراف د یوې تابع گراف دی.

پوښتنې

1 - د لاندې تابع گانو د تعریف ساحې (Domains) پیدا کړئ.

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$$

$$g(x) = 2x - 5$$

$$h(x) = \sqrt{x^2 - 4}$$

$$f(x) = \sqrt{x+1}$$

$$g(x) = |x - 3|$$

$$h(x) = \frac{3}{x-4}$$

$$f(x) = \frac{7x}{x^2 - 16}$$

$$g(x) = \frac{2}{(x+3)(x-7)}$$

$$h(x) = \frac{4}{x^2 + 11x + 24}$$


$$f(x) = \frac{3}{x^2 + 4}$$

2 - د $f(x) = x^2$ او $f(x) = -x^2$ د تابع گانو گرافونه رسم کړئ.

3 - د $g(x) = 2x - 1$ تابع گراف رسم کړئ که $x = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ وي.

4 - د $x = y^2 - 2$ گراف رسم کړئ او آیا دا د یوې تابع گراف دی؟ ولې؟


د گراف له مخې د یوې تابع د
تعریف او د قیمتونو د ناحیو او د
تابع د قیمتونو پیدا کول:



$$\text{Dom } f(x) = (-4, 5)$$


$$\text{Range } f(x) = (-4, 3]$$

آیا د توابعو په لاندېنیو راکړل شوو گرافونو کې د تابع د تعریف ساحه (Domain) او د قیمتونو ساحه (Range) یې ټاکلای شئ؟



$$\text{Dom } f = [a, b]$$

$$\text{Range } f = [c, d]$$




$$\text{Dom } f = (a, \infty)$$

$$\text{Range } f = (-\infty, d)$$

فعالیت


شکل وگورئ لاندېنیو پوښتنو ته ځواب ورکړئ:



- د شکل له مخې د f تابع د تعریف او قیمتونو ساحه پیدا کړئ.
- آیا د -4 عدد د f د تابع د قیمتونو په ساحه کې شامل دی؟ ولې؟
- آیا د 3 عدد د f د تعریف په ساحه کې شامل دی؟ ولې؟
- آیا د 6 عدد د f د تعریف په ساحه کې شامل دی؟

لیدل کېږي چې $f(-1) = 2$ او $f(1) = 4$ دي او هم د شکل له مخې د تابع د تعریف ساحه له -3 څخه تر 6 پورې ده، لیکن $-3 \notin \text{dom } f$ او $6 \in \text{dom } f$ ، نو $\text{dom } f = (-3, 6]$ او په همدې ډول د $f(x)$ تابع د قیمتونو ساحه (Range) له -4 څخه تر 4 پورې ده، خو $-4 \notin \text{Range } f$ نو $\text{Range } f = (-4, 4]$.

لومړی مثال: په راکړل شوو شکلونو کې د تابع گانو د تعریف او د قیمتونو ساحې پیدا کړئ.




حل:

د لومړي شکل په گراف کې د تعریف ساحه د 1 او 6 تر منځ ټول حقيقي عددونه دي او د قیمتونو ساحه یې د 2 او 4 تر منځ ټول حقيقي عددونه دي یا: $1 \leq x \leq 6$ او $2 \leq y \leq 4$
 د (2) شکل په گراف کې $2 \leq x \leq 10$ یا $\text{Dom} = [2, 10]$ او $1 \leq y \leq 8$ یا $\text{Range} = [1, 8]$

دویم مثال: لاندې شکل په پام کې ونیسئ.

- $f(-2)$ ، $f(3)$ او $f(5)$ پیدا کړئ.
- د X او Y له محورونو سره د گراف د تقاطع د نقطو وضعیه کمیات پیدا کړئ.


حل: څرنګه چې د X له محور سره د گراف د تقاطع په ټکي کې $y = 0$ وي، نو $f(-2) = 0$ ، $f(3) = 0$ او $f(5) = 0$ دي، نو گراف د X محور د



$(-2, 0)$, $(3, 0)$ او $(5, 0)$ په نقطو کې قطع کوي.

څرنگه چې د y له محور سره د گراف د تقاطع په ټکي کې $x = 0$ دی $f(0) = 3$ ، نو گراف د y محور د $(0, 3)$ په نقطه کې قطع کوي.

درېم مثال: په لاندې شکل کې د f تابع Domain او Range پیدا کړئ $f(3)$ او $f(6)$ هم په لاس راوړئ.





حل: لیدل کېږي چې د تعریف ساحه یې له -3 - څخه تر 6 پورې ده، خو -3 د تعریف په ساحه کې شامل نه دی.

$$\text{Domain } f(x) = -3 < x \leq 6 \text{ یا } (-3, 6]$$

او د قیمتونو ساحه یې: $\text{Range } f(x) = -5 \leq y < 4$ یا $[-5, 4)$ ، $f(6) = -3$ او $f(3) = -5$ ده.

پوښتنې

په راځړل شوو شکلونو کې:



a- د تابع د تعريف ساحه


b- د تابع د قيمتونو ساحه

c- د X له محور سره د گراف د تقاطع ټکي



d- د Y له محور سره د تقاطع ټکي او په دريم شکل کې د تابع غوښتل شوي قيمتونه پيدا کړئ.

ځينې خاصې تابع گانې او گرافونه يې

د هغو تابع گانو نومونه واخلئ چې گرافونه يې
راکړل شوي دي



توابع ډېر ډولونه لري چې ځينې خاصې تابع گانې ترڅېړنې لاندې نيسو:
ثابته تابع، د عينيت تابع، د مطلقه قيمت تابع، څو معادله يي تابع او د علامې تابع




فعاليت

- ثابتي تابع ته ولې ثابته تابع وايي؟
- آيا د عينيت تابع د تعريف او د قيمتونو ساحې سره مساوي وي؟
- آيا د مطلقه قيمت د تابع د قيمتونو ساحه منفي قيمتونه اخيستلای شي؟

ثابت تابع (Constant Function)

که x او y د حقيقي عددونو ستونه وي، د $y = f(x)$ يا $f: x \rightarrow y$ په تابع کې که y له يوه ثابت عدد سره مساوي وي يا $y = f(x) = c$ چې c يو ثابت عدد دی، نو y د ثابتې تابع په نوم يادېږي. د مثال په ډول: $f(x) = 2$ ، $f(x) = -3$ او $f(x) = -2$ او داسې نورې ثابتې تابع گانې دي.

لومړی مثال: $f(x) = 2$ او $f(x) = -2$ تابع گانو گرافونه رسم کړئ.




په دې معنا چې په ثابت تابع کې د تعريف د ساحې د هر عنصر تصوير همغه ثابت عدد دی.

د عينيت تابع (Identity function): هغه تابع ده چې د تعريف د ساحې هر عنصر ته له

خپل ځان سره ارتباط ورکړي يا $f(x) = x$ د عينيت د تابع په نامه يادېږي.

مثال: د $f(x) = x$ تابع گراف رسم کړئ.




د مطلقه قیمت تابع (Absolute value function)

د مطلقه قیمت تابع $f(x) = |x|$ په لاندې ډول تعریف شوی ده:

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

لومړی مثال: د $f(x) = |x|$ تابع گراف رسم کړئ.



لیدل کېږي چې د مطلقه قیمت د تابع د تعریف ساحه ټول حقيقي عددونه او د قیمتونو ساحه یې $[0, \infty)$ ده.

څو معادله یي تابع (Piecewise function) او گراف یې

آیا کېدای شي چې یوه تابع د تعریف په ساحه کې د دوو یا څو معادلو په واسطه تعریف شوي وي؟

لومړی مثال: که $f(x) = \begin{cases} 2x + 3: x < 4 \\ x^2 - 1: 4 \leq x \leq 10 \end{cases}$ وي، نو $f(-5)$, $f(8)$ او د f تابع د تعریف

ساحه پیدا کړئ.

حل: څرنګه چې $-5 < 4$ دی، نو په لومړۍ معادله کې وضع کېږي، لرو چې:

$$f(-5) = 2(-5) + 3 = -10 + 3 = -7$$

او څرنګه چې د 8 عدد د 4 او 10 ترمنځ واقع دی $4 < 8 < 10$ ، نو په دویمه معادله کې وضع

کېږي لرو چې:

$$f(8) = 8^2 - 1 = 64 - 1 = 63$$

د f تابع د تعریف ساحه په لومړۍ معادله کې $(-\infty, 4)$ او په دویمه معادله کې $[4, 10]$ ده، نو د

f د تعريف ساحه د $(-\infty, 10]$ څخه عبارت ده.

فعاليت

$$g(x) = \begin{cases} -\frac{11}{60}x + 15 & : 0 \leq x < 60 \\ \frac{1}{5}x - 8 & : 60 \leq x \leq 90 \end{cases} \quad \text{که چېرې وي،}$$

وښايست چې $g(80) = 8$ او $g(30) = 9.5$ دی.

د څو معادله يي تابع گراف (Graph of function defined piecewise)


دويم مثال: د $f(x)$ تابع د تعريف او قيمتونو ساحې پيدا او گراف يې هم رسم کړئ که:

$$f(x) = \begin{cases} x & : 0 \leq x \leq 1 \\ x - 1 & : 1 < x \leq 2 \end{cases} \quad \text{وي.}$$

حل: د لومړۍ معادلې د تعريف ساحه $[0, 1]$ او د دويمې معادلې د تعريف ساحه $(1, 2]$ ده چې په

نتيجه کې د $f(x)$ د تعريف ساحه $[0, 2]$ ده.

د گراف د رسمولو لپاره، د دواړو برخو گراف رسموو په ډول:



$$y = f(x) = x$$

x	0	0.5	0.8	1
y = f(x)	0	0.5	0.8	1

$$y = f(x) = x - 1$$

x	1,1	1,5	1,8
f(x)	0,1	0,5	0,8

په نتیجه کې دوه مستقیم خطونه په لاس راځي چې دواړه د $f(x)$ تابع گراف دی.


فعالیت

که: $f(x) = \begin{cases} x \Leftarrow 0 \leq x \leq 4 \\ x-1 \Leftarrow 0 < x < -4 \end{cases}$ وي، $f(0)$, $f(-2)$, $f(2)$ پیدا کړئ او ددې تابع گراف هم رسم کړئ.

دریم مثال: د $f(x) = \begin{cases} x-1 \Leftarrow x < 0 \\ x+1 \Leftarrow x > 0 \end{cases}$ تابع گراف رسم د تعریف او د قیمتونو ساحې یې وټاکئ.

حل:

x	1	2	4	-1	-2	-3	-4
f(x)	2	3	5	-2	-3	-4	-5



لیدل کېږي چې د تابع د تعریف په ساحه کې صفر شامل نه دی ($x \neq 0$) یا

$Dom f(x) = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ او د قیمتونو ناحیه (Range) یې عبارت دی له:


$$(-\infty, -1) \cup (1, \infty) \text{ یا } y < -1 \text{ او } y > 1$$

د علامې تابع (Sign Function): د علامې تابع چې په $\text{sgn}(x)$ سره ښودل کېږي د څو معادله یې تابع یو مثال دی چې په لاندې ډول تعریف شوي ده:

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & : x > 0 \\ 0 & : x = 0 \\ -1 & : x < 0 \end{cases}$$

د دې تابع د تعريف ناحيه د حقيقي عددونو سټ او د قيمتونو ساحه

(Range) يې $\{-1, 0, 1\}$ ده.



$$\text{Dom}_{\text{sgn}} = \mathbb{R} \quad \text{Range}_{\text{sgn}} = \{-1, 0, 1\}$$

$f(x) = c$ ثابته تابع، $f(x) = x$ د عينيت تابع او $f(x) = |x|$ د مطلقه قيمت تابع ده چې د تعريف ساحه يې ټول حقيقي عددونه او د قيمتونو ساحه يې صفر او مثبت حقيقي عددونه دي.

پوښتنې


1- د $f(x) = -5$ ، $g(x) = \frac{1}{2}$ او $h(x) = 4$ تابع گانو گرافونه رسم کړئ.

2- د $f(x) = |x| - 3$ تابع گراف رسم کړئ.



3- که $f(x) = \begin{cases} -x & : x < 0 \\ x & : x \geq 0 \end{cases}$ وي $f(0)$ ، $f(-2, 3)$ او $f(16)$ پيدا کړئ.

4- که $h(x) = \begin{cases} x+1 & : -1 \leq x < 0 \\ -x+1 & : 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$ وي د $h(x)$ تابع د تعريف ساحه پيدا کړئ.

متزایدي او متناقصې تابع گانې (Increasing and decreasing functions)



- په راکړل شوو گرافونو کې کوم گراف د متزایدي تابع گراف دی؟
- کوم گراف د متناقصې تابع گراف دی؟
- کوم گراف نه متزاید دی او نه متناقص؟



1 - یوه تابع په یوه انټروال کې متزایده ده که $x_1 < x_2$ وي، په نتیجه کې $f(x_1) < f(x_2)$ شي.

2 - یوه تابع په یوه انټروال کې متناقصه ده که $x_1 < x_2$ وي، په نتیجه کې $f(x_1) > f(x_2)$ شي.



3 - که $x_1 < x_2$ وي او په نتیجه کې $f(x_1) = f(x_2)$ شي دا تابع نه متناقصه ده او نه متزایده. لکه: څرنګه چې په شکل کې لیدل کېږي دا یوه ثابت تابع ده.

مثال: د $f(x) = x^2$ او $f(x) = -x^2$ د تابع گانو گراف په کومو انټروالونو کې متزاید او په

کومو انټروالونو کې متناقص دی؟



x	0	1	-1	2	-2
$f(x) = x^2$	0	1	1	4	4

x	0	1	-1	2	-2
$f(x) = -x^2$	0	-1	-1	-4	-4



لیدل کېږي چې د $f(x) = x^2$ تابع د $(-\infty, 0)$ په انټروال کې متناقصه او د $(0, \infty)$ په انټروال کې متزايدة ده، لیکن د $f(x) = -x^2$ تابع په $(-\infty, 0)$ انټروال کې متزايدة او د $(0, \infty)$ په انټروال کې متناقصه ده.

فعالیت




په راکړل شوو شکلونو کې د تابع گراف په کومو انټروالونو کې متزايدة په کومو کې متناقص دی، کوم گراف نه متزايدة او نه متناقص دی؟

جفتي او طاقی تابع گانې (Even and Odd Functions):

1- د $f(x)$ تابع یوه جفته تابع ده که چېرې $f(-x) = f(x)$ وي، په دې معنا که په تابع کې x پر ځای $-x$ عوض کړو، د تابع په قیمت کې تغیر رانه شي.

2- د $f(x)$ تابع یوه طاقه تابع ده که چېرې $f(-x) = -f(x)$ وي یا دا چې که په تابع کې د



X پر ځای $-X$ عوض کړو، د تابع قیمت منفي شي.

لومړی مثال: د $f(x) = x^2$ او $f(x) = x^3$ په

تابع گانو کې کومه تابع جفته او کومه یوه طاقه ده؟

حل: په دواړو تابع گانو کې

د X پر ځای $-X$ عوض کوو:

$$f(-x) = (-x)^3 = (-x)(-x)(-x) = -x^3$$

نو د $f(x) = x^3$ تابع یوه طاقه تابع ده،

ځکه چې $f(-x) = -f(x)$ کېږي لکه:

$$f(x) = x^2 \text{ او } f(-2) = -f(2) = -8$$

تابع کې لرو چې:

$$f(-x) = (-x)^2 = (-x)(-x) = x^2$$



نو $f(x) = x^2$ یو جفته تابع ده، ځکه چې

$$f(-2) = f(2) = 4 \text{ کېږي لکه: } f(-x) = f(x)$$

لیدل کېږي چې د جفتو تابع گانو گرافونه نظر د Y محور ته

او د طاقو تابع گانو گرافونه نظر د وضعیه کمیاتو مبدا ته سره

متناظر دي.



دویم مثال: د $f(x) = x^2 - 4$ او

$$g(x) = x^2 + 3x + 2$$

په تابع گانو کې کومه یوه جفته او کومه یوه طاقه ده؟

حل:

$$f(-x) = (-x)^2 - 4 = x^2 - 4 = f(x)$$

نو دا تابع جفته ده، په شکل کې هم لیدل کېږي، دوه

نقطې د $(3,5)$ او $(-3,5)$ تابع د $x = 3$ او $x = -3$

لپاره د تابع قیمت سره مساوي دی چې د (5) عدد دی.

یعنې: $f(-3) = f(3) = 5$

همدارنگه د $x = 2$ او $x = -2$ لپاره د تابع قیمت سره مساوي دی چې صفر دی، نو په نتیجه کې تابع جفته ده.

$$g(x) = (-x)^2 + 3(-x) + 2 = x^2 - 3x + 2$$

چې دا تابع نه جفته او نه طاقه ده.

دریم مثال: که f له حقيقي عددونو څخه حقيقي عددونو ته یوه طاقه تابع وي او

$$f(-2) = k + 5 \quad \text{او} \quad f(2) = 2k + 3 \quad \text{وي، د } k \text{ قیمت پیدا کړئ.}$$

حل: څرنگه چې f یوه طاقه تابع ده، نو: $f(-x) = -f(x)$

$$f(-2) = -f(2) \quad \text{د طاقې تابع د تعریف په اساس:}$$

$$k + 5 = -(2k + 3)$$

$$k + 5 = -2k - 3$$

$$3k = -8$$

$$k = -\frac{8}{3}$$

که د $f(x)$ په تابع کې $x_1 < x_2$ وي او په نتیجه کې $f(x_1) < f(x_2)$ شي تابع متزایده او که $x_1 < x_2$ وي او $f(x_1) > f(x_2)$ شي، تابع متناقضه ده که $f(-x) = f(x)$ وي تابع جفته او که $f(-x) = -f(x)$ شي تابع طاقه ده د جفتو تابع گانو گراف نظر د Y محور ته او د طاقو تابع گانو گراف نظر د وضعیه کمیاتو مبدأ ته سره متناظر دي.

پوښتنې

1- د لاندېنیو تابع گانو څخه کومه یوه یې متزایده، کومه یوه یې متناقضه او کومه یوه نه متزایده او نه متناقضه ده؟


$$f(x) = x^3 + x, \quad f(x) = x^2 + x, \quad f(x) = x^2 - x^4$$

2- د لاندېنیو راکړل شوو تابع گانو څخه کومه یوه جفته او کومه یوه طاقه ده؟


$$f(x) = x, \quad f(x) = |x|$$

$$f(x) = x^4, \quad f(x) = x^5$$

د گرافونو انتقال (Translation)



آيا کولای شئ چې ووايئ راکړل شوي گرافونه
يو له بله سره څه اړيکه لري؟




فعاليت

- د $f(x) = x^2$ تابع گراف رسم کړئ.
- د $f(x) = x^2 + 4$ تابع گراف رسم کړئ.
- د $f(x) = x^2 - 4$ تابع گراف رسم کړئ.
- ووايست چې پورتنی گرافونه يو له بله سره څه ډول اړيکه لري؟

که د $f(x) = x^2$ گراف رسم کړو، څنگه کولای شو د $f(x) = x^2$ د گراف له انتقال څخه د $f(x) = x^2 - 4$ تابع گراف رسم کړو؟

د $y = x^2$ د گراف د (x, y) د هرې نقطې لپاره د $(x, y - 4)$ اړونده نقطه د $y = x^2 - 4$ په گراف واقع ده، نو د $y = x^2$ تابع گراف هره نقطه د 4 واحدو په اندازه ښکته خواته انتقال کوي ترڅو د $y = x^2 - 4$ گراف لاس ته راشي، لکه: څنگه چې په شکل کې لیدل کېږي، دا انتقال



د عمودي انتقال (Vertical Translation) په نوم یادېږي. انتقال په دوه ډوله دی: عمودي انتقال او افقي انتقال.

1- عمودي انتقال (Vertical Translation):

عمودي انتقال پورته او یا ښکته خواته وي. که $c > 0$ وي:


1: که د $y = f(x)$ د تابع گراف د c په اندازه پورته خواته انتقال شوی وي، نو د $y = f(x) + c$ گراف لاس ته راځي.

2: که د $y = f(x)$ د تابع گراف د c په اندازه ښکته خواته انتقال شوی وي، نو د $y = f(x) - c$ گراف لاس ته راځي.

لومړی مثال: د $y = x^2 + 2$ او $y = x^2 - 3$ تابع گانو

گرافونه د $y = x^2$ تابع له گراف سره څرنگه اړیکه لري؟ درې واړه گرافونه د وضعیه کمیانو په عین سیستم کې رسم کړئ.

حل: د $y = x^2$ تابع گراف د (2) واحدو په اندازه پورته خواته انتقالوو، ترڅو د $y = x^2 + 2$ د تابع گراف په لاس راشي او که د $y = x^2$ تابع گراف د (3) واحدو په اندازه ښکته خواته نقل کړو، د $y = x^2 - 3$ تابع گراف لاس ته راځي:



$x =$	0	1	2	-1
$y = x^2$	0	1	4	1
$y = x^2 + 2$	2	3	6	3
$y = x^2 - 3$	-3	-2	1	-2


یا عمودي انتقال داسې هم تعریفولای شو:

که د تابع په گراف کې د y پر ځای $y - a$ وضع کړو داسې چې a یو ثابت عدد دی، نو گراف د $|a|$ په اندازه په عمودي ډول انتقال کوي که $a > 0$ وي، انتقال په عمودي ډول پورته خواته او که $a < 0$ وي گراف د $|a|$ په اندازه په عمودي ډول ښکته خواته انتقال کوي.

دویم مثال: د $y = x^2$ تابع گراف له انتقاله څخه د $y = x^2 + 2$ ، $y = x^2 - 2$ ،
 $y = x^2 + 4$ او $y = x^2 - 4$ تابع گانو گرافونه د وضعیه کمیاتو په عین سیستم کې رسم او یو
له بله سره یې پرتله کړئ.

$$y = x^2 \quad y = x^2 + 2 \quad y = x^2 + 4 \quad y = x^2 - 2 \quad y = x^2 - 4$$

x	y	x	y	x	y	x	y	x	y
0	0	0	2	0	4	0	-2	0	-4
± 1	1	± 1	3	± 1	5	± 1	-1	± 1	-3
± 2	4	± 2	6	± 2	8	± 2	2	± 2	0



افقي انتقال: (Horizontal Translation)

که د تابع په گراف کې د x پر ځای $x - b$ وضع شي چې b یو ثابت عدد دی. د تابع گراف د $|b|$
په اندازه په افقي ډول انتقال کوي، که $b > 0$ وي گراف ښي خوا ته او که $b < 0$ وي، گراف کیڼې
خوا ته انتقال کوي.


دریم مثال: د $y = x^2$ گراف له انتقال څخه د $y = (x + 2)^2$ او $y = (x - 3)^2$ گرافونه
رسم کړئ.

حل: لکه څنګه چې په شکل کې لیدل کېږي که د $y = x^2$ تابع گراف د 2 واحدو په اندازه کیڼې

خواته انتقال کړو، د $y = (x+2)^2$ گراف لاس ته راځي، که د $y = x^2$ گراف 3 واحدې بني خواته انتقال کړو، د $y = (x-3)^2$ د تابع گراف لاس ته راځي، لکه: څنگه چې په شکل کې هم لیدل کېږي.

x	-2	0	-1	-3	-4	
$y = (x+2)^2$	0	4	1	1	4	

x =	3	4	2	5	1	
$y = (x-3)^2$	0	1	1	4	4	



فعالیت

د $f(x) = |x|$ تابع گراف له انتقال څخه د $g(x) = |x+2|$ او $h(x) = |x-3|$ تابع گانو گرافونه په وضعیه کمیانو په عین سیستم کې رسم کړئ.

د عمودي او افقي انتقالونو ترکیب:

(Combining Horizontal and Vertical Shifts)


څلورم مثال: د $g(x) = (x+1)^2$ او $h(x) = (x+1)^2 - 3$ د تابع گانو گرافونه رسم کړئ.

حل: لومړی د $f(x) = x^2$ تابع گراف رسموو چې د دویمې درجې تابع د معیاري گراف په نامه یادېږي لومړی د گراف پر مخ د $(0, 0)$ ، $(2, 4)$ او $(-2, 4)$ درې نقطې ټاکو.

بیا د $g(x) = (x+1)^2$ تابع گراف رسموو چې د $f(x) = x^2$ د تعریف له ساحې سره د (1) عدد جمع کوو، ترڅو چې د $f(x) = x^2$ گراف کینې خواته د یو واحد په اندازه نقل شي، په دویم شکل کې ښودل شوی دی. په پای کې د $f(x) = (x+1)^2 - 3$ تابع گراف د رسمولو لپاره دویم شکل گراف د 3 واحدونو په اندازه په عمودي ډول ښکته خواته انتقالوو چې گراف یې په دریم شکل کې ښودل شوی دی:


$$f(x) = x^2$$

x	0	2	-2
f(x)	0	4	4




$$g(x) = (x+1)^2$$

x	-1	1	-3
f(x)	0	4	4




$$f(x) = (x+1)^2 - 3$$

x	1	-3	-1
f(x)	1	1	-3



پنځم مثال: د $y = |x|$ تابع گراف له انتقال کولو څخه د $y = |x+3| + 2$ تابع گراف رسم کړئ.

x	0	1	-1	-2	-3	3	2
$y = x $	0	1	1	2	3	3	2
$y = x+3 + 2$	5	6	4	3	2	8	7



انتقال په (2) ډول دی، (عمودي او افقي)

عمودي انتقال: که C یو مثبت عدد وي.

1- که چېرې د $y = f(x)$ تابع گراف د C واحدونو په اندازه په عمودي ډول پورته خواته انتقال

شي، د $y = f(x) + c$ تابع گراف لاس ته راځي.

2- که د $y = f(x)$ تابع گراف د C واحدونو په اندازه په عمودي ډول ښکته خواته انتقال شي د

$y = f(x) - c$ تابع گراف لاس ته راځي.

افقي انتقال: که C یو مثبت عدد وي.

1- که د $y = f(x)$ تابع گراف د C واحدونو په اندازه کيښي خواته انتقال شي، د $y = f(x + c)$

گراف لاس ته راځي.

2- که د $y = f(x)$ تابع گراف د C واحدونو په اندازه ښي خواته انتقال شي، د $y = f(x - c)$

د تابع گراف لاس ته راځي.

پوښتنې

1- د $y = x^2$ تابع گراف له انتقال څخه د لاندېنيو تابع گانو گرافونه رسم کړئ.

$$g(x) = x^2 - 2, \quad g(x) = x^2 - 1, \quad g(x) = (x - 2)^2$$

2- د $f(x) = \sqrt{x}$ تابع گراف رسم کړئ او ددې له انتقال څخه د $f(x) = \sqrt{x} + 2$ او

$$f(x) = \sqrt{x + 2}$$

3- د $f(x) = |x|$ تابع گراف رسم کړئ او ددې گراف له انتقال څخه د

$$g(x) = |x| + 4, \quad g(x) = |x + 4|, \quad h(x) = |x - 4|$$

4- د $f(x) = x^3$ تابع گراف له انتقال څخه د $g(x) = x^3 - 3$ او $g(x) = (x - 3)^3$ تابع

گانو گرافونه رسم کړئ.

د تابع گانو عمليې

(Operations on functions)

$$f(x) = \sqrt{4-x}$$

$$g(x) = \sqrt{3+x}$$

$$(f+g)(x) = ?$$

که $f(x) = x+2$ او $g(x) = 2x+11$

وي $(f+g)(x)$ او $(f-g)(x)$ پيدا

کولای شی؟

د تابع گانو څلورگونې عمليې په لاندې ډول تعريف شوي دي:

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f-g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$(g(x) \neq 0)$$

$$\text{dom}(f+g)(x) = \text{dom } f \cap \text{dom } g$$

$$\text{dom}(f-g)(x) = \text{dom } f \cap \text{dom } g$$

$$\text{dom}(f \cdot g)(x) = \text{dom } f \cap \text{dom } g$$

$$\text{dom}\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \text{dom } f \cap \text{dom } g - \{x / g(x) = 0\}$$

لومړی مثال: که $f(x) = 2x+1$ او $g(x) = x^2 - 4$ وي، $(f+g)(x)$ پيدا کړئ او هم د دې تابع د تعريف ساحه په لاس راوړئ.

حل:

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f+g)(x) = (2x+1) + (x^2 - 4) = 2x - 3 + x^2 = x^2 + 2x - 3$$

$$\text{dom } g = \mathbb{R} \quad \text{او} \quad \text{dom } f = \mathbb{R}$$

$$\text{dom}(f+g)(x) = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

دویم مثال: که $f(x) = x^2 - 3$ او $g(x) = 4x + 5$ وي، $(f+g)(x)$ او $(f+g)(3)$ پيدا کړئ.

حل:

$$(f + g)(x) = (x^2 - 3) + (4x + 5) = x^2 + 4x + 2$$

$$(f + g)(3) = 3^2 + 4(3) + 2 = 9 + 12 + 2 = 23$$

$$\text{dom } g = \mathbb{R} \quad \square \quad \text{dom } f = \mathbb{R}$$

$$\text{dom}(f + g)(x) = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

فعالیت

که $f(x) = 3x^2 + 4x - 1$ او $g(x) = 2x + 7$ وي، $(f + g)(x)$ او $(f + g)(4)$ پیدا کړئ.

دریم مثال: که $f(x) = 2x - 1$ او $g(x) = x^2 + x - 2$ وي، $(f \cdot g)(x)$ او $(f - g)(x)$

$(\frac{f}{g})(x)$ پیدا کړئ او د تعریف ساحې یې هم وټاکئ.

حل

$$(f - g)(x) = (2x - 1) - (x^2 + x - 2) = 2x - 1 - x^2 - x + 2 = -x^2 + x + 1$$

خرنگه چې $\text{dom } f = \mathbb{R}$ او $\text{dom } g = \mathbb{R}$

$$\text{dom}(f - g)(x) = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

$$(f \cdot g)(x) = (2x - 1)(x^2 + x - 2) = 2x^3 + x^2 - 5x + 2$$

$$\text{dom}(f \cdot g)(x) = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

$$(\frac{f}{g})(x) = \frac{2x - 1}{x^2 + x - 2} = \frac{2x - 1}{(x + 2)(x - 1)}$$

$$\text{dom}(\frac{f}{g})(x) = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} - \{x / g(x) = 0\}$$

$$\text{dom}(\frac{f}{g})(x) = \{x \in \mathbb{R} / x \neq -2 \text{ او } x \neq 1\}$$

فعالیت

که $f(x) = x - 5$ او $g(x) = x^2 - 1$ وي، نو $(\frac{f}{g})(x)$ ، $(f \cdot g)(x)$ او $(f - g)(x)$ پیدا کړئ.

خلورم مثال: که $f(x) = x + 3$ او $g(x) = x - 1$ وي، $(f - g)(x)$ ، $(f \cdot g)(x)$ او $(\frac{f}{g})(x)$ پيدا کړئ.

حل:

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x) = x + 3 - (x - 1) = x + 3 - x + 1 = 4$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = (x + 3)(x - 1) = x^2 + 2x - 3$$

څرنگه چې د $f(x)$ د تعريف په ساحه کې ټول حقيقي عددونه شامل دي (X هر حقيقي عدد اخيستلای شي) يا $dom f = IR$ په همدې ډول: $dom g = IR$

$$(\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x+3}{x-1} \quad (x \neq 1)$$

$$dom(f - g)(x) = IR \cap IR = IR$$

$$dom(f \cdot g)(x) = IR \cap IR = IR$$

$$dom(\frac{f}{g})(x) = IR - \{1\}$$

$$dom(\frac{f}{g})(x) = \{x \in IR / x \neq 1\}$$

يا

$$dom(\frac{f}{g})(x) = (-\infty, 1) \cup (1, \infty)$$

يا

پنځم مثال: که $f(x) = \sqrt{4-x}$ او $g(x) = \sqrt{3+x}$ وي، $f + g$ ، $f - g$ ، $f \cdot g$ او $\frac{f}{g}$ پيدا کړئ او د تعريف ناحیه (Domain) يې وټاکئ.

حل:


$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = \sqrt{4-x} + \sqrt{3+x}$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x) = \sqrt{4-x} - \sqrt{3+x}$$


$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = (\sqrt{4-x})(\sqrt{3+x}) = \sqrt{(4-x)(3+x)} \\ = \sqrt{12 + x - x^2}$$

$$(\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\sqrt{4-x}}{\sqrt{3+x}} = \sqrt{\frac{4-x}{3+x}}$$

$$dom f : \{4 - x \geq 0, x \leq 4\} \text{ يا } (-\infty, 4]$$




$$\text{dom } g : \{x/3 + x \geq 0, x \geq -3\} \text{ یا } [-3, \infty)$$




$$(-\infty, 4] \cap [-3, \infty) = [-3, 4]$$

چې $[-3, 4]$ د $f+g$, $f-g$ او $f \cdot g$ د تابع گانو د تعريف ساحه ده.



$$\text{Dom } \frac{f}{g} = (-3, 4] \text{ نو: } g(-3) = 0 \text{ چې څرنگه چې } g(-3) = 0$$



له ثابت عدد سره د تابع د ضرب حاصل

که c یو ثابت عدد او f یوه تابع وي، نو حاصل ضرب یې عبارت دی له:

$$(cf)(x) = c \cdot f(x)$$

شپږم مثال: که $f(x) = x^2 - x + 2$ او $c = 5$ وي.

$$(5f)(x) = 5 \cdot f(x) = 5(x^2 - x + 2) = 5x^2 - 5x + 10$$

پوښتنې

لاندې تابع گانې په پام کې ونیسئ .

$$1 - (f+g)(x), (f-g)(x), (f \cdot g)(x) \text{ او } \left(\frac{f}{g}\right)x \text{ پیدا کړئ.}$$

2- د تعريف ناحیې یې وټاکئ.


$$a: f(x) = 2x + 3 \quad , \quad g(x) = x - 1 \quad , \quad b: f(x) = x - 5 \quad , \quad g(x) = 3x^2$$

$$c: f(x) = 2x^2 - x - 3 \quad , \quad g(x) = x + 1 \quad , \quad d: f(x) = \sqrt{x} \quad , \quad g(x) = x - 5$$

$$e: f(x) = \sqrt{x+4} \quad , \quad g(x) = \sqrt{x-1} \quad , \quad f: f(x) = \sqrt{3x} \quad , \quad g(x) = \sqrt{x^2 - 1}$$

د تابع گانو ترکیب یا مرکبې تابع گانې

composition of functions or composite functions



فعالیت

• که $f(x) = x^2 - 2$ او $g(x) = x + 3$ وي، $(f \circ g)(x)$ او $(g \circ f)(x)$ پیدا کړئ.

• په کوم حالت کې $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$ وي.

• $(f \circ f)(x)$ او $(g \circ g)(x)$ پیدا کړئ.

که چېرې f او g د x تابع گانې وي د f ترکیب له g سره د $(f \circ g)(x)$ یا $f(g(x))$ سره ښودل

کېږي $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f[g(x)]$

د $(f \circ g)(x)$ د تعریف ساحه عبارت له x څخه ده چې x د g د تعریف په ساحه کې او $g(x)$

د f د تعریف په ساحه کې شامل وي.

یا: د $(f \circ g)$ تعریف ساحه: $\text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \mathbb{R} / x \in \text{dom } g, g(x) \in \text{dom } f\}$

1- چې x د g د تعریف په ساحه کې شامل وي.

2- $g(x)$ د f د تعریف په ساحه کې شامل وي.

په پورتنۍ شکل کې $(f \circ g)(x)$ تابع د دوو ماشینو په واسطه ښودل شوي ده چې په لومړۍ ماشین

کې ورودی x ، (in put) دی او خروجي (output) یې $g(x)$ ده، په دویم ماشین کې (input)

یې $g(x)$ او (output) یې $(f \circ g)(x)$ دی. که

$x \xrightarrow{g} \boxed{g(x)} \xrightarrow{f} f(g(x))$ نو په $g(x)$ د f د تعریف په ساحه کې شامل نه وي،

دویم ماشین (f) کې داخلیدلای نه شي.

$x \xrightarrow{f} \boxed{f(x)} \xrightarrow{g} g(f(x))$

لومړی مثال: که $f(x) = x^2 - 1$ او $g(x) = 3x$ وي $(f \circ g)(x)$ او $(g \circ f)(x)$ پیدا کړئ.

حل:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(3x) = (3x)^2 - 1 = 9x^2 - 1$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2 - 1) = 3(x^2 - 1) = 3x^2 - 3$$

لیدل کېږي چې:

$$(f \circ g)(x) \neq (g \circ f)(x)$$

$$9x^2 - 1 \neq 3x^2 - 3$$

دویم مثال: که $f(x) = 3x - 4$ او $g(x) = x^2 + 6$ وي $(f \circ g)(x)$ او $(g \circ f)(x)$ پیدا کړئ.

حل: په حقیقت کې په $(f \circ g)(x)$ کې د $g(x)$ تابع د f په تابع کې د (Domain) یا x ځای نیسي

$$f(g(x)) = f(x^2 + 6) = 3(x^2 + 6) - 4 = 3x^2 + 18 - 4 = 3x^2 + 14$$

$$g(f(x)) = (g \circ f)(x) = g(3x - 4) = (3x - 4)^2 + 6 = 9x^2 - 24x + 22$$

ښکاره خبره ده چې د $(f \circ g)(x)$ او $(g \circ f)(x)$ د تعریف ساحه ټول حقیقي عددونه دي.

فعالیت

که $f(x) = x + 6$ او $g(x) = x - 6$ وي، وښیاست چې $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$ دی.

دریم مثال: که $g(x) = 1 - x$ او $f(x) = \sqrt{x}$ وي:

لومړی د $f \circ g$ او $g \circ f$ د تعریف ساحې پیدا کړئ، بیا $f \circ g$ او $g \circ f$ په لاس راوړئ.

حل: د f تابع د تعریف ساحه $[0, \infty)$ او د g تابع د تعریف ساحه ټول حقیقي عددونه $(-\infty, \infty)$ دي.

یا: $\text{Dom} f = [0, \infty)$ $\text{Dom} g = (-\infty, \infty)$

یا: $\text{Dom}(f \circ g) = \{x / x \in \text{dom} g, g(x) \in \text{dom} f\}$


$$\text{Dom}(f \circ g) = \{x / x \in \mathbb{R}, 1-x \geq 0\}, -x \geq -1 \Rightarrow x \leq 1 = (-\infty, 1]$$

$$\text{Dom}(g \circ f) = \{x / x \in \text{dom } f, f(x) \in \text{dom } g\} = \{x / x \geq 0, \sqrt{x} \in \mathbb{R}\} = (0, \infty]$$

$$(f \circ g)(x) = f(1-x) = \sqrt{1-x}$$

$$(g \circ f)(x) = g(\sqrt{x}) = 1 - \sqrt{x}$$

د مرکبو تابع گانو د تعريف د ساحې د لا روښانتيا لپاره لاندې شکل وگورئ.



څلورم مثال: که $h(x) = \sqrt{3x^2 + 1}$ وي، په دوو طريقو سره وښايست چې د $h(x)$ تابع د کومو

دوو تابع گانو له ترکيب څخه په لاس راغلي ده؟

حل: د $h(x)$ تابع کولای شو د $(g \circ f)(x)$ او $(j \circ k)(x)$ دوو تابع گانو د ترکيب په شکل وليکو.

په دې ډول که: $f(x) = 3x^2 + 1$ او $g(x) = \sqrt{x}$ وي.

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(3x^2 + 1) = \sqrt{3x^2 + 1}$$

په همدې ډول کولای شو د $h(x)$ تابع د $(j \circ k)(x)$ د دوو تابع گانو د ترکيب په شکل وليکو. په دې

ډول چې: $j(x) = \sqrt{x+1}$ او $k(x) = 3x^2$ وي.

$$(j \circ k)(x) = j(k(x)) = j(3x^2) = \sqrt{3x^2 + 1}$$

پنځم مثال: که $f(x) = \frac{x}{x+2}$ ، $(x \neq -2)$ وي، $f(f(x))$ او $(f \circ f)(2)$ پيدا کړئ.

حل:

$$(f \circ f)(x) = \frac{\frac{x}{x+2}}{\frac{x}{x+2} + 2} = \frac{\frac{x}{x+2}}{\frac{x+2x+4}{x+2}} = \frac{x}{x+2} \cdot \frac{x+2}{3x+4} = \frac{x}{3x+4}$$

$$(f \circ f)(2) = ? \quad (f \circ f)(x) = \frac{x}{3x+4} \Rightarrow (f \circ f)(2) = \frac{2}{3 \cdot 2 + 4} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$$

$$\begin{aligned} (f \circ f \circ f)(x) &= \frac{\frac{x}{x+2}}{3\left(\frac{x}{x+2}\right) + 4} = \frac{\frac{x}{x+2}}{\frac{3x}{x+2} + 4} = \frac{\frac{x}{x+2}}{\frac{3x + 4x + 8}{x+2}} \\ &= \frac{x}{x+2} \cdot \frac{x+2}{7x+8} = \frac{x}{7x+8} \end{aligned}$$

فعالیت

که $f(x) = x^2 - 2$ او $g(x) = x + 3$ وي، $(f \circ g)(x)$ ، $(g \circ f)(x)$ ، $(g \circ f)(-2)$ او $(f \circ g)(3)$ پیدا کړئ.

پوښتنې

1- که $f(x) = -3x + 2$ او $g(x) = x^3$ وي:

$(f + g)(x)$ ، $(f - g)(x)$ ، $(g - f)(x)$ ، $(f \cdot g)(x)$ ، $(\frac{g}{f})(x)$ پیدا او د تعریف ساحې یې هم وټاکئ.


2- که $f(x) = x^2 - 3$ او $g(x) = \sqrt{x-3}$ وي، $(f \cdot g)(x)$ ، $(\frac{f}{g})(x)$ او $(\frac{g}{f})(x)$ پیدا کړئ.

3- که $f(x) = x^2 + 1$ ، $g(x) = \frac{1}{x}$ ، $h(x) = \sqrt{4-x^2}$ او $k(x) = \sqrt{3x+4}$ وي، د $(f \cdot g)(x)$ ، $(\frac{f}{g})(x)$ ، $(h \cdot k)(x)$ او $(\frac{h}{k})(x)$ تابع ګانو د تعریف ساحې پیدا کړئ.

4- که $f(x) = 3x - 2$ ، $g(x) = x^2$ وي $(g \circ f)(3)$ او $(f \circ g)(1)$ پیدا کړئ.

5- که $f(x) = \sqrt{x}$ او $g(x) = \sqrt{2-x}$ وي، $f \circ g$ او $g \circ f$ پیدا کړئ.

6- که $f(x) = \frac{x}{x+1}$ ، $g(x) = x^{10}$ او $h(x) = x + 3$ وي $(f \circ g \circ h)(x)$ پیدا کړئ.



معکوسه تابع (Inverse Function)

فعالیت

- په شکل کې د دواړو تابع گانو ترمنځ کومه اړیکه شتون لري؟
- آیا د هرې تابع معکوس، هم یوه تابع وي؟
- که د یوې تابع معکوس هم یوه تابع وي، داسې تابع په څه نامه یادېږي؟
- که $f = \{(1,2)(3,5)(6,7)\}$ او $g = \{(2,1)(5,3)(7,6)\}$ وي آیا د g تابع د f معکوسه تابع ده او که نه؟ ولې؟
- که $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$ وي، آیا د f تابع معکوسه تابع ده؟

په پورتنی شکل کې یو تېرمامیټر لیدل کېږي او پوهېږو چې د سانتي گریډ او فارنهایت د تودوخې د درجو ترمنځ د $f = \frac{9}{5}c + 32$ اړیکه شته دی، که دا معادله د (C) له پاره حل شي لرو چې:

$$f = \frac{9}{5}c + 32 \Rightarrow f - 32 = \frac{9}{5}c + 32 - 32$$

$$\Rightarrow \frac{5}{9}(f - 32) = \frac{5}{9}\left(\frac{9}{5}c\right)$$

$$c = \frac{5}{9}(f - 32)$$

د C تابع د f معکوسه تابع ده.

د (x, y) رابطې معکوس له (y, x) څخه عبارت ده چې د معکوسې تابع د تعریف ساحه د تابع

د قیمتونو د ساحې او د معکوسې تابع د قیمتونو ساحه، د تابع د تعریف له ساحې څخه عبارت ده.

$$\text{Range } f^{-1} = \text{domain } f \quad \text{او} \quad \text{domain } f^{-1} = \text{Range } f$$

د f د تابع معکوس په f^{-1} ښودل کېږي، پام مو وي چې:

$$(f^{-1}(x)) \neq \frac{1}{f(x)}$$

لومړی مثال: که $f(x) = \{(1,5)(3,7)(8,-10)\}$ وي.

نو $f^{-1}(x) = \{(5,1)(7,3)(-10,8)\}$ ده. ځکه چې:

$$f(3) = 7 \quad f^{-1}(7) = 3$$

$$f(1) = 5 \quad f^{-1}(5) = 1$$

$$f(8) = -10 \quad f^{-1}(-10) = 8$$

نو $f^{-1}(x)$ هم یوه تابع ده.

خو که $f(x) = \{(1,2)(3,2)(4,5)\}$ وي، $f^{-1}(x) = \{(2,1)(2,3)(5,4)\}$ ده.

لیدل کېږي چې $f^{-1}(x)$ یوه تابع نه ده، ځکه د $x = 2$ لپاره دوه مختلف تصویرونه په (Range) کې وجود لري. $f(2) = 1$ او $f(2) = 3$.

نو د هرې تابع معکوس یوه تابع نه وي، یا په بل عبارت هره تابع معکوس منونکي نه وي.

څه وخت چې یوه تابع د مرتبو جوړو په شکل راکړل شوي وي، که د لومړیو او دویمو عناصرو ځایونه یې یو تر بله تبدیل کړو، هغه رابطه چې لاسته راځي، د لومړنۍ تابع معکوسه ده، هغه تابع چې معکوس یې هم تابع وي، نو تابع معکوس منونکي ده.

دویم مثال: آیا د f او g تابع گانې چې په لاندې ډول د مرتبو جوړو په شکل راکړل شوي دي معکوس منونکي دي که نه؟

$$f = \{(1,2), (-2,3), (3,1), (0,-1)\} \quad g = \{(2,4), (3,1), (0,2), (5,1)\}$$

حل: که د مرتبو جوړو د لومړنیو او دویمو عناصرو ځایونه یو تر بله تبدیل شي، نو لرو چې:

$$f^{-1} = \{(2,1), (3,-2), (1,3), (-1,0)\}$$

لیدل کېږي چې f^{-1} یا د f تابع معکوس هم یوه تابع ده، ځکه چې د f^{-1} د مرتبو جوړو لومړنۍ عناصر تکرار شوي نه دي. او $g^{-1} = \{(4,2), (1,3), (2,0), (1,5)\}$

لیدل کېږي چې g^{-1} یا د $g(x)$ معکوس تابع نه ده، ځکه د $x = 1$ لپاره دوه قیمتونه د 3 او 5 وجود لري، نو د g تابع معکوس منونکی تابع نه ده.

په لنډ ډول څرنگه چې f یو په یو تابع ده، نو معکوس منونکي هم ده او د g تابع چې یو په یو تابع نه ده، نو معکوس منونکي هم نه ده.

نتیجه: یوازې د یو په یو تابع معکوس هم یوه تابع وي.

یو په یو تابع (one-to-one function)

د $f(x)$ تابع یوه یو په یو تابع ده که چېرې $x_1 \neq x_2$ وي او په نتیجه کې $f(x_1) \neq f(x_2)$ شي.

یا: $a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b)$ او که $a = b \Rightarrow f(a) = f(b)$

که یوه تابع یو په یو وي، نو معکوس یې هم یوه تابع ده.

دریم مثال: که $f(x) = -4x + 12$ او $g(x) = \sqrt{25 - x^2}$ وي، وښیاست چې کومه یوه له دې تابع گانو څخه یو په یو تابع ده؟

حل: که $a \neq b$ وي، $-4a + 12 \neq -4b + 12$ دی.

نو $f(x)$ یوه یو په یو تابع ده.

$$f(2) = -4(2) + 12 = -8 + 12 = 4$$

د مثال په ډول: که $x = 2$ وي:

که $x = 3$ وي:

$$f(3) = -4(3) + 12 = -12 + 12 = 0$$

$$a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b)$$

$$2 \neq 3 \Rightarrow 4 \neq 0$$

نو $f(x)$ یو په یو تابع ده. او $g(x) = \sqrt{25 - x^2}$ لپاره:

$$g(3) = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4 \quad \text{که } x = 3 \text{ وي.}$$

$$g(-3) = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4 \quad \text{که } x = -3 \text{ وي.}$$



$$f(3) = f(-3) \quad \text{لېکن } 3 \neq -3 \quad \text{نو } g(x) \text{ یو په یو تابع نه ده.}$$

فعالیت

که $f(x) = 3x + 8$ او $g(x) = x^2$ وي، وښیاست چې کومه یوه تابع یو په یو تابع ده او کومه یوه تابع یو په یو تابع نه ده؟ ولې؟

د گراف له مخې د یو په یو تابع پېژندنه: که یو افقي خط چې د X له محور سره موازي وي د تابع گراف په یوه نقطه کې قطع کړي، دا یو په یو تابع ده، که افقي خط د تابع گراف له یوې نقطې څخه په زیاتو نقطو کې قطع کړي، نو دا گراف د یو په یو تابع گراف نه دی.

څلورم مثال: په راکړل شوو شکلونو کې لیدل کېږي چې د X له محور سره موازي خط لومړنی تابع گراف په یوه نقطه کې او د دویمې تابع گراف یې په دوو نقطو کې قطع کړی دی، نو لومړنی تابع یو په یو تابع ده، خو دویمه تابع یو په یو تابع نه ده.



د معکوسي تابع تعریف: که f یوه یو په یو تابع وي چې د تعریف ساحه یې X او د قیمتونو ساحه یې Y ده، نو د g تابع د f د تابع معکوسه تابع ده، که د g د تعریف ساحه Y او د قیمتونو ساحه یې X وي او یا د g تابع په هغه صورت کې د f د تابع معکوسه ده که چېرې:

$$(f \circ g)(x) = x$$

$$(g \circ f)(x) = x$$

$$(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) = x$$


پنځم مثال: که $f(x) = 3x + 2$ وي، د $f(x)$ د تابع معکوسه تابع $f^{-1}(x)$ پیدا کړئ.

حل:

$$y = f(x) = 3x + 2$$

$$x = 3y + 2$$

$$3y = x - 2$$



$$y = \frac{x-2}{3}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x-2}{3} = \frac{1}{3}x - \frac{2}{3}$$

$$f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$$

دا مثال په لنډ ډول په شکل کې هم ښودل شوی دی.

له بلې خوا که $f^{-1}(x) = \frac{x-2}{3}$ په $g(x) = \frac{x-2}{3}$ سره وښودل

شي، $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) = x$ دی.

ځکه چې:

$$(f \circ g)(x) = 3\left(\frac{x-2}{3}\right) + 2 = x - 2 + 2 = x$$

$$(g \circ f)(x) = \frac{3x+2-2}{3} = \frac{3x}{3} = x$$

یا: $f^{-1}(f(x)) = x$ او $f(f^{-1}(x)) = x$

شپږم مثال: که $f(x) = x^3 + 1$ وي $f^{-1}(x)$ او که $g(x) = x^2$ وي $g^{-1}(x)$ پیدا کړئ.

حل:

$$y = x^3 + 1$$

$$x = y^3 + 1 \Rightarrow y^3 = x - 1 \Rightarrow y = \sqrt[3]{x-1}$$

که Y په $f^{-1}(x)$ سره وښیو، نو $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1}$

$$g(x) = x^2 \Rightarrow y = x^2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{y}$$


X پر Y او Y پر X بدلوه.

$$y = \pm\sqrt{x} \quad \text{یا} \quad g^{-1}(x) = \pm\sqrt{x}$$

لیدل کېږي چې $g^{-1}(x)$ یوه تابع نه ده، ځکه چې که $x = 2$

او یا $x = -2$ وي، $g(-2) = 4$ او $g(2) = 4$ کېږي شکل

وگورئ نو د $g(x)$ تابع معکوس پښیره نه ده.



اووم مثال: د x د کوم قیمت لپاره د $f(x) = 5x - 2$ تابع له خپل معکوس سره مساوي کېږي؟

حل: که $y = 5x - 2$ وي، نو معکوس یې

$$x = 5y - 2 \Rightarrow 5y = x + 2$$

$$y = \frac{x+2}{5} \quad f^{-1}(x) = \frac{x+2}{5}$$

$$\frac{x+2}{5} = 5x - 2 \Rightarrow 24x = 12$$

$$x = \frac{1}{2}$$

نو د $x = \frac{1}{2}$ په قیمت سره د $f(x)$ تابع له خپلې معکوسې تابع سره مساوي کېږي.

اتم مثال: وښایست چې د $f(x) = 7x - 2$ او $g(x) = \frac{1}{7}x + \frac{2}{7}$ تابعګانې یو د بل معکوسې

تابع ګانې دي.

حل:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f\left(\frac{1}{7}x + \frac{2}{7}\right) = 7\left(\frac{1}{7}x + \frac{2}{7}\right) - 2 = x$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(7x - 2) = \frac{1}{7}(7x - 2) + \frac{2}{7} = x$$

نو د $f(x)$ او $g(x)$ تابع ګانې یو د بل معکوسې تابعګانې دي، نو نتیجه کېږي چې د تابع او د تابع د معکوسې تابع ترکیب د عینیت ($f(x) = x$) تابع ده.

فعالیت

که $f(x) = \frac{2x+1}{x-2}$ وي، $f^{-1}(x)$ پیدا کړئ او هم وښایست چې $(f \circ f^{-1})(x) = x$ کېږي.

د تابع او دهغې د معکوسې تابع ګراف: د $f(x)$ د یو په یو تابع او د دهغې د معکوسې تابع

$f^{-1}(x)$ د ګرافونو ترمنځ یوه رابطه موجوده ده، ځکه که چېرې (a, b) د $f(x)$ تابع د ګراف پر

منځ یوه نقطه وي، نو د (b, a) نقطه د $f^{-1}(x)$ تابع د ګراف پر منځ واقع ده چې (a, b) او (b, a)


نقطې له نظره د $y = x$ خط ته سره متناظرې دي.

نهم مثال: که $f(x) = 3x - 2$ وي، نو ښکاره ده چې $f^{-1}(x) = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$ د $f(x)$ معکوسه

تابع ده. د دواړو تابع گانو گرافونه د وضعيه کمياتو په عين سيستم کې رسم او يو له بله سره يې پرتله کړئ چې گرافونه نظر د $y = x$ خط ته سره متناظر دي.

x	0	1	2
$f(x)$	-2	1	4


x	-2	1	4
$f^{-1}(x)$	0	1	2



ليدل کېږي چې د دواړو تابع گانو گرافونه نظر د $y = x$ خط ته سره متناظر دي.

لسم مثال: که $f(x)$ د $(-1, 0)$, $(-3, -2)$ او $(4, 2)$ مرتبو جوړولرونکي وي د $f(x)$ او

$f^{-1}(x)$ د تابع گانو گرافونه د وضعيه کمياتو په عين سيستم کې رسم کړي او وښايست چې دواړه گرافونه نظر د $y = x$ خط ته سره متناظر دي.



ليدل کېږي چې د $f(x)$ او $f^{-1}(x)$ تابع گانو گرافونه نظر د $y=x$ خط ته سره متناظر دي.

• د يو په يو تابع معکوس هم يوه تابع ده.

• د X له محور سره موازي خط (افقي خط) د يو په يو تابع گراف په يوه نقطه کې قطع کوي.

• د $y = f(x)$ تابع د معکوس د پيدا کولو لپاره د تابع معادله د X لپاره حلوو، بيا X پر Y او Y

پر X بدلوو په لاس راغلی تابع $y = f^{-1}(x)$ ده چې د $f(x)$ د تابع معکوسه تابع ده.

• د $f(x)$ د تابع او د $f(x)$ د معکوسې تابع گرافونه نظر د $y=x$ خط ته سره متناظر دي.

• $dom f(x) = Range f^{-1}(x)$ او $Range f(x) = dom f^{-1}(x)$ دي.

پوښتنې

1- د لاندېنيو تابع گانو معکوس پيدا کړئ او ووايئ چې د کومې تابع معکوس هم يوه تابع ده؟

$$f = \{(-1,0), (-2,1), (4,3), (3,4)\} \quad h = \{(1,4), (2,3), (4,1)\}$$

$$g = \{(1,2), (2,3), (3,2), (4,1)\} \quad k = \{(3,0), (2,-1), (1,2), (0,1), (-1,2)\}$$

2- د لاندېنيو هرې يوې تابع معکوسه تابع پيدا کړئ او د خپل ځواب صحت د $f(f^{-1}(x)) = x$

سره وازمائي.

$$f(x) = x + 3 \quad f(x) = 2x \quad f(x) = 2x + 3$$

$$f(x) = x^3 + 2 \quad f(x) = (x + 2)^3 \quad f(x) = \frac{1}{x}$$


3- د لاندېنيو تابع گانو گرافونه رسم کړئ او د X له محور سره د موازي خط (افقي خط) په واسطه

وښايست چې ددوی معکوس هم يوه تابع ده.

$$f(x) = 1 - x^2 \quad g(x) = \frac{7 - 2x}{5}$$

4- له لاندېنيو تابع گانو څخه کومه يوه يو په يو تابع ده.

$$y = 4x - 5 \quad y = 6 - x \quad y = (x - 2)^2 \quad y = 9 \quad y = \frac{1}{x + 2}$$



پولینومي تابع گانې

- آيا پوهېږي چې لومړۍ درجې تابع ته ولې خطي تابع وايي؟
- آيا د لومړۍ درجې تابع گراف يو مستقيم خط دی؟

پولینومونه مو په لومړي فصل کې تر څېړنې لاندې ونيول. هغه پولینوم چې له يوه تورې (متحول) څخه جوړ شوي وي د پولینومي تابع په نامه يادېږي.

خطي تابع (Liner function) يا لومړۍ درجه تابع


هغه پولینومي تابع ده چې درجه يې يوه وي، د لومړۍ درجې تابع عمومي شکل $f(x) = ax + b$ دی چې $a \neq 0$ او a , b حقيقي عددونه دي.

د مثال په ډول: $f(x) = 3x + 4$, $f(x) = x - 1$, $f(x) = 2x$ او $f(x) = \frac{1}{2}x$ خطي تابع گانې دي.

لومړۍ مثال: د $f(x) = \frac{3}{4}x - 3$ تابع گراف رسم کړئ او د X او Y له محورونو سره د گراف د تقاطع نقطې پيدا کړئ.

$$f(x) = \frac{3}{4}x - 3$$

$x =$	8	4	0
$f(x)$	3	0	-3



د X له محور سره د گراف د تقاطع نقطه $(4, 0)$ او د Y له محور سره د گراف د تقاطع نقطه $(0, -3)$ ده.

لیدل کېږي چې د لومړۍ درجې تابع گراف یو مستقیم خط دی او له همدې سببه ورته خطي تابع هم وایي، د خطي تابع د گراف د رسمولو لپاره همدومره کافي ده چې د X او Y له محورونو سره یې د تقاطع ټکي پیدا کړو او مستقیم خط رسم کړو، لکه: چې په شکل کې لیدل کېږي.

فعالیت

د $y = x - 1$ او $y = f(x) = x + 1$ تابع گانو گراف رسم او د X او Y له محورونو سره یې د تقاطع د نقطو وضعیه کمیات هم پیدا کړئ.

دویم مثال: د $f(x) = \frac{2}{3}x + 2$ خطي تابع گراف رسم کړئ.

حل: د Y له محور سره د گراف د تقاطع په نقطه کې ($x = 0$) دی، نو:

$$f(0) = \frac{2}{3}(0) + 2 = 2$$

نو د Y له محور سره د گراف د تقاطع نقطه $(0, 2)$ ده.


او د X له محور سره د گراف د تقاطع په نقطه کې د y یا $f(x)$ قیمت صفر دی $f(x) = 0$

$$0 = \frac{2}{3}x + 2 \Rightarrow x = -3$$

نو د X له محور سره د گراف د تقاطع ټکی $(-3, 0)$ دی.



د $(0, 2)$ او $(-3, 0)$ نقطې یو له بله سره نښلولو او مستقیم خط رسموو او هم کولای شو چې د گراف یو څو نورې نقطې وټاکو چې پر همدې مستقیم خط باندې پرتې دي.

$x =$	0	3	-3	6	-6	...
$f(x) =$	2	4	0	6	-2	...



دویمه درجه تابع (Quadratic Function) او گراف یې:

دا گرافونه د کوم ډول تابع گرافونه دي؟



• دا دواړه گرافونه سره څه توپیر لري؟

• له $k(x) = x^2$, $h(x) = x^2 + 3x$, $g(x) = x^2 + 1$, $f(x) = x^2 + 7x + 12$ او

$r(x) = 2x - 1$ څخه کومه یوه یې دویمه درجه تابع نه ده؟

هغه پولینومي تابع چې درجه یې یوه وي، لومړۍ درجه یا د خطي تابع (Liner Function) په نامه

یادېږي او که د پولینومي تابع درجه (2) وي، د دویمي درجې تابع په نوم یادېږي.

فعالیت

• د دویمي درجې تابع گراف په کوم نوم یادېږي؟

• د دویمي درجې تابع د گراف د تناظر محور کوم خط دی؟

• د دویمي درجې تابع گراف څه وخت پورته خواته او کوم وخت ښکته خواته خلاصېږي؟

• د دویمي درجې تابع د گراف رأس په کوم وخت کې اصغري (Minimum) او په کوم وخت


کې اعظمي (Maximum) دی؟

• آیا د دویمي درجې تابع گراف د رأس د نقطې وضعیه کمیات پیدا کولای شي؟

• په کوم حالت کې د دویمي درجې تابع گراف د X او Y محورو په قطع کولای شي؟

• آیا د X او Y له محورو سره د دویمي درجې تابع د گراف د تقاطع د نقطو وضعیه کمیات پیدا

کولای شی؟



x	0	1	2	-1	-2
y	0	1	4	1	4

د دویمې درجې تابع عمومي شکل $f(x) = ax^2 + bx + c$

دی چې a ، b او c حقیقي عددونه او $a \neq 0$ دی.

د دویمې درجې تابع گراف: تر ټولو ساده دویمه درجه تابع

د $f(x) = y = x^2$ تابع ده چې $a = 1$ او $b = c = 0$

که x ته یو شو قیمتونه ورکړل شي د تابع یا y اړونده قیمتونه

لاس ته راوړلای شو، گراف یې رسم کېدای شي لکه: څنگه

چې په شکل کې لیدل کېږي.

د دویمې درجې تابع گراف د پارابولا (Parabola) په نوم

یادېږي چې دا گراف نظر د y محور ته متناظر دی، هغه خط

چې د پارابول له رأس څخه تېر شي او د y له محور سره

موازي وي، د تناظر د محور په نامه یادېږي چې د y محور ددې تابع د گراف د تناظر محور دی.

هغه نقطه چې د تناظر محور په کې گراف قطع کوي، د پارابول د رأس (Vertex) په نامه یادېږي. که

$a > 0$ وي، د پارابول خوله پورته خواته خلاصېږي او د گراف د رأس ټکی اصغري دی د $y = x^2$

تابع گراف د $(-\infty, 0)$ په انټروال کې متناقص او د $(0, \infty)$ په انټروال کې گراف متزايد دی.


لومړی مثال: د $y = -x^2$ تابع گراف رسم کړئ.

حل:

د پارابول خوله ښکته خواته خلاصېږي، ځکه چې $a < 0$

دی، د $(-\infty, 0)$ په انټروال کې گراف متزايد او د $(0, \infty)$

په انټروال کې گراف متناقص دی.



x	0	1	-1	2	-2
y	0	-1	-1	-4	-4

فعالیت

د $y = x^2 + 4$ تابع گراف رسم کړئ.

دویم مثال: د $f(x) = x^2$, $g(x) = 2x^2$ او $h(x) = \frac{1}{2}x^2$ تابع گانو گرافونه د وضعیه کمیاتو په عین سیستم کې رسم او یو له بله سره یې پرتله کړئ.

$$g(x) = 2x^2$$


$x =$	0	1	-1	2	-2
$g(x) =$	0	2	2	8	8

$$f(x) = x^2$$

$x =$	0	1	-1	2	-2
$f(x) =$	0	1	1	4	4


$$h(x) = \frac{1}{2}x^2$$

$x =$	0	1	-1	2	-2
$h(x) =$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	2	2



درېم مثال: د $y = x^2 - 4$ تابع گراف رسم کړئ.


x	0	1	-1	2	-2	3	-3
y	-4	-3	-3	0	0	5	5



په حقیقت کې د $y = x^2$ تابع گراف 4 واحد بنځته خواته نقل شوی دی.


څلورم مثال: د $y = (x - 4)^2$ تابع گراف رسم کړئ.

حل: که x ته یو څو قیمتونه ورکړو او د y اړونده قیمتونه پیدا کړو د تابع گراف رسمیدلای شي لکه:



x	4	5	3	6	2	...
y	0	1	1	4	4	...

لیدل کېږي چې گراف د $(-\infty, 4)$ په انټروال کې متناقص او د $(4, \infty)$ په انټروال کې متزايد دی. له شکل څخه لیدل کېږي چې د $y = x^2$ گراف په افقي ډول 4 واحدې بنې خوا ته انتقال شوی دی د پارابول رأس د $(4, 0)$ ټکی دی او د تناظر محور یې $x = 4$ مستقیم خط دی.



x	-3	-2	-4	-5	-1
y	1	0	0	-3	-3

پنځم مثال: د $y = -(x+3)^2 + 1$ تابع گراف رسم کړئ.

د $y = x^2$ گراف درې واحدې کینې خوا ته او یو واحد په عمودي ډول پورته خوا ته نقل شوی دی او د پارابول رأس د $(-3, 1)$ ټکی د گراف اعظمي نقطه او د تناظر محور یې $x = -3$ دی چې په شکل کې هم لیدل کېږي.

فعالیت

د $y = 3x^2$ او $y = -3x^2$ تابع گانو گرافونه رسم کړئ.

D او Y له محورونو سره د گراف د تقاطع ټکي:

ددې لپاره چې په اسانۍ سره پارابول رسم کړو، د X او Y له محور سره یې د تقاطع ټکي پیدا کوو (که چېرې د X له محور سره تقاطع ولري)

د Y له محور سره د تقاطع ټکي پيدا کولو لپاره د $y = ax^2 + bx + c$ معادله کې $x=0$ وضع کېږي په نتيجه کې $y=c$ دی.

د X له محور سره د تقاطع د پيدا کولو لپاره $y = 0$ وضع کوو، نو لرو چې:

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$0 = ax^2 + bx + c \Rightarrow ax^2 + bx + c = 0$$

څرنگه چې پوهېږئ $ax^2 + bx + c = 0$ يوه دويمه درجه معادله ده او جذرونه يې

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ دی، پوهېږو چې ددې معادلې جذرونه هغه وخت حقيقي عددونه دي}$$

چې $b^2 - 4ac \geq 0$ وي، که $b^2 - 4ac < 0$ گراف د X محور قطع کولای نه شي، په لنډ

ډول يې په لاندې جدول کې وگورئ:

د $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) تابع گراف

a	د دويمې درجې تابع گراف په هغه صورت کې د X محور په دوو نقطو کې قطع کوي چې $b^2 - 4ac > 0$ وي.
b	په هغه صورت کې د X محور په يوه نقطه کې قطع کوي چې $b^2 - 4ac = 0$ وي.
c	په هغه صورت کې د X محور قطع کولای نه شي چې $b^2 - 4ac < 0$ وي.

د پارابولا د راس د نقطې د وضعيه کمياتو پيدا کول:

د تکميل مربع په طريقه هم کولای شو چې د پارابول د راس د نقطې وضعيه کميات پيدا کړو.

$$y = ax^2 + bx + c = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c$$

$$y = a\left[\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2\right) - \left(\frac{b}{2a}\right)^2\right] + c$$

$$= a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}\right] + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - a\left(\frac{b^2}{4a^2}\right) + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c$$

$$y = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}$$


$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

د پارابولا د رأس د ټکي وضعیه کمیات $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$ او یا (h, k) دي او څرنگه چې د تناظر محور د پارابولا له رأس څخه تېریږي، نو $x = -\frac{b}{2a}$ د تناظر د محور معادله ده. که چېرې $a > 0$ وي، رأس اصغري (Minimum) او که $a < 0$ وي، رأس اعظمي (Maximum) دی.

شپږم مثال: د $f(x) = 2x^2 + 4x + 5$ تابع گراف رسم کړئ.

1- د X له محور سره د تقاطع ټکي پیدا کوو. څرنگه چې $a = 2$ ، $b = 4$ او $c = 5$ دی. $\Delta = b^2 - 4ac = 4^2 - 4 \cdot 2 \cdot 5 = -24 < 0$ دا چې $\Delta < 0$ ده نو گراف د X محور نه قطع کوي.

2- د Y له محور سره د گراف د تقاطع ټکي پیدا کوو په دې حالت کې $x = 0$ دی. د $y = ax^2 + bx + c$ په تابع کې که $x = 0$ شي $y = c$ کېږي، نو $(0, c)$ د Y له محور سره د گراف د تقاطع نقطه ده. $f(0) = 2 \cdot 0^2 + 4 \cdot 0 + 5 = 5$.



نو په دې مثال کې $(0, 5)$ د Y له محور سره د تقاطع نقطه ده.

3- د رأس د نقطې وضعیه کمیات عبارت دي له:

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2 \cdot 2} = -\frac{4}{4} = -1$$

$$y = \frac{4ac - b^2}{4a} = \frac{4 \cdot 2 \cdot 5 - 4^2}{4 \cdot 2} = \frac{40 - 16}{8} = \frac{24}{8} = 3$$

$(-1, 3)$ د پارابولا د رأس د نقطې وضعیه کمیات دي او

رأس اصغري دی، ځکه چې $a > 0$ دی.

4- د تناظر د محور معادله $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{4} = -1$ ده، د گراف د تناظر د محور معادله $x = -1$ ده، د

گراف د رسمولو لپاره کولای شو د گراف یو څو نورې نقطې هم پیدا کړو:

$$f(x) = 2x^2 + 4x + 5$$

x =	-1	-2	0	1	-3
f(x) =	3	5	5	11	11

اووم مثال: د $y = -3x^2 - 2x + 1$ تابع گراف رسم کړئ.


$$y = -3\left(x^2 + \frac{2}{3}x\right) + 1$$

د X د ضرب نیمایي مربع جمع او هم تفریقوو.

$$y = -3\left[x^2 + \frac{2}{3}x + \left(\frac{1}{3}\right)^2 - \left(\frac{1}{3}\right)^2\right] + 1$$

$$y = -3\left[x^2 + \frac{2}{3}x + \left(\frac{1}{3}\right)^2\right] - 3\left(-\frac{1}{9}\right) + 1 = -3\left[\left(x^2 + \frac{2}{3}x + \left(\frac{1}{3}\right)^2\right)\right] + \frac{4}{3}$$

$$y = -3\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{4}{3}$$



په نتیجه کې $x = -\frac{1}{3}$ د تناظر د محور معادله ده، ځکه چې: $x + \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{3}$ او $\left(-\frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right)$ د رأس د ټکي وضعیه کمیات دي او څرنگه چې $a < 0$ دی، نو د پارابولا رأس اعظمي دی.

یادونه: که دویمه درجه تابع د $y - k = a(x - h)^2$

یا $y = a(x - h)^2 + k$ په شکل ولیکل شي $x = h$

د تناظر د محور معادله او (h, k) د رأس د نقطې وضعیه کمیات دي.

$f(x) = ax + b$ ($a \neq 0$) د لومړۍ درجې یا خطي

تابع عمومي شکل دی.

او $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) د دویمې درجې معادلې عمومي شکل دی.

د دویمې درجې تابع گراف ته پارابول (Parabola) وایي که $a > 0$ وي، رأس اصغري او که $a < 0$

وه، رأس اعظمي دی. $\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$ د پارابولا د رأس وضعیه کمیات او $x = -\frac{b}{2a}$ د پارابول

د تناظر د محور معادله ده. که $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ پارابولا د X محور په دوو نقطو کې او که $\Delta = 0$

نو پارابولا د X محور په یوه نقطه کې قطع کوي او که $\Delta < 0$ وي، پارابولا د X محور قطع کولای نه شي.

پوښتنې

1 - د $h(x) = -\frac{3}{2}x + 3$ د تابع گراف رسم کړئ.

2 - د $g(x) = 2x + 1$ او $g(x) = 2x - 1$ تابع گانو گرافونه د وضعیه کمیاتو په عین سیستم

کې رسم او سره پرتله یې کړئ.

3 - د $f(x) = x^2$ ، $f(x) = 2x^2$ ، $f(x) = 3x^2$ ، $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ او $f(x) = \frac{1}{3}x^2$

تابع گانو گرافونه د وضعیه کمیاتو په عین سیستم کې رسم کړئ او یو له بله سره یې پرتله کړئ

4 - د لاندې تابع گانو د گراف د تناظر محور معادلې پیدا کړئ.

$f(x) = x^2 + 8x + 13$ ، $f(x) = x^2 - 12x + 30$ ، $f(x) = 3x^2 - 2x + 6$

5 - د $f(x) = (x-2)^2$ ، $g(x) = (x+1)^2$ او $h(x) = (x-3)^2$ تابع گانو گرافونه رسم


کړئ او ووايست چې د $f(x) = x^2$ له گراف سره څه اړیکه لري؟

6 - د $y = -x^2 - 1$ تابع د گراف د راس وضعیه کمیات عبارت دي له:

a : $(-1, 1)$ b : $(1, -1)$ c : $(0, -1)$ d : $(0, 1)$

7 - د $y = (x-1)^2 - 2$ تابع د گراف د راس وضعیه کمیات عبارت دي له:

a : $(1, 1)$ b : $(-1, 2)$ c : $(-1, -2)$ d : $(1, -2)$



ناطقې يا نسبتي تابع گانې (Rational functions)

دا شکل د کوم ډول تابع گانو گرافونه دي؟

فعالیت

- آیا د ناطقې تابع د عمودي مجانب معادله پیدا کولای شئ؟
- آیا د هرې ناطقې تابع د تعریف په ساحه کې ټول حقیقي عددونه شاملیدلای شي؟
- آیا د یوې ناطقې تابع افقي مجانب پیدا کولای شئ؟
- آیا هره ناطقه تابع عمودي مجانب لري؟

تعریف

ناطقه تابع هغه تابع ده چې د دوو پولینومي تابع گانو له خارج قسمت څخه جوړه شوي وي که $f(x) = \frac{p(x)}{g(x)}$ وي، په داسې حال کې چې $g(x) \neq 0$ او $p(x)$ او $g(x)$ پولینومونه وي، نو $f(x)$ یوه ناطقه تابع ده.

د ناطقې تابع د تعریف ساحه ټول حقیقي عددونه دي، پرته د x له هغو قیمتونو څخه چې د ناطقې تابع مخرج پرې صفر کېږي، د مثال په ډول: $f(x) = \frac{1}{x}$ ، $h(x) = \frac{x^3 - 1}{x}$ ، $g(x) = \frac{x - 1}{x^2 - x - 6}$ ، $g(x) = 3$ او $P(x) = 2x^2 - 3$ ناطقې تابع گانې دي.

فعالیت

آیا $k(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x+2}$ یوه ناطقه تابع ده؟ ولې؟

د ناطقې تابع د تعريف د ساحې پيدا كول (Finding Domain of Rational function)

لومړۍ مثال: د لاندېنيو ناطقو تابع گانو د هرې يوې د تعريف ساحه پيدا كړئ.

$$f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}, \quad g(x) = \frac{x}{x^2 - 9}, \quad h(x) = \frac{x + 3}{x^2 + 9}$$

حل: د $f(x)$ په تابع کې د $x = 3$ لپاره د تابع مخرج صفر کېږي، نو د 3 عدد د $f(x)$ د ناطقې

تابع د تعريف په ساحه کې شامل نه دی يا: $Dom f(x) = \{x / x \in IR, x \neq 3\}$

د $g(x)$ په تابع کې که چېرې $x = 3$ يا $x = -3$ شي، نو مخرج يې صفر کېږي، نو د 3 او -3 عددونه د $g(x)$ د تابع د تعريف په ساحه کې شامل نه دي.

$$Dom g(x) = \{x / x \in IR, x \neq 3, x \neq -3\}$$

څرنګه چې د $h(x)$ تابع مخرج د x په هيڅ قيمت نه صفر کېږي، نو د $h(x)$ تابع د تعريف ساحه ټول حقيقي عددونه دي.

$$Dom h(x) = IR \quad \text{يا} \quad Dom h(x) = (-\infty, \infty)$$

فعاليت

د لاندېنيو ناطقو تابع گانو د تعريف ساحې تعين كړئ.

$$f(x) = \frac{x^2 - 25}{x - 5}, \quad g(x) = \frac{x}{x^2 - 25}, \quad h(x) = \frac{x + 5}{x^2 + 25}$$

دويم مثال: د لاندېنيو ناطقو تابع گانو د تعريف او قيمتونو ساحې پيدا كړئ.

$$f(x) = \frac{x + 3}{x - 4} \quad g(x) = \frac{x - 3}{x + 5}$$

حل: د $f(x)$ تابع د تعريف ساحه پرته له (4) څخه ټول حقيقي عددونه دي.

$$\text{dom } f(x) = IR \setminus \{4\} \quad \text{یا} \quad IR - \{4\}$$

$$y = f(x) = \frac{x+3}{x-4} \Rightarrow y(x-4) = x+3$$

$$xy - x = 4y + 3$$

$$(y-1)x = 4y+3$$

$$xy - 4y = x + 3 \Rightarrow x = \frac{4y+3}{y-1}$$

$$\text{Range } f(x) = IR \setminus \{1\} \quad \text{یا} \quad IR - \{1\}$$

د $g(x)$ تابع د تعریف ساحه ټول حقیقي عددونه دي، پرته له (-5) څخه:

$$\text{dom } g(x) = IR - \{-5\} \quad \text{یا} \quad \{x \in IR / x \neq -5\}$$

$$g(x) = y = \frac{x-3}{x+5} \Rightarrow y(x+5) = x-3 \Rightarrow xy+5y = x-3$$

$$x = \frac{-5y-3}{y-1} \quad \text{Range } g(x) = IR - \{1\} \quad \text{یا} \quad \{y \in IR / y \neq 1\}$$

فعالیت

د لاندې راکړل شوو ناطقو تابع گانو د تعریف او قیمتونو ساحې پیدا کړئ.

$$h(x) = \frac{1}{x^3}, \quad k(x) = \frac{x+1}{3}, \quad r(x) = \frac{4x-1}{2-x}, \quad m(x) = \frac{x}{3x-2}$$


د ناطقې تابع د گراف رسمول (Graphing Rational function):

دریم مثال: د $f(x) = \frac{1}{x}$ تابع گراف رسم کړئ.

حل: که $x = 0$ شي، نو د تابع مخرج صفر کېږي، صفر د $f(x)$ د تابع د تعریف په ساحه کې شامل نه دی.

$$\text{Dom } f = IR - \{0\}$$

x	... -4	-3	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	1	2	3	4...
f(x)	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	-1	-2	-4	-3	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$...



اوس د $f(x) = \frac{1}{x}$ د تابع وضعیت مطالعه کوو:

څرنگه چې $x = 0$ د $f(x)$ تابع د تعریف په ناحیه کې شامل نه دی، ددې تابع د گراف د رسمولو لپاره x ته داسې قیمتونه ورکوو چې له دواړو خواوو څخه صفر ته نژدې شي (تقرب وکړي)، که x له کینې خوا صفر ته نژدې شي ($x \rightarrow 0^-$) د تابع قیمت $-\infty$ ته نژدې کېږي ($f(x) \rightarrow -\infty$) او که x له ښي خوا څخه صفر ته نژدې کېږي، ($x \rightarrow 0^+$) د تابع قیمت $+\infty$ ته تقریب کوي ($f(x) \rightarrow \infty$) لاندې جدول وگورئ.

a: x له کینې خوا څخه صفر ته نژدې کېږي.

x	... -1	-0.5	-0.1	-0.01	-0.001	$x \rightarrow 0^-$
$f(x) = \frac{1}{x}$	... -1	-2	-10	-100	-1000	$f(x) \rightarrow -\infty$

b: x له ښي خوا څخه صفر ته نژدې کېږي.

x	$0^+ \leftarrow x$	0.001	0.01	0.1	0.5	1...
$f(x) = \frac{1}{x}$	$\infty \leftarrow f(x)$	1000	100	10	2	1...

عمودي مجانب (Vertical Asymptotes)

که په یوه ناطقه تابع $f(x) = \frac{p(x)}{g(x)}$ کې چې صورت او مخرج یې مشترک فکتور، ونه لري او

$p(a) \neq 0$ وي، که $g(a) = 0$ شي، نو د $x = a$ خط د $f(x)$ د تابع عمودي مجانب دی چې د y له محور سره موازي دی. د عمودي مجانبونو شمېر د مخرج د جذرونو له شمېر سره مساوي دي یا په بل عبارت که $x \rightarrow a$ په نتیجه کې $f(x) \rightarrow +\infty$ یا $f(x) \rightarrow -\infty$ ، نو د $x = a$ عمودي خط ددې تابع عمودي مجانب دی یا که:

$$x \rightarrow a \Rightarrow |f(x)| \rightarrow \infty \quad \text{نو } x = a \text{ د تابع عمودي مجانب دی.}$$

x هر خومره چې د a قیمت ته نژدې شي، خو د تابع گراف د $x = a$ مستقیم خط قطع کولای نه شي، ځکه چې د a عدد د تابع د تعریف په ساحه کې شامل نه دی، لکه: د $f(x) = \frac{1}{x}$ تابع د تعریف په ساحه کې صفر شامل نه دی، نو $x = 0$ یا د Y محور د $f(x) = \frac{1}{x}$ تابع عمودي مجانب دی.

څلورم مثال: د $f(x) = \frac{2x}{x-3}$ ، $g(x) = \frac{x}{x^2-25}$ او $h(x) = \frac{x+5}{x^2+25}$ تابع گانو عمودي مجانبونه پیدا کړئ.

حل:

1 - د $f(x)$ تابع د عمودي مجانب د پیدا کولو لپاره د x هغه قیمت پیدا کوو چې د $f(x)$ تابع مخرج پرې صفر کېږي. نو د 3 عدد د $f(x)$ د تابع د تعریف په ساحه کې شامل نه دی.

$$\text{dom} f(x) = \{x / x \in \mathbb{R}, x \neq 3\}$$

نو د $x = 3$ خط د $f(x)$ تابع عمودي مجانب دی.

2 -

$$g(x) = \frac{x}{x^2-25} = \frac{x}{(x-5)(x+5)}$$

$$x-5=0 \Rightarrow x=5$$

$$x+5=0 \Rightarrow x=-5$$

د $x=5$ او $x=-5$ لپاره د $g(x)$ تابع مخرج صفر کېږي، نو د 5 او -5 عددونه د $g(x)$ د تابع د تعریف په ساحه کې شامل نه دي.

$$\text{dom} g(x) = \{x / x \in \mathbb{R}, x \neq -5, x \neq 5\}$$

نو د $g(x)$ د تابع عمودي مجانبونه د $x=5$ او $x=-5$ خطونه دي.

3 - څرنګه چې د x په هر قیمت د $h(x) = \frac{x+5}{x^2+25}$ تابع مخرج نه صفر کېږي، نو عمودي مجانب نه لري یا ددې تابع د تعریف ساحه ټول حقيقي عددونه دي.

افقي مجانب (Horizontal Asymptote)

که په یوه ناطقه تابع کې د صورت او مخرج درجې سره مساوي وي، نو ښکاره خبره ده چې دوېش

حاصل (خارج قسمت) به یو ثابت عدد وي، که دې ثابت عدد ته b ووايو، نو د $y = b$ افقي خط ددې تابع افقي مجانب دی چې دا خط یا د X محور او یا د X له محور سره موازي خط دی چې په حقیقت کې د b عدد د صورت او مخرج د لویو توانونو د ضربونو له نسبت څخه عبارت دی او یا صورت پر مخرج وېشو.

د مثال په ډول د $f(x) = \frac{2x^2}{x^2 - 1}$ د تابع افقي مجانب د $y = 2$ خط دی. افقي مجانب داسې تعریفوو:

که $x \rightarrow \infty$ یا $x \rightarrow -\infty$ او په نتیجه کې $f(x) \rightarrow b$ نو $y = b$ مستقیم خط د $f(x)$ تابع افقي مجانب دی او یا که $|x| \rightarrow \infty$ او $y \rightarrow b$ ، نو $y = b$ مستقیم خط ددې تابع افقي مجانب دی. **پنځم مثال:** د $f(x) = \frac{2x}{x-1}$ تابع گراف رسم کړئ. **حل:**

1 - د X له محور سره د گراف د تقاطع نقطه: د X له محور سره د تقاطع په نقطه کې

$$f(x) = 0 \text{ کېږي، په نتیجه کې لرو چې: } 0 = \frac{2x}{x-1} \Rightarrow 2x = 0 \Rightarrow x = 0$$

نو د تابع گراف د X محور په $x = 0$ یا د $(0, 0)$ په نقطه کې قطع کوي.

$$2 - \text{د } Y \text{ له محور سره د گراف د تقاطع نقطه: } f(0) = \frac{2 \cdot 0}{0-1} = \frac{0}{-1} = 0$$

نو گراف د X او Y محورونه د $(0, 0)$ په نقطه کې قطع کوي یا په بل عبارت ددې تابع گراف د وضعیه کمیاتو له مبدأ څخه تېرېږي.

3 - د تابع د عمودي مجانب معادله: $x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$ دی دا خط رسم کړئ.

4 - د تابع د گراف افقي مجانب $\frac{2}{1} = 2$ دی، نو $y = f(x) = 2$ د تابع افقي مجانب دی، یا



$$\frac{2x}{x-1} = 2 + \frac{2}{x-1} \text{ افقي مجانب یې هم رسم کړئ.}$$

5 - د گراف یو څو نورې نقطې هم پیدا کوو، لکه:

x	0	-2	-1	$\frac{1}{2}$	2	4
$y = f(x)$	0	$\frac{4}{3}$	1	-2	4	$\frac{8}{3}$

له محورونو سره د تقاطع نقطې ټاکو، د تابع مجانبونه رسموو او بیا یې گراف، لکه: څنگه چې په

شکل کې لیدل کېږي، رسموو. $f(x) = \frac{2x}{x-1}$



فعالیت

د $f(x) = \frac{3x}{x-2}$ تابع گراف رسم کړئ.

شپږم مثال: د $f(x) = \frac{x+2}{x-2}$ د تابع افقي او عمودي مجانبونه پیدا کړئ او گراف یې رسم کړئ.

حل: د عمودي او افقي مجانبونو معادلې عبارت دي له:

1 - د عمودي مجانب معادله $x = 2$

2 - د افقي مجانب معادله $f(x) = y = 1$

3 - د Y له محور سره تقاطع:

که $x = 0$ شي، نو $f(x) = -1$ دي، گراف د Y محور په $(0, -1)$ کې قطع کوي.

4 - د X له محور سره تقاطع $f(x) = 0$ شي، نو:


$$x + 2 = 0$$

$$x = -2$$

نو د $(-2, 0)$ په نقطه کې گراف د X محور قطع کوي.

5 - ددې لپاره چې گراف په اسانه ډول رسم شي، په لاندې جدول کې د گراف د هرې څانگې قيمتونه وگورئ.

x	-1	0	1	3	4	5	-2
f(x)	$-\frac{1}{3}$	-1	-3	5	3	$2\frac{1}{3}$	0



که صورت پر مخرج وېشو $\frac{x+2}{x-2} = 1 + \frac{4}{x-2}$

په حقيقت کې د $f(x) = \frac{1}{x}$ تابع گراف د يو واحد په اندازه پورته خواته او د (2) واحدونو په اندازه ښي خواته انتقال شوی دی او $y = f(x) = 1$ د تابع افقي مجانب دی.

مايل مجانب: (slant or Oblique asymptote)

څه وخت چې د يوې ناطقې تابع د صورت درجه د يو په اندازه د مخرج له درجې څخه زياته وي ښکاره خبره ده چې تابع افقي مجانب نه لري په دې حالت کې تابع مايل مجانب لري.

اووم مثال: د $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$ تابع گراف رسم کړئ.

حل:

1 - د مايل مجانب د پيدا کولو لپاره صورت پر مخرج وېشو، نو لرو چې:

$$f(x) = \frac{x^2+1}{x-1} = x+1 + \frac{2}{x-1}$$

مايل مجانب

که $|x|$ هر څومره لوی شي $\frac{2}{x-1}$ صفر ته نژدې کېږي، نو په نتيجه کې گراف د $y = f(x) = x+1$

مستقيم خط ته نژدې کېږي چې همدا د $y = x+1$ خط د $f(x)$ تابع مايل مجانب دی.

2- د Y له محور سره يې د تقاطع نقطه:

$$f(0) = 0 + 1 + \frac{2}{0-1} = 1 - 2 = -1$$

گراف د $(0, -1)$ په نقطه کې د Y محور قطع کوي.

3- ښکاره خبره ده چې گراف د X محور قطع

کولای نه شي، ځکه چې $x = \sqrt{-1}$ کېږي.


4- عمودي مجانب يې

$$x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1 \text{ دی.}$$

5- ښکاره ده چې افقي مجانب نه لري.

6- يو څو نورې نقطې پيدا کوو او د تابع گراف

رسموو:



x	2	3	5	-1	-3
f(x)	5	5	6.5	-1	-2.5

اتم مثال: د $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2}$ تابع گراف رسم کړئ.

1- د تابع عمودي مجانب د $x = 2$ خط دی، ځکه چې $x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$

$$\frac{x^2 + 1}{x - 2} = x + 2 + \frac{5}{x - 2} \text{ وېشولرو چې:}$$

که $|x|$ لوی شي $\frac{5}{x - 2}$ صفر ته نږدې کېږي او د تابع گراف د $y = x + 2$ خط ته نږدې کېږي

چې $y = x + 2$ خط ددې تابع مايل مجانب دی.


3- د Y له محور سره تقاطع $-\frac{1}{2}$ ده، ځکه که $x = 0$ شي $f(0) = \frac{0+1}{0-2} = -\frac{1}{2}$

4- گراف د X له محور سره تقاطع نه لري، ځکه چې که $f(x) = 0$ شي، نو: $0 = \frac{x^2 + 1}{x - 2}$

(چې په حقيقي عددونو کې تعريف شوی نه دی) $x^2 + 1 = 0 \Rightarrow x = \sqrt{-1}$

د مجانبونو په رسمولو او د Y له محور سره د تقاطع ټکي او خو نورو قيمتونو په مرسته د تابع گراف

رسمولای شو.



x	0	1	4
f(x)	$-\frac{1}{2}$	-2	8.5

که $f(x) = \frac{P(x)}{g(x)}$ په تابع کې په ترتيب سره m او n د صورت او مخرغ درجې وي نو:

1- که $m < n$ وي د X محور افقي مجانب دی.

2- که $m = n$ وي $y = b$ د تابع افقي مجانب دی چې b د m او n د درجو حدونو د ضريبونو

نسبت دی يا که چېرې $f(x) = \frac{a_n x^n + \dots + a_0}{b_n x^n + \dots + b_0}$ ($b_n \neq 0$) وي، نو $y = \frac{a_n}{b_n}$ د $f(x)$ تابع افقي مجانب دی.

3- که $m > n$ وي، نو افقي مجانب نه لري.

4- که د صورت درجه د يو په اندازه د مخرغ له درجې څخه زياته وي، نو د تابع گراف مايل مجانب لري چې په بې نهايت کې له گراف سره موازي کېږي، يوه ناطقه تابع يو يا څو عمودي مجانبونه درلودلای شي، خو يو افقي يا مايل مجانب به لري.

1 - د $f(x) = \frac{3x^2}{x^2 - 4}$ تابع افقي او عمودي مجانبونه پيدا کړئ.

2 - آیا د $f(x) = \frac{x^4}{x^2 + 1}$ تابع عمودي مجانب لري؟ ولې؟

3 - د لاندې راکړل شوو تابع گانو د تعريف ساحې پيدا کړئ او د عمودي مجانبونو معادلې يې وليکئ.

$$f(x) = \frac{5x}{x-4}, \quad g(x) = \frac{3x^2}{(x-5)(x+4)}, \quad h(x) = \frac{x+7}{x^2-49}, \quad k(x) = \frac{x+7}{x^2+49}$$

4 - له لاندې تابع گانو څخه کومه يوه چې عمودي مجانب ولري، پيدا يې کړئ.

$$f(x) = \frac{x}{x+4}, \quad g(x) = \frac{x+3}{x(x+4)}$$

$$h(x) = \frac{x}{x(x+4)}, \quad k(x) = \frac{x}{x^2+4}$$

5 - د لاندې ناطقو تابع گانو گرافونه رسم کړئ.

$$f(x) = \frac{4x}{x-2}, \quad g(x) = \frac{2x}{x-4}$$

6 - د $f(x) = \frac{3x+1}{x-3}$ تابع افقي مجانب عبارت دی له:

$$a: \quad y = 2$$

$$b: \quad y = 3$$

$$c: \quad y = -2$$

$$d: \quad y = -3$$

7 - د $f(x) = \frac{1}{x+2}$ او $f(x) = \frac{3}{x+2}$ تابع گانو گرافونه رسم کړئ او د $f(x) = \frac{1}{x}$ د تابع

له گراف سره يې پرتله کړئ.

8 - د $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ تابع مایل مجانب پيدا کړئ.

د څپرکي لنډيز

• تابع د دوو ستونو تر منځ داسې يوه رابطه يا قاعده (Rule) ده چې د لومړني سټ هر عنصر يوازې او يوازې د دويم سټ له يو عنصر سره اړيکه ولري. لومړني سټ ته د تابع د تعريف ساحه (Domain) او دويم سټ ته د قيمتونو ساحه (Range) وايي يا تابع د هغو مرتبو جوړو سټ دی چې لومړني عناصر يې تکرار شوي نه وي.

• يوه تابع د $y = f(x)$ په شکل ليکل کېږي، په يوه نقطه کې د تابع د قيمت د پيدا کولو لپاره د x راکړل شوی قيمت د تابع په معادله کې وضع کوو، د تابع قيمت په هغه نقطه کې په لاس راځي او يوه معادله هغه وخت د يوې تابع ښودونکی وي چې د هر x لپاره يو y وجود ولري.

• د يوې تابع د تعريف په ساحه (Domain) کې هغه عددونه شامل وي چې تابع په کې تعريف شوي وي يا د تابع قيمت يو حقيقي عدد وي. د يوې تابع گراف د XOY په مستوي کې د S د هغو نقطو سټ دی په دې ډول چې $S = \{(x, y) | y = f(x)\}$ او x د تابع د تعريف په ساحه کې شامل وي، که y له محور سره موازي خط گراف يوازې په يوه نقطه کې قطع کړي، دا گراف د يوې تابع گراف دی.

• $f(x) = c$ ثابته تابع، $f(x) = ax + b$ خطي تابع، $(a \neq 0)$ ، $f(x) = x$ د عينيت تابع او $f(x) = |x|$ د مطلقه قيمت تابع ده چې د تعريف ساحه يې ټول حقيقي عددونه او د قيمتونو ساحه يې صفر او مثبت حقيقي عددونه دي.

• د علامې تابع دا ډول تعريف شوي ده:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{sgn}(x) = \begin{cases} 1: x > 0 \\ 0: x = 0 \\ -1: x < 0 \end{cases}$$

ددې تابع د تعريف ساحه ټول حقيقي عددونه او د قيمتونو ساحه يې $\{-1, 0, 1\}$ ده.

• د دويمې درجې تابع عمومي شکل $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) دی او د دويمې درجې تابع گراف ته پارابولا (parabola) وايي که $a > 0$ وي، رأس اصغري او که $a < 0$ وي، رأس اعظمي دی. $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a})$ د پارابولا د رأس وضعيه کميات او $x = -\frac{b}{2a}$ د پارابول د تناظر د

محور معادله ده. که $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ پارابولا د X محور په دوو نقطو کې او که $\Delta = 0$ ، نو

پارابولا د X محور په یوه نقطه کې قطع کوي او که $\Delta < 0$ ، وي پارابول د X محور نه قطع کوي.

• که د $f(x)$ په تابع کې $x_1 < x_2$ وي او په نتیجه کې $f(x_1) < f(x_2)$ شي، تابع متزایده، که

$x_1 < x_2$ وي او $f(x_1) > f(x_2)$ شي، تابع متناقصه ده او هم که $f(-x) = f(x)$ وي، تابع

جفته او که $f(-x) = -f(x)$ شي، تابع طاقه ده.

• انتقال په (2) ډوله دی (عمودي او افقي انتقال)

• **عمودي انتقال:** که C یو مثبت عدد وي.

که د $y = f(x)$ تابع گراف د C واحدونو په اندازه په عمودي ډول پورته خواته انتقال شي د

$$y = f(x) + c \text{ تابع گراف لاس ته راځي.}$$

که د $y = f(x)$ تابع گراف د C واحدونو په اندازه په عمودي ډول ښکته خواته انتقال شي، د

$$y = f(x) - c \text{ تابع گراف لاس ته راځي.}$$

افقي انتقال: که C یو مثبت عدد وي.

که د $y = f(x)$ تابع گراف د C واحدونو په اندازه کینې خواته انتقال شي، د $y = f(x + c)$

گراف لاس ته راځي.

که د $y = f(x)$ تابع گراف د C واحدونو په اندازه ښي خواته انتقال شي، د $y = f(x - c)$

تابع گراف لاس ته راځي.

• د تابع گانو عملې په لاندې ډول تعریف شوي دي:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \quad (g(x) \neq 0)$$

$$\text{dom}(f + g)(x) = \text{dom } f \cap \text{dom } g$$

$$\text{dom}(f - g)(x) = \text{dom } f \cap \text{dom } g$$

$$\text{dom}(f \cdot g)(x) = \text{dom } f \cap \text{dom } g$$

$$\text{dom}\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \text{dom } f \cap \text{dom } g - \{x / g(x) = 0\}$$

• د مرکبو تابع گانو د تعریف ساحه:

$$Dom(fog)(x) = \{x / x \in domg, g(x) \in domf\}$$

$$Dom(gof)(x) = \{x / x \in domf, f(x) \in domg\}$$

• د یو په یو تابع معکوس هم یوه تابع ده.

• د X له محور سره موازي خط (افقي خط) د یو په یو تابع گراف په یوه نقطه کې قطع کوي.

• د $y = f(x)$ د یو په یو تابع د معکوس د پیدا کولو لپاره معادله د X لپاره حلوو، بیا X پر Y او Y

پر X بدلولو په لاس راغلی تابع $f^{-1}(x)$ ده چې د $f(x)$ د تابع معکوسه تابع ده. د $f(x)$ او د

$f(x)$ د معکوسې تابع گرافونه نظر د $y=x$ خط ته سره متناظر دي.

• که د $f(x) = \frac{P(x)}{g(x)}$ په ناطقه تابع کې په ترتیب سره m او n عددونه د صورت او مخرج درجې وي، نو:

1- که $m < n$ وي، د X محور افقي مجانب دی.

2- که $m = n$ وي، $y = b$ د تابع افقي مجانب دی چې b د m او n درجو لرونکو حدونو د

ضریبونو نسبت دی یا که چېرې $f(x) = \frac{a_n x^n + \dots + a_0}{b_n x^n + \dots + b_0}$ وي، نو $y = \frac{a_n}{b_n}$ د $f(x)$ د تابع افقي مجانب دی.

3- که $m > n$ وي، نو افقي مجانب نه لري.

4- که د صورت درجه د یو په اندازه د $f(x)$ د مخرج له درجې څخه زیاته وي، نو تابع مایل مجانب لري.

• یوه ناطقه تابع یو یا څو عمودي مجانبونه درلودلای شي، خو یو افقي یا مایل مجانب به لري.

د څپرکي پوښتنې

1 - د لاندېنيو مرتبو جوړولو ستونز څخه کوم یو یې د یوې تابع ښودونکي دی؟ د تعریف او د قیمتونو ساحې یې پیدا کړئ.

1 - $\{(1,2), (3,4), (5,5)\}$

2 - $\{(3,4), (3,5), (4,4), (4,5)\}$

3 - $\{(-3,-3), (-2,-2), (-1,-1), (0,0)\}$

4 - $\{(1,4), (1,5), (1,6)\}$

2 - که $g(x) = x^2 + 2x + 3$ وي، $g(-1)$ ، $g(-x)$ او $g(x+5)$ پیدا کړئ.

3 - که $h(x) = x^4 + x^2 + 1$ وي، $h(2)$ ، $h(-1)$ ، $h(-x)$ او $h(3a)$ پیدا کړئ.

4 - د لاندېنيو تابع گانو د تعریف ساحې پیدا کړئ.

$$f(x) = 2x$$

$$f(x) = (x-3)^{\frac{1}{2}}$$

$$f(x) = \sqrt{16-x^2}$$

$$f(x) = \frac{2}{x^2-4}$$

$$f(x) = \sqrt{\frac{3}{x^2+25}}$$

$$f(x) = \sqrt{x^2-4x-5}$$

5 - که چېرې $f(x) = \begin{cases} x+3 & : x < 0 \\ 4x+7 & : x \geq 0 \end{cases}$ وي، $f(0)$ ، $f(3)$ او $f(-2)$ پیدا کړئ.

6 - که چېرې $g(x) = \begin{cases} x+3 & : x \geq -3 \\ -(x+3) & : x < -3 \end{cases}$ وي، $g(0)$ ، $g(-6)$ او $g(-3)$ پیدا کړئ.

7 - که چېرې $h(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x-3} & \Leftarrow x \neq 3 \\ 6 & \Leftarrow x = 3 \end{cases}$ وي، $h(0)$ ، $h(3)$ او $h(5)$ پیدا کړئ.

8 - له لاندېنيو معادلو څخه کومه یوه یې تابع تعریفوي؟

$$x + y = 16$$

$$x^2 + y = 16$$

$$x^2 + y^2 = 16$$

$$x = y^2$$

$$y = \sqrt{x+4}$$

$$x + y^3 = 8$$

9 - په لاندېنيو تابع گانو کې کومه طاقه، کومه یوه جفته او کومه یوه، نه طاقه او نه جفته ده؟

$$f(x) = x^4 - 2x^2 + 5, \quad f(x) = x^2 + 2x - 1, \quad f(x) = \frac{2}{x-6}$$

10 - د $f(x) = x^2 - 1$, $f(x) = (x-1)^2$ تابع گانو گرافونه رسم او د $f(x) = x^2$ سره یې پرتله کړئ.

11 - د لاندېنيو تابع گانو $(f+g)$, $(f-g)$, $(f \cdot g)$ او $(\frac{f}{g})$ پیدا کړئ او د تعریف ساحې یې وټاکئ.

$$\begin{aligned} f(x) &= 4x - 1 & g(x) &= 6x + 3 \\ f(x) &= \sqrt{2x+5} & g(x) &= \sqrt{4x-9} \\ f(x) &= 4x^2 - 11x + 2 & g(x) &= x^2 + 5 \end{aligned}$$

12 - که $f(x) = 4x^2 - 2x$ او $g(x) = 8x + 1$ وي، نو:

$$\begin{aligned} (f+g)(3) & & (f+g)(-5) & & (f \cdot g)(4) \\ (\frac{f}{g})(4) & & (f \circ g)(2) & & (g \circ f)(-5) \end{aligned}$$

پیدا کړئ.

13 - fog او gof پیدا کړئ که:

$$\begin{aligned} f(x) &= 8x + 12 & g(x) &= 3x - 1 \\ f(x) &= 5x + 3 & g(x) &= -x^2 + 4x + 3 \\ f(x) &= -x^3 + 2 & g(x) &= 4x \\ f(x) &= \frac{1}{x} & g(x) &= x^2 \\ f(x) &= \sqrt{x+2} & g(x) &= 8x^2 - 6 \end{aligned}$$

14 - د $y=f(x)$ تابع د گراف په پام کې نیولو سره وویاست چې د $y = f(x) - 5$ تابع گراف د 5 واحدو په اندازه:

- a- بښکته خواته انتقال شوي دی.
- b- پورته خوا ته انتقال شوي دی.
- c- ښي خواته انتقال شوي دی.
- d- کیني خواته انتقال شوي دی.

15 - که د $f(x)$ تابع په لاندې ډول تعریف شوی وي گراف یې رسم کړئ، د تعریف او قیمتونو

ساحې يې وټاکئ.

$$f(x) = \begin{cases} -x+2 & : x > 1 \\ x^2 & : -1 < x < 1 \\ x+2 & : x < -1 \end{cases}$$

16 - د $f(x) = \frac{2x}{x+1}$ تابع د تعريف او قيمتونو ساحې وټاکئ.

17 - د $f(x) = \sqrt{2x-1}$ تابع د تعريف او قيمتونو ساحې وټاکئ.

18 - د لاندېنيو ناطقو تابع گانو د تعريف ساحې پيدا کړئ او کومه تابع چې عمودي مجانب ولري، د عمودي مجانبونو معادلې يې هم پيدا کړي.

$$f(x) = \frac{5x}{x-4}$$

$$g(x) = \frac{7x}{x-8}$$

$$h(x) = \frac{x+8}{x^2-64}$$

$$f(x) = \frac{x+8}{x^2+64}$$

$$g(x) = \frac{x+7}{x^2-49}$$

$$h(x) = \frac{x+7}{x^2-36}$$

19 - د $f(x) = x^2 + 2$, $f(x) = x^2 + 1$, $f(x) = x^2 - 1$ او $f(x) = x^2 - 2$ تابع گانو گرافونه د وضعيه کمياتو په عين سيستم کې رسم او د $f(x) = x^2$ د تابع له گراف سره يې پرتله کړئ.

20 - د لاندېنيو دويمې درجې تابع گانو د رأسونو وضعيه کميات اود تناظر د محورونو معادلې پيدا کړئ.

$$y = (x-2)^2 \quad y = (x+3)^2 - 4$$

21 - د $y = -\frac{x}{2}$ تابع گراف رسم کړئ.

22 - د $f(x) = \frac{x^2-5}{x+2}$ تابع عمودي او مايل مجانبونه پيدا کړئ.

23 - د $h(x) = \frac{x+1}{x-4}$ تابع د افقي مجانب معادله عبارت ده له:

a) $y = -1$

b) $y = 1$

c) $y = -\frac{1}{4}$

d) $y = 4$

$$24 - د \quad f(x) = \begin{cases} 3x+1 & : x < 2 \\ -x & : x \geq 2 \end{cases} \text{ د تابع گراف رسم کړئ.}$$

$$25 - د \quad g(x) = |x| - 5 \text{ د تابع گراف رسم او د قیمتونو ساحه یې پیدا کړئ.}$$

$$26 - د علامې تابع د قیمتونو په ساحه کې کوم عددونه شامل وي؟$$

$$27 - د لاندېنیو تابع گاتو معکوسه تابع پیدا کړئ او وښیاست چې $f(f^{-1}(x)) = x$ دی.$$

$$f(x) = \frac{1}{8}x$$

$$f(x) = 8x - 1$$

$$f(x) = x^2 + 6$$

$$f(x) = \frac{4x+6}{5}$$

$$f(x) = x^3 - 1$$

$$28 - \text{آیا د } g(x) = x^2 \text{ تابع معکوس منونکي ده؟ (معکوس یې هم یوه تابع ده)}$$

$$29 - \text{که } (fog)(x) = (gof)(x) \text{ وي، د } f \text{ او } g \text{ تابع ګانې سره څه اړیکه لري؟}$$

$$30 - \text{د } X \text{ او } Y \text{ له محورونو سره د } g(x) = 3 - \frac{3}{2}x \text{ د گراف، د تقاطع د نقطو وضعیه کمیات پیدا کړئ.}$$

$$31 - د \quad f(x) = -3 \text{ د تابع گراف رسم کړئ.}$$

$$32 - د \quad f(x) = 2x^2 + 4x + 5 \text{ د گراف د رأس د نقطې وضعیه کمیات پیدا کړئ.}$$

$$33 - د \quad f(x) = \frac{1}{2}x^2, f(x) = 3x^2, f(x) = 2x^2 \text{ او } f(x) = \frac{1}{3}x^2 \text{ د تابع ګانو گرافونه}$$


$$\text{د وضعیه کمیاتو په عین سیستم کې رسم او د } f(x) = x^2 \text{ د گراف سره یې پرتله کړئ.}$$

$$34 - د \quad f(x) = \frac{x^2 - 1}{x} \text{ د ناطقې تابع مایل مجانب عبارت دی له:}$$

$$a: y = x$$

$$b: y = x - 1$$

$$c: y = x + 1$$



څلورم څپرکی

مثناتي تابع گانې








زاویه او رادیان (Angle and Radian) زاویه او د زاویې د اندازه کولو واحدونه:

آیا زاویه په مثلثاتو او هندسه کې یو له بله توپیر لري؟
آیا په هندسه کې منفي زاویې شته دي؟

له هندسې څخه پوهېږو، زاویه هغه شکل دی چې د دوه نیمو خطونو له یو ځای کیدو څخه چې مشترکه مبدأ ولري، تشکیل شوی وي چې مشترکه مبدأ د زاویې له رأس څخه عبارت ده. په هندسه کې زاویه له 1° څخه تر 360° پورې وي، خو په مثلثاتو کې په هره اندازه زاویه درلودلای شو. له بلې خوا په مثلثاتو کې مثبتې او منفي زاویې هم شته دي.

په مثلثاتو کې زاویه د یو خط له دوران څخه په دې ډول چې د خط یو انجام ثابت وي، لاس ته راځي. چې د لومړي خط دوران د دویمې ضلعې موقعیت اختیاري وي (یوه ضلع د رأس په نقطه کې دوران کوي). د ساعت د عقربې د حرکت مطابق دوران (clockwise) منفي او د ساعت د عقربې د حرکت مخالف (Counter clockwise) دوران مثبت فرض شوی دی.

چې لومړۍ ضلعې ته (Initial side) او د دوران پای ته دویمه ضلع (Terminal side) وایي. لکه: څرنگه چې په شکل کې لیدل کېږي.




که په شکل کې د $\vec{OA}$ نیم خط ته د مختصاتو د مبدأ پر شاوخوا د ساعت د عقربې د حرکت په مخالف جهت کې دوران ورکړو، د θ زاویه لاس ته راځي.

که د $\vec{OA}$ نیم خط ته د 360° په اندازه (یو پوره دوران) دوران ورکړو، او دوران ته دوام ورکړو، ترڅو د $\vec{OA}$ نیم خط د OB موقعیت ته ورسېږي. په دې حالت کې جوړه شوې زاویه $\theta + 360^\circ$ ده. او که د دوو پوره دورانونو وروسته د B ټکي ته ورسېږو، طی شوی زاویه به $\theta + 720^\circ$ او په همدې ډول

که د $\vec{OA}$ نیم خط ته K دورانونه ورکړو او د B ټکي ته ورسېږو، نو د زاوېې اندازه به $\theta + K \cdot 360^\circ$ وي، لکه: څرنگه چې لیدل کېږي، په مثلثاتو کې له 360° څخه لویې زاوېې هم شته دي.

لومړی مثال: د 60° $\square$ 360° $\square$ 360° $\square$ 720° او -720° زاوېې رسم کړئ.



فعالیت

د 45° , 90° , -180° او 180° زاوېې رسم کړئ.

د زاوېې د اندازه کولو واحدونه: زاویه د درجې، گراد او رادیان په مرسته اندازه کېږي.

درجه: د یو دوران (Rotation) $\frac{1}{360}$ برخه له درجې څخه عبارت ده، یا د یوې قایمې زاوېې $\frac{1}{90}$ برخې ته درجه وایي.

$$1^\circ = 60' \quad 1' = 60'' \quad 1^\circ = 60 \cdot 60 = 3600''$$

$$\left(\frac{1}{60}\right)^\circ = 1' \quad , \quad \left(\frac{1}{60}\right)' = 1'' \quad \left(\frac{1}{3600}\right)^\circ = 1''$$

دویم مثال: $35^\circ 15' 27''$ د درجې په اعشاري شکل ولیکئ او $(48,3625)^\circ$ په درجه، دقیقه او ثانیه (DMS) واړوئ.

حل

$$35^\circ 15' 27'' = 35^\circ + \left(\frac{15}{60}\right)^\circ + \left(\frac{27}{3600}\right)^\circ = 35^\circ + 0,25^\circ + 0,0075^\circ = 35,2575^\circ$$

$$48,3625^\circ = 48^\circ + 0,3625^\circ = 48^\circ + (0,3625 \cdot 60)' = 48^\circ + (21,75)' \\ = 48^\circ + (21)' + (0,75 \cdot 60)'' = 48^\circ \quad 21' \quad 45''$$

فعالیت

$36^\circ 47' 12''$ په درجه واړوئ او $55,967663^\circ$ په درجه، دقیقه او ثانیه (DMS) (Degree, Minute, Second) واړوئ.

ګراد: ګراد هم د زاوېې د اندازه کولو واحد دی، د یو دوران $\frac{1}{400}$ برخې ته ګراد وایي. د ګراد $\frac{1}{100}$

برخې ته دقیقه ګراد او د دقیقه ګراد $\frac{1}{100}$ مې برخې ته ثانیه ګراد وایي.

$$1g = 100'g \quad , \quad 1'g = 100''g \quad , \quad 1g = 10000''g$$

د درجې بدلول په ګراد او د ګراد بدلول په درجې باندې: کولای شو چې درجه په ګراد او ګراد په درجه واړوو.

دریم مثال: 45° درجې په ګراد او $100g$ په درجه واړوئ.

حل: څرنګه چې یو مکمل دوران 360° یا $400g$ دی نو:

$$360^\circ = 400g$$

$$1^\circ = \frac{400}{360}g = \frac{10}{9}g$$

$$45^\circ = 45\left(\frac{10}{9}\right)g = 50g$$

$$400g = 360^\circ$$

$$1g = \left(\frac{360}{400}\right)^\circ = \left(\frac{9}{10}\right)^\circ$$


$$100g = 100\left(\frac{9}{10}\right)^\circ = 90^\circ$$

اویا:

$$\frac{d}{180} = \frac{g}{200}, \quad \frac{d}{180} = \frac{100}{200}$$

$$d = \frac{180 \cdot 100}{200} = 90^\circ$$

راډیان (Radian): د درجې او گراد سربېره د زاوېې د اندازه کولو بل واحد راډیان دی. راډیان




د هغوي مرکزي زاوېې اندازه ده چې د مقابل قوس اوږدوالی یې د شعاع له اوږدوالی سره مساوي وي. راډیان په عالي ریاضیاتو کې ډېر استعمالېږي. په شکل کې د $\widehat{ACB}$ مرکزي زاویه چې شعاع یې r او د AB قوس اوږدوالی له r سره مساوي دی، نو د $\widehat{ACB}$ زاویه 1 Radian ده.

$$\widehat{ACB} = 1 \text{ radian} = 1^R$$

که د AB قوس د دایرې له شعاع r سره مساوي وي، θ د راډیان په حساب مساوي ده په:

$$\hat{\theta} = \frac{\widehat{AB}}{r} = \frac{s}{r} \text{ او یا } s = r\theta$$



په مثلثاتي دایره یا واحده دایره (Unit Circle) کې چې شعاع یې د اوږدوالی واحد او مرکز یې د وضعیه کمیاتو په مبدا کې واقع وي، د راډیان په حساب د مرکزي زاوېې اندازه له مقابل قوس سره مساوي ده.

$$\theta = \frac{\widehat{AB}}{r} = \frac{\widehat{AB}}{1} = \widehat{AB} = S \text{ radian}$$

څرنگه چې د دایرې محیط $C = 2\pi r$ دی، نو $\frac{2\pi r}{r} = 2\pi \text{ radian}$ په دې معنا چې یو پوره دوارن 360° یا $2\pi^R$ دی.

$$2\pi^R = 360^\circ$$

$$1^R = \frac{360^\circ}{2\pi} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx \frac{180^\circ}{3.14159} \approx (57.29578)^\circ \approx 57^\circ 17' 45'' \approx (57.3)^\circ$$

$$1^\circ = \frac{2\pi}{360^\circ} = \frac{\pi}{180^\circ} \approx \frac{3.14159}{180^\circ} \approx 0.01745 \text{ Radians}$$

څلورم مثال: د $\frac{\pi}{3} \text{ radian}$ د مرکزي زاوېې د مقابل قوس اوږدوالی پیدا کړئ، که د دایرې قطر 30m وي.

حل: څرنگه چې: $r = \frac{d}{2} = \frac{30m}{2} = 15m$ دی، نو: $s = r\theta = 15\left(\frac{\pi}{3}\right) = 5\pi m \approx 15.7m$

فعالیت

د 1Rad مرکزي زاوېې د مقابل قوس اوږدوالی به څو سانتي متره وي؟ که د دایرې شعاع 10cm وي.

د درجې او گراد بدلول په راډیان او د راډیان بدلول په درجه او گراد:

$$\frac{d}{180} = \frac{g}{200} = \frac{R}{\pi} \text{ او یا } \frac{d}{360^\circ} = \frac{g}{400} = \frac{R}{2\pi} \text{ نو، د } 360^\circ = 400g = 2\pi^R \text{ څرنگه چې}$$

$$360^\circ = 2\pi^R$$

$$1^\circ = \left(\frac{2\pi}{360}\right)^R = \left(\frac{\pi}{180}\right)^R$$

په همدې ډول څرنگه چې: $2\pi^R = 360^\circ$

$$1^R = \left(\frac{360}{2\pi}\right)^\circ = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ$$

$$1^R = \frac{200g}{\pi} = \frac{200g}{3,1415} \approx 63,66198g$$

پنجم مثال: د 75° , 220° , -400° , $-100g$ او 40° زاوې په راډيان واړوئ.

څرنگه چې $1^\circ = \left(\frac{\pi}{180}\right)^R$ ده، نو:

$$75^\circ \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{12} \text{ radian}$$

$$220^\circ \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{11\pi}{9} \text{ radian},$$

$$-400^\circ \cdot \frac{\pi}{180} = -\frac{20\pi}{9} \text{ radian}$$

$$40^\circ \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{2\pi}{9} \text{ radian}$$

څرنگه چې یو پوره دوران $2\pi^R$ او یا $400g$ دی، نو:

$$1g = \left(\frac{2\pi}{400}\right)^R = \left(\frac{\pi}{200}\right)^R$$

$$-100g = \left(-100 \cdot \frac{\pi}{200}\right)^R = \left(-\frac{\pi}{2}\right)^R$$

پوښتنه: که د گراد په حساب له یوې زاوې څخه 30 واحد کم کړو، په لاس راغلی عدد، د زاوې اندازه په درجه راکوي، دا زاویه څو راډیانه ده؟

حل

$$\frac{10}{9}D - 30 = D$$

$$\frac{270}{180} = \frac{R}{\pi} \Rightarrow R = \frac{3\pi}{2} \text{ Radian}$$

$$\frac{10}{9}D - D = 30 \Rightarrow \frac{10D - 9D}{9} = 30 \Rightarrow D = 270^\circ$$

نو دا زاویه $\frac{3\pi}{2}$ راډیانه ده.

شپږم مثال: a: $\left(\frac{5\pi}{6}\right)$, $\frac{\pi}{5}$, $\frac{4\pi}{9}$ او 6π راډيان په درجه واړوئ.

(b): د یو دوران (Revolution) $\frac{1}{4}$ برخه څو راډیانه کېږي؟

حل

$$1^{\circ} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^{\circ}, \quad \frac{\pi}{5} \cdot \frac{180}{\pi} = 36^{\circ}$$


$$a: \left(\frac{5\pi}{6}\right) \cdot \left(\frac{180}{\pi}\right) = 150^{\circ}, \quad 6\pi \cdot \frac{180}{\pi} = 1080^{\circ}, \quad \frac{4\pi}{9} \cdot \frac{180}{\pi} = 80^{\circ}$$

$$b: = \frac{1}{4} \cdot 2\pi^{\circ} = \frac{\pi}{2} \text{ radian}$$

لاندې شڪلونه وگورئ.

$$\frac{1}{2} \text{ Rev}$$

$$\frac{1}{2} \cdot 2\pi = \pi^{\circ}$$




1 Re volution

2 π Radians



$$\frac{1}{4} \text{ Rev}$$


$$\frac{1}{4} \cdot 2\pi = \frac{\pi}{2} \text{ Radain}$$



$\frac{3}{4}$ Re volution

$\frac{3}{4} \cdot 2\pi = \frac{3\pi}{2}$ Radians





د درجې او رادېان
تر منځ د اړیکې
د ښه څرگندېدو
لپاره لاندې شکل
هم وگورئ:

فعالیت

$\frac{\pi}{12}$ ، $\frac{3\pi}{4}$ او $-\frac{5\pi}{4}$ رادېانه زاوې په درجه واړوئ.


اووم مثال

(a) د $\frac{2\pi}{3}$ ، $\frac{11\pi}{6}$ او $-\frac{\pi}{6}$ زاوې په شکل کې وښایست:

(b) په شکل کې لوی او کوچنی څرخ ښودل شوی دی، که د θ_1 او θ_2 د زاویو مقدار د رادېان په


حساب وي، د θ_2 د زاوې مقدار د θ_1 ، r_1 او r_2 له جنسه حساب کړئ.

د (a) حل:



له شکل څخه لیدل کېږي چې د $\frac{11\pi}{6}$ او $-\frac{\pi}{6}$ زاویو دویمې ضلعې یو پر بل منطبقې دي.

د (b) حل:



$$\theta_2 r_2 = \theta_1 r_1 \Rightarrow \theta_2 = \frac{\theta_1 r_1}{r_2}$$

اتم مثال: که د ساعت د ثانیې عقربې 40 ثانیې دوران کړی وي، د ثانیې د عقربې په واسطه طي شوې مثبتې زاویه په رادینان پیدا کړئ.

حل: څرنګه چې 60 ثانیې یو پوره دوران یا 2π رادینان کېږي، نو $\frac{40}{60} = \frac{2}{3} \text{ Rev}$ او څرنګه چې یو دوران $2\pi \text{ Radian}$ دی، نو: $\frac{2}{3} \cdot 2\pi^R = \frac{4\pi}{3} \text{ Radian}$

همدارنګه د ساعت د دوو عقربو ترمنځ د زاویې د پیدا کولو لپاره له $\theta = |5,5 \text{ min} - 30 \text{ hr}|$ څخه کار اخلو. د مثال په توګه د 3 بجو او 40 دقیقو په وخت کې د ساعت گرد او دقیقه گرد په منځ کې زاویه څو درجې ده؟

$$\theta = |5,5 \cdot 40 - 30 \cdot 3| = 130^\circ$$

پوښتنې

1 - که د یوې مرکزي زاوېې مقابل قوس 50cm او د دايرې شعاع 25cm وي، مرکزي زاويه به

څو راديانه وي؟

2 - $32,4222^\circ$ په درجې، دقيقې او ثانيې واړوئ

3 - د یو دوران $\frac{1}{8}$ برخه څو راديانه، څو درجې او څو گراډه کېږي؟

4 - $\frac{5\pi}{4}$ راديانه څو گراډه او $7,5^\circ$ څو راديانه کېږي؟

5- $225^\circ, -315^\circ, 720^\circ$ او 45° زاوې په راډيان او گراد واړوئ

6- د يو دوران $\frac{1}{9}$ ، $\frac{1}{24}$ ، $\frac{1}{18}$ او $\frac{4}{5}$ برخې څو راډيانه او څو درجې کېږي؟

7- $\frac{11\pi}{3}$ ، $\frac{9\pi}{4}$ ، $\frac{\pi}{6}$ ، $-\frac{\pi}{6}$ ، $-\frac{\pi}{10}$ ، $\frac{2\pi}{5}$ او $-\frac{5\pi}{12}$ راډيانه په درجو واړوئ

8- که د يو ساعت د ثانيې د عقربې اوږدوالی 6cm وي، په 40 ثانيو کې د ثانيې عقربه څو سانتي

متره فاصله طی کوي؟

9- که د دايرې شعاع 3cm او مرکزي زاويه $\frac{5}{3}$ راډيانه وي. د دې مرکزي زاوې د مقابل قوس

اوږدوالی به څو سانتي متره وي؟

10- که د يو ساعت د ثانيې د عقربې دوران 35 ثانيې وي، نو د ثانيې عقربې به څو راډيانه مثبت

زاويه طی کړي وي؟

11- د دوو زاويو مجموعه 152° ده، که د يوې زاوې اندازه د درجې په حساب له بلې زاوې سره

د گراد په حساب برابره وي، د هرې زاوې اندازه د راډيان په حساب څومره ده؟

12- 1620° څو راډيانه کېږي؟

a) $4\pi^R$ b) $8\pi^R$ c) $9\pi^R$ d) $10\pi^R$


13- څلور دورانونه څو راډيانه کېږي؟

a) $2\pi^R$ b) $4\pi^R$ c) $6\pi^R$ d) $8\pi^R$

14- که د يوې دايرې شعاع 10m وي، د 45radian مرکزي زاوې، مقابل قوس به څو متره

وي؟



د یوې زاوې معیاري حالت او کوټرمینل زاوې






آیا ویلای شئ چې د 60° او 420° زاویو
دویمې ضلعې یو پر بل منطبق دي؟ ولې؟

د یوې زاوې معیاري حالت (Standard position of an angle):

که د یوې زاوې رأس د وضعیه کمیاتو په مبدأ کې او لومړنۍ ضلع یې د X د محور په مثبت جهت پرته وي، نو دا زاویه په معیاري حالت کې ده.
د مثال په توګه: په لاندې شکلونو کې د θ_1 او θ_2 زاوې په معیاري حالت کې ښودل شوي دي.



لومړۍ مثال: 115° ، 280° او -300° زاوې په معیاري حالت کې رسم کړئ.



که په معیاري حالت کې د یوې زاوېې دویمه ضلع د X او یا د Y پر محور منطبق شي، داسې زاوېې ته ربعي زاویه (Quadrantale angle) وایي. د مثال په توګه: $90^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 360^\circ$ او داسې نورې زاوېې ربعي زاوېې دي.

فعالیت

د $130^\circ, 50^\circ, 500^\circ$ او -210° زاوېې په معیاري حالت کې رسم کړئ.


کوټرمینل زاوېې: (Conterminal angles)

دوې یا څو زاوېې چې په معیاري حالت کې یې دویمې ضلعې یو پر بل منطبقې شي، د کوټرمینل زاوېو په نامه یادېږي.

دویم مثال: په شکل کې وښیاست چې د 60° او 420° زاوېې او همدارنګه د 110° او 830°


زاوېې چې په معیاري حالت کې دي، یو له بلې سره کوټرمینل زاوېې دي.

حل: څرنګه چې په معیاري حالت کې د دې زاوېو لومړنۍ ضلعې یو پر بل منطبق دي، لکه څنګه چې په شکل کې لیدل کېږي د 60° او 420° زاوېو دویمې ضلعې (Conterminal sides) یو پر بل منطبق دي. نو د تعریف په اساس دا دواړه زاوېې سره کوټرمینل دي. همدارنګه د 110° او 830° زاوېې هم سره کوټرمینل دي.



درېم مثال: په معیاري حالت کې د 60° زاوېې سره درې کوټرمینل زاوېې رسم کړئ او په شکل کې یې هم وښیاست.

حل: $60^\circ + 360^\circ = 420^\circ$, $60^\circ - 360^\circ = -300^\circ$, $60^\circ + 2 \cdot 360^\circ = 780^\circ$



فعالیت

ایا د 230° ، 590° او 230° ، -130° زاویې سره کوټرمینل دي؟ رسم یې کړئ.

څرنگه چې کوټرمینل زاویې یو له بله سره د یوه پوره دوران (360°) یا $2\pi^R$ او یا څو دورانونه $n \cdot 360^\circ$ او یا $n \cdot 2\pi$ توپیر لري، نو د θ د زاویې سره کوټرمینل زاویې عبارت دي له:

$\theta + 2\pi$	$\theta + 360^\circ$
$\theta + 2 \cdot 2\pi$	$\theta + 2 \cdot 360^\circ$
$\theta + 3 \cdot 2\pi$	$\theta + 3 \cdot 360^\circ$
-----	-----
$\theta + 2n\pi$	$\theta + n \cdot 360^\circ$

څلورم مثال:

- (a) له 30° زاویې سره څلور کوټرمینل زاویې پیدا کړئ.
 (b) له 90° زاویې سره دوه کوټرمینل زاویې پیدا او په شکل کې یې وښایست.


حل (a)

$$30^\circ + 360^\circ = 390^\circ \quad \text{یا} \quad \frac{\pi}{6} + 2\pi = \frac{13\pi}{6} \quad \text{Radian}$$

$$30^\circ + 2 \cdot 360^\circ = 750^\circ \quad \text{یا} \quad \frac{\pi}{6} + 2 \cdot 2\pi = \frac{25\pi}{6} \quad \text{Radian}$$

$$30^\circ + 3 \cdot 360^\circ = 1110^\circ \quad \text{یا} \quad \frac{\pi}{6} + 3 \cdot 2\pi = \frac{37\pi}{6} \quad \text{Radian}$$

$$30^\circ + 4 \cdot 360^\circ = 1470^\circ \quad \text{یا} \quad \frac{\pi}{6} + 4 \cdot 2\pi = \frac{49\pi}{6} \quad \text{Radian}$$



$$90^\circ + 360^\circ = 450^\circ$$

$$90^\circ + 2 \cdot 360^\circ = 810^\circ$$

حل (b)

پنجم مثال: آیا 410° , 80° , 800° , 40° , -680° او 60° او 410° زاویې سره کوټرمینل دي؟

حل: څرنگه چې $410^\circ = 50^\circ + 360^\circ$ دی، نو د 50° او 410° زاویې سره کوټرمینل دي او $800^\circ = 80^\circ + 2 \cdot 360^\circ$ نو د 80° او 800° زاویې هم سره کوټرمینل دي. همدارنگه $-680^\circ = 40^\circ - 2 \cdot 360^\circ$ نو 40° او -680° زاویې هم سره کوټرمینل دي، خو $410^\circ \neq 60^\circ + 360^\circ$ ، نو د 60° او 410° زاویې سره کوټرمینل نه دي.

که د یوې زاویې رأس د وضعیه کمیانو په مبدا کې او لومړنی ضلع یې د X د محور پر مثبت جهت منطبق وي، نو دا زاویه په معیاري حالت کې ده. که په معیاري حالت کې د دوو یا څو زاویو دویمې ضلعي یو پر بل منطبق وي، داسې زاویې د کوټرمینل زاویو په نوم یادېږي.


پوښتنې

- 1 - د $90^\circ, 120^\circ, 270^\circ$ او 240° زاویې په معیاري حالت کې رسم کړئ.
- 2 - تر ټولو کوچنۍ مثبت زاویه پیدا کړئ چې له لاندېنیو زاویو سره کوټرمینل وي.
 135° 90° 60° 539° 450° -125° -40°
- 3 - آیا د $(-80^\circ, 280^\circ)$ او د $(35^\circ, 395^\circ)$ زاویې سره کوټرمینل دي؟
- 4 - له 40° زاویې سره، شپږ کوټرمینل زاویې پیدا کړئ.
- 5 - آیا د $(-930^\circ, 150^\circ)$ او د $(180^\circ, 900^\circ)$ زاویې سره کوټرمینل دي، په شکل کې یې هم

وښیاست؟

مثلثاتي تابعگاني

(Trigonometric Functions)



آيا ويلاي شئ چې د θ د زاويې مثلثاتي نسبتونه د θ د زاويې د ضلعو په اوږدوالي پورې اړه لري او که نه؟


څرنگه چې پوهېږو چې د د يوې حادې زاويې (θ) مثلثاتي نسبتونه (Trigonometric ratios) په يوه قايمه الزاويه مثلث کې په لاندې ډول تعريف شوي دي.

$$\sin \theta = \frac{AB}{AC} = \frac{y}{r}, \quad \cos \theta = \frac{BC}{AC} = \frac{x}{r}$$

$$\tan \theta = \frac{AB}{BC} = \frac{y}{x}, \quad \cot \theta = \frac{BC}{AB} = \frac{x}{y}$$

$$\sec \theta = \frac{AC}{BC} = \frac{r}{x}, \quad \csc \theta = \frac{AC}{AB} = \frac{r}{y}$$

او په نتيجه کې ليدل کېږي چې: $\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$, $\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$ او $\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$.



لومړی مثال: که په معياري حالت کې د θ زاويې

دويمه ضلع د (8,15) له ټکي څخه تېره شي، د θ

زاويې مثلثاتي نسبتونه پيدا کړئ.

د فيثاغورث د قضيې په اساس لرو چې:

$$r^2 = x^2 + y^2 \text{ دی.}$$

$$r^2 = 8^2 + (15)^2 = 64 + 225 = 289$$

$$r = \sqrt{289} = 17$$

$$\sin \theta = \frac{y}{r} = \frac{15}{17}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{8}{17}$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{15}{8}, \quad \cot \theta = \frac{x}{y} = \frac{8}{15}$$

$$\sec \theta = \frac{r}{x} = \frac{17}{8}, \quad \csc \theta = \frac{r}{y} = \frac{17}{15}$$

د زاویو د ځینو مثلثاتي نسبتونو ترمنځ اساسي اړیکې:

د فیثاغورث د قضیې په اساس د شکل له مخې لیکلای شو چې:


$$y^2 + x^2 = r^2 \dots\dots\dots I$$

دواړو خواوې په r^2 وېشو:

$$\frac{y^2}{r^2} + \frac{x^2}{r^2} = \frac{r^2}{r^2}$$

$$\left(\frac{y}{r}\right)^2 + \left(\frac{x}{r}\right)^2 = 1$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$



همدارنگه که د (I) معادلې دواړه خواوې په y^2 وېشو، نو لرو چې:

$$\frac{y^2}{y^2} + \frac{x^2}{y^2} = \frac{r^2}{y^2} \Rightarrow 1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2 = \left(\frac{r}{y}\right)^2$$

$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

او که د (I) معادلې دواړه خواوې په x^2 وېشو:

$$\frac{y^2}{x^2} + \frac{x^2}{x^2} = \frac{r^2}{x^2} \Rightarrow \left(\frac{y}{x}\right)^2 + 1 = \left(\frac{r}{x}\right)^2$$

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

له بلې خوا:

$$\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\frac{y}{r}}{\frac{x}{r}} = \frac{y}{x} = \tan \theta$$

$$\frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\frac{x}{r}}{\frac{y}{r}} = \frac{x}{y} = \cot \theta$$

او له دې ځايه څخه نتيجه کېږي چې:

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \sin \theta \cdot \csc \theta = 1, 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta, \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\tan \theta \cdot \cot \theta = 1, \cos \theta \cdot \sec \theta = 1, 1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta, \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

څرنگه چې دا اړيکې د θ د هر قيمت لپاره سمې دي، نو په دې اساس مثلثاتي مطابقتونه هم ورته وايي.

فعاليت


که په معياري حالت کې د θ دويمه ضلع د (12,5) له ټکي څخه تېره شي، د θ زاوېې مثلثاتي نسبتونه پيدا کړئ.

د مثلثاتي تابع گانو پورتنی قيمتونه يوازې د θ زاوېې د اندازې پورې اړه لري، د P د ټکي پر موقعيت پورې چې د θ پر دويمه ضلع واقع دی اړه نه لري چې دا حقيقت په شکل کې د $\triangle OH_1P_1 \cong \triangle OPH$ او $\triangle OH_2P_2$ مثلثونو د مشابهت په اساس ليدل کېږي.

$$|OP| = 1$$

$$\cos \theta = \frac{|OH|}{|OP|} = \frac{|OH_1|}{|OP_1|} = \frac{|OH_2|}{|OP_2|}$$

$$\sin \theta = \frac{|PH|}{|OP|} = \frac{|P_1H_1|}{|OP_1|} = \frac{|P_2H_2|}{|OP_2|}$$



که د θ زاویه د راډیان په حساب وي. θ آزاد متحول او $\sec \theta, \cot \theta, \tan \theta, \cos \theta, \sin \theta$

او $\csc \theta$ مقید (مربوط) متحولونه دي. په دې معنا چې

$\sec \theta, \cot \theta, \tan \theta, \cos \theta, \sin \theta$ او $\csc \theta$

مثلثاتي تابعگانې دي چې مقدار یې د θ د ضلعو

اوږدوالی پورې اړه نه لري، بلکې د θ د زاویې په

مقدار پورې اړه لري.

څرنگه چې مثلثاتي دایره

(Trigonometric Circle) هغه دایره ده چې د

شعاع اوږدوالی یې د اوږدوالی واحد دی.

په مثلثاتي دایره کې چې مرکز یې د وضعیه کمیانو په

مبدأ کې او د XX' او YY' محورونه د دې دایرې افقي او عمودي قطرونه دي. د قرارداد په اساس

له $y'oy$ ته د ساینو محور او $x'ox$ ته د کوساینو محور وایي. د TAT' محور چې د A په ټکي کې

له دایرې سره مماس دی، د ټانجانټ محور او د $q'Bq$ محور چې د B په ټکي کې پر دایره مماس

دی، د کوټانجانټ محور بلل کېږي. د ساینو او کوساینو د محورونو مبدأ د دایرې مرکز او د ټانجانټ

د محور مبدأ، د A ټکي د کوټانجانټ د محور مبدأ، د B ټکي دی.

که چېرې د A له ټکي څخه په مثبت جهت کې د M تر ټکي حرکت وکړو او د $\hat{MOA}$ زاویې ته

θ ووايو، د θ د زاویې مثلثاتي توابع په لاندې ډول هم تعریفېږي.

$$(r = OM = OA = OB = 1)$$

$$\sin \theta = \frac{HM}{OM} = \frac{\overline{OH'}}{\overline{OM}} = \frac{\overline{OH'}}{1} = \overline{OH'} \quad \cos \theta = \frac{\overline{OH}}{\overline{OM}} = \frac{\overline{OH}}{1} = \overline{OH}$$

$$\tan \theta = \frac{HM}{OH} = \frac{\overline{AP}}{\overline{OA}} = \overline{AP} \quad \sec \theta = \frac{OM}{OH} = \frac{OP}{OA} = \overline{OP}$$

$$\cot \theta = \frac{\overline{OH}}{HM} = \frac{BQ}{OB} = \overline{BQ} \quad \csc \theta = \frac{OM}{HM} = \frac{OQ}{OB} = \overline{OQ}$$

په دې اساس مثلثاتي نسبتونو ته مثلثاتي خطونه هم وایي.

په همدې ډول که د θ دویمه ضلع او یا د قوس پای په دویمه، دریمه یا څلورمه ناحیه (ربع) کې وي.

کولی شو چې مثلثاتي نسبتونه یې پر لاس راوړو:
د مثلثاتي نسبتونو علامې په څلورو ناحیو (ربعو) (quadrants) کې په لاندې ډول دي.

$\sec \theta, \cos \theta$	$\tan \theta, \cot \theta$	$\sin \theta, \csc \theta$	ربع
+	+	+	I
-	-	+	II
-	+	-	III
+	-	-	IV

$\sin \theta > 0$	$\sin \theta > 0$
$\cos \theta < 0$	$\cos \theta > 0$
$\tan \theta < 0$	$\tan \theta > 0$
$\cot \theta < 0$	$\cot \theta > 0$
$\sec \theta < 0$	$\sec \theta > 0$
$\csc \theta > 0$	$\csc \theta > 0$
$\sin \theta < 0$	$\sin \theta < 0$
$\cos \theta < 0$	$\cos \theta > 0$
$\tan \theta > 0$	$\tan \theta < 0$
$\cot \theta > 0$	$\cot \theta < 0$
$\sec \theta < 0$	$\sec \theta > 0$
$\csc \theta < 0$	$\csc \theta < 0$

دویم مثال: له لاندې شکل سره سم که په معیاري حالت کې د θ د زاوې دویمه ضلع، په دویمه

ناحیه (ربع) کې واقع وي او $\cos \theta = \frac{-3}{5}$ وي، د θ د زاوې نور مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ.

حل: لومړی د P د ټکي وضعیه کمیات پیدا کوو: څرنگه چې $\cos \theta = \frac{-3}{5}$ دی، په دویمه ربع

کې د x قیمت منفي دی، نو $x = -3$ او

$r = 5$ د فیثاغورث د قضیې له مخې لرو


چې:

$$5^2 = (-3)^2 + y^2$$

$$y^2 = 25 - 9 = 16$$

$$y = \pm \sqrt{16}$$


$$y = 4$$



(ځکه چې د P ټکی په دویمه ربع کې دی، $y > 0$ دی)

$$\sin \theta = \frac{y}{r} = \frac{4}{5}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{-3}{5}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{4}{-3}$$

$$\csc \theta = \frac{r}{y} = \frac{5}{4}, \quad \sec \theta = \frac{r}{x} = \frac{5}{-3}, \quad \cot \theta = \frac{x}{y} = \frac{-3}{4}$$



څرنگه چې د X محور ته د $\cos$ محور او د Y محور ته د $\sin$ محور وايي، موږ کولای شو چې په مثلثاتي دایره کې د P د ټکي وضعیه کميات له $P(\cos \theta, \sin \theta)$ او يا $P(x, y)$ سره وښايو.

د θ د زاوېې مثلثاتي توابع يوازې د θ د زاوېې په مقدار پورې اړه لري چې θ آزاد متحول او د θ مثلثاتي نسبتونه مقيد متحولونه دي.

په لومړي ناحیه (ربع) کې ټول مثلثاتي نسبتونه

مثبت، په دویمه ناحیه (ربع) کې $\sin \theta$ او $\csc \theta$

مثبت، په دریمه ناحیه (ربع) کې $\tan \theta$ ، $\cot \theta$ مثبت او په څلورمه ناحیه (ربع) کې $\cos \theta$ ، $\sec \theta$ مثبت او نور منفي دي.

پوښتنې


1- د لاندېنيو زاويو د مثلثاتي نسبتونو نښې (علامې) په شفاهي ډول ووايست.

$$\sin 120^\circ \quad \tan 170^\circ \quad \tan 60^\circ \quad \cos 330^\circ \quad \sec 200^\circ$$

$$\cot 271^\circ \quad \csc 91^\circ \quad \sin 271^\circ \quad \csc 181^\circ \quad \csc 315^\circ$$

2- که θ په معياري حالت کې د راډيان په حساب وي او د θ دویمه ضلع له لاندې راکړل شوو ټکو څخه تېره شي، $\sin \theta$ ، $\cos \theta$ او $\tan \theta$ پيدا کړئ.

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \quad \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \quad \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right), \quad \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$



د ځينو خاصو زاويو مثلثاتي نسبتونه

آيا کولای شئ چې ووايئ $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ$ دی؟

د 45° مثلثاتي نسبتونه: په يوه قايم الزاويه متساوي الساقين مثلث کې، دوي قايمي څنډې يې يو، يو واحد په پام کې ونيسئ.

$$r^2 = 1^2 + 1^2$$

$$r^2 = 2 \Rightarrow r = \sqrt{2}$$

$$\sin 45^\circ = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\text{مقابلہ ضلع}}{\text{وتر}} = \frac{y}{r} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$


$$\cos 45^\circ = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\text{مجاورہ ضلع}}{\text{وتر}} = \frac{x}{r} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan 45^\circ = \tan \frac{\pi}{4} = \frac{\text{مقابلہ ضلع}}{\text{مجاورہ ضلع}} = \frac{y}{x} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\cot 45^\circ = \cot \frac{\pi}{4} = \frac{\text{مجاورہ ضلع}}{\text{مقابلہ ضلع}} = \frac{x}{y} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\sec 45^\circ = \sec \frac{\pi}{4} = \frac{\text{وتر}}{\text{مجاورہ ضلع}} = \frac{r}{x} = \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}$$

$$\csc 45^\circ = \csc \frac{\pi}{4} = \frac{\text{وتر}}{\text{مقابلہ ضلع}} = \frac{r}{y} = \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}$$



فعالیت


یو متساوي الساقين قائمه زاويه مثلث داسې په پام کې ونیسئ چې هره قائمه ضلع یې b واحد وي، د 45° زاويې مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ.

که د $\triangle ABC$ متساوي الاضلاع مثلث چې هره ضلع یې دوه واحد وي، په پام کې ونیسو، د A له رأس څخه د AH ارتفاع رسموو، څرنگه چې د $\hat{A}$ زاويه نیمایي شوې ده چې نیمایي یې 30° ده، نو:

$$h^2 + 1^2 = 2^2$$

$$h^2 = 4 - 1 = 3$$

$$h = \sqrt{3}$$



$$\sin 30^\circ = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\cos 30^\circ = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan 30^\circ = \tan \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\cot 30^\circ = \cot \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}$$

$$\sec 30^\circ = \sec \frac{\pi}{6} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$\csc 30^\circ = \csc \frac{\pi}{6} = \frac{2}{1} = 2$$

فعالیت

یو داسې متساوي الاضلاع مثلث په پام کې ونیسئ چې هره ضلع یې a واحد وي د $30^\circ = \frac{\pi}{6}$ زاويې مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ.

همدارنگه که شکل ته پام وکړو:

$$\sin 60^\circ = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 60^\circ = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

$$\tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

$$\cot 60^\circ = \cot \frac{\pi}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\sec 60^\circ = \sec \frac{\pi}{3} = 2$$

$$\csc 60^\circ = \csc \frac{\pi}{3} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

ليدل کېږي چې $30^\circ + 60^\circ = 90^\circ$ کېږي:

$$\sin 30^\circ = \cos 60^\circ$$

$$\cos 30^\circ = \sin 60^\circ$$

$$\tan 30^\circ = \cot 60^\circ$$

$$\sec 30^\circ = \csc 60^\circ$$

$$\csc 30^\circ = \sec 60^\circ$$

$$\cot 30^\circ = \tan 60^\circ$$

يا په عمومي ډول هر وخت چې د دوو زاويو مجموعه 90° وي، که يوه زاويه θ وي، بله زاويه به

$(90^\circ - \theta)$ وي.


$$\sin(90^\circ - \theta) = \frac{x}{r}, \cos \theta = \frac{x}{r} \Rightarrow \sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$$

$$\cos(90^\circ - \theta) = \frac{y}{r}, \sin \theta = \frac{y}{r} \Rightarrow \cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$$

$$\tan(90^\circ - \theta) = \frac{x}{y}, \cot \theta = \frac{x}{y} \Rightarrow \tan(90^\circ - \theta) = \cot \theta$$

$$\sec(90^\circ - \theta) = \frac{r}{y}, \csc \theta = \frac{r}{y} \Rightarrow \sec(90^\circ - \theta) = \csc \theta$$

$$\csc(90^\circ - \theta) = \frac{r}{x}, \sec \theta = \frac{r}{x} \Rightarrow \csc(90^\circ - \theta) = \sec \theta$$



فعالیت

په همدې ډول وښیاست چې: $\cot(90^\circ - \theta) = \tan \theta$

لکه: څنگه چې د نهم ټولګي په مثلثاتو کې مو ویلي دي چې د زاویو د مثلثاتي نسبتونو جدول هم په همدې اساس جوړ شوی دی:

لومړی مثال: د 39° زاوېې مثلثاتي نسبتونه راکړل شوي دي، د 51° زاوېې مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ.

$$\begin{array}{lll} \sin 39^\circ = 0,6293 & \tan 39^\circ = 0,8098 & \sec 39^\circ = 1,287 \\ \cos 39^\circ = 0,7771 & \cot 39^\circ = 1,235 & \csc 39^\circ = 1,589 \end{array}$$

حل: څرنگه چې $39^\circ + 51^\circ = 90^\circ$ کېږي، نو:

$$\begin{array}{ll} \sin 51^\circ = \cos 39^\circ = 0,7771 & \cos 51^\circ = \sin 39^\circ = 0,6293 \\ \tan 51^\circ = \cot 39^\circ = 1,235 & \cot 51^\circ = \tan 39^\circ = 0,8098 \\ \sec 51^\circ = \csc 39^\circ = 1,589 & \csc 51^\circ = \sec 39^\circ = 1,287 \end{array}$$

پوښتنې


1 - که:

$$\begin{array}{llll} \sin 17^\circ = 0,2927 & \cos 17^\circ = 0,9563 & \sec 17^\circ = 1,046 & \csc 17^\circ = 3,420 \\ \tan 17^\circ = 0,3057 & \cot 17^\circ = 3,271 & & \end{array}$$

وي د 73° زاوېې مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ.

2 - د لاندې اړیکو څخه کومه یوه یې ناسمه ده؟

$$\begin{array}{ll} \sin 28^\circ = \cos 62^\circ & \cos 12^\circ 10' 20'' = \sin 77^\circ 49' 40'' \\ \sec 12^\circ = \sec 88^\circ & \tan 70^\circ = \cot 20^\circ \end{array}$$



د $270^\circ, 180^\circ, 90^\circ, 0^\circ$ او
 360° زاويو مثلثاتي نسبتونه:

آيا $\tan 90^\circ$ او $\tan 270^\circ$ تعريف شوي دي؟

د $90^\circ = \frac{\pi}{2}$ زاويې مثلثاتي نسبتونه:

څرنگه چې $P(0,1)$ ټکی په مثلثاتي دایره باندې د 90° زاويې په دویمه ضلع واقع دی، نو:

$$r = 1 \quad x = 0 \quad y = 1$$

$$\sin \frac{\pi}{2} = \sin 90^\circ = \frac{y}{r} = \frac{1}{1} = 1$$


$$\cos \frac{\pi}{2} = \cos 90^\circ = \frac{x}{r} = \frac{0}{1} = 0$$

$$\tan \frac{\pi}{2} = \tan 90^\circ = \frac{y}{x} = \frac{1}{0} \quad (\text{تعريف شوی نه دی}) \quad \cot \frac{\pi}{2} = \cot 90^\circ = \frac{x}{y} = \frac{0}{1} = 0$$

$$\sec \frac{\pi}{2} = \sec 90^\circ = \frac{r}{x} = \frac{1}{0} \quad (\text{تعريف شوی نه دی}) \quad \csc \frac{\pi}{2} = \csc 90^\circ = \frac{r}{y} = \frac{1}{1} = 1$$

فعالیت

آيا کولای شئ، ووايئ چې $\cot 0^\circ$ او $\csc 0^\circ$ تعريف شوي نه دي؟ ولې؟



د 180° زاويې مثلثاتي نسبتونه: څرنگه چې د

$p(-1,0)$ ټکی په مثلثاتي دایره باندې د 180° زاويې

په دویمه ضلع باندې پروت دی، نو:

$$r = 1 \quad x = -1 \quad y = 0$$


$$\begin{aligned}\sin 180^\circ &= \sin \pi = \frac{y}{r} = \frac{0}{1} = 0 & \cos 180^\circ &= \cos \pi = \frac{x}{r} = \frac{-1}{1} = -1 \\ \tan 180^\circ &= \tan \pi = \frac{y}{x} = \frac{0}{-1} = 0 & \cot 180^\circ &= \cot \pi = \frac{x}{y} = \frac{-1}{0} = \text{(تعریف شوی نه دی)}\end{aligned}$$

فعالیت

$\sec 180^\circ$ او $\csc 180^\circ$ پیدا کړئ.

د $\frac{3\pi}{2} = 270^\circ$ زاوېي مثلثاتي نسبتونه:

خرنگه چې د $P(0, -1)$ ټکی په مثلثاتي دایره باندې د 270° زاوېي پر دویمه ضلع واقع دی.



$$r = 1 \quad x = 0 \quad y = -1$$

$$\sin \frac{3\pi}{2} = \sin 270^\circ = \frac{y}{r} = \frac{-1}{1} = -1 \quad \cos \frac{3\pi}{2} = \cos 270^\circ = \frac{x}{r} = \frac{0}{1} = 0$$

$$\tan \frac{3\pi}{2} = \tan 270^\circ = \frac{y}{x} = \frac{-1}{0} = \text{(تعریف نه دی)} \quad \cot \frac{3\pi}{2} = \cot 270^\circ = \frac{x}{y} = \frac{0}{-1} = 0$$

$$\sec \frac{3\pi}{2} = \sec 270^\circ = \frac{r}{x} = \frac{1}{0} = \text{(تعریف نه دی)} \quad \csc \frac{3\pi}{2} = \csc 270^\circ = \frac{r}{y} = \frac{1}{-1} = -1$$

په یاد ولرئ چې د 360° او 0° زاویو مثلثاتي نسبتونه سره مساوي دي، کولای شئ چې ووايئ ولې؟

د $360^\circ = 2\pi$ زاويې مثلثاتي نسبتونه:

څرنگه چې د $p(1,0)$ نقطه د 360° د زاويې په دویمه ضلعه باندې پرته ده، نو:


$$x=1 \quad y=0 \quad r=1$$

$$\sin 2\pi = \sin 360^\circ = \frac{y}{r} = \frac{0}{1} = 0 \quad \cos 2\pi = \cos 360^\circ = \frac{x}{r} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\tan 2\pi = \tan 360^\circ = \frac{y}{x} = \frac{0}{1} = 0$$

$$\cot 2\pi = \cot 360^\circ = \frac{x}{y} = \frac{1}{0} \quad (\text{تعريف شوي نه دي})$$

$$\sec 2\pi = \sec 360^\circ = \frac{r}{x} = \frac{1}{1} = 1, \quad \csc 2\pi = \csc 360^\circ = \frac{r}{y} = \frac{1}{0} \quad (\text{تعريف شوي نه دي})$$



فعالیت

د 0° زاويې ټول مثلثاتي نسبتونه پيدا کړئ.

$0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ او 360° زاویو ته محوري زاويې وايي چې د هرې زاويې دوه، دوه مثلثاتي نسبتونه تعريف شوې نه دي.

پوښتنې

1- لاندې جدول پک کړئ.

θ	0°	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin \theta$					
$\cos \theta$					
$\tan \theta$					

$\tan 270^\circ = ?$ -2


a) -1 b) 1 c) 0 d) تعريف شوي نه دي

$\cos 90^\circ = ?$ -3

a) -1 b) 1 c) 0 d) تعريف شوي نه دي

4- آیا $\cos \frac{3\pi}{2} = \cos \frac{9\pi}{2}$ دی؟ ولې؟

د یوې حاده زاوېې او نورو زاویو د مثلثاتي نسبتونو په منځ کې اړیکې:



څرنگه چې مو په نهم ټولگي کې ولیدل چې
مثلثاتي جدول یوازې د یوې حادې مثبتې زاوېې
مثلثاتي نسبتونه را ښيي ددې لپاره چې د منفي
او منفرد زاویو مثلثاتي نسبتونه هم له مثلثاتي
جدول څخه پیدا کړای شو، نو باید ددې زاویو
او د یوې حاده مثبتې زاوېې د مثلثاتي نسبتونو په
منځ کې اړیکې پیدا کړو.

د $\hat{\theta}$ او $-\hat{\theta}$ زاویو د مثلثاتي نسبتونو تر منځ اړیکې:

د θ حاده زاویه مثبت او له θ سره مساوي زاویه، د ساعت د عقربې د حرکت په جهت کې $-\theta$ زاویه په معیاري حالت په مثلثاتي دایره کې رسموو.

د $P(x, y)$ ټکی د θ پر دویمه ضلع او د $P_1(x_1, y_1)$ ټکی د $-\theta$ د زاوېې پر دویمه ضلع واقع دی.

څرنگه چې په پورته شکل کې د $\triangle OMP$ او $\triangle OMP_1$ مثلثونه یو له بله سره مساوي دي.

$$x_1 = x \quad |y_1| = |y| \quad -y_1 = y \Rightarrow y_1 = -y$$

$$\sin(-\theta) = \frac{y_1}{r} = \frac{y_1}{1} = y_1 = -y = -\sin \theta$$

$$\cos(-\theta) = \frac{x}{r} = x = \cos \theta$$

$$\tan(-\theta) = \frac{\sin(-\theta)}{\cos(-\theta)} = \frac{-\sin \theta}{\cos \theta} = -\tan \theta$$

$$\cot(-\theta) = \frac{\cos(-\theta)}{\sin(-\theta)} = \frac{\cos \theta}{-\sin \theta} = -\cot \theta$$

لومړی مثال: د $(-30^\circ = -\frac{\pi}{6})$ زاوېې مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ.

$$\sin(-30^\circ) = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\cos(-30^\circ) = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

حل

$$\tan(-30^\circ) = -\tan 30^\circ = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\cot(-30^\circ) = -\cot 30^\circ = -\sqrt{3}$$

$$\sec(-30^\circ) = \sec 30^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\csc(-30^\circ) = -\csc 30^\circ = -2$$

فعالیت

و بنیاست چپ: $\csc(-\theta) = -\csc \theta$, $\sec(-\theta) = \sec \theta$

دویم مثال: د $-\frac{3\pi}{2}$ زاویې مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ.

حل:

$$\sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right) = -\sin \frac{3\pi}{2} = -(-1) = 1$$

$$\cos\left(-\frac{3\pi}{2}\right) = \cos \frac{3\pi}{2} = 0$$

فعالیت

د $-\frac{3\pi}{2}$ زاویې نور څلور مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ.

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta$$

$$\cos(-\theta) = \cos \theta$$

$$\tan(-\theta) = -\tan \theta$$

$$\cot(-\theta) = -\cot \theta$$

$$\sec(-\theta) = \sec \theta$$


$$\csc(-\theta) = -\csc \theta$$

پوښتنې

1- د 360° یا 2π راډیان مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ.

2- د 45° یا $-\frac{\pi}{4}$ راډیان د (-30°) او (-60°) زاویو مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ.

3- د 90° یا $-\frac{\pi}{2}$ راډیان مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ.



د دوه زاویو د مثلثاتي نسبتونو په منځ کې اړیکې چې مجموعه او یا توپیر یې π یا 180° وي

- آیا د 150° او 135° زاویو مثلثاتي نسبتونه پیدا کولای شئ؟
- آیا $\sin 135^\circ$ او $\sin 45^\circ$ سره مساوي دي؟ ولې؟
- آیا ویلای شئ چې $\sin 130^\circ$ او $\sin 50^\circ$ یو له بله سره څه اړیکه لري؟

دوې زاوې چې مجموعه یې π یا 180° وي، په پام کې نیسو. که θ یوه حاده مثبتې زاویه وي بله زاویه $(\pi - \theta)$ ده. دا دواړه زاوې په مثلثاتي دایره کې په معیاري حالت کې رسموو. د $M(x, y)$ ټکی د θ د زاوې په دویمه ضلع باندې او د $M_1(x_1, y_1)$ ټکی د $(\pi - \theta)$ یا $(180 - \theta)$ د زاوې پر دویمه ضلع باندې واقع دی. څرنگه چې په پورته شکل کې د $\triangle OAM$ او $\triangle OM_1B$ مثلثونه سره مساوي دي.

$$(r=1) \quad |x_1| = |x| \quad -x_1 = x \Rightarrow x_1 = -x \quad y_1 = y$$

$$\sin(180^\circ - \theta) = \sin(\pi - \theta) = \frac{y_1}{r} = \frac{y}{1} = y = \sin \theta$$


$$\cos(180^\circ - \theta) = \cos(\pi - \theta) = \frac{x_1}{r} = \frac{-x}{r} = \frac{-x}{1} = -x = -\cos \theta$$

$$\tan(180^\circ - \theta) = \tan(\pi - \theta) = \frac{\sin(180^\circ - \theta)}{\cos(180^\circ - \theta)} = \frac{\sin \theta}{-\cos \theta} = -\tan \theta$$

فعالیت

- د $(\pi - \theta)$ زاوې نور درې مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ.

د هغو دوو زاویو د مثلثاتي نسبتونو ترمنځ اړیکې چې توپیر یې 180° او یا π راډیان وي.



که حاده زاویه θ وي، بله زاویه $(\pi + \theta)$ کېږي. د $M(x, y)$ ټکی پر مثلثاتي دایره باندې د θ پر دویمه ضلع او د $M_1(x_1, y_1)$ ټکی د $(\pi + \theta)$ یا $(180^\circ + \theta)$ د زاوې پر دویمه ضلع باندې واقع دی.

څرنگه چې د $\triangle OAM$ او $\triangle OBM_1$ مثلثونه سره

مساوي دي: $y_1 = -y$, $x_1 = -x$

$$\sin(180^\circ + \theta) = y_1 = -y = -\sin \theta$$

$$\cos(180^\circ + \theta) = x_1 = -x = -\cos \theta$$

$$\tan(180^\circ + \theta) = \frac{\sin(180^\circ + \theta)}{\cos(180^\circ + \theta)} = \frac{-\sin \theta}{-\cos \theta} = \tan \theta$$

$$\cot(180^\circ + \theta) = \frac{\cos(180^\circ + \theta)}{\sin(180^\circ + \theta)} = \frac{-\cos \theta}{-\sin \theta} = \cot \theta$$

$$\sec(180^\circ + \theta) = \frac{1}{\cos(180^\circ + \theta)} = \frac{1}{-\cos \theta} = -\sec \theta$$

$$\csc(180^\circ + \theta) = \frac{1}{\sin(180^\circ + \theta)} = \frac{1}{-\sin \theta} = -\csc \theta$$

لومړی مثال: د 120° او 240° زاویو مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ.

حل

$$\sin 120^\circ = \sin(\pi - 60^\circ) = \sin(180^\circ - 60^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 120^\circ = \cos(\pi - 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\tan 120^\circ = \tan(\pi - 60^\circ) = -\tan 60^\circ = -\sqrt{3}$$

$$\sin 240^\circ = \sin(180^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 240^\circ = \cos(180^\circ + 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\tan 240^\circ = \tan(180^\circ + 60^\circ) = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

فعالیت

د 120° او 240° زاویو نور درې، درې مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ.

دویم مثال: د $\frac{3\pi}{4}$ او $\frac{4\pi}{3}$ زاویو $\sin$ ، $\cos$ او $\tan$ پیدا کړئ.
حل:

$$\pi - \frac{3\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

$$\sin\left(\pi - \frac{3\pi}{4}\right) = \sin \frac{3\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos\left(\pi - \frac{3\pi}{4}\right) = \cos \frac{3\pi}{4} = -\cos \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$



$$\tan\left(\pi - \frac{3\pi}{4}\right) = \tan \frac{3\pi}{4} = -\tan \frac{\pi}{4} = -1$$

$$\frac{4\pi}{3} - \pi = \frac{\pi}{3}$$

$$\sin \frac{4\pi}{3} = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos \frac{4\pi}{3} = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$

$$\tan \frac{4\pi}{3} = \tan\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$



څرنگه چې $(180^\circ - \theta)$ د زاوې دویمه ضلع په دویمه ناحیه (ربع) کې پرته ده. په دویمه ناحیه کې $\sin \theta$ او $\csc \theta$ مثبت او د $(180^\circ - \theta)$ زاوې نور مثلثاتي نسبتونه منفي دي او څرنگه چې د $(180^\circ + \theta)$ یا $(\pi + \theta)$ زاوې دویمه ضلع په دریمه ربع کې پرته ده، نو ددې زاوې $\tan \theta$ او $\cot \theta$ مثبت او د $(180^\circ + \theta)$ د زاوې نور مثلثاتي نسبتونه منفي دي.

پوښتنې

1- د 225° زاوېې مثلثاتي نسبتونه پيدا کړئ.

2- د 210° زاوېې مثلثاتي نسبتونه پيدا کړئ.

3- د 150° زاوېې مثلثاتي نسبتونه پيدا کړئ.

$$\cot \frac{3\pi}{4} = ? -4$$

a) $-\frac{1}{2}$

b) 1

c) 0

d) -1


$$\sec(225^\circ) = ? -5$$

a) $\frac{2}{\sqrt{2}}$

b) $-\frac{2}{\sqrt{2}}$

c) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

d) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$



د دوو زاویو د مثلثاتي نسبتونو
تر منځ اړیکې چې مجموعه یې

90° یا $\frac{\pi}{2}$ راډیانه وي.

- آیا $\sin 60^\circ = \cos 30^\circ$ دی؟ ولې؟
- د 150° او 60° زاویو مثلثاتي نسبتونه سره
څه اړیکه لري؟

د $\widehat{AOM}$ زاویه θ او د $\widehat{AOM'}$ زاویه له $(\frac{\pi}{2} - \theta)$ څخه عبارت ده چې د θ او $\frac{\pi}{2} - \theta$ زاویو مجموعه 90° یا $\frac{\pi}{2}$ کېږي. څرنگه چې د $\triangle OHM$ او $\triangle OH'M'$ مثلثونه سره مساوي دي.

$$\overline{OH'} = \overline{OH}$$

$$\sin(\frac{\pi}{2} - \theta) = \cos \theta$$

$$\overline{H'M'} = \overline{HM}$$

$$\cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = \sin \theta$$

$$\tan(\frac{\pi}{2} - \theta) = \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - \theta)}{\cos(\frac{\pi}{2} - \theta)} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \cot \theta$$

$$\cot(\frac{\pi}{2} - \theta) = \frac{1}{\tan(\frac{\pi}{2} - \theta)} = \frac{1}{\cot \theta} = \tan \theta$$

فعالیت

وښیاست چې: $\sec(90 - \theta) = \csc \theta$ او $\csc(90 - \theta) = \sec \theta$ دي.

لومړۍ مثال: که:

$$\sin 23^\circ = 0,3907 \quad \cos 23^\circ = 0,9205 \quad \tan 23^\circ = 0,4245$$

$$\cot 23^\circ = 2,356 \quad \sec 23^\circ = 1,086 \quad \csc 23^\circ = 2,559$$

وي، د 67° زاوې مثلثاتي نسبتونه پيدا کړئ.

حل:

$$\sin 67^\circ = \cos 23^\circ = 0.9205$$

$$\cot 67^\circ = \tan 23^\circ = 0.4245$$

$$\cos 67^\circ = \sin 23^\circ = 0.3907$$

$$\sec 67^\circ = \csc 23^\circ = 2.559$$

$$\tan 67^\circ = \cot 23^\circ = 2.356$$

$$\csc 67^\circ = \sec 23^\circ = 1.086$$

فعالیت

که:

$$\sin 8^\circ 10' = 0.1421 \quad \cos 8^\circ 10' = 0.9899$$

$$\tan 8^\circ 10' = 0.1435 \quad \cot 8^\circ 10' = 6.968$$

$$\sec 8^\circ 10' = 1.010 \quad \csc 8^\circ 10' = 7.040$$

وي، د $81^\circ 50'$ زاوې مثلثاتي نسبتونه پيدا کړئ.


د هغو زاوېو مثلثاتي نسبتونه چې توپیر یې $\frac{\pi}{2}$ یا 90° وي په لاندې ډول دي:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \sin\left[\frac{\pi}{2} - (-\theta)\right] = \cos(-\theta) = \cos \theta$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos\left[\frac{\pi}{2} - (-\theta)\right] = \sin(-\theta) = -\sin \theta$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)} = \frac{\cos \theta}{-\sin \theta} = -\cot \theta$$

$$\cot\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)} = \frac{-\sin \theta}{\cos \theta} = -\tan \theta$$



$$\sec\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \frac{1}{\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)} = \frac{1}{-\sin \theta} = -\csc \theta$$

$$\csc\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)} = \frac{1}{\cos \theta} = \sec \theta$$

دویم مثال: د 120° زاویې مثلثاتی نسبتونه پیدا کړئ.
حل

$$\sin 120^\circ = \sin(90^\circ + 30^\circ) = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 120^\circ = \cos(90^\circ + 30^\circ) = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\tan 120^\circ = \tan(90^\circ + 30^\circ) = -\cot 30^\circ = -\sqrt{3}$$

$$\cot 120^\circ = \cot(90^\circ + 30^\circ) = -\tan 30^\circ = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\sec 120^\circ = \sec(90^\circ + 30^\circ) = -\csc 30^\circ = -2$$

$$\csc 120^\circ = \csc(90^\circ + 30^\circ) = \sec 30^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta \qquad \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos \theta$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta \qquad \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin \theta$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cot \theta \qquad \tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\cot \theta$$

$$\cot\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \tan \theta \qquad \cot\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\tan \theta$$

$$\sec\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \csc \theta \qquad \sec\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\csc \theta$$

$$\csc\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sec \theta \qquad \csc\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \sec \theta$$

پوښتنې

1- د 135° زاوېې مثلثاتي نسبتونه پيدا کړئ.

2- د 150° زاوېې مثلثاتي نسبتونه پيدا کړئ.

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = ? \quad -3$$

a) $\cos x$

b) $\sin x$

c) $-\cos x$

d) $-\sin x$


$$\cot\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = ? \quad -4$$

a) $\tan \theta$

b) $-\tan \theta$

c) $\cot \theta$

d) $-\cot \theta$



د هغه زاويو د مثلثاتي نسبتونو تر
منځ اړیکې چې مجموعه یې 360°
یا 2π وي.

آیا ښودلای شئ چې

$$\sin(360^\circ - \theta) = -\sin \theta$$

$$\cos(360^\circ - \theta) = \cos \theta$$

اړیکې سمې دي؟

په پورته شکل کې د $\triangle OPD$ او $\triangle OP_1D$ مثلثونو له مساوي والی څخه لرو چې:

$$x_1 = x \quad |y_1| = |y|$$

$$-y_1 = y \Rightarrow y_1 = -y$$


$$\sin(360^\circ - \theta) = y_1 = -y = -\sin \theta$$

$$\cos(360^\circ - \theta) = x_1 = x = \cos \theta$$

$$\tan(360^\circ - \theta) = \frac{\sin(360^\circ - \theta)}{\cos(360^\circ - \theta)} = \frac{-\sin \theta}{\cos \theta} = -\tan \theta$$

فعالیت

په همدې ډول د θ او $360^\circ - \theta$ زاويو د $\sec, \cot$ او $\csc$ د مثلثاتي نسبتونو ترمنځ اړیکې پیدا کړئ او د θ او $(-\theta)$ زاويو مثلثاتي نسبتونو له اړیکو سره یې پرتله کړئ.



مثال: د 330° یا $\frac{11\pi}{6}$ راډيانه زاويې مثلثاتي نسبتونه پیدا

کړئ.

حل:


$$\begin{aligned}\sin \frac{11\pi}{6} &= \sin(2\pi - \frac{\pi}{6}) = \sin 330^\circ = \sin(360^\circ - 30^\circ) = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2} \\ \cos \frac{11\pi}{6} &= \cos(2\pi - \frac{\pi}{6}) = \cos 330^\circ = \cos(360^\circ - 30^\circ) = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \tan \frac{11\pi}{6} &= \tan(2\pi - \frac{\pi}{6}) = \tan 330^\circ = \tan(360^\circ - 30^\circ) = -\tan 30^\circ = -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \cot \frac{11\pi}{6} &= \cot(2\pi - \frac{\pi}{6}) = \cot 330^\circ = \cot(360^\circ - 30^\circ) = -\cot 30^\circ = -\sqrt{3} \\ \sec \frac{11\pi}{6} &= \sec(2\pi - \frac{\pi}{6}) = \sec 330^\circ = \sec(360^\circ - 30^\circ) = \sec 30^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \csc \frac{11\pi}{6} &= \csc(2\pi - \frac{\pi}{6}) = \csc 330^\circ = \csc(360^\circ - 30^\circ) = -\csc 30^\circ = -2\end{aligned}$$

فعالیت

د 315° زاویې مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ.

د کوټر مینل زاویو مثلثاتي نسبتونه:

- آیا $\sin 450^\circ$, $\tan 390^\circ$ او $\csc 450^\circ$ پیدا کولای شئ؟
- آیا $\sin 90^\circ$, $\sin 450^\circ$ او $\sin 790^\circ$ سره برابر دي؟ ولې؟



په معیاري حالت کې د θ حاده زاویې او $360^\circ + \theta$ زاویو دویمې ضلعې یو پر بل پرتې دي، نو:

$$\sin(360^\circ + \theta) = \sin \theta$$

$$\cos(360^\circ + \theta) = \cos \theta$$

$$\tan(360^\circ + \theta) = \tan \theta$$

$$\cot(360^\circ + \theta) = \cot \theta$$

$$\csc(360^\circ + \theta) = \csc \theta$$

$$\sec(360^\circ + \theta) = \sec \theta$$

لومړی مثال: د 405° زاوې مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ.
حل

$$\sin 405^\circ = \sin\left(2\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \sin(360^\circ + 45^\circ) = \sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos 405^\circ = \cos\left(2\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \cos(360^\circ + 45^\circ) = \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan 405^\circ = \tan\left(2\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \tan(360^\circ + 45^\circ) = \tan 45^\circ = 1$$

$$\cot 405^\circ = \cot\left(2\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \cot(360^\circ + 45^\circ) = \cot 45^\circ = 1$$

$$\sec 405^\circ = \sec\left(2\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \sec(360^\circ + 45^\circ) = \sec 45^\circ = \sqrt{2}$$

$$\csc 405^\circ = \csc\left(2\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \csc(360^\circ + 45^\circ) = \csc 45^\circ = \sqrt{2}$$

دویم مثال: د 1500° زاوې مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ.

$$\sin 1500^\circ = \sin(4 \cdot 360^\circ + 60^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 1500^\circ = \cos(4 \cdot 360^\circ + 60^\circ) = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\tan 1500^\circ = \tan(4 \cdot 360^\circ + 60^\circ) = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

$$\cot 1500^\circ = \cot(4 \cdot 360^\circ + 60^\circ) = \cot 60^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\sec 1500^\circ = \sec(4 \cdot 360^\circ + 60^\circ) = \sec 60^\circ = 2$$

$$\csc 1500^\circ = \csc(4 \cdot 360^\circ + 60^\circ) = \csc 60^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

دریم مثال: د 900° او -930° زاویو $\sin$ ، $\cos$ او $\tan$ پیدا کړئ.
حل

$$-930^\circ + 3 \cdot 360^\circ = 150^\circ$$

$$\sin(-930^\circ) = \sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$


$$\cos(-930^\circ) = \cos 150^\circ = \cos(180^\circ - 30^\circ) = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan(-930^\circ) = \tan 150^\circ = \tan(180^\circ - 30^\circ) = \tan 30^\circ = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\sin 900^\circ = \sin(2 \cdot 360^\circ + 180^\circ) = \sin 180^\circ = 0$$

$$\cos 900^\circ = \cos(2 \cdot 360^\circ + 180^\circ) = \cos 180^\circ = -1$$

$$\tan 900^\circ = \tan(2 \cdot 360^\circ + 180^\circ) = \tan 180^\circ = 0$$



خلورم مثال: د $-\frac{5\pi}{2}$ او $\frac{7\pi}{3}$ زاویو مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ.

حل:

$$\sin\left(-\frac{5\pi}{2}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\sin\frac{\pi}{2} = -1$$

$$\sin\frac{7\pi}{3} = \sin\left(2\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos\left(-\frac{5\pi}{2}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \cos\frac{\pi}{2} = 0$$

$$\cos\frac{7\pi}{3} = \cos\left(2\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

$$\tan\left(-\frac{5\pi}{2}\right) = \tan\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)}{\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)} = \frac{-1}{0}$$

تعریف شوی نه دی

$$\tan\frac{7\pi}{3} = \tan\left(2\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

$$\cot\left(-\frac{5\pi}{2}\right) = \cot\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)}{\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)} = \frac{0}{-1} = 0$$

$$\cot\left(\frac{7\pi}{3}\right) = \cot\left(2\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \cot\frac{\pi}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

فعالیت

د $\frac{7\pi}{3}$ او $(-\frac{5\pi}{2})$ زاویو نور دوه، دوه مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ.

$$\sin(2\pi - \theta) = \sin(360^\circ - \theta) = -\sin \theta$$

$$\cos(2\pi - \theta) = \cos(360^\circ - \theta) = \cos \theta$$

$$\tan(2\pi - \theta) = \tan(360^\circ - \theta) = -\tan \theta$$

$$\cot(2\pi - \theta) = \cot(360^\circ - \theta) = -\cot \theta$$

$$\sec(2\pi - \theta) = \sec(360^\circ - \theta) = \sec \theta$$

$$\csc(2\pi - \theta) = \csc(360^\circ - \theta) = -\csc \theta$$

$$\sin(2\pi + \theta) = \sin(360^\circ + \theta) = \sin \theta$$

$$\cos(2\pi + \theta) = \cos(360^\circ + \theta) = \cos \theta$$

$$\tan(2\pi + \theta) = \tan(360^\circ + \theta) = \tan \theta$$

$$\cot(2\pi + \theta) = \cot(360^\circ + \theta) = \cot \theta$$

$$\sec(2\pi + \theta) = \sec(360^\circ + \theta) = \sec \theta$$

$$\csc(2\pi + \theta) = \csc(360^\circ + \theta) = \csc \theta$$

پوښتنې

1- د 480° او 390° زاويو مثلثاتي نسبتونه پيدا کړئ.

2- د 600° او 300° زاويو مثلثاتي نسبتونه پيدا کړئ.

3- د 1830° او د $(1095^\circ 20')$ زاويو مثلثاتي نسبتونه پيدا کړئ.

4- د $\frac{25\pi}{6}$ زاويې مثلثاتي نسبتونه پيدا کړئ.

5- د $\frac{5\pi}{3}$ زاويې مثلثاتي نسبتونه پيدا کړئ.

6- د $\frac{41\pi}{6}$, $\frac{4\pi}{3}$ او $\frac{3\pi}{4}$ زاويو مثلثاتي نسبتونه پيدا کړئ.

7- د 780° , -300° او 420° زاويو مثلثاتي نسبتونه پيدا کړئ.

8- $\cos(-3\pi) = ?$


- a) 1 b) -1 c) 0 d) $\frac{1}{2}$

9- $\cos(-15\pi) = ?$

- a) 1 b) -1 c) 0 d) درې واړه سم نه دي.

10- $\sin(-1110^\circ) = ?$

- a) $\frac{1}{2}$ b) $-\frac{1}{2}$ c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ d) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$



د مثلثاتي تابع گانو گراف

- آیا کولای شی وویاست چې د $f(x) = \sin x$ او $f(x) = \cos x$ د تابعگانو د تناوب دوره خوږه ده؟
- آیا ویلای شی چې د $f(x) = \sin x$ او $f(x) = \cos x$ د تابعو domain کوم عددونه دي؟

د $f(x) = \sin x$ تابع د گراف رسمول (graph of the sine function):





د $f(x) = \sin x$ تابع د تعریف ناحیه (domain) د ټولو حقيقي عددونو سټ دی او Range یې $[-1, 1]$ دی. د دې تابع د تناوب دوره 2π ده، ځکه پوهېږئ چې د یوې تابع د تعریف ساحه ټول هغه حقيقي عددونه (Real numbers) دي چې تابع په کې تعریف شوی وي. د هر حقيقي عدد x لپاره یوه x راډیان زاویه او له مثلثاتي دایرې سره د x راډیان د زاویې د تقاطع ټکی، هر وخت تعریف شوی دی. که x د راډیان په حساب وي، ددې ټولو زاویو اندازه $2k\pi + x$ راډیان ده، نو د sine او cosine د تابع گانو د تعریف ساحه ټول حقيقي عددونه دي. څرنګه چې $\sin x$ او $\cos x$ په مثلثاتي دایره باندې د یوه ټکي وضعیه کمیات دي، نو د $f(x) = y = \sin x$ او $f(x) = y = \cos x$ د تابع گانو Range د (1) او (-1) تر منځ دی، یا د $[-1, 1]$ انټروال د $y = \sin \theta$ او $y = \cos \theta$ د تابع گانو Range دی.

فعالیت


وښیاست چې $-1 \leq \sin \theta, \cos \theta \leq 1$ دی.

باید په یاد ولرو چې د f تابع ته متناوبه تابع ویل کېږي، که چېرې د t یو عدد د صفر خلاف موجود وي، په دې شرط چې که لومړی $x \in D_f$ وي او $x + t$ او $x - t$ هم د f د تابع د تعریف په ساحه (domain) کې شامل وي او $f(x + t) = f(x)$ وي. تر ټولو کوچنی داسې عدد، لکه: (t) چې د $f(x + t) = f(x)$ په اړیکه کې صدق وکړي. دا د (t)

عدد f د تابع د اصلي تناوب په نوم یادېږي. که f د تابع د تناوب دوره وي. نو $f(-t)$ هم f د تابع د تناوب دوره ده. څرنگه چې پوهېږئ $\sin(x + 2K\pi) = \sin x$ او $\cos(x + 2K\pi) = \cos x$ دی چې K یو تام عدد دی، نو د $\sin x$ او $\cos x$ تناوب متنوېې توابع دي او تر ټولو کوچنی عدد چې په پورتنیو اړیکو کې صدق کوي 2π دی، نو د دې دواړو توابعو اصلي تناوب 2π دی. له شکل سره سم په معیاري حالت کې یو د t راډیان زاویه په پام کې ونیسئ په داسې حال کې چې د t د زاوېې دویمه ضلع مثلثاتي دایره د P په ټکي کې قطع کوي، نو د P د ټکي د y مختصه له $\sin t$ څخه عبارت ده. $h(t) = \sin t$ او $\sin t$ تغیرات په لاندې جدول او شکل کې وگورئ:

اړونده شکل	$\sin t$	P د ټکي حرکت	t په قیمت کې تغیر
	له صفر څخه تر یوه پورې تزايد کوي	له (1,0) څخه تر (0,1)	له 0 څخه تر $\frac{\pi}{2}$ پورې
	له یوه څخه تر صفره پورې تناقص کوي	له (0,1) څخه تر (-1,0)	له $\frac{\pi}{2}$ څخه تر π پورې
	له صفره څخه تر -1 پورې تناقص کوي	له (-1,0) څخه تر (0,-1)	له π څخه تر $\frac{3\pi}{2}$ پورې
	له -1 څخه تر صفره پورې تزايد کوي	له (0,-1) څخه تر (1,0)	له $\frac{3\pi}{2}$ څخه تر 2π پورې


په همدې ډول په هر 2π کې تکرارېږي په نتیجه کې $\sin(t \pm 2\pi) = \sin t$ دی.
لاندې جدول او شکل وگورئ:



او یا کولای شو، که د یو دوران زاوې د درجې په حساب وي، د $\sin t$ تغیرات په لاندې جدول او شکل کې وښایو:

$$h(t) = \sin t$$

t	واقعي	تقریبي	180°	0	0.00
0°	0	0.00	210°	$-\frac{1}{2}$	-0.50
30°	$\frac{1}{2}$	0.50	225°	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-0.71
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0.71	240°	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-0.87
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0.87	270°	-1	-1.00
90°	1	1.00	300°	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-0.87
120°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0.87	315°	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-0.71
135°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0.71	330°	$-\frac{1}{2}$	-0.50
150°	$\frac{1}{2}$	0.50	360°	0	0.00




دې ته په پام سره چې $\sin t$ د تابع د تناوب دوره 2π ده، نو $\sin(t \pm 2\pi) = \sin t$ دی، نو د $\sin t$ د تابع گراف په $[0, 2\pi]$ ، $[2\pi, 4\pi]$ ، $[4\pi, 6\pi]$ ، $[-2\pi, 0]$ او داسې نورو انټروالو کې یو شان دی.

فعالیت

په $4\pi, 2\pi, \pi, 0, -\pi, -2\pi, -3\pi, -4\pi$ کې د $\sin t$ د تابع قیمتونه پیدا کړئ.

لومړی مثال: د t هغه ټول قیمتونه وښایست چې د $\sin t$ قیمت په کې (-1) وي.
حل: څرنگه چې د $\sin t$ قیمت د (1) او (-1) تر منځ دی او په هر 2π کې په افقي محور باندې تکرارېږي، نو بې شمېره قیمتونه شته چې په هغه کې د $\sin t$ قیمت -1 دی. د نمونې په ډول څو ټکي په سور رنګ په شکل کې ښودل شوي دي.




د $\sin t$ په گراف کې له صفر څخه تر 2π پورې یوازې یو ټکی (نقطه) د $(\frac{3\pi}{2}, -1)$ شته چې په

سره رنګ ښودلی شوې دی. ټول هغه قیمتونه چې $\sin t$ په کې (-1) دی، له $t = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ څخه عبارت دي چې k یو تام عدد دی.

دویم مثال: د $y = \sin x + 1$ تابع گراف په $[0, 2\pi]$ انټروال کې رسم کړئ.

حل: ددې لپاره د تابع د تعریف ساحه $[0, 2\pi]$ او Range یې $[0, 2]$ دی، ددې تابع د گراف د رسمولو لپاره همدا بس دی چې د $y = \sin x$ گراف رسم کړو او د یوه واحد په اندازه یې د Y پر محور پورته خوا ته انتقال کړو. (عمودی انتقال)



sine او cosine د تابع گانو پریود او لمن (Amplitude):

که $b > 0$ وي د $f(t) = \sin bt$ او $g(t) = \cos bt$ گرافونه، د صفر او 2π تر منځ یوه

دوره (Cycle) جوړوي، ددې دواړو تابع گانو پریود $\frac{2\pi}{b}$ دی ($b > 0$). د مثال په ډول د $y = \cos 3t$

پریود $\frac{2\pi}{b} = \frac{2\pi}{3}$ دی او د $y = \sin \frac{1}{2}t$ تابع پریود $\frac{2\pi}{b} = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$ دی او د $y = a \sin bt$

او $y = a \cos bt$ د تابع گانو لمن د $|a|$ دی ($a \neq 0$)، د مثال په ډول د $y = -2 \sin 4t$ لمن

$$|a| = |-2| = 2 \text{ او پریود یې } \frac{2\pi}{b} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \text{ دی.}$$


دریم مثال: د $y = 2 \sin x$ تابع گراف رسم او د $y = \sin x$ د تابع له گراف سره یې پرتله کړئ.

حل: ددې تابع گراف توپیر د $y = \sin x$ د تابع له گراف سره دا دی چې $-2 \leq y \leq 2$ دی


چې د 2 عدد ته لمن (amplitude) وايي. ځکه چې د $|2| = 2$ دی. ددې تابع پریود هم 2π

دی، لاندې جدول او شکل وگورئ:

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
sin x	0	1	0	-1	0
2 sin x	0	2	0	-2	0



څلورم مثال: د $y = 3 \sin 2x$ تابع گراف په $[0, \pi]$ انټروال کې رسم کړئ.



حل: د دې تابع پریود $\frac{2\pi}{2} = \pi$ دی، لاندې جدول او شکل وگورئ

x	0	$\pi/4$	$\pi/2$	$3\pi/4$	π
2x	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
sin 2x	0	1	0	-1	0
3 sin 2x	0	3	0	-3	0

د $\sin t$ د تابع د تعریف ساحه ټول حقیقي عددونه دي، د $\sin t$ د تابع گراف د y محور په $(0,0)$ او د X محور په $(0,0)$ ، π ، 2π ، 3π ، 4π او $-\pi$ ، -2π ، -3π ، -4π او نورو کې قطع

کوي، د $\sin t$ تابع له صفر څخه تر $\frac{\pi}{2}$ پورې متزایده، له $\frac{\pi}{2}$ څخه تر π پورې متناقصه، له π

څخه تر $\frac{3\pi}{2}$ پورې متناقصه او له $\frac{3\pi}{2}$ څخه تر 2π پورې متزایده ده.


د $f(t) = \cos t$ د تابع گراف (Graph of the cosine function)

د دې تابع د تعریف ساحه (domain) هم د ټولو حقیقي عددونو سټ دی او Range یې $[-1,1]$


دی، د $\cos x$ د تابع د تناوب دوره هم 2π ده، له شکل سره سم په معیاري حالت (Standard position) کې د $\hat{t}$ رادیان یوه زاویه په پام کې ونیسئ چې د $\hat{t}$ د زاوې دویمه ضلع مثلثاتي دایره د p په ټکي کې قطع کوي، نو د p د ټکي د x مختصه د $\cos t$ څخه عبارت ده. $f(t) = \cos t$ د تابع گراف د رسمولو لپاره لاندې جدول او شکلونه وگورئ.

اړونده شکل	cost یا د p ټکي د x مختصه	د P د ټکي حرکت	د t په قیمت کې تغیر
	له یوه څخه تر صفره پورې تناقص کوي	له $(1,0)$ څخه تر $(0,1)$ پورې	له 0 څخه تر $\frac{\pi}{2}$
	له صفر څخه تر -1 پورې تناقص کوي.	له $(0,1)$ څخه تر $(-1,0)$ پورې	له $\frac{\pi}{2}$ څخه تر π
	له -1 څخه تر صفره پورې تزايد کوي.	له $(-1,0)$ څخه تر $(0,-1)$ پورې	له π څخه تر $\frac{3\pi}{2}$
	له صفر څخه تر یوه پورې تزايد کوي	له $(0,-1)$ څخه تر $(1,0)$ پورې	له $\frac{3\pi}{2}$ څخه تر 2π

په همدې ډول په هر 2π کې تکرارېږي. په نتیجه کې $\cos(t \pm 2\pi) = \cos t$ دی. لاندې جدول او شکل وگورئ.



کولای شو، د درجې په حساب د $f(t) = \cos t$ تابع گراف هم رسم کړو:



د $f(t) = y = \cos t$ تابع د تناوب دوره 2π ده، ځکه چې د $\cos t$ د تابع گراف د $[0, 2\pi]$ ، $[2\pi, 4\pi]$ ، $[4\pi, 6\pi]$ او داسې نورو کې یو شان دی.

د $\cos t$ د تابع د تعریف ساحه د حقیقي عددونو سټ او Range یا د y قیمت یې د 1 او -1 تر منځ دی، یا د $[-1, 1]$ انټروال د $\cos t$ د تابع Range دی.

$$f(t) = \cos t$$

t	واقعي	تقريبي
0°	1	1.00
30°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0.87
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0.71
60°	$\frac{1}{2}$	0.50
90°	0	0.00
120°	$-\frac{1}{2}$	-0.50
135°	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-0.71
150°	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-0.87


180°	-1	-1.00
210°	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-0.87
225°	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-0.71
240°	$-\frac{1}{2}$	-0.50
270°	0	0.00
300°	$\frac{1}{2}$	0.50
315°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0.711
330°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0.87
360°	1	1.00

فعاليت

د $g(t) = \cos t$ تابع گراف د t په کومو قيمتونو کې د y محور قطع کوي؟

لومړی مثال: د t ټول هغه قيمتونه وښايست چې د $\cos t$ د تابع قيمت په کې له $\frac{1}{2}$ سره مساوی وي.

حل: څرنگه چې بې شمېره زاوېې شته دی چې په هغه قيمتونو کې $y = \cos t = \frac{1}{2}$ دي، په شکل کې خو ټکي د نمونې په ډول په سره رنگ ښودل شوې دي.



د $[0, 2\pi]$ په انټروال کې داسې دوه ټکي شته چې $\cos t = \frac{1}{2}$ شي چې له $(\frac{\pi}{3}, \frac{1}{2})$ او $(\frac{5\pi}{3}, \frac{1}{2})$ څخه عبارت دي. ټول هغه قيمتونه چې په هغو کې $\cos t = \frac{1}{2}$ وي، له $t = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ يا $t = \frac{5\pi}{3} + 2k\pi$ څخه عبارت دي. چې k يو تام عدد دی.


د $\sin$ او $\cos$ تابع گانو د تعريف ساحه ټول حقيقي عددونه دي، $y = \cos t$ تابع له صفره څخه تر $\frac{\pi}{2}$ پورې متناقصه او له $\frac{\pi}{2}$ څخه تر π هم متناقصه ده. ليکن له π څخه تر $\frac{3\pi}{2}$ متزايدة او له $\frac{3\pi}{2}$ څخه تر 2π پورې هم متزايدة ده. د $y = \sin t$ او $y = \cos t$ ، د تابع گانو پريود 2π دی، په دې معنا چې: $\sin(t \pm 2\pi) = \sin t$ ، $\cos(t \pm 2\pi) = \cos t$ دی.

د $f(t) = \sin t$ تابع طاقه او $f(t) = \cos t$ تابع يوه جفته تابع ده، ځکه چې: $\sin(-t) = -\sin t$ او $\cos(-t) = \cos t$ دی يا د $\sin t$ د تابع گراف نظر مبداء ته متناظر او د $\cos t$ د تابع گراف نظر د y محور ته متناظر دی.

پوښتنې

- 1- د لاندې تابع گانو گرافونه په راډرل شوو انټروالونو کې رسم کړئ.
 $f(t) = \sin t : [2\pi, 6\pi]$ $g(t) = \cos t : [\pi, 3\pi]$
- 2- د $[-2\pi, 6\pi]$ په انټروال کې د t د کوم قيمت لپاره $\sin t = 1$ دی؟
- 3- د $[-2\pi, 6\pi]$ په انټروال کې د t د کوم قيمت لپاره $\cos t = 0$ دی؟
- 4- د $g(t) = -\frac{1}{2} \sin t$ د تابع گراف په $[-2\pi, 6\pi]$ انټروال کې رسم کړئ.

د تانجانټ د تابع گراف



آيا پوهېږئ چې د $\tan$ تابع يوه متزايدة تابع ده؟

څرنگه چې $\tan t = \frac{y}{x} = \frac{\sin t}{\cos t}$ دی، په دې شرط چې $\cos t \neq 0$ وي، نو د $\tan$ تابع د تعريف

ساحه ټول حقيقي عددونه دي، پرته له هغو زاويو څخه چې $\cos$ يې صفر وي، د $\frac{\pi}{2}$ او $\frac{3\pi}{2}$ او يا

$$\frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ او } \frac{3\pi}{2} + 2k\pi \text{ د زاويو کوساينونه صفر دي.}$$

څرنگه چې د $\frac{\pi}{2}$ زاوې د دويمې ضلعي د تقاطع ټکي له مثلثاتي دايرې سره د $(0,1)$ ټکي دی، نو د

$$\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}, \dots \text{ په جمع کولو سره د } (2\pi) \text{ زاوې سره د يو پوره دوران } (2\pi) \text{ په جمع کولو سره د } \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}, \dots$$

زاوې په لاس راځي چې ددې زاويو د $\tan$ قيمتونه تعريف شوي نه دي او د $t = k\pi \pm \frac{\pi}{2}$ مستقيم خطونه د $\tan$ د تابع عمودي مجانبونه دي.

په همدې ډول د $(0,-1)$ ټکي د $\frac{3\pi}{2}$ زاوې پر دويمه ضلع واقع دي، د $\frac{3\pi}{2}$ له زاوې سره د يو پوره

$$\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}, \frac{9\pi}{2}, \dots \text{ له جمع کولو څخه د } (2\pi) \text{ دوران } \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}, \frac{9\pi}{2}, \dots \text{ په لاس}$$

راځي چې د $\tan$ د تابع د تعريف په ساحه کې شامل نه دي.

يا د $\tan$ د تابع د تعريف په ناحيه (domain) کې ټول حقيقي عددونه شامل دي پرته د $\frac{\pi}{2}$ له

طاق مضرب څخه، او يا $\{t \in \mathbb{R}, t = k\pi + \frac{\pi}{2}\}$ او د $\tan$ د تابع Range د


ټولو حقيقي عددونو سټ دی. د ټانجانت د تابع پریود π دی. د t راډیان زاویې لپاره لرو چې:

$$\tan(t \pm \pi) = \tan t \quad \text{دې وخت چې د } \hat{t} \text{ زاویه له صفره تر } \frac{\pi}{2} \text{ پورې تزیاید وکړي، نو } \tan t$$

هم له صفره څخه تر $+\infty$ پورې تزیاید کوي ($\tan \frac{\pi}{2}$ تعریف شوی نه دی). په دویمه ربع کې هم


څه وخت چې د t زاویه له $\frac{\pi}{2}$ څخه تر π پورې تزیاید وکړي، $\tan t$ هم له $-\infty$ څخه تر صفره پورې تزیاید کوي.

په همدې ډول په دریمه ناحیه کې هغه وخت چې د $\hat{t}$ زاویه له π څخه تر $\frac{3\pi}{2}$ پورې تزیاید وکړي، د $\hat{t}$ د زاویې ټانجانت له صفره څخه تر $+\infty$ پورې تزیاید کوي. په څلورمه ناحیه کې د $\hat{t}$ د زاویې ټانجانت له $-\infty$ څخه تر صفره پورې تزیاید کوي. لاندې جدول د ټانجانت د تابع تحول ښکاره کوي، همدارنگه د دې تابع تحول په لاندې شکلونو کې ښودل شوی دی:



که θ د درجې په حساب وي، د ټانجانت تابع قیمتونه او شکل په لاندې ډول وگورئ.

	θ	-90°	-60°	-45°	-30°	0°	30°	45°	60°
		90°	120°	135°	150°	180°	210°	255°	240°
$\tan \theta$	حقيقي	تعريف شوی نه دی	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$
	تقريبی	تعريف شوی نه دی	-1.73	-1	-0.58	0	0.58	1	1.73




څرنگه چې د $(\pi, 2\pi)$ او د $(0, \pi)$ په فاصله کې د ټانجانټ د تابع تغیرات یو شی دي، نو د $\tan$ تابع پریود π دی او د $\tan$ تابع یوه متزایده تابع ده. له بلې خوا که $b > 0$ وي، د $f(t) = \tan bt$

تابع د $\frac{\pi}{2}$ او $-\frac{\pi}{2}$ تر منځ یوه دوره (Cycle) جوړوي، د دې تابع پریود $\frac{\pi}{b}$ دی. د مثال په ډول د

$$f(t) = \tan 2t \quad \text{پریود} \quad \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{b} \quad \text{دی.}$$

مثال: د t ټول هغه قیمتونه پیدا کړئ چې $\tan t = -1$ وي.

حل: څرنگه چې د $\tan t$ قیمتونه د π په فاصله کې تکرارېږي، نو د t بې شمېره قیمتونه شته چې $y = \tan t$ له -1 سره مساوي وي چې په لاندې شکل کې څو ټکي د نمونې په ډول ښودل شوي دي.



څرنگه چې د $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ په انټروال کې یوازې د $(-\frac{\pi}{4}, -1)$ یو ټکی لري، نو د t ټول قیمتونه

$$\tan t = -1 \quad \text{دي مساوي دي په:} \quad t = -\frac{\pi}{4} + K\pi \quad (K \text{ یو تام عدد دی}).$$

د $\tan$ تابع هر وخت متزایده ده او پرته د $\frac{\pi}{2}$ د طاق مضرب له زاویو څخه پرته په ټولو حقيقي

عددونو کې تعريف شوې ده. او د تناوب دوره یې π ده، ځکه چې: $\tan(t \pm \pi) = \tan(t)$.

څرنگه چې $\tan(-t) = -\tan t$ دی، نو $y = \tan t$ یوه طاقه تابع ده او د $\frac{\pi}{2}$ په تام مضرب کې عمودي محانب هم لري.

د $\sin$ ، $\cos$ او $\tan$ تابع گانو د مشخصو لنډیز:

تابع	سمبول	Domain	Range	پریود	طاقه / جفته
$\sin$	$f(t) = \sin t$	د ټولو حقيقي عددونو سټ	ټول حقيقي عددونه د 1 او -1 ترمنځ	2π	طاقه
$\cos$	$f(t) = \cos t$	ټول حقيقي عددونه	ټول حقيقي عددونه د 1 او -1 ترمنځ	2π	جفته
$\tan$	$f(t) = \tan t$	ټول حقيقي عددونه پرته د $\frac{\pi}{2}$ له طاق مضرب څخه	ټول حقيقي عددونه	π	طاقه

$$D_{\sin} = D_{\cos} = \mathbb{R}$$

$$R_{\sin} = R_{\cos} = [-1, 1]$$

یا په بل عبارت:

$$D_{\tan} = \{x \in \mathbb{R} : \cos x \neq 0\}$$

پوښتنې

1- د t د زاویې په کوم قیمت د $\tan t$ د تابع قیمت په $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ انټروال کې له صفره کوچنی دی؟


2- د $y = 3 \tan \theta$ تابع گراف رسم کړئ.

3- $\tan \theta$ تابع پریود مساوي دی په:

درې واړه سم نه دي d) 3π c) π b) 2π a)

4- که د θ زاویه له 0° څخه تر 90° پورې تحول وکړي، د $\tan \theta$ تحول عبارت دی له:

له $-\infty$ څخه تر $+\infty$ c) له صفر څخه تر $+\infty$ b) له -1 څخه تر $-\infty$ a)



د کونټانجانت د تابع گراف

- آیا د کونټانجانت د تابع د تناوب دوره پېژنئ؟
- که $\sin t = 0$ وي، آیا $\cot(t)$ تعریف شوی دی؟ که نه، ولې؟


څرنگه چې $\cot(t) = \frac{\cos t}{\sin t}$ دی، که $\sin t = 0$ وي، $\cot(t)$ تعریف شوی نه دی چې t یو تام عدد وي.


د $\cot$ تابع د تعریف ساحه (domain) ټول حقيقي عددونه دي پرته د π له تام مضرب څخه، یا په بل عبارت $\{t \in \mathbb{R} / t = k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ یا $\text{dom}_{\cot} = \{t \in \mathbb{R} / \sin t \neq 0\}$ د دې تابع Range ټول حقيقي عددونه دي.

د $f(t) = \cot(t)$ د تابع گراف د π په تام مضرب کې عمودي مجانب (Vertical asymptotes) لري ($t = k\pi$) چې k یو تام عدد دی.

څه وخت چې د t زاویه له صفره تر $\frac{\pi}{2}$ پورې زیاته شي، د $\cot(t)$ قیمت له $+\infty$ څخه تر صفره پورې کمېږي ($\cot 0^\circ$ نه دی تعریف شوی) په دویمه ناحیه کې څه وخت چې د t زاویه

له $\frac{\pi}{2}$ څخه تر π پورې زیاته شي، $\cot(t)$ له صفره تر $-\infty$ پورې کمېږي (تناقص کوي). دې ته په پام سره چې د $\cot$ د تابع د تناوب دوره π ده، نو په دریمه او څلورمه ناحیه کې د $\cot(t)$ د تابع تغیرات د لومړۍ او دویمې ناحیې په شان دي. پورتنۍ حقیقت په لاندې جدول او شکل کې لیدلای شئ.





د $\sec(t)$ تابع گراف (Graph of the secant Function)

د $\sec(t)$ او $\cos(t)$ گرافونه یو له بله سره څه اړیکه لري؟

د $f(t) = \sec(t)$ تابع گراف د $\cos t$ د تابع له گراف سره معکوسه اړیکه لري، ځکه چې

$\sec(t) = \frac{1}{\cos(t)}$ دی. که $\sec t$ د $\frac{1}{\cos t}$ په شکل په پام کې ونیسو، څه وخت چې د t زاوې

قیمت له صفر څه تر $\frac{\pi}{2}$ یا 90° پورې زیات شي، د $\cos t$ قیمت له (1) څخه صفر ته نژدې

کېږي، د $\frac{1}{\cos t}$ یا $\sec t$ قیمت له 1 څخه تر $+\infty$ زیاتېږي، که $t = 90^\circ$ شي، $\sec t$ تعریف

شوی نه دی، که t له 90° لږ څه زیاته شي د $\sec t$ قیمت $-\infty$ کېږي او په $t = \pi = 180^\circ$ کې د -1 سره مساوي کېږي. په همدې ډول که t له 180° څخه تر 270° پورې زیاته شي، نو د $\cos t$ قیمت له -1 څخه صفر ته نژدې کېږي او $\sec(t)$ له -1 څخه تر $-\infty$ پورې کمېږي.

په $t = \frac{3\pi}{2} = 270^\circ$ کې د $\sec t$ قیمت غیر معین کېږي په همدې ډول، څه وخت چې د t

قیمت له 270° څخه تر 360° زیات شي، نو $\cos(t)$ له صفر څخه تر یوه پورې قیمت اخلي


او $\sec(t)$ د $+\infty$ څخه تر (1) پورې تناقص کوي. لیدل کېږي چې:

$$\text{Domain } \sec t = \mathbb{R} - \left\{ t \mid t = (2k+1)\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$$


او $\text{Range } \sec(t) = \mathbb{R} - \{t \mid -1 \leq t \leq 1\}$ یا ټول حقیقي عددونه پرته د $[-1, 1]$ له انټروال څخه یا په بل عبارت د $f(t) = \sec(t)$ تابع د تعریف ساحه (Domain) د ټولو حقیقي عددونو

سټ دی پرته د $\frac{\pi}{2}$ د طاق مضرب څخه او د $f(t) = \sec(t)$ د تابع Range ټول حقیقي عددونه دي چې لوی یا مساوي د یو او یا کوچنی یا مساوي له -1 وي، لکه: څنگه چې لیدل کېږي د

$\sec(t)$ تابع پریود هم 2π دی او د $f(t) = \sec(t)$ تابع د $t = (2k+1)\frac{\pi}{2}$ کې عمودي
مجانگونه لري چې k یو تام عدد دی.



$$\sec t = \frac{\overline{OM}}{\overline{OB}} = \frac{\overline{OM}}{1} = \overline{OM}$$



t	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
t	0°	90°	180°	270°	360°
$F(t) = \sec t$	1	$+\infty$	-1	$+\infty$	1
		$-\infty$		$-\infty$	


فعالیت

د $f(t) = \frac{4}{3}\sec(t)$ تابع گراف رسم کړئ.

د cosecant د تابع گراف (Graph of the cosecant Function)

د $f(t) = \sin(t)$ تابع گراف د $f(t) = \csc(t)$ د تابع له گراف سره څه اړیکه لري؟

څرنګه چې $\csc t = \frac{1}{\sin t}$ دی، $\sin t$ او $\csc t$ یو د بل معکوس دي. څه وخت چې $\sin(t) = 0$ وي، $\csc t$ تعریف شوی نه دی، د $f(t) = \csc(t)$ د تابع د تعریف ناحیه ټول حقيقي عددونه دي پرته له هغو زاویو څخه چې د π تام مضرب وي، (هغه زاویې چې sine یې صفر وي) چې په دې قیمتونو کې عمودي مجانبونه هم لري او د $f(t) = \csc(t)$ د تابع Range ټول هغه حقيقي عددونه دي چې لوی یا مساوي د یو، کوچنی یا مساوي له (-1) سره وي. او ددې تابع پریود هم 2π دی.



څه وخت چې د t زاویه له 0° څخه تر 90° پورې زیاته شي، نو $\sin t$ له صفر څخه تر (1) پورې زیاتېږي (تزايد کوي) او $\csc(t)$ له $+\infty$ څخه تر (1) پورې کمېږي (تناقص کوي)، څه وخت چې $t = 90^\circ$ شي، $\csc(t) = 1$ کېږي او که د t زاویه له 90° څخه تر 180° زیاته شي، نو $\sin(t)$ له یوه څخه صفر ته راکمېږي او $\csc(t)$ له (1) څخه $+\infty$ ته زیاتېږي (تزايد کوي). کله چې $t = 180^\circ$ شي نو $\sin(t) = 0$ او د $\csc(t)$ قیمت غیر معین شي او که t زاویه 180° څخه

تر 270° پورې زیاته شي، $\sin(t)$ له صفر څخه تر (-1) پورې کمېږي او $\csc(t)$ له $-\infty$ څخه تر (-1) پورې زیاتېږي، د $t = 270^\circ$ په قیمت $\csc(t)$ له (-1) سره مساوي کېږي. په همدې ډول کله چې د t زاویه له 270° څخه تر 360° پورې زیاته شي (تزايد وکړي)، نو $\sin t$ له -1 څخه صفر ته نژدې کېږي او $\csc(t)$ له (-1) څخه تر $-\infty$ پورې کمېږي. په $t = 360^\circ$ کې د $\csc(t)$ قیمت غیر معین شي (تعریف شوی نه دی). $t = k\pi$ کې تابع عمودي مجانبونه لري.

په شکل کې د مثلثاتي دایرې د C په ټکي کې یو مماس رسموو، د $\triangle OCA$ په قایم الزاویه مثلث


$$\csc(t) = \csc \angle OAC = \frac{\overline{OA}}{\overline{OC}} = \frac{\overline{OA}}{1} = \overline{OA} \quad (\hat{t} = \angle OAC)$$

کې لرو چې:

د $\overline{OA}$ د خط يا $\csc(t)$ تحول په لاندې جدول کې لاندو:

t	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$F(t) = \csc t$	$+\infty$	1	$+\infty$	-1	$-\infty$

ليدل کېږي چې که د t زاويه له صفر څخه تر 360° يا (2π) پورې قيمتونه واخلي، نو $\csc(t) \geq 1$ او يا $\csc(t) \leq -1$ کېږي، نو لاندې شکل وگورئ.



فعالیت

د $h(t) = -3\csc t$ تابع گراف رسم کړئ.

لاندې جدول ته وگورئ:

سمبول	Domain	Range	پریود	طاقه یا جفته
$f(t) = \sec t$	ټول حقيقي عددونه پرته د $\frac{\pi}{2}$ له طاق مضرب څخه	ټول حقيقي عددونه کوچني یا مساوي په -1 لوی یا مساوي په (1)	2π	جفته

$f(t) = \csc(t)$	ټول حقيقي عددونه پرته د π له تام مضرب څخه	ټول حقيقي عددونه کوچني یا مساوي په -1 لوی یا مساوي په 1	2π	طاقه
$f(t) = \cot(t)$	ټول حقيقي عددونه پرته د π له تام مضرب څخه	ټول حقيقي عددونه	π	طاقه

له مثلثاتي تابع گانو څخه دا نتیجه په لاس راځي چې: د θ یا t د زاويې په زياتوالي سره د $\sin \theta$ او $\tan \theta$ مثلثاتي نسبتونه هم زياتیږي، خو د $\cos \theta$ او $\cot \theta$ قيمت کمېږي.

پوښتنې

1 - د $f(t) = \cot(t)$ تابع د t په کوم قيمت کې تعريف شوې نه ده او ولې؟

2 - څه وخت چې د θ زاويه له $\frac{\pi}{2}$ څخه تر π پورې تحول وکړي، د $\cot \theta$ تحول عبارت دی:

a) $1 \rightarrow -\infty$ b) $0 \rightarrow -\infty$ c) دواړه سمې نه دي

3 - که $\hat{t} = \pi$ وي، $\cot(t)$ عبارت دی له:

a) صفر b) -1 c) نه دی تعريف شوی

4 - د $\sec$ او $\csc$ تابع گانو $Range$ عبارت دی له:

a) $\mathbb{R} - \{t \mid -1 < t < 1\}$ b) ټول حقيقي عددونه c) $\mathbb{R} - \{t \mid -1 \leq t \leq 1\}$

5 - د $f(t) = \csc(t)$ تابع د تعريف ساحه ($Domain$) عبارت ده، له:

(a) ټول حقيقي عددونه پرته د π له تام مضرب څخه

(b) ټول حقيقي عددونه پرته د $\frac{\pi}{2}$ له طاق مضرب څخه

(c) ټول حقيقي عددونه پرته د 2π له تام مضرب څخه (d) درې واړه سمې نه دي

6 - د $f(t) = \csc(t)$ تابع د $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ په انټروال کې:

a) متزايدة ده b) متناقصه ده c) نه متزايدة او نه متناقصه ده

د څپرکي لنډيز

• د $\frac{R}{\pi} = \frac{g}{200} = \frac{d}{180}$ د فورمول په مرسته کولای شو، زاویه له یوه واحد څخه بل واحد ته واړوو.

• یو راډیان هغه مرکزي زاویه ده چې د مقابل قوس اوږدالی یې د شعاع له اوږدوالي سره مساوي وي.

• θ د راډیان په حساب مساوي ده په: $\theta = \frac{s}{r}$ چې s د مرکزي زاوېې مقابل قوس او r د دایرې شعاع ده.

• که د یوې زاوېې رأس د وضعیه کمیاتو په مبدأ کې او لومړنی ضلع یې د X د محور په مثبت جهت منطبق وي، زاویه په معیاري حالت کې ده.

• که په معیاري حالت کې د دوو یا څو زاویو دویمې ضلعې یو پر بل منطبقې وي، دا زاوېې کوټرمینل زاوېې نومېږي.

• مثلثاتي دایره هغه دایره ده چې د شعاع اوږدوالی یې د اوږدوالي واحد وي.

$\sin(90 - \theta) = \cos \theta$	$\sin(-\theta) = -\sin \theta$	$\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$
$\cos(90 - \theta) = \sin \theta$	$\cos(-\theta) = \cos \theta$	$\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$
$\tan(90 - \theta) = \cot \theta$	$\tan(-\theta) = -\tan \theta$	$\tan(\pi - \theta) = -\tan \theta$
$\cot(90 - \theta) = \tan \theta$	$\cot(-\theta) = -\cot \theta$	$\cot(\pi - \theta) = -\cot \theta$
$\sec(90 - \theta) = \csc \theta$	$\sec(-\theta) = \sec \theta$	$\sec(\pi - \theta) = -\sec \theta$
$\csc(90 - \theta) = \sec \theta$	$\csc(-\theta) = -\csc \theta$	$\csc(\pi - \theta) = \csc \theta$
$\sin(\frac{\pi}{2} + \theta) = \cos \theta$	$\sin(\pi + \theta) = -\sin \theta$	$\sin(2\pi - \theta) = -\sin \theta$
$\cos(\frac{\pi}{2} + \theta) = -\sin \theta$	$\cos(\pi + \theta) = -\cos \theta$	$\cos(2\pi - \theta) = \cos \theta$
$\tan(\frac{\pi}{2} + \theta) = -\cot \theta$	$\tan(\pi + \theta) = \tan \theta$	$\tan(2\pi - \theta) = -\tan \theta$
$\cot(\frac{\pi}{2} + \theta) = -\tan \theta$	$\cot(\pi + \theta) = -\cot \theta$	$\cot(2\pi - \theta) = -\cot \theta$
$\sec(\frac{\pi}{2} + \theta) = -\csc \theta$	$\sec(\pi + \theta) = -\sec \theta$	$\sec(2\pi - \theta) = \sec \theta$
$\csc(\frac{\pi}{2} + \theta) = \sec \theta$	$\csc(\pi + \theta) = -\csc \theta$	$\csc(2\pi - \theta) = -\csc \theta$

• د θ او $(\theta + 2k\pi)$ زاوې چې k یو تام عدد دی، کوټرمینل زاوې دي چې ټول مثلثاتي نسبتونه یې سره مساوي دي.

• د $\sin\theta$ او $\cos\theta$ د توابعو *domain* ټول حقيقي عددونه او *Range* یې $[-1,1]$ دی.

• د $y = \sin\theta$ تابع یوه طاقه تابع ده، ځکه چې $\sin(-\theta) = -\sin\theta$ ددې تابع گراف نظر د وضعیه

کمیاتو مبدأ ته متناظر دی او د $y = \cos\theta$ تابع جفته تابع ده، ځکه چې $\cos(-\theta) = \cos\theta$

او د $\cos$ تابع گراف نظر y محور ته متناظر دی.

• د 0° ، $\frac{\pi}{2}$ ، π ، $\frac{3\pi}{2}$ او 2π د زاویو دوه، دوه مثلثاتي نسبتونه تعریف شوې نه دي.

• د $\sin$ ، $\cos$ ، $\sec$ او $\csc$ تابع گانو د تناوب دوره 2π او د $\tan$ او $\cot$ د تابع گانو د

تناوب دوره (پریود)، π ده.

• د $\tan$ تابع هر وخت متزاید او د $\cot$ تابع هر وخت متناقضه تابع ده.

• د $\cos$ او $\sec$ تابع گانې جفتې او د $\sin$ ، $\tan$ ، $\cot$ او $\csc$ تابع گانې طاقې دي.

• که د یوې تابع گراف نظر د y محور ته متناظر وي، دا ډول تابع گانې جفتې دي یا د هر x لپاره،

$$f(-x) = f(x) \text{ د } x \in \text{dom} f \text{ رابطه صدق وکړي.}$$

• که د یوې تابع گراف نظر د وضعیه کمیاتو مبدأ ته سره متناظر وه، طاقه تابع ده چې د هر x لپاره،


$$f(-x) = -f(x) \text{ د } x \in \text{dom} f \text{ رابطه صدق وکړي.}$$

د مثلثاتي توابعو تحول په لنډ ډول په لاندې جدول کې ښودل شوی دی.

تابع θ	0°	I $\frac{\pi}{2}$	II π	III $\frac{3\pi}{2}$	IV 2π
Sin	0	1	0	-1	0
Cos	1	0	-1	0	1
Tan	0	$+\infty$	0	$+\infty$	0
Cot	$+\infty$	0	$-\infty$	0	$-\infty$
Sec	1	$+\infty$	-1	$-\infty$	1
Csc	$+\infty$	1	$+\infty$	-1	$-\infty$

د څپرګۍ پوښتنې

- 1 - $42,6033^\circ$ په درجه، دقیقه او ثانیه بدلي کړئ؟
- 2 - که د یو ساعت د ثانیې د عقربې دوران 3 دقیقې او 25 ثانیې وي، د ثانیې عقربې به څو رادیانه مثبت زاویه طی کړي وي؟
- 3 - د JKL په مثلث کې لاندې قیمتونه پیدا کړئ؟



- 4 - که د یوې دایرې شعاع 20cm او د مرکزي زاوې مقابل قوس یې $s = 85\text{cm}$ وي، مرکزي زاویه څو رادیانه ده؟
- 5 - د 1 radian او 2radian مرکزي زاویو د مقابلو قوسو اوږدوالی پیدا کړئ. په دې ډول چې د دایرې قطر 10 cm وي.
- 6 - د لاندې زاویو دویمې ضلعې (terminal side) چېرې واقع کېږي؟
- $\frac{3\pi}{2}$, -7π , $-\frac{11\pi}{2}$, -500° , 900° , $-\pi$
- 7 - لاندې زاوې چې په رادیان راکړل شوي دي، په درجه یې واړوئ.
- $\frac{\pi}{8}$, $\frac{\pi}{15}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{17\pi}{45}$
- 8 - په 54 دقیقو کې د یوه ساعت د ثانیې او د ساعت عقربه هره یوه څو رادیانه طی کوي؟
- 9 - که د یوه ټراکتور د کوچني ټایر قطر یو متر او د لوی ټایر قطر 120cm وي، څه وخت چې کوچنی ټایر د 70° درجو په اندازه وڅرخېږي لوی ټایر څو رادیانه طی کوي؟
- 10 - یو څرخ په یو ساعت کې 300ReV دورانونه کوي، دا څرخ په یوه ثانیه کې څو رادیانه ګرځي؟

- 11 - د یوه مثلث زاوې په ترتیب سره $4x$ درجې، $\frac{70x}{9}$ گراډه او $\frac{\pi x}{20}$ رادیانه دي. هره یوه

زاویه خو درجې ده؟

$$12 - \hat{A}, \hat{B}, \hat{C} \text{ او } \hat{D} \text{ د یوې څلور ضلعې زاوې دي، که } \hat{A} + \hat{D} = 240^\circ, \hat{C} + \hat{D} = 200g$$

$$\text{او } \hat{B} + \hat{D} = \frac{2\pi^R}{3} \text{ وي: د دې څلور ضلعې زاوې د درجې په حساب پیدا کړئ.}$$

$$13 - \text{د یوه دوران } \frac{1}{12} \text{ برخه مساوي ده په:}$$

$$\text{درې واړه سمې دي (d) } \frac{100}{3}g \quad \text{(c) } \frac{\pi}{6} \text{ radian} \quad \text{(b) } 30^\circ \quad \text{(a)}$$

$$14 - \text{د دوو زاویو مجموعه } 17^\circ \text{ او تفاضل یې } 17 \text{ گراډه دی، دا دواړه زاوې پیدا کړئ.}$$

$$15 - \text{د درجې په حساب د دوو زاویو مجموعه } X \text{ او تفاضل یې د گراډ په حساب هم } X \text{ دی، دا دواړه زاوې پیدا کړئ.}$$

$$16 - \text{لاندې زاوې د درجې په اعشاري شکل ولیکئ.}$$

$$47^\circ \quad 15' \quad 36'' \quad 15^\circ \quad 24' \quad 45''$$

$$17 - \text{لاندې زاوې په درجه، دقیقه او ثانیې (DMS) وپوړئ.}$$

$$23.16^\circ \quad 4.2075^\circ$$

$$18 - \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right), \tan\frac{3\pi}{4} \text{ او } \cot\frac{7\pi}{6} \text{ زاویو مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ}$$

$$19 - \text{د } [-2\pi, 2\pi] \text{ په انټروال کې د } \theta \text{ په کوم قیمت، } \sin\theta = 1 \text{ دی؟}$$

$$20 - \text{د } [-2\pi, 2\pi] \text{ په انټروال کې د } \tan\theta \text{ تابع، د } \theta \text{ په کومو قیمتونو کې عمودي مجانب لري؟}$$

$$21 - \text{له (i) څخه تر (iii) پورې کومه یوه اړیکه سمه نه ده؟}$$

$$(i) \sin(-x) = -\sin x$$

$$(ii) \cos(-x) = -\cos x$$

$$(iii) \tan(-x) = -\tan x$$

$$(a) \text{ i او ii سمې دي. (b) یوازې ii سمه ده.}$$

$$(c) \text{ i او iii سمې دي. (d) درې واړه سمې دي.}$$

$$(e) \text{ هېڅ یو.}$$

$$22 - \cos \frac{47\pi}{2}, \sin(-13\pi) \text{ او } \tan \frac{8\pi}{3} \text{ پيدا کړئ؟}$$

23 - داسې زاویه پیدا کړئ چې که د گراد په حساب یې له مقدار ه 23 واحد کم کړو، د زاوې مقدار په درجه لاس ته راشي.

24 - د دریو زاویو مجموعه 240 گراډه ده، که لومړنۍ زاویه 40 گراډه، دویمه $\frac{3\pi}{4}$ راډیانه وي، دریمه زاویه څو درجې ده؟

25 - د 4185° زاوې مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ.

26 - د (-3660°) زاوې مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ.

27 - د $y = \cos \theta$ تابع د $[\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$ په انټروال کې:

هم متزایده او هم متناقضه ده c) متناقضه ده b) متزایده ده a)
28 - د $y = \tan \theta$ تابع پریود عبارت دی، له:

a) 2π b) π c) $\frac{\pi}{2}$ d) $\frac{3\pi}{2}$

29 - د $f(t) = \cos(t)$ تابع:

نه جفته او نه طاقه ده c) طاقه ده b) جفته ده a)

30 - هغه تابع چې گراف یې نظر مبدأ ته متناظر وي.

نه جفته او نه طاقه ده c) طاقه ده b) جفته ده a)

31 - د $y = \cos \theta$ تابع د تناوب دوره عبارت ده، له:

a) π b) $\frac{3\pi}{2}$ c) 2π d) 3π

32 - $\sin 67^\circ$ له $\sin 787^\circ$ سره څه اړیکه لري؟

a) $\sin 787^\circ > \sin 67^\circ$ b) $\sin 787^\circ < \sin 67^\circ$ c) $\sin 67^\circ = \sin 787^\circ$

33 - کومه یوه له لاندې اړیکو څخه سمه ده؟

a) $\sec 135^\circ = -\csc 45^\circ$

b) $\sec 135^\circ = \csc 45^\circ$

d) $\sec 135^\circ = \sec 45^\circ$

c) $\sec 135^\circ = -\sec 45^\circ$

34 - کومه یوه له لاندې اړیکو څخه سمه ده؟

a) $\tan 240^\circ = \tan 60^\circ$

b) $\tan 240^\circ = -\tan 60^\circ$

c) $\tan 240^\circ = \cot 60^\circ$

d) $\tan 240^\circ = -\cot 60^\circ$

$\cot 0^\circ = ?$ - 35

a) 1

b) -1

c) 0

d) تعریف شوی نه دی.

$\cos 9\pi = ?$

- 36

a) 1

b) -1

c) 0

d) $\frac{1}{2}$

$\sin(-\frac{13\pi}{2}) = ?$

- 37

a) 1

b) -1

c) 0

d) درې واړه سم نه دي

38 - د 2430° له زاوېې مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ.

$\sin(270^\circ - \theta) = ?$

- 39

a) $\sin \theta$

b) $-\sin \theta$

c) $\cos \theta$

d) $-\cos \theta$

$\sin(-\frac{9\pi}{2}) = ?$

- 40

a) 1

b) -1

c) 0

d) تعریف شوی نه دی

$\sec(-\frac{9\pi}{2}) = ?$

- 41

a) 1

b) -1

c) 0

d) تعریف شوی نه دی

$\tan(-15\pi) = ?$

- 42

a) 1

b) -1

c) 0

d) تعریف شوی نه دی

$\sec(-1530^\circ) =$

- 43

a) 1 b) -1 c) 0 d) تعریف شوی نه دی

$\cot(-2430^\circ) = ?$ - 44

a) 1 b) -1 c) 0 d) تعریف شوی نه دی

$\sin(\frac{235\pi}{2}) = ?$ - 45

a) 1 b) -1 c) 0 d) تعریف شوی نه دی

$\cos(\frac{407\pi}{2}) = ?$ - 46

a) 1 b) 0 c) -1 d) ∞

$\tan(90 + \theta)$ - مساوی دی په: - 47

a) $\cot\theta$ b) $-\cot\theta$ c) $-\tan\theta$ d) $\tan\theta$

$\tan(270 + \theta) = ?$ - 48

a) $\cot\theta$ b) $-\cot\theta$ c) $\tan\theta$ d) $-\tan\theta$

$\sin(-1980^\circ) = ?$ - 49


a) 1 b) -1 c) 0 d) $\frac{1}{2}$

$\sin(-\frac{3\pi}{2}) = ?$ - 50


a) 1 b) -1 c) 0 d) $\frac{1}{2}$

51 - له لاندې اړیکو څخه کومه یوه یې سمه ده؟


a) $\sin \frac{3\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4}$ b) $\sin \frac{3\pi}{4} > \sin \frac{\pi}{4}$ c) $\sin \frac{3\pi}{4} < \sin \frac{\pi}{4}$



پنجم خیر کی د مثلثاتو تطبیقات



د مرکبو زاویو د مثلثاتي نسبتونو قوانین
د جمعې او تفاضل فورمولونه
د دوو زاویو د مجموعې مثلثاتي نسبتونه:



آیا د

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta$$

رابطې سموالی ښودلای شی؟

1- د $\sin(\alpha + \beta)$ محاسبه کول: د $\widehat{XOZ}$ زاویه له α او د $\widehat{ZOT}$ زاویه له β سره مساوي جلا کوو او داسې پې يو د بل څنګ ته ږدو چې دوه مجاورې زاوې جوړې کړي بیا د OT د قطعې خط پر مخ د OB قطعې خط د واحد په اندازه جلا کوو. د B له ټکي څخه د BA خط پر OZ عمود رسموو، بیا د A له ټکي څخه د AH خط پر OX عمود رسموو، شکل ته په پام سره لرو چې:

$$\sin\beta = \frac{\overline{AB}}{\overline{OB}} = \frac{\overline{AB}}{1} = \overline{AB}$$

$$\cos\beta = \frac{\overline{OA}}{\overline{OB}} = \frac{\overline{OA}}{1} = \overline{OA}$$

$$\sin\alpha = \frac{\overline{HA}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{HA}}{\cos\beta} \Rightarrow \overline{HA} = \sin\alpha \cos\beta$$

$$\cos\alpha = \frac{\overline{OH}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{OH}}{\cos\beta} \Rightarrow \overline{OH} = \cos\alpha \cos\beta$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \frac{\overline{KB}}{\overline{OB}} = \frac{\overline{KB}}{1} = \overline{KB}$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \frac{\overline{OK}}{\overline{OB}} = \frac{\overline{OK}}{1} = \overline{OK}$$

د A له ټکي څخه پر KB باندې د AM عمود رسموو چې د KHAM څلور ضلعي مستطیل دی، په نتیجه کې $MA=KH$ او $KM=HA$ دی.

د $\hat{MBA}$ زاویه د α له زاوې سره مساوي ده (ددې دواړو زاویو ضلعي یو پر بل باندې عمود دي). د BMA په قایم الزاویه مثلث کې لرو چې:

$$\cos(\hat{MBA}) = \cos \alpha = \frac{\overline{MB}}{\overline{AB}} = \frac{MB}{\sin \beta} \Rightarrow \overline{MB} = \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\hat{MBA}) = \sin \alpha = \frac{\overline{MA}}{\overline{AB}} = \frac{MA}{\sin \beta} = \frac{\overline{KH}}{\sin \beta} \Rightarrow \overline{KH} = \sin \alpha \sin \beta$$

که د $\overline{KB} = \overline{KM} + \overline{MB}$ په رابطه کې د KB، KM او $\overline{MB}$ پر ځای یې قیمتونه وضع کړو، لرو چې: $(KM = AH = \sin \alpha \cos \beta)$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

د 2: $\cos(\alpha + \beta)$ محاسبه کول: په همدې ډول که د $\overline{OK} = \overline{OH} - \overline{KH}$ په رابطه کې د KH، OK او OH پر ځای یې قیمتونه وضع کړو، نو لرو چې:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

د 3: $\tan(\alpha + \beta)$ محاسبه کول:

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}$$

صورت او مخرغ په $\cos \alpha \cos \beta$ وېشو:

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\frac{\sin \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} + \frac{\cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}}{\frac{\cos \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} - \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}} = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

لومړی مثال: $\sin 120^\circ$ ، $\cos 120^\circ$ او $\tan \frac{5\pi}{12}$ پیدا کړئ. **حل**

$$\begin{aligned}\sin \frac{7\pi}{12} &= \sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}\end{aligned}$$

$$\sin 120^\circ = \sin(90^\circ + 30^\circ) = \sin 90^\circ \cos 30^\circ + \cos 90^\circ \sin 30^\circ$$

$$\sin 120^\circ = 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 0 \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 120^\circ = \cos(90^\circ + 30^\circ) = \cos 90^\circ \cos 30^\circ - \sin 90^\circ \sin 30^\circ$$

$$= 0 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 \cdot \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}\tan \frac{5\pi}{12} &= \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\tan \frac{\pi}{4} + \tan \frac{\pi}{6}}{1 - \tan \frac{\pi}{4} \cdot \tan \frac{\pi}{6}} = \frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 - 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 - \frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{\frac{3 + \sqrt{3}}{3}}{\frac{3 - \sqrt{3}}{3}} \\ &= \frac{3 + \sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}}\end{aligned}$$

د دوو زاويو د تفاضل مثلثاتي نسبتونه:

$$\sin 120^\circ = \sin(180^\circ - 60^\circ) = ?$$

که د جمعې په فورمولونو کې د β پر ځای $-\beta$ وضع کړو، نو لرو چې:

$$\sin[\alpha + (-\beta)] = \sin \alpha \cos(-\beta) + \cos \alpha \sin(-\beta)$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha (-\sin \beta)$$

پوهېږو چې:

$$\cos(-\beta) = \cos \beta$$

$$\sin(-\beta) = -\sin \beta$$

$$\tan(-\beta) = -\tan \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos[\alpha + (-\beta)] = \cos \alpha \cos(-\beta) - \sin \alpha \sin(-\beta)$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan[(\alpha + (-\beta))] = \frac{\tan \alpha + \tan(-\beta)}{1 - \tan \alpha \cdot \tan(-\beta)}$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \cdot \tan \beta}$$

فعالیت

پہ ہمدی ڈول وشیاست چپی: $\cot(\alpha - \beta) = \frac{\cot \alpha \cdot \cot \beta + 1}{\cot \beta - \cot \alpha}$ دی.

لومری مثال: $\cos \frac{\pi}{12}$ او $\sin 150^\circ$ پیدا کریں.

حل:

$$\begin{aligned} \cos \frac{\pi}{12} &= \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right) = \cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{6} + \sin \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{6} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin 150^\circ &= \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 180^\circ \cos 30^\circ - \cos 180^\circ \sin 30^\circ \\ &= 0 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - (-1) \cdot \frac{1}{2} = -(-\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

دویم مثال: د تفاضل د فورمولونو پہ مرسته بنکاره کریں چپی $\cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = \sin \theta$ دی.

حل:

$$\cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = \cos \frac{\pi}{2} \cos \theta + \sin \frac{\pi}{2} \sin \theta = 0 \cdot \cos \theta + 1 \cdot \sin \theta = \sin \theta$$

دریم مثال: وشیاست چپی $\cos(270^\circ - \theta) = -\sin \theta$ دی.

حل:

$$\cos(270^\circ - \theta) = \cos 270^\circ \cos \theta + \sin 270^\circ \sin \theta$$

$$\cos(270^\circ - \theta) = 0 \cdot \cos \theta + (-1) \sin \theta = -\sin \theta$$

خلورم مثال: $\tan 120^\circ$ پیدا کریں:
حل:

$$\begin{aligned}\tan 120^\circ &= \tan(180^\circ - 60^\circ) = \frac{\tan 180^\circ - \tan 60^\circ}{1 + \tan 180^\circ \cdot \tan 60^\circ} = \frac{0 - \sqrt{3}}{1 + 0 \cdot \sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{1} \\ &= -\sqrt{3}\end{aligned}$$

فعالیت

وہابیاست چپی: $\sin 211^\circ \cos 59^\circ + \cos 211^\circ \sin 59^\circ = -1$ او
 $\cos 211^\circ \cos 149^\circ - \sin 211^\circ \sin 149^\circ = 1$ دی.

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \\ \sin(\alpha - \beta) &= \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta\end{aligned}$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\begin{aligned}\cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \\ \cos(\alpha - \beta) &= \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta\end{aligned}$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

پوښتنې

1- وښیاست چې:

$$\tan(45 - \theta) = \frac{1 - \tan \theta}{1 + \tan \theta}$$

2- وښیاست چې:

$$\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta) = 2 \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos 277^\circ \cos 97^\circ + \sin 277^\circ \sin 97^\circ = ? \quad -3$$

$$\text{a) } -1 \quad \text{b) } 1 \quad \text{c) } 0 \quad \text{d) } \frac{1}{2}$$

4- د جمعې د فورمولونو په مرسته $\sin 240^\circ$ ، $\cos 240^\circ$ او $\tan 240^\circ$ پیدا کړئ.

5- د جمعې او تفاضل د فورمولونو په مرسته وښیاست چې:

$$\frac{1}{2} [\cos(x + y) + \cos(x - y)] = \cos x \cdot \cos y \quad \text{دی.}$$

6- د جمعې د فورمولونو په مرسته د 210° زاوېې مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ.

$$105^\circ = (60^\circ + 45^\circ) \quad \text{پیدا کړئ } \tan 105^\circ \text{ او } \cos 105^\circ, \sin 105^\circ \quad -7$$

$$-8 \quad \text{که } \sin x = -\frac{3}{4} \text{ وی او } \frac{3\pi}{2} < x < 2\pi \text{ وی، } \cos\left(\frac{\pi}{4} + x\right) \text{ پیدا کړئ.}$$

9- وښیاست چې: $\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta) = -2 \sin \alpha \sin \beta$ دی.

$$\sin 2^\circ \cos 88^\circ + \cos 2^\circ \sin 88^\circ = ? \quad -10$$

$$\text{a) } -1 \quad \text{b) } 1 \quad \text{c) } 0 \quad \text{d) } \frac{1}{2}$$

د 2α مثلثاتی نسبتونه د α له
جنسه:

$$\sin \frac{x}{3} \cos \frac{x}{3} + \cos \frac{x}{3} \sin \frac{x}{3} = ?$$

$$\cos^2 x - \sin^2 x = ?$$

آيا ښودلای شئ چې:

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

دی؟

$$\sin 2\alpha = \sin(\alpha + \alpha) = \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos(\alpha + \alpha) = \cos \alpha \cos \alpha - \sin \alpha \sin \alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

څرنگه چې $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$ دی:

$$\cos 2\alpha = 1 - \sin^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

او همدارنگه $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$ دی، نو:

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - (1 - \cos^2 \alpha) = \cos^2 \alpha - 1 + \cos^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$\tan 2\alpha = \tan(\alpha + \alpha) = \frac{\tan \alpha + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \alpha} = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

لومړی مثال: که $\sin \theta = \frac{4}{5}$ او د θ دویمه ضلع په دویمه ناحیه (ربع) کې واقع وي $\sin 2\theta$ ،

$\cos 2\theta$ او $\tan 2\theta$ پیدا کړئ.

حل: $\cos \theta = -\sqrt{1 - \sin^2 \theta}$ (د θ دویمه ضلع په دویمه ربع کې ده).

$$\cos \theta = -\sqrt{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2} = -\sqrt{1 - \frac{16}{25}} = -\sqrt{\frac{25-16}{25}} = -\sqrt{\frac{9}{25}} = -\frac{3}{5}$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta = 2\left(\frac{4}{5}\right)\left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{24}{25}$$

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \left(-\frac{3}{5}\right)^2 - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} - \frac{16}{25} = -\frac{7}{25}$$

$$\tan 2\theta = \frac{\sin 2\theta}{\cos 2\theta} = \frac{-\frac{24}{25}}{-\frac{7}{25}} = \frac{24}{7}$$

فعالیت

که $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ ، وي او د α دویمه ضلع په لومړي ربع کې پرته وي، $\tan 2\alpha$ پیدا کړئ.

او که $\sin \beta = \frac{12}{13}$ او د β دویمه ضلع په دویمه ربع کې وي $\sin 2\beta$ پیدا کړئ.

دویم مثال: د 60° زاوې د مثلثاتي نسبتونو له جنسه د 120° زاوې مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ.

حل

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\sin 120^\circ = 2 \sin 60^\circ \cos 60^\circ = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\cos 120^\circ = \cos^2 60^\circ - \sin^2 60^\circ = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} - \frac{3}{4} = -\frac{1}{2}$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} \Rightarrow \tan 120^\circ = \frac{2 \tan 60^\circ}{1 - \tan^2 60^\circ} = \frac{2 \cdot \sqrt{3}}{1 - 3} = -\sqrt{3}$$

په همدې ډول:

$$\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$$

$$\cos \theta = \cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2} = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} - 1 = 1 - 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}, \quad \tan \theta = \frac{2 \tan \frac{\theta}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}}$$

دریم مثال: که $90^\circ < \theta < 180^\circ$ او $\cos \theta = -\frac{3}{4}$ وي، د $\cos 2\theta$ قیمت پیدا کړئ.

حل:

$$x^2 + y^2 = r^2$$


$$(-3)^2 + y^2 = 4^2$$

$$y = \pm \sqrt{4^2 - (-3)^2}$$

$y = \sqrt{7}$ (ځکه چې د y قیمت په دویمه ربع کې مثبت دی.) $P(-3, y)$

$$\sin \theta = \frac{y}{r} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \left(-\frac{3}{4}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{7}}{4}\right)^2 = \frac{1}{8}$$



فعالیت

که $90^\circ < \theta < 180^\circ$ او $\cos \theta = -\frac{1}{3}$ وي، د $\sin \frac{\theta}{2}$ قیمت پیدا کړئ.

همدارنگه کولای شو چې د $\sin \theta$ ، $\cos \theta$ او $\tan \theta$ قیمتونه د $\tan \frac{\theta}{2}$ له جنسه پیدا کړو:

$$\sin \theta = \frac{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{1} = \frac{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{\sin^2 \frac{\theta}{2} + \cos^2 \frac{\theta}{2}}$$

پوهېږو چې:

$$\sin^2 \frac{\theta}{2} + \cos^2 \frac{\theta}{2} = 1$$

(صورت او مخرج پر $\cos^2 \frac{\theta}{2}$ وېشو:)

$$\sin \theta = \frac{\frac{2 \sin \frac{\theta}{2} \cdot \cos \frac{\theta}{2}}{\cos^2 \frac{\theta}{2}}}{\frac{\sin^2 \frac{\theta}{2} + \cos^2 \frac{\theta}{2}}{\cos^2 \frac{\theta}{2}}} = \frac{\frac{2 \sin \frac{\theta}{2}}{\cos \frac{\theta}{2}}}{\frac{\sin^2 \frac{\theta}{2}}{\cos^2 \frac{\theta}{2}} + 1} = \frac{2 \tan \frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}}$$

$$\cos \theta = \cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{\cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2}}{1} = \frac{\cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2}}{\sin^2 \frac{\theta}{2} + \cos^2 \frac{\theta}{2}}$$

$$\cos \theta = \frac{\frac{\cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2}}{\cos^2 \frac{\theta}{2}}}{\frac{\sin^2 \frac{\theta}{2}}{\cos^2 \frac{\theta}{2}} + \frac{\cos^2 \frac{\theta}{2}}{\cos^2 \frac{\theta}{2}}}$$

$$\cos \theta = \frac{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}}, \quad \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\frac{2 \tan \frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}}}{\frac{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}}} = \frac{2 \tan \frac{\theta}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}}$$

همدارنگه کولای شو چې د θ زاوېې مثلثاتي نسبتونه د 2θ زاوېې د مثلثاتي نسبتونو له جنسه په لاس راوړو:

$$2 \cos^2 \theta - 1 = \cos 2\theta$$

$$2 \cos^2 \theta = 1 + \cos 2\theta$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$$

$$\cos \theta = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos 2\theta}{2}}$$

یا

$$\cos \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}}$$

په همدې ډول:

$$1 - 2 \sin^2 \theta = \cos 2\theta$$

$$-2 \sin^2 \theta = -1 + \cos 2\theta$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$$

$$\sin \theta = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos 2\theta}{2}} \quad \text{يا} \quad \sin \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}}$$

په نتيجه کې:

$$\tan \theta = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos 2\theta}{1 + \cos 2\theta}} \quad \text{يا} \quad \tan \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}}$$

لومړۍ مثال: د 30° زاوېې مثلثاتي نسبتونه د 60° له جنسه په لاس راوړئ.

حل:

$$\sin 30^\circ = \sqrt{\frac{1 - \cos 60^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{1}{2}}{2}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{2}}{2}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

$$\cos 30^\circ = \sqrt{\frac{1 + \cos 60^\circ}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{1}{2}}{2}} = \sqrt{\frac{\frac{3}{2}}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan 30^\circ = \sqrt{\frac{1 - \cos 60^\circ}{1 + \cos 60^\circ}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

دویم مثال: که $180^\circ < \theta < 270^\circ$ او $\sin \theta = -\frac{2}{3}$ وي د $\cos \frac{\theta}{2}$ قیمت پیدا کړئ.

حل:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$x^2 + (-2)^2 = 3^2 \quad x = \pm \sqrt{3^2 - (-2)^2} = -\sqrt{5}$$

$$\cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{-\sqrt{5}}{3} \quad (\text{ځکه چې د } x \text{ قیمت په دویمه ربع کې منفي دی})$$

څرنگه چې $180^\circ < \theta < 270^\circ$ ده، نو $\frac{180^\circ}{2} < \frac{\theta}{2} < \frac{270^\circ}{2}$ يا $90^\circ < \theta < 135^\circ$ ده په دې معنا چې د $\cos \frac{\theta}{2}$ علامه منفي ده.

$$\cos \frac{\theta}{2} = -\sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}}$$

$$\cos \frac{\theta}{2} = -\sqrt{\frac{1 + (\frac{\sqrt{5}}{3})}{2}} = -\sqrt{\frac{1}{2}(1 + \frac{\sqrt{5}}{3})} = -\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{6}}$$

فعالیت

وښایست چې: $\cos \theta = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} - 1$ او $\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$ دی.

درېم مثال: که $\cos \theta = \frac{4}{5}$ وي او د θ دویمه ضلع په لومړني ربع کې وي $\sin \frac{\theta}{2}$ ، $\cos \frac{\theta}{2}$ او $\tan \frac{\theta}{2}$ قیمتونه پیدا کړئ.

حل:

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - (\frac{4}{5})^2} = \sqrt{1 - \frac{16}{25}} = \frac{3}{5}$$

$$\sin \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{4}{5}}{2}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{5}}{2}} = \sqrt{\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

$$\cos \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{4}{5}}{2}} = \sqrt{\frac{\frac{9}{5}}{2}} = \sqrt{\frac{9}{5} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{3}{\sqrt{10}}$$

$$\tan \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{4}{5}}{1 + \frac{4}{5}}} = \sqrt{\frac{1}{9}} = \frac{1}{3}$$

خلورم مثال: ونبیاست چې $\frac{\sin 3\theta}{\sin \theta} - \frac{\cos 3\theta}{\cos \theta} = 2$ دی.
حل:

$$\begin{aligned}\frac{\sin 3\theta}{\sin \theta} - \frac{\cos 3\theta}{\cos \theta} &= \frac{\sin 3\theta \cos \theta - \cos 3\theta \sin \theta}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{\sin(3\theta - \theta)}{\sin \theta \cos \theta} \\ &= \frac{\sin 2\theta}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{\sin \theta \cos \theta} = 2\end{aligned}$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta \quad , \quad \sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$$

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = 1 - 2 \sin^2 \theta$$

$$\cos \theta = \cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2} = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} - 1 = 1 - 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} \qquad \tan \theta = \frac{2 \tan \frac{\theta}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}}$$

$$\sin \theta = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos 2\theta}{2}} \qquad \cos \theta = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos 2\theta}{2}}$$

$$\tan \theta = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos 2\theta}{1 + \cos 2\theta}}$$

پوښتنې

1- د 120° زاوې د مثلثاتي نسبتونو له مخې د 240° زاوې مثلثاتي نسبتونه پيدا کړئ.

2 - که $\sin \theta = \frac{3}{5}$ وي او د θ دويمه ضلع په لومړنۍ ربع کې وي، $\sin 2\theta$ ، $\cos 2\theta$ او $\tan 2\theta$ پيدا کړئ.

3 - که $\sin \theta = \frac{4}{5}$ وي او د θ دويمه ضلع په دويمه ربع کې وي $\cos \theta/2$ پيدا کړئ.

4 - $\sin \frac{\pi}{12}$ د $\sin \frac{\pi}{6}$ له جنسه پيدا کړئ.

5 - که $\sin \theta = \frac{12}{13}$ وي او د θ دويمه ضلع په دويمه ربع کې وي، $\sin \theta/2$ او $\tan \theta/2$ پيدا کړئ.

6 - د 15° زاوې مثلثاتي نسبتونه د 30° زاوې له جنسه پيدا کړئ.

7 - که $\sin \beta = \frac{12}{13}$ وي او د β دويمه ضلع په دويمه ربع کې وي، د $\sin 2\beta$ قيمت مساوی دی په:

a) $\frac{120}{169}$ b) $-\frac{120}{169}$ c) $-\frac{169}{120}$ d) درې واړه سم نه دي

8 - $\frac{\cos 3\beta}{\cos \beta} - \frac{\sin 3\beta}{\sin \beta} = ?$

a) 2 b) 1 c) -2 d) -1

د 3α زاويي مثلثاتي نسبتونه د α زاويي د مثلثاتي نسبتونو له جنسه:

$$4 \cos^3 45^\circ - 3 \cos 45^\circ = ?$$

آيا بنودلای شئ چې دا رابطه

$$\cos 90^\circ = 4 \cos^3 30^\circ - 3 \cos 30^\circ$$

سمه ده؟

څرنگه چې:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin 3\alpha = \sin(2\alpha + \alpha) = \sin 2\alpha \cos \alpha + \cos 2\alpha \sin \alpha$$

$$\sin 3\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha \cdot \cos \alpha + (1 - 2 \sin^2 \alpha) \sin \alpha$$

$$= 2 \sin \alpha \cos^2 \alpha + \sin \alpha - 2 \sin^3 \alpha \quad (\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha)$$

$$= 2 \sin \alpha (1 - \sin^2 \alpha) + \sin \alpha - 2 \sin^3 \alpha \quad (\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha)$$

$$= 2 \sin \alpha - 2 \sin^3 \alpha + \sin \alpha - 2 \sin^3 \alpha$$

$$\boxed{\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha}$$

لومړي مثال: $\sin 180^\circ$ د $\sin 60^\circ$ له جنسه په لاس راوړئ.
حل:

$$\begin{aligned} \sin 180^\circ &= 3 \sin 60^\circ - 4 \sin^3 60^\circ = 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - 4 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^3 = \frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{12\sqrt{3}}{8} \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2} = \frac{0}{2} = 0 \end{aligned}$$

څرنگه چې:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos 3\alpha = \cos(2\alpha + \alpha) = \cos 2\alpha \cos \alpha - \sin 2\alpha \sin \alpha$$

$$= (2 \cos^2 \alpha - 1) \cos \alpha - 2 \sin \alpha \cos \alpha \sin \alpha$$

$$\begin{aligned}
&= 2\cos^3 \alpha - \cos \alpha - 2\sin^2 \alpha \cos \alpha \\
&= 2\cos^3 \alpha - \cos \alpha - 2\cos \alpha (1 - \cos^2 \alpha) \quad (\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha) \\
&= 2\cos^3 \alpha - \cos \alpha - 2\cos \alpha + 2\cos^3 \alpha
\end{aligned}$$

$$\cos 3\alpha = 4\cos^3 \alpha - 3\cos \alpha$$

فعالیت

$\cos 270^\circ$ د $\cos 90^\circ$ له جنسہ پیدا کریں۔

دویم مثال: $\cos 180^\circ$ د $\cos 60^\circ$ له جنسہ پیدا کریں۔

حل:

$$\cos 180^\circ = 4\cos^3 60^\circ - 3\cos 60^\circ = 4\left(\frac{1}{2}\right)^3 - 3 \cdot \frac{1}{2} = 4 \cdot \frac{1}{8} - \frac{3}{2} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -1$$

د $\tan 3\alpha$ پیدا کول:

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\tan 3\alpha = \tan(2\alpha + \alpha) = \frac{\tan 2\alpha + \tan \alpha}{1 - \tan 2\alpha \cdot \tan \alpha} = \frac{\frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} + \tan \alpha}{1 - \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} \cdot \tan \alpha}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\frac{2 \tan \alpha + \tan \alpha - \tan^3 \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{2 \tan \alpha + \tan \alpha - \tan^3 \alpha}{1 - \tan^2 \alpha - 2 \tan^2 \alpha} = \frac{3 \tan \alpha - \tan^3 \alpha}{1 - 3 \tan^2 \alpha}
\end{aligned}$$

دریم مثال: $\tan 135^\circ$ د $\tan 45^\circ$ له جنسہ پہ لاس راوړئ۔

حل:

$$\tan 135^\circ = \frac{3 \tan 45^\circ - \tan^3 45^\circ}{1 - 3 \tan^2 45^\circ} = \frac{3 \cdot 1 - 1}{1 - 3 \cdot 1} = \frac{2}{-2} = -1$$

خلورم مثال: وڻياسٽ چڻي $4 \sin \theta \sin(60^\circ - \theta) \sin(60^\circ + \theta) = \sin 3\theta$
حل:

$$\begin{aligned} & 4 \sin \theta (\sin 60^\circ \cos \theta - \cos 60^\circ \sin \theta) (\sin 60^\circ \cos \theta + \cos 60^\circ \sin \theta) \\ &= 4 \sin \theta \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta - \frac{1}{2} \sin \theta \right) \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta + \frac{1}{2} \sin \theta \right) \\ &= 4 \sin \theta \left(\frac{3}{4} \cos^2 \theta - \frac{1}{4} \sin^2 \theta \right) = \sin \theta (3 \cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \\ & \sin \theta [3(1 - \sin^2 \theta) - \sin^2 \theta] = \sin \theta \cdot 3 - 3 \sin^3 \theta - \sin^3 \theta \\ &= 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta = \sin 3\theta \end{aligned}$$

د) مثلثاتي نسبتونه: $(\alpha + \beta + \square)$

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + \beta + \square) &= \sin[\alpha + (\beta + \square)] = \sin \alpha \cos(\beta + \square) + \cos \alpha \sin(\beta + \square) \\ &= \sin \alpha (\cos \beta \cos \square - \sin \beta \sin \square) + \cos \alpha (\sin \beta \cos \square + \cos \beta \sin \square) \\ &= \sin \alpha \cos \beta \cos \square - \sin \alpha \sin \beta \sin \square + \sin \beta \cos \alpha \cos \square + \sin \square \cos \alpha \cos \beta \\ \cos[\alpha + (\beta + \square)] &= \cos \alpha \cos(\beta + \square) - \sin \alpha \sin(\beta + \square) \\ &= \cos \alpha (\cos \beta \cos \square - \sin \beta \sin \square) - \sin \alpha (\sin \beta \cos \square + \cos \beta \sin \square) \\ &= \cos \alpha \cos \beta \cos \square - \cos \alpha \sin \beta \sin \square - \cos \square \sin \alpha \sin \beta - \cos \beta \sin \alpha \sin \square \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tan(\alpha + \beta + \square) &= \tan[\alpha + (\beta + \square)] = \frac{\tan \alpha + \tan(\beta + \square)}{1 - \tan \alpha \cdot \tan(\beta + \square)} \\ \tan(\alpha + \beta + \square) &= \frac{\tan \alpha + \frac{\tan \beta + \tan \square}{1 - \tan \beta \tan \square}}{1 - \tan \alpha \frac{\tan \beta + \tan \square}{1 - \tan \beta \tan \square}} \\ &= \frac{\tan \alpha - \tan \alpha \tan \beta \tan \square + \tan \beta + \tan \square}{1 - \tan \beta \tan \square} \\ &= \frac{1 - \tan \beta \tan \square - \tan \alpha \tan \beta - \tan \alpha \cdot \tan \square}{1 - \tan \beta \tan \square} \end{aligned}$$

$$\frac{\tan \alpha + \tan \beta + \tan \gamma + \tan \alpha \cdot \tan \beta \cdot \tan \gamma}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta - \tan \beta \tan \gamma - \tan \alpha \tan \gamma}$$

پنجم مثال: $\sin 135^\circ$ د $\sin(30^\circ + 45^\circ + 60^\circ)$ له جنسه په لاس راوړئ.
حل

$$\sin 135^\circ = \sin(30^\circ + 45^\circ + 60^\circ) = \sin 30^\circ \cos 45^\circ \cos 60^\circ$$

$$- \sin 30^\circ \sin 45^\circ \sin 60^\circ + \sin 45^\circ \cos 30^\circ \cos 60^\circ + \sin 60^\circ \cos 30^\circ \cos 45^\circ$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{8} - \frac{\sqrt{6}}{8} + \frac{\sqrt{6}}{8} + \frac{3\sqrt{2}}{8} = \frac{\sqrt{2}}{8} + \frac{3\sqrt{2}}{8} = \frac{4\sqrt{2}}{8} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

پوښتنې

1- $\sin 90^\circ$ ، $\cos 90^\circ$ او $\tan 90^\circ$ په ترتيب سره د $\sin 30^\circ$ ، $\cos 30^\circ$ او $\tan 30^\circ$ له جنسه پيدا کړئ.

2- $\cos 135^\circ$ او $\tan 135^\circ$ پيدا کړئ. $135^\circ = (30^\circ + 45^\circ + 60^\circ)$

3- $8\cos^3\theta - 6\cos\theta = ?$

a) $\cos 3\theta$

b) $2\cos 3\theta$

c) $-2\cos 3\theta$

4- $\cos(\hat{A} - \hat{B} + \hat{C})$ د $\hat{A}$ ، $\hat{B}$ او $\hat{C}$ زاويو د مثلثاتي نسبتونو له جنسه پيدا کړئ.

5- وښايست چې:

$$4\cos x \cos(60^\circ - x) \cos(60^\circ + x) = \cos 3x$$

$$\tan x \tan(60^\circ - x) \tan(60^\circ + x) = \tan 3x$$

د زاویو د مثلثاتي نسبتونو د مجموعي
او تفاضل بدلول د ضرب د حاصل په
شکل

$$\sin 30^\circ + \sin 60^\circ = ?$$

$$\tan 45^\circ + \tan 60^\circ = ?$$

آیا د $\sin 30^\circ + \sin 60^\circ$ قیمت پیدا کولای
شئ؟

څرنگه چې پوهېږو:

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B \dots (I)$$

$$\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B \dots (II)$$

که $A + B = P$ او $A - B = q$ فرض کړو او (I) او (II) رابطې سره جمع کړو، نو لرو چې:

$$\sin(A + B) + \sin(A - B) = 2 \sin A \cos B$$

$$A + B = p$$

$$A - B = -q$$

$$2B = P - q$$

$$B = \frac{P - q}{2}$$

$$A + B = p$$

$$A - B = q$$

$$2A = P + q$$

$$A = \frac{P + q}{2}$$

$$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$$

په نتیجه کې لرو چې:

که له I رابطې څخه II رابطه تفریق کړو، نو لرو چې:

$$\sin(A + B) - \sin(A - B) = 2 \cos A \sin B$$

$$\sin p - \sin q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$$

په همدې ډول:

$$\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B \dots \text{III}$$

$$\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B \dots \text{IV}$$

که III رابطه د IV سره جمع کړو، لرو چې:

$$\cos(A + B) + \cos(A - B) = 2 \cos A \cos B$$

$$\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$$

که له III رابطې څخه IV رابطه تفریق کړو، نو:

$$\cos(A + B) - \cos(A - B) = -2 \sin A \sin B$$

$$\cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$$

فعالیت

د $\sin 60^\circ + \sin 30^\circ$ او $\cos 60^\circ + \cos 30^\circ$ قیمتونه پیدا کړئ.

$$\tan p + \tan q = \frac{\sin p}{\cos p} + \frac{\sin q}{\cos q} = \frac{\sin p \cos q + \cos p \sin q}{\cos p \cos q} = \frac{\sin(p+q)}{\cos p \cos q}$$

$$\tan p - \tan q = \frac{\sin p}{\cos p} - \frac{\sin q}{\cos q} = \frac{\sin p \cos q - \cos p \sin q}{\cos p \cos q} = \frac{\sin(p-q)}{\cos p \cos q}$$

$$\frac{\sin 7\theta + \sin 3\theta}{\cos 7\theta + \cos 3\theta} = \tan 5\theta \quad \text{لومړۍ مثال (a): وښایست چې:}$$

$$\frac{\sin 7\theta + \sin 3\theta}{\cos 7\theta + \cos 3\theta} = \frac{2 \sin \frac{7\theta+3\theta}{2} \cos \frac{7\theta-3\theta}{2}}{2 \cos \frac{7\theta+3\theta}{2} \cos \frac{7\theta-3\theta}{2}} = \frac{\sin 5\theta \cos 2\theta}{\cos 5\theta \cos 2\theta} = \tan 5\theta$$

b: وښايست چې $\sin 3x + \sin x = 2 \cdot \sin 2x \cdot \cos x$ دی:

$$\sin 3x + \sin x = 2 \sin \frac{3x+x}{2} \cos \frac{3x-x}{2} = 2 \cdot \sin 2x \cdot \cos x$$

حل:

فعالیت

وښايست چې $\cot p - \cot q = \frac{\sin(q-p)}{\sin p \sin q}$ او $\cot p + \cot q = \frac{\sin(p+q)}{\sin p \sin q}$

دویم مثال: وښايست چې: $\frac{\cos 2\theta - \cos 2\beta}{\sin 2\theta + \sin 2\beta} = \tan(\beta - \theta)$

$$\cos 4\theta - \cos 2\theta = -2 \sin 3\theta \sin \theta$$

حل:

$$\begin{aligned} \frac{\cos 2\theta - \cos 2\beta}{\sin 2\theta + \sin 2\beta} &= \frac{-2 \sin \frac{2\theta+2\beta}{2} \sin \frac{2\theta-2\beta}{2}}{2 \sin \frac{2\theta+2\beta}{2} \cos \frac{2\theta-2\beta}{2}} = \frac{-2 \sin(\theta+\beta) \sin(\theta-\beta)}{2 \sin(\theta+\beta) \cos(\theta-\beta)} \\ &= -\frac{\sin(\theta-\beta)}{\cos(\theta-\beta)} = -\tan(\theta-\beta) = \tan(\beta-\theta) \end{aligned}$$

$$\cos 4\theta - \cos 2\theta = -2 \sin \frac{4\theta+2\theta}{2} \sin \frac{4\theta-2\theta}{2} = -2 \sin 3\theta \sin \theta$$

د زاویو د مثلثاتي نسبتونو د ضرب د حاصل بدلول په جمع او یا تفاضل باندې:

$$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$$

$$\begin{aligned} A+B &= P \\ A-B &= q \end{aligned}$$

څرنگه چې:

$$\sin(A+B) + \sin(A-B) = 2 \sin A \cos B$$

یا

$$2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$$

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2} [\sin(A+B) + \sin(A-B)]$$

څرنگه چې: $\sin(A+B) - \sin(A-B) = 2 \cos A \sin B$ دی.

$$2 \cos A \sin B = \sin(A + B) - \sin(A - B)$$

نو:

$$\cos A \sin B = \frac{1}{2} [\sin(A + B) - \sin(A - B)]$$

$$\cos(A + B) + \cos(A - B) = 2 \cos A \cos B$$

خرنگه چې:

$$2 \cos A \cos B = \cos(A + B) + \cos(A - B)$$

نو:

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A + B) + \cos(A - B)]$$

$$\cos(A + B) - \cos(A - B) = -2 \sin A \sin B$$

خرنگه چې:

$$-2 \sin A \sin B = \cos(A + B) - \cos(A - B)$$

نو:

$$\begin{aligned} \sin A \sin B &= -\frac{1}{2} [\cos(A + B) - \cos(A - B)] \\ &= \frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)] \end{aligned}$$

لومړۍ مثال: وښايست چې:

$$a: \quad \frac{\sin 8x + \sin 5x + \sin 2x}{\cos 8x + \cos 5x + \cos 2x} = \tan 5x$$

$$b: \quad \cos 75^\circ - \cos 15^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

د a حل:

$$\begin{aligned} &= \frac{2 \sin \frac{8x+2x}{2} \cos \frac{8x-2x}{2} + \sin 5x}{2 \cos \frac{8x+2x}{2} \cos \frac{8x-2x}{2} + \cos 5x} \\ &= \frac{2 \sin 5x \cos 3x + \sin 5x}{2 \cos 5x \cos 3x + \cos 5x} = \frac{\sin 5x (2 \cos 3x + 1)}{\cos 5x (2 \cos 3x + 1)} = \tan 5x \end{aligned}$$

د ب حل:

$$\begin{aligned}\cos 75^\circ - \cos 15^\circ &= -2 \cdot \sin \frac{75^\circ + 15^\circ}{2} \sin \frac{75^\circ - 15^\circ}{2} = -2 \sin 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= -2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

دویم مثال: د جمعې یا تفاضل شکل ته یې واروئ.

$$2 \cos 95^\circ \sin 13^\circ = \sin(95^\circ + 13^\circ) - \sin(95^\circ - 13^\circ) = \sin 108^\circ - \sin 82^\circ$$

$$\begin{aligned}\cos 38^\circ \cos 61^\circ &= \frac{1}{2} [\cos(38^\circ + 61^\circ) + \cos(38^\circ - 61^\circ)] \\ &= \frac{1}{2} [\cos 99^\circ + \cos(-23^\circ)] = \frac{1}{2} [\cos 99^\circ + \cos 23^\circ]\end{aligned}$$

$$\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} \left[\cos 2x + \cos \frac{\pi}{2}\right] = \frac{1}{2} \cos 2x$$

دریم مثال:

$$\cos 34^\circ \sin 28^\circ = \frac{1}{2} [\sin(34^\circ + 28^\circ) - \sin(34^\circ - 28^\circ)] = \frac{1}{2} (\sin 62^\circ - \sin 6^\circ)$$

$$\begin{aligned}2 \cos 45^\circ \cos 15^\circ &= \cos(45^\circ + 15^\circ) + \cos(45^\circ - 15^\circ) = \cos 60^\circ + \cos 30^\circ \\ &= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

$$\sin 10\theta \cos 4\theta = \frac{1}{2} [\sin(10\theta + 4\theta) + \sin(10\theta - 4\theta)] = \frac{1}{2} (\sin 14\theta + \sin 6\theta)$$

څلورم مثال: وښیاست چې: $\frac{1}{2} [\cos(x + y) + \cos(x - y)] = \cos x \cos y$ **حل:**

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} [\cos(x + y) + \cos(x - y)] &= \frac{1}{2} [(\cos x \cos y - \sin x \sin y) \\ &+ (\cos x \cos y + \sin x \sin y)] = \frac{1}{2} [(\cos x \cos y + \cos x \cos y)] \\ &= \frac{1}{2} (2 \cos x \cos y) = \cos x \cos y\end{aligned}$$

پنجم مثال: ونبیاست چې: $\frac{\sin 8\theta \cos \theta - \sin 6\theta \cos 3\theta}{\cos 2\theta \cos \theta - \sin 3\theta \sin 4\theta} = \tan 2\theta$

حل:

$$\begin{aligned} \frac{\sin 8\theta \cos \theta - \sin 6\theta \cos 3\theta}{\cos 2\theta \cos \theta - \sin 3\theta \sin 4\theta} &= \frac{\frac{1}{2}(\sin 9\theta + \sin 7\theta) - \frac{1}{2}(\sin 9\theta + \sin 3\theta)}{\frac{1}{2}(\cos 3\theta + \cos \theta) + \frac{1}{2}(\cos 7\theta - \cos \theta)} \\ &= \frac{\sin 7\theta - \sin 3\theta}{\cos 3\theta + \cos 7\theta} = \frac{2 \cos 5\theta \sin 2\theta}{2 \cos 5\theta \cos(-2\theta)} = \frac{\sin 2\theta}{\cos 2\theta} = \tan 2\theta \end{aligned}$$

$$\sin A + \sin B = 2 \cdot \sin \frac{A+B}{2} \cdot \cos \frac{A-B}{2}$$

$$\sin A - \sin B = 2 \cdot \cos \frac{A+B}{2} \cdot \sin \frac{A-B}{2}$$

$$\cos A + \cos B = 2 \cdot \cos \frac{A+B}{2} \cdot \cos \frac{A-B}{2}$$

$$\cos A - \cos B = -2 \cdot \sin \frac{A+B}{2} \cdot \sin \frac{A-B}{2}$$

$$\tan A + \tan B = \frac{\sin(A+B)}{\cos A \cos B} \quad \tan A - \tan B = \frac{\sin(A-B)}{\cos A \cos B}$$

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2}[\sin(A+B) + \sin(A-B)]$$

$$\cos A \sin B = \frac{1}{2}[\sin(A+B) - \sin(A-B)]$$

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A+B) + \cos(A-B)]$$

$$\sin A \sin B = -\frac{1}{2}[\cos(A+B) - \cos(A-B)] = \frac{1}{2}[\cos(A-B) - \cos(A+B)]$$

پوښتنې

1- وښیاست چې:

$$\frac{\cos 37^\circ + \sin 37^\circ}{\cos 37^\circ - \sin 37^\circ} = \cot 8^\circ$$

2- د زاویو د مثلثاتي نسبتونو د ضرب حاصل د جمعې یا تفاضل شکل ته واړوئ.

$$\sin 5x \cos 8x$$

$$\sin 3\theta \cos 5\theta$$

$$\cos 30^\circ \cos 60^\circ$$

$$\sin 32^\circ \cdot \cos 24^\circ$$

$$\cos 5x \sin 8x$$

$$\cos 7\theta \sin 5\theta$$

$$\sin 88^\circ \sin 12^\circ$$

$$2 \sin 60^\circ \cdot \sin 20^\circ$$

$$2 \cos 8\theta \cdot \sin 4\theta$$

$$2 \cos 75\alpha \cdot \sin 25\alpha$$

$$\sin \frac{A+B}{2} \cdot \cos \frac{A-B}{2}$$

3- د زاویو د مثلثاتي نسبتونو د جمعې او تفریق حاصل، ضرب ته واړوئ.

$$\cos 56^\circ + \cos 22^\circ$$

$$\sin 84^\circ - \sin 76^\circ$$

$$\sin 94^\circ - \sin 86^\circ$$

$$\cos 86^\circ + \cos 22^\circ$$

$$\cos 84^\circ - \cos 76^\circ$$

$$\sin 8\theta + \sin 4\theta$$

$$\cos 95^\circ - \cos 41^\circ$$

$$\sin \frac{P+Q}{2} - \sin \frac{P-Q}{2}$$

$$\sin \frac{5x}{3} - \sin \frac{5x}{6}$$

$$\cos \frac{3A}{4} + \cos \frac{4A}{3}$$

$$\cos 84^\circ + \cos 76^\circ$$

$$\cos \frac{A+B}{2} + \cos \frac{A-B}{2}$$

4- وښیاست چې:

$$\frac{\sin 4A - \sin 2A}{\cos 4A + \cos 2A} = \tan A$$

,

$$\frac{\cos \beta + \cos 9\beta}{\sin \beta + \sin 9\beta} = \cot 5\beta$$

$$\sin 10^\circ \cdot \sin 30^\circ \cdot \sin 50^\circ \cdot \sin 70^\circ = \frac{1}{16}$$

$$\cos 20^\circ \cdot \cos 40^\circ \cdot \cos 60^\circ \cdot \cos 80^\circ = \frac{1}{16}$$

5- که $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$ وي، (د یو مثلث د داخلي زاویو مجموعه) وښیاست چې:

$$\sin A + \sin B + \sin C = 4 \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}$$

$$\sin 10^\circ + \sin 50^\circ - \sin 70^\circ = 0$$

6- وښیاست چې:

$$\sin 30^\circ \cos 60^\circ + \cos 30^\circ \sin 60^\circ = ?$$

7-

a) -1 b) 1 c) 0 d) $\frac{1}{2}$

8- د جمعې یا تفاضل د فورمولونو په واسطه وښیاست چې:

$$\sin(180^\circ + \theta) = -\sin \theta$$


$$\cos(180^\circ + \theta) = -\cos \theta$$

$$\sin(360^\circ - \theta) = -\sin \theta$$

$$\sin(270^\circ + \theta) = -\cos \theta$$

$$\cos(270^\circ + \theta) = \sin \theta$$

$$\cos(360^\circ - \theta) = \cos \theta$$



د قوس اوږدوالی (Arc length)

که د یوې دایرې شعاع 5cm وي، د دې دایرې د 45° مرکزي زاوېې د مقابل قوس اوږدوالی به څو cm وي؟

که د دوو قوسونو شعاع گانې سره مساوي وي، د دې دوو قوسونو اوږدوالی د راډیان په حساب د قوس له مقدار سره متناسب دی، لکه: څنگه چې په شکل کې لیدل کېږي.

$$\frac{\widehat{AB}}{m\widehat{AB}} = \frac{\widehat{A'B'}}{m\widehat{A'B'}}$$

چې $\widehat{AB}$ او $\widehat{A'B'}$ د دې دواړو قوسونو مقدار د راډیان په حساب دي. که د قوس مقدار دوه چنده شي، د قوس اوږدوالی هم دوه چنده کېږي. که د یو قوس مقدار θ° او شعاع یې R وي، د θ° د زاوېې د مقابل اوږدوالی L او د دایرې محیط C وي، نو لرو چې:

$$\frac{L}{\theta^\circ} = \frac{C}{360^\circ}$$

څرنگه چې د دایرې محیط $C = 2\pi R$ دی، نو:

$$\frac{L}{\theta^\circ} = \frac{2\pi R}{360^\circ} \Rightarrow L = \frac{\theta^\circ}{180^\circ} \pi R$$

باید پام مو وي، که د قوس یا θ مقدار د راډیان په حساب وي، نو $L = R\theta$ کېږي.

لومړی مثال: د 45° مرکزي زاوېې د مقابل قوس اوږدوالی پیدا کړئ، که د دایرې شعاع 14cm وي.

حل:

$$L = \frac{45^\circ}{180^\circ} \cdot \pi \cdot 14 \text{ cm} = \frac{14}{4} \pi \text{ cm} \approx \frac{14}{4} \cdot \frac{22}{7} \text{ cm} = 11 \text{ cm}$$

دویم مثال: د $\frac{\pi}{4}$ مرکزي زاوې د مقابل قوس اوږدوالی پیدا کړئ، که د دایرې شعاع 14cm وي.

$$L = R \theta$$

$$L = 14 \text{ cm} \cdot \frac{\pi}{4} \approx 14 \text{ cm} \cdot \frac{22}{7} \cdot \frac{1}{4} = 11 \text{ cm}$$

دریم مثال: که په یوه دایره کې، د 45° مرکزي زاوې د مقابل قوس اوږدوالی $3\pi \text{ cm}$ وي، د دې دایرې شعاع پیدا کړئ.

حل: څرنگه چې: $45^\circ = \frac{\pi}{4} \text{ radian}$ ، نو:


$$L = R \theta$$

$$R = \frac{L}{\theta} = \frac{3\pi \text{ cm}}{\frac{\pi}{4}} = 3\pi \cdot \frac{4}{\pi} = 12 \text{ cm}$$

د یوې دایرې قطاع (Sector of a circle): د یوې دایرې د $\widehat{AB}$ قوس چې د دایرې مرکز O او شعاع پې R ده، په پام کې نیسو، د $\overline{OP}$ د ټولو خطونو مجموعې ته چې P د AB د قوس یوه نقطه ده، قطاع ویل کېږي.

که د $\widehat{AB}$ قوس اندازه θ رادیان وي، ته د قطاع زاویه وایي. یا قطاع په دې ډول هم تعریفولای شو:

د یوې دایرې د سطحې هغه برخه چې د دایرې د دوو شعاع گانو تر منځ واقع وي، قطاع بلل کېږي.



د قطاع د مساحت پيدا كول: که د دایرې شعاع R وي، د دې دایرې د θ رادیان د قطاع

مساحت مساوي دی په: $S = \frac{1}{2} R^2 \theta$ چې S د قطاع مساحت او R د دایرې شعاع ده، ځکه

$$\left. \begin{array}{l} 2\pi^R \\ \theta^R \end{array} \right\} \Rightarrow S = \frac{\pi R^2 \cdot \theta}{2\pi} = \frac{1}{2} R^2 \theta$$

او یکه د θ زاویه د درجې په حساب وي.

$$\left. \begin{array}{l} 360^\circ \\ \theta^\circ \end{array} \right\} \Rightarrow S = \pi R^2 \frac{\theta}{360^\circ}$$

لومړی مثال: که د یوې دایرې شعاع 10cm وي، د دایرې د هغه قطاع مساحت پیدا کړئ چې د قطاع زاویه یې $\theta = 90^\circ$ وي.

حل: څرنګه چې $90^\circ = \frac{\pi}{2}$ Radian دی:

$$S = \frac{1}{2} R^2 \theta$$

$$S = \frac{1}{2} (10\text{cm})^2 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2} \cdot 100\text{cm}^2 \cdot \frac{\pi}{2} = 25\pi\text{cm}^2$$

دویم مثال: که د یوې دایرې شعاع 10cm وي، د دایرې د هغه قطاع مساحت پیدا کړئ چې د قطاع زاویه یې $\theta = 72^\circ$ وي.

$$72^\circ = 72 \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{2\pi}{5} \text{ Radian}$$

$$S = \frac{1}{2} R^2 \theta = \frac{1}{2} \cdot 100\text{cm}^2 \cdot \frac{2\pi}{5} = 20\pi\text{cm}^2$$

دریم مثال: که د دایرې شعاع 6cm او د دې دایرې د یوې قطاع مساحت $15\pi\text{cm}^2$ وي. د قطاع د قوس اوږدوالی پیدا کړئ.

حل:

$$S = \frac{1}{2} R^2 \theta \quad \text{یا} \quad 15\pi\text{cm}^2 = \frac{1}{2} (6\text{cm})^2 \theta$$

$$15\pi\text{cm}^2 = 18\theta$$

$$\theta = \frac{15\pi}{18} = \frac{5\pi}{6} \text{ Radian}$$

$$L = R\theta = 6\text{cm} \cdot \frac{5\pi}{6} = 5\pi\text{cm} = 5 \cdot 3.14\text{cm} \approx 15.7\text{cm}$$

خلورم مثال: یوه دایره چې شعاع لري، ددې دایرې محیط، مساحت او د 60° مرکزي زاوېې د مقابل قوس اوږدوالی یې پیدا کړئ او هم ددې دایرې د قطاع مساحت پیدا کړئ چې $\theta = 60^\circ$ وي.

حل: څرنگه چې $60^\circ = \frac{\pi}{3}$ Radian دی، نو:

$$C = 2\pi R \approx 2 \cdot \frac{22}{7} \cdot 7\text{cm} = 44\text{cm}, \quad A = \pi R^2 \approx \frac{22}{7} \cdot 49\text{cm}^2 = 154\text{cm}^2$$

$$L = R\theta = 7 \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{7\pi}{3}\text{cm}, \quad A = \frac{1}{2}R^2\theta = \frac{1}{2} \cdot 49\text{cm}^2 \cdot \frac{\pi}{3} \approx 25.6\text{cm}^2$$


پنځم مثال: که د یوې دایرې شعاع 8cm او د قطاع زاویه یې 45° وي، د قطاع مساحت، د قطاع د مقابل قوس اوږدوالی او ددې قطاع محیط پیدا کړئ.

حل:

$$A_s = \pi R^2 \frac{\theta}{360^\circ} = (8\text{cm})^2 (3.14) \cdot \frac{45^\circ}{360^\circ} \approx 25.12\text{cm}$$

$$L = 2\pi R \frac{\theta}{360^\circ} = 2 \cdot 8\text{cm} \cdot 3.14 \cdot \frac{45^\circ}{360^\circ} \approx 6.28\text{cm}$$

$$d = 2\pi R \frac{\theta}{360^\circ} + 2R = 6.28\text{cm} + 2 \cdot 8\text{cm} \approx 22.28\text{cm}$$



فعالیت


که د دایرې شعاع 10cm وي، د هغه قطاع گانو مساحت پیدا کړئ چې د قوس اندازه یې 180° ، 216° او 324° وي.

شپږم مثال: د لاندې شکل په شان په 90° قطاع کې د R په شعاع مربع محاط شوي ده، د خط شوي برخې مساحت پیدا کړئ.

حل: څرنګه چې د دایرې شعاع R ده، د دایرې په څلورمه برخه کې د مربع قطر $d = R = a\sqrt{2}$

دی، که a د مربع ضلع وي، نو د مربع یوه ضلع $a = \frac{R}{\sqrt{2}}$ او د مربع مساحت $S = \frac{R^2}{2}$

دی، څرنګه چې د دایرې د څلورمې برخې مساحت $\frac{1}{4}\pi R^2$ دی.




نود خط شوی برخې مساحت مساوي دی په: $\frac{1}{4}\pi R^2 - \frac{1}{2}R^2 = \frac{R^2}{4}(\pi - 2)$

اووم مثال: په شکل کې د دایرې قطاع چې شعاع یې 1cm او مرکزي زاویه یې 300° ده. د دې شکل محیط څو سانتي متره کېږي؟

$$360^\circ \quad 2\pi R$$

$$300^\circ \quad x \quad x = \frac{300^\circ \cdot 2\pi R}{360^\circ} = \frac{5\pi R}{3} \text{ cm}$$




$$= \left(\frac{5}{3}\pi R + 2\right) \text{ cm} \quad \text{د دې شکل محیط.}$$

د دایرې قطعه (Segment of a circle): د دایرې د سطحې یوې برخې ته چې د قوس

او مقابل وتر تر منځ واقع وي، قطعه وایي.

د دایرې قطعه د قطعې د قوس په حساب

ښودل کېږي. د مثال په ډول که د AB



قوس $\frac{\pi}{6}$ رادیان وي، قطعې ته هم $\frac{\pi}{6}$

رادیان وایی.

د قطعي مساحت: د θ رادیان د قطعي مساحت چې د دایرې شعاع R وي، مساوي دی، په:

$$S = \frac{1}{2} R^2 (\theta - \sin \theta)$$

ځکه که د AB قوس θ رادیان وي او د O نقطه د A او B له نقطو سره ونښلوو، نو لرو چې:

د AOB د مثلث مساحت - د AOB د قطاع مساحت = د قطعي مساحت

$$S_{\triangle AOB} \text{ د مثلث مساحت} - S_{OAB} \text{ د قطاع مساحت} = S \text{ د قطعي مساحت}$$

په لاندې شکل کې لیدل کېږي چې د $\triangle AOB$ مثلث متساوي الساقين دی، نو په دې اساس:


$$\cos \frac{\theta}{2} = \frac{h}{R}$$

$$h = R \cos \frac{\theta}{2} \text{ ارتفاع}$$

$$\sin \frac{\theta}{2} = \frac{\frac{AB}{2}}{R}$$

$$AB = 2R \sin \frac{\theta}{2} \text{ د مثلث قاعده:}$$

قاعده . ارتفاع



$$\text{د } \triangle AOB \text{ مثلث مساحت} = \frac{h \cdot AB}{2} = \frac{h \cdot 2R \sin \frac{\theta}{2}}{2}$$

څرنگه چې $\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$ دی.

$$\text{په نتیجه کې: } \text{مثلث مساحت} = \frac{R \cos \frac{\theta}{2} \cdot 2R \sin \frac{\theta}{2}}{2} = \frac{R^2 \sin \theta}{2} = \frac{1}{2} R^2 \sin \theta$$

څرنگه چې $S_{OAB} = \frac{R^2 \sin \theta}{2}$ د مثلث مساحت او د قطاع مساحت $A_s = \frac{1}{2} R^2 \theta$ دی.

$$S = \frac{1}{2} R^2 \theta - \frac{1}{2} R^2 \sin \theta = \frac{1}{2} R^2 (\theta - \sin \theta) \text{ د قطعي مساحت}$$

لومړی مثال: د پورته شکل په شان که د یوې دایرې شعاع $R = 6.8 \text{ cm}$ وي او د دې دایرې

د یوې قطاع زاویه $\theta = 71^\circ$ وي، د قطاع مساحت، د ABO د مثلث مساحت او د دې دایرې د

قطعي مساحت پيدا ڪري.
حل:

$$R = 6,8\text{cm}$$

$$\theta = 71^\circ$$

$$A = \pi R^2 \frac{\theta}{360^\circ} = (6.8\text{cm})^2 \cdot 3.14 \frac{71^\circ}{360^\circ} \approx 28.64\text{cm}^2$$

$$h = R \cos \frac{\theta}{2} = 6.8\text{cm} \cdot \cos \frac{71^\circ}{2} \approx 5.54\text{cm}$$

$$\cos 35^\circ 30' = 0.8141$$

$$b = 2 \cdot R \sin \frac{\theta}{2} = 2 \cdot 6.8\text{cm} \cdot \sin \frac{71^\circ}{2} \approx 7.9\text{cm}$$

$$\sin 35^\circ 30' = 0.5807$$

$$A = \frac{1}{2} R^2 \sin \theta = \frac{1}{2} (6.8\text{cm})^2 \cdot \sin 71^\circ \approx 21.96\text{cm}^2$$

$$\sin 71^\circ = 0.9455$$

د مثلث مساحت - د قطاع مساحت = د قطعي مساحت

$$= 28,64\text{cm}^2 - 21,96\text{cm}^2 = 6,68\text{cm}^2$$


دويم مثال: د هغه قطعي مساحت پيدا ڪري ڇي شعاع يي R او قوس يي $\widehat{AB}$ وي، ڪه:

$$\widehat{AB} = 60^\circ, R = 12\text{cm}$$

حل: خرنگه ڇي $60^\circ = \frac{\pi}{3} R$ دي، نو:

$$S = \frac{1}{2} R^2 (\theta - \sin \theta) = \frac{1}{2} (12\text{cm})^2 \left(\frac{\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{2} \cdot 144\text{cm}^2 \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$= 72\text{cm}^2 \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 24\pi\text{cm}^2 - 36\sqrt{3}\text{cm}^2 = (24\pi - 36\sqrt{3})\text{cm}^2$$




فعالیت

د هغې دایرې د قطعي مساحت پیدا کړئ چې شعاع یې 6cm او $\widehat{AB} = 120^\circ$ قوس وي.

دریم مثال: د هغه قطعي مساحت پیدا کړئ چې د 6cm وتر په واسطه جلا شوی وي او د دایرې شعاع هم 6cm وي.


حل: څرنگه چې د قطعي قوس $\frac{\pi}{3}$ رادیانه دی:

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} R^2 (\theta - \sin \theta) = \frac{1}{2} (6\text{cm})^2 \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= 18\text{cm}^2 \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = (6\pi - 9\sqrt{3})\text{cm}^2 \\ &\approx 6(3.14)\text{cm}^2 - 9(1.73)\text{cm}^2 = 3.27\text{cm}^2 \end{aligned}$$



پوښتنې

- 1- د هغې قطاع مساحت پیدا کړئ چې د $\frac{\pi}{6}$ رادیان مرکزي زاوې په مقابل کې واقع وي، که د دایرې شعاع 20cm وي.
- 2- د هغې قطاع اړونده مرکزي زاویه پیدا کړئ چې مساحت یې 55.5cm^2 او د دایرې شعاع 12cm وي.
- 3- که د یوې دایرې شعاع 10m وي، د هغو قوسونو اوږدوالی پیدا کړئ چې د 3.8 رادیان او 27 رادیانه مرکزي زاویو په مقابل کې واقع وي.



د مثلث د مساحت پیدا کول د دوو ضلعو او ددې دوو ضلعو تر منځ د زاويې له جنسه:

که په یوه مثلث کې د دوو ضلعو اوږدوالی
4cm او 8cm وي او ددې ضلعو تر منځ
زاویه 30° وي آیا ددې مثلث مساحت پیدا
کولای شئ؟

د $\triangle ABC$ مثلث په پام کې نیسو او د B له راس څخه د $\overline{BH}$ ارتفاع د $\overline{AC}$ پر ضلع باندې
رسمو:

څرنگه چې $\sin A = \frac{BH}{c} = \frac{h}{c}$ دی، په نتیجه کې $h = c \sin A$ کېږي له هندسې څخه پوهیږو

چې د یوه مثلث مساحت $(S = \frac{\text{ارتفاع} \cdot \text{قاعدې}}{2})$ دی.

$$S_{ABC} = \frac{b \cdot h}{2}$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} b c \sin A \quad (h = c \sin A)$$

فعالیت

د پورتنی مثلث د A او C له رأسونو څخه ارتفاع ګانې رسم کړئ او وینیاست چې:

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} ac \sin B \quad \text{او} \quad S_{ABC} = \frac{1}{2} ab \sin C$$

لومړی مثال: د هغه مثلث مساحت پیدا کړئ چې د دوو ضلعو اوږدوالی یې $a = 3,5\text{cm}$ او
 $c = 6\text{cm}$ او د دواړو ضلعو ترمنځ زاویه یې $B = 47,5^\circ$ وي.
حل:


$$A = \frac{1}{2} ac \sin B$$

$$\sin 47.5^\circ = 0.73727733$$

$$A = \frac{1}{2} \cdot 3.5 \text{ cm} \cdot 6 \text{ cm} \cdot \sin 47.5^\circ \approx 7.74 \text{ cm}^2$$

دویم مثال: د لاندې شکل د مثلث مساحت پیدا کړئ.
حل:


$$A = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} (8)(13) \sin 130^\circ \approx 39.83 \text{ cm}^2$$



دریم مثال: د $\triangle ABC$ په متساوي الساقين مثلث کې $\overline{AB} = \overline{AC} = 8 \text{ cm}$ او $A = 30^\circ$ ده، ددې مثلث مساحت پیدا کړئ.

$$S = \frac{1}{2} AB \cdot AC \sin 30^\circ$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = 16 \text{ cm}^2$$



د مثلث د مساحت پیدا کول د دریو ضلعو له جنسه (د هیرون فورمول)

ددې کار لپاره د یوې زاوې د نیمایي $\sin$ ، د مثلث د ضلعو د اوږدوالي له جنسه په لاس راوړو:
د ABC په هر مثلث کې لاندې اړیکې صدق کوي.

$$\sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{bc}}, \sin \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(p-a)(p-c)}{ac}}, \sin \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{(p-a)(p-b)}{ab}}$$

چې a, b, c د مثلث ضلعې او p د مثلث د محیط نیمایي ده ($p = \frac{a+b+c}{2}$) په تیرو لوستو کې مولوستل چې:

$$\sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos A}{2}} \quad \square \quad \sin \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos B}{2}} \quad \square \quad \sin \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos C}{2}}$$

په هر مثلث کې $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ چې دا رابطه د *cosine* د قضیې په نوم یادېږي، دلته د دې رابطې له ثبوت څخه صرف نظر کوو او په خپل وخت کې به وروسته ثبوت شي، د $\cos A$ پر ځای یې قیمت وضع کوو.

$$\begin{aligned} \sin \frac{A}{2} &= \sqrt{1 - \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}} = \sqrt{\frac{2bc - b^2 - c^2 + a^2}{4bc}} = \sqrt{\frac{a^2 - (b^2 - 2bc + c^2)}{4bc}} \\ &= \sqrt{\frac{a^2 - (b - c)^2}{4bc}} = \sqrt{\frac{(a - b + c)(a + b - c)}{4bc}} \end{aligned}$$

څرنگه چې: $a + b + c = 2p$ دی.

$$a - b + c = a + b + c - 2b = 2p - 2b = 2(p - b)$$

$$a + b - c = a + b + c - 2c = 2p - 2c = 2(p - c)$$

د $(a - b + c)$ او $(a + b - c)$ قیمتونه وضع کوو، نو لرو چې:

$$\sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{2(p - b)2(p - c)}{4bc}} = \sqrt{\frac{(p - b)(p - c)}{bc}}$$

فعالیت

په همدې ډول وښایست چې:

$$\sin \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(p - a)(p - c)}{ac}}, \quad \sin \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{(p - a)(p - b)}{ab}}$$

په همدې ډول کولای شو چې د مثلث د ضلعو له جنسه د یوې زاوې نیمایي *cosine* په لاس راوړو:

$$\cos \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{p(p - a)}{bc}} \quad \square \quad \cos \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{p(p - b)}{ac}} \quad \square \quad \cos \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{p(p - c)}{ab}}$$

ثبوت: ڇرنگه ڇڻي $\cos \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos A}{2}}$ ڏي.

د $\cos A$ قيمت وضع ڪو:

$$\begin{aligned}\cos \frac{A}{2} &= \sqrt{1 + \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}} = \sqrt{\frac{2bc + b^2 + c^2 - a^2}{4bc}} = \sqrt{\frac{(b+c)^2 - a^2}{4bc}} \\ &= \sqrt{\frac{(b+c+a)(b+c-a)}{4bc}}\end{aligned}$$

$$b + c + a - 2a = 2p - 2a$$

$$b + c - a = 2p - 2a = 2(p - a)$$

$$\cos \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{p(p-a)}{bc}}$$

په نتيجه ڪي لرو ڇڻي:

فعاليت


ڇرنگه ڇڻي $\tan \frac{A}{2} = \frac{\sin \frac{A}{2}}{\cos \frac{A}{2}}$ ڏي، وٺيائست ڇڻي: $\tan \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{p(p-a)}}$

پوهيڙو ڇڻي $\sin A = 2 \sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2}$ ڏي ڪه د $\sin \frac{A}{2}$ او $\cos \frac{A}{2}$ قيمتونه وضع ڪپرو لرو ڇڻي:

$$\sin A = 2 \sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{bc}} \cdot \sqrt{\frac{p(p-a)}{bc}}$$

$$\sin A = 2 \sqrt{\frac{p(p-a)(p-b)(p-c)}{(bc)^2}}$$

$$\sin A = \frac{2}{bc} \cdot \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$



ڇرنگه ڇڻي د $S = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} ac \sin B = \frac{1}{2} bc \sin A$ مثلث مساحت ڏي.

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} bc \cdot \sin A$$

د $\sin A$ قیمت وضع کوو:

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} bc \cdot \frac{2}{bc} \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$S_{ABC} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

د پورتنیو مساواتو له پرته کولو څخه لرو چې:

$$\sin A = \frac{2}{bc} \cdot S = \frac{2S}{bc} \quad \square \quad \sin B = \frac{2S}{ac} \quad \square \quad \sin C = \frac{2S}{ab}$$

دریم مثال: د هغه مثلث مساحت پیدا کړئ چې د ضلعو اوږدوالی یې په لاندې ډول راکړل شوی وي.

$$a = 5\text{cm} \quad b = 4\text{cm} \quad c = 3\text{cm}$$

حل:

$$P = \frac{a+b+c}{2} = \frac{5\text{cm} + 4\text{cm} + 3\text{cm}}{2} = 6\text{cm}$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{6(6-5)(6-4)(6-3)} \\ = \sqrt{6 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3} = \sqrt{36} = 6\text{cm}^2$$

فعالیت

د هغه مثلث مساحت پیدا کړئ چې: $a = 4\text{cm}$ او $b = 5\text{cm}$, $c = 6\text{cm}$ وي.

څلورم مثال: که د یوه مثلث ضلعي $a = 18\text{cm}$, $b = 24\text{cm}$ او $c = 30\text{cm}$ وي. د دې مثلث مساحت پیدا کړئ.

حل

$$P = \frac{a+b+c}{2} = \frac{18+24+30}{2} = 36\text{cm}$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \\ = \sqrt{36(36-18)(36-24)(36-30)} = \sqrt{36 \cdot 18 \cdot 12 \cdot 6} = 216\text{ cm}^2$$

پنځم مثال: د هغه مثلث مساحت پیدا کړئ چې د ضلعو اوږدوالی یې $b = 42,3\text{ft}$ ، $a = 29,7\text{ft}$ او $c = 38,4\text{ft}$ وي.

حل:

$$p = \frac{a + b + c}{2} = \frac{29.7 + 42.3 + 38.4}{2} = 55,2\text{ft}$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{55.2(55.2-29.7)(55.2-42.3)(55.2-38.4)} \\ = \sqrt{55.2(25.5)(12.9)(16.8)} = 552\text{ft}^2$$

د یو مثلث د محیطي دایرې د شعاع پیدا کول:

محیطي دایره هغه دایره ده چې مثلث د دایرې په داخل کې واقع وي او دایره د مثلث په درې واړو راسونو باندې مماس وي، او د محیطي دایرې مرکز د مثلث د درې واړو عمودي ناصفونو د تقاطع نقطه ده.

Δ

د شکل په شان د ABC مثلث د ضلعو اوږدوالی د a ، b او c څخه عبارت دی چې د O ټکی چې د دایرې مرکز دی د مثلث د ضلعو د درې واړو عمودي ناصفونو (Bisector Perpendicular) د تقاطع ټکی هم دی.

څرنګه چې د BOC مثلث متساوي الساقين دی، نو ارتفاع د $\hat{BOC}$ زاویه او د مثلث قاعده نیمایي کوي. په نتیجه کې: $\hat{A} = \hat{BOL} = \hat{LOC}$

$$\sin \hat{A} = \sin \hat{BOL} = \sin \hat{LOC}$$

ځکه چې مرکزي زاویه د محیطي زاویې دوه برابره ده چې د عین قوس په مقابل کې واقع وي.


$$\sin \hat{A} = \frac{\frac{a}{2}}{R} = \frac{a}{2R}$$

$$R = \frac{a}{2 \sin A} = \frac{a}{2 \cdot \frac{2s}{bc}} = \frac{abc}{4s} \quad (\sin A = \frac{2S}{bc})$$

$$R = \frac{a}{2 \sin A} \text{ او د } R \text{ څخه لرو چې:}$$

$$a = R \cdot 2 \sin A$$

$$\frac{a}{\sin A} = 2R$$



په همدې ډول

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R \text{ یا } R = \frac{a}{2 \sin A} = \frac{b}{2 \sin B} = \frac{c}{2 \sin C}$$

لومړۍ مثال: د ABC مثلث د محیطي دایرې شعاع پیدا کړئ چې ضلعي یې $a = 11\text{cm}$ ، $b = 12\text{cm}$ او $c = 13\text{cm}$ وي.

حل:

$$R = \frac{abc}{4s} = \frac{11 \cdot 12 \cdot 13}{4\sqrt{18 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}} = 6,98\text{cm} \quad , \quad p = \frac{11+12+13}{2} = 18\text{cm}$$

فعالیت

د هغه مثلث د محیطي دایرې شعاع پیدا کړئ چې د ضلعو اوږدوالی یې 18cm ، 24cm او 30cm وي.

دویم مثال: د هغه مثلث د محیطي دایرې شعاع پیدا کړئ چې د ضلعو اوږدوالی یې $a = 3\text{cm}$ ، $b = 5\text{cm}$ او $c = 6\text{cm}$ وي.

حل:

$$R = \frac{abc}{4 \cdot \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}} = \frac{3 \cdot 5 \cdot 6}{4 \cdot \sqrt{7 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 1}} = \frac{90}{4 \cdot \sqrt{56}} = \frac{45}{2 \cdot \sqrt{56}} \approx 3\text{cm}$$

د یو مثلث د محاطي دایرې د شعاع پیدا کول:

د مثلث محاطي دایره هغه دایره ده چې دایره د مثلث په دننه کې واقع وي او دایره د مثلث په دننه کې د مثلث د درې واړه ضلعو سره مماس وي، د محاطي دایرې مرکز د مثلث د درې واړو ناصف الزاویو د تقاطع ټکی (O) دی.


د OAB د OAC د OBC مثلثونو مساحت = د ABC مثلث له مساحت سره

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}ar + \frac{1}{2}br + \frac{1}{2}cr = \frac{1}{2}r(a+b+c) = \frac{1}{2}r \cdot 2p$$

$$S = r \cdot p \Rightarrow r = \frac{S}{p}$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$r = \frac{\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}{p}$$



درېم مثال: د هغه مثلث د محاطي دایرې شعاع او د محاطي دایرې مساحت پیدا کړئ چې د ضلعو اوږدوالی یې 7cm، 8cm او 9cm وي.

حل

$$p = \frac{7+8+9}{2} = 12\text{cm}$$

$$S = \sqrt{12(12-7)(12-8)(12-9)} = 26.83\text{cm}^2$$

$$r = \frac{s}{p} = \frac{26.83\text{cm}^2}{12\text{cm}} = 2.23\text{cm}$$

$$= \pi r^2 = \frac{22}{7} \cdot (2.23\text{cm})^2 \approx 15.6\text{cm}^2$$

د محاطي دایرې مساحت مساوي دی، په:

څلورم مثال: د یو قائم الزاویه مثلث دوه قائمې ضلعې په ترتیب سره 3cm او 4cm دي، د محیطي او محاطي دایرو شاع گانې یې پیدا کړئ.

حل:

$$(\overline{AC})^2 = (\overline{AB})^2 + (\overline{BC})^2$$


$$p = \frac{3+4+5}{2} = 6\text{cm}$$

$$AC = \sqrt{9+16} = 5$$

$$R = \frac{abc}{4s} = \frac{3 \cdot 4 \cdot 5}{4 \cdot \sqrt{6(6-3)(6-4)(6-5)}} = \frac{60}{4 \cdot \sqrt{6 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}} = \frac{60}{4 \cdot 6} = \frac{60}{24}$$

$$= \frac{5}{2}\text{cm} = 2.5\text{cm}$$

$$r = \frac{s}{p} = \frac{6}{6} = 1\text{cm}$$



پنځم مثال: د MTN په قایم الزاویه مثلث کې که قایمې ضلعې یې m او n راکړ شوي وي، د دې مثلث مساحت او د محیطي دایرې شعاع یې پیدا کړئ.


حل:

$$(\overline{MN})^2 = m^2 + n^2$$

$$t = MN = \sqrt{m^2 + n^2}$$

$$S = \frac{n \cdot m}{2}, R = \frac{m \cdot n \cdot t}{4S} = \frac{m \cdot n \cdot \sqrt{m^2 + n^2}}{4 \frac{nm}{2}} = \frac{mn\sqrt{m^2 + n^2}}{2mn}$$

$$R = \frac{\sqrt{m^2 + n^2}}{2} \text{ محیطی دایری شعاع}$$



فعالیت

د هغه مثلث د محاطي دایرې شعاع پیدا کړئ، که چېرې د ضلعو اوږدوالی یې 34cm ، 35cm او 36cm وي.

د متساوي الاضلاع مثلث ارتفاع، مساحت او د محیطي او محاطي دایرو د شعاع گانو پیدا کول:


$$\sin A = \sin 60^\circ = \frac{h}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow h = \frac{a}{2} \sqrt{3}$$

د فیثاغورث د قضیې په اساس لرو چې:

$$h^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = a^2$$

$$h^2 = a^2 - \frac{a^2}{4} = \frac{4a^2 - a^2}{4} = \frac{3a^2}{4}$$

$$h = \frac{\sqrt{3}a}{2} = \frac{a}{2} \sqrt{3}$$



$$S = \frac{h \cdot a}{2} = \frac{\frac{\sqrt{3}a}{2} \cdot a}{2} = \frac{\sqrt{3}a^2}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{a^2}{4}\sqrt{3}$$

ABC مثلث مساحت

$$R = \frac{abc}{4s} = \frac{a^3}{4 \cdot \frac{a^2}{4}\sqrt{3}} = \frac{a^3}{a^2\sqrt{3}} = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{a}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{a}{3}\sqrt{3}$$

$$r = \frac{s}{p} = \frac{\frac{a^2}{4} \cdot \sqrt{3}}{\frac{3a}{2}} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{2}{3a} = \frac{a}{6}\sqrt{3}$$

شپږم مثال: د یو متساوي الاضلاع مثلث محیط 18cm دی. د دې مثلث مساحت، ارتفاع او د محیطي او محاطي دایرو شعاع گانې پیدا کړئ.


حل: د دې مثلث یوه ضلع (a) مساوي ده، په:

$$a = \frac{1}{3} \cdot 18\text{cm} = 6\text{cm}$$

$$S = \frac{a^2}{4}\sqrt{3} = \frac{(6\text{cm})^2}{4}\sqrt{3} = 15,6\text{cm}^2 \quad h = \frac{a}{2}\sqrt{3} = \frac{6\text{cm}}{2}\sqrt{3} = 5,2\text{cm}$$

$$R = \frac{a}{3}\sqrt{3} = \frac{6\text{cm}}{3}\sqrt{3} = 3,5\text{cm} \quad r = \frac{a}{6}\sqrt{3} = \frac{6\text{cm}}{6}\sqrt{3} \approx 1,7\text{cm}$$

پوښتنې



1- د شکل مطابق د OAB مثلث متساوي الاضلاع دی چې هره ضلع یې R ده. د O په مرکز دایره رسم شوې ده چې د A او B له ټکو څخه تیرېږي. د AB په وتر سره د قطعې مساحت مساوي دی په:

- a) $(\frac{\pi}{6} - \frac{1}{4})R^2$ b) $(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{5})R^2$ c) $(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2})R^2$
- d) $(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{2}}{2})R^2$ e) $(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4})R^2$

- 2- که دیو متساوی الساقین مثلث د هر ساق اوږدوالی 6cm او د ساقو تر منځ زاویه یې 30° وي د مثلث مساحت پیدا کړئ.
- 3- که دیوه مثلث د دوو ضلعو اوږدوالی $5\sqrt{2}\text{cm}$ او 6cm وي، او دواړو ضلعو تر منځ زاویه یې 45° وي، د دې مثلث مساحت پیدا کړئ.
- 4- که دیوه مثلث د ضلعو اوږدوالی په ترتیب سره 3cm ، 4cm او 5cm وي، د دې مثلث مساحت پیدا کړئ.
- 5- د هغه مثلث مساحت پیدا کړئ چې د ضلعو اوږدوالی یې $a = 7\text{cm}$ ، $b = 9\text{cm}$ او $c = 12\text{cm}$ وي.
- 6- د هغه قایم الزاویه مثلث د محیطي دایرې شعاع پیدا کړئ، که قایمې ضلعې یې 12cm او 5cm وي.
- 7- که د ABC ، د متساوي الساقین مثلث قاعده $a = 8\text{cm}$ او د دې مثلث محاطي شعاع $r = 3\text{cm}$ وي. د محیطي دایرې شعاع اوږدالی یې پیدا کړئ.
- 8- که دیوه قایم الزاویه مثلث مساحت 84cm^2 وي او د یوې ارتفاع اوږدوالی یې $3,36\text{cm}$ وي، د دې مثلث د محیطي شعاع اوږدوالی پیدا کړئ.

د څپرګي لنډيز

• د جمعې او تفاضل فورمولونه:

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \quad \text{او} \quad \sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \quad \text{او} \quad \cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \\ \tan(\alpha + \beta) &= \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta} \quad \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} \end{aligned}$$

• د 2α د زاوې مثلثاتي نسبتونه د α د مثلثاتي نسبتونو له جنسه:

$$\begin{aligned} \sin 2\alpha &= 2 \sin \alpha \cos \alpha \\ \cos 2\alpha &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha \\ \tan 2\alpha &= \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} \end{aligned}$$

• د يوې زاوې مثلثاتي نسبتونه، د زاوې د دوه چند مثلثاتي نسبتونو له جنسه:

$$\sin \alpha = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos 2\alpha}{2}} \quad , \quad \cos \alpha = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos 2\alpha}{2}} \quad , \quad \tan \alpha = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha}}$$

• د يوې زاوې د نيمايي مثلثاتي نسبتونه د زاوې د مثلثاتي نسبتونو له جنسه:

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} \quad , \quad \cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} \quad , \quad \tan \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}$$

• د يوې زاوې د درې چنده مثلثاتي نسبتونه د هغې زاوې د مثلثاتي نسبتونو له جنسه:

$$\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha \quad , \quad \cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha$$

$$\tan 3\alpha = \frac{3 \tan \alpha - \tan^3 \alpha}{1 - 3 \tan^2 \alpha}$$

• د دريو زاويو د مجموعې $(\alpha + \beta + \theta)$ مثلثاتي نسبتونه:

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + \beta + \theta) &= \sin \alpha \cos \beta \cos \theta + \sin \beta \cos \alpha \cos \theta \\ &\quad + \sin \theta \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \sin \theta \\ \cos(\alpha + \beta + \theta) &= \cos \alpha \cos \beta \cos \theta - \cos \alpha \sin \beta \sin \theta \\ &\quad - \cos \beta \sin \alpha \sin \theta - \cos \theta \sin \alpha \sin \beta \end{aligned}$$

$$\tan(\alpha + \beta + \theta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta + \tan \theta - \tan \alpha \cdot \tan \beta \cdot \tan \theta}{1 - \tan \alpha \tan \beta - \tan \beta \tan \theta - \tan \alpha \tan \theta}$$

د ضرب فورمولونه (هغه فورمولونه چې د دوو زاویو د مجموعې یا تفاضل مثلثاتي نسبتونه په ضرب بدلوي).

$$\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

$$\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

$$\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

• هغه فورمولونه چې د دوه زاویو د مثلثاتي نسبتونو ضرب د جمعې او یا د تفاضل په شکل بدلوي:

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2} [\sin(A+B) + \sin(A-B)]$$

$$\cos A \sin B = \frac{1}{2} [\sin(A+B) - \sin(A-B)]$$

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A+B) + \cos(A-B)]$$

$$\sin A \sin B = -\frac{1}{2} [\cos(A+B) - \cos(A-B)] = \frac{1}{2} [\cos(A-B) - \cos(A+B)]$$

• د R په شعاع د دایرې د مرکزي زاوې (θ°) د مقابل قوس اوږدوالی مساوي دی په:

$$L = \pi R \frac{\theta^\circ}{180^\circ}$$

• د R په شعاع د دایرې مرکزي زاوې θ راډیان د مقابل قوس اوږدوالی مساوي دی په:

$$L = R\theta$$

• د دایرې د سطحې هغه برخه چې د دوو شعاعو تر منځ واقع وي، قطاع بلل کېږي:

• د قطاع مساحت د $A_{\text{sector}} = \frac{1}{2} R^2 \theta$ د فورمول په مرسته لاسته راځي:

• د دایرې د سطحې هغه برخه چې د قوس او د مقابل وتر تر منځ واقع وي، قطعه بلل کېږي:

• د قطعي مساحت د $A_{\text{Segment}} = \frac{1}{2} R^2 (\theta - \sin \theta)$ د فورمول په مرسته پیدا کېږي:

• د دوو ضلعو او ددې دوو ضلعو تر منځ زاوېې له جنسه د مثلث مساحت مساوي دی په:

$$S = \frac{1}{2} ac \sin B, \quad S = \frac{1}{2} bc \sin A, \quad S = \frac{1}{2} ab \sin C$$

• د یوې زاوېې د نیمایي مثلثاتي نسبتونه د مثلث د ضلعو د اوږدوالی له جنسه:

$$\sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{bc}} \quad \sin \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(p-a)(p-c)}{ac}} \quad \sin \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{(p-b)(p-a)}{ab}}$$

$$\cos \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{p(p-a)}{bc}} \quad \cos \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{p(p-b)}{ac}} \quad \cos \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{p(p-c)}{ab}}$$

$$\tan \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{p(p-a)}}$$

• د مثلث مساحت د مثلث د ضلعو د اوږدوالی له جنسه:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

• د یوه مثلث د محیطي دایرې شعاع (R) مساوي دی په:

$$R = \frac{a}{2 \sin A} = \frac{b}{2 \sin B} = \frac{c}{2 \sin C} \Rightarrow 2R = \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

$$R = \frac{abc}{4S} \quad \text{یا}$$

• د یوه مثلث د محاطي دایرې شعاع د $r = \frac{S}{p}$ یا $r = \frac{\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}{p}$ فرمول څخه په لاس راځي.

د څپرګۍ پوښتنې

1- وښیاست چې د متساوي الاضلاع مثلث مساحت $S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$ دی، که a د مثلث یوه ضلع وي؟

2- که د یوه مثلث د ضلعو اوږدوالی $a = 7\text{cm}$ ، $b = 8\text{cm}$ او $c = 9\text{cm}$ وي، د دې مثلث مساحت پیدا کړئ؟

3- د جمعې د فورمولونو په مرسته $\cos 165^\circ$ او $\sin 165^\circ$ پیدا کړئ؟

4- $\sin(-165^\circ) = ?$ مساوي دی په:

a) $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

b) $\frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$

c) $\frac{-\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

5- وښیاست چې: $\frac{\cos 2\theta}{\sin \theta} - \frac{\sin 2\theta}{\cos \theta} = \frac{\cos 3\theta}{\sin \theta \cos \theta}$ دی.

6- د جمعې او تفاضل د فورمولونو په مرسته، د لاندېو زاویو مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ؟

$\sin(30^\circ + 45^\circ)$ $\cos(150^\circ - 45^\circ)$ $\tan(30^\circ + 60^\circ)$

$\sin(135^\circ + 180^\circ)$ $\sin(135^\circ - 180^\circ)$ $\tan(180^\circ - 45^\circ)$

7- د دوو زاویو د مثلثاتي نسبتونو د مجموعې او تفاضل د فورمولونو په مرسته، د لاندېنیو رابطو سموالی وښیاست.

$\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$ $\cos(90^\circ + \theta) = -\sin \theta$ $\cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$

$\sin(270^\circ + \theta) = -\cos \theta$ $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta$ $\sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta$

8- که $0^\circ < \theta < 90^\circ$ او $\sin \theta = \frac{2}{5}$ وي، د $\cos 2\theta$ ، $\sin 2\theta$ ، $\cos \frac{\theta}{2}$ او $\sin \frac{\theta}{2}$ قیمتونه په لاس راوړئ؟

9- وښیاست چې:

$\frac{\sin 2\theta}{\cos \theta} = 2 \sin \theta$ ، $\cos 2\theta + 1 = 2 \cos^2 \theta$ ، $\cos 2\theta + 2 \sin^2 \theta = 1$

$2 \cos^2 \theta - 2 \sin^2 \theta = 2 \cos 2\theta$ ، $\frac{\cos 2\theta}{\cos \theta + \sin \theta} = \cos \theta - \sin \theta$

10- که دیوه مثلث د ضلعو اوږدوالی په ترتیب سره 5cm ، 7cm او 8cm وي، د دې مثلث د محیطي او محاطي دایرو شعاع گانې پیدا کړئ؟

11- $\sin(180^\circ + \theta) = ?$

a) $\sin \theta$ b) $-\cos \theta$ c) $-\sin \theta$ d) $\cos \theta$

12- د جمعې او تفاضل د فورمولونو په مرسته وښیاست چې:

$\sin(360^\circ - \theta) = -\sin \theta$ او $\tan(180^\circ + \theta) = \tan \theta$ ، $\sec(360^\circ - \theta) = \sec \theta$

$\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta) = ?$ 13-

a) $2\sin \alpha \sin \beta$ b) $2\cos \alpha \cos \beta$ c) $-2\sin \alpha \sin \beta$

14- وښیاست چې: $\frac{\sin \alpha}{\sec 4\alpha} + \frac{\cos \alpha}{\csc 4\alpha} = \sin 5\alpha$ دی؟

15- لاندې د مثلثاتی نسبتونو ضرب حاصلونه د مجموعې او یا تفاضل په شکل ولیکئ؟


$\cos 100^\circ \sin 50^\circ$ ، $\cos 40^\circ \cos 60^\circ$

$\sin 80^\circ \cos 100^\circ$ ، $\sin \frac{3\theta}{2} \sin \frac{5\theta}{2}$

16- لاندې د مثلثاتی نسبتونو مجموعې او یا تفاضل د ضرب په حاصل په څېر ولیکئ؟

$\sin 80^\circ - \sin 72^\circ$ ، $\sin 12\theta + \sin 8\theta$

17- وښیاست چې: $\frac{\sin 5\theta + \sin 3\theta}{\cos 5\theta - \cos 3\theta} = -\cot \theta$ دی.



18- د یوې دایرې مساحت 180cm^2 دی، د دې دایرې د 80° قطاع مساحت پیدا کړئ.

19- د شکل مطابق د 60° مرکزي زاوې د مقابل قوس اوږدوالی (1cm) دی. د دې قوس شعاع او د وتر اوږدوالی یې پیدا کړئ؟

$$\frac{\tan 60^\circ - \tan 30^\circ}{1 + \tan 60^\circ \cdot \tan 30^\circ} = ? \quad -20$$

$$a) -\frac{1}{\sqrt{3}} \quad b) \frac{1}{\sqrt{3}} \quad c) \sqrt{3} \quad d) -\sqrt{3}$$

21- که $\sin \theta = \frac{3}{5}$ او د θ دویمه ضلع په لومړۍ ربع کې وي، $\sin 2\theta$ ، $\cos 2\theta$ او $\tan 2\theta$ پیدا کړئ؟

22- وښیاست چې: $\tan(45^\circ + \theta) = \frac{\cos \theta + \sin \theta}{\cos \theta - \sin \theta}$ دی؟

23- $\cos 37^\circ \cos 53^\circ - \sin 37^\circ \sin 53^\circ$ مساوي دی په:

a) 1 b) -1 c) 0 d) درې واړه ناسم دي

24- $\cos 60^\circ \cos 14^\circ + \sin 60^\circ \sin 14^\circ$ مساوي دی په:

a) $\cos 74^\circ$ b) $\cos 46^\circ$ c) $\sin 74^\circ$ d) $\sin 46^\circ$

25- $\cos 14^\circ \cos 31^\circ - \sin 14^\circ \sin 31^\circ$ مساوي دی په:

a) $\cos 17^\circ$ b) $\cos 45^\circ$ c) $\sin 17^\circ$ d) $-\sin 17^\circ$

26- $\cos 80^\circ \cos 35^\circ + \sin 80^\circ \sin 35^\circ$ مساوي دی په:

a) $\cos 115^\circ$ b) $\sin 115^\circ$ c) $\cos 45^\circ$ d) $\sin 45^\circ$

27- که $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ ، $\sin \beta = \frac{5}{13}$ وي، α او β په لومړنۍ ربع کې واقع وي $\cos(\alpha - \beta)$ پیدا کړئ؟

28- که $\cos \theta = -\frac{8}{17}$ ، $\cos \square = -\frac{3}{5}$ وي او د θ او $\square$ دویمې ضلعې په دریمه ربع کې واقع وي. $\cos(\theta - \square)$ پیدا کړئ؟

29- وښیاست چې: $\frac{\cos(x - y) - \cos(x + y)}{\cos(x - y) + \cos(x + y)} = \tan x \cdot \tan y$ دی.

$$\cos(0^\circ - t) = ? \quad -30$$

$$a) \sin t$$

$$b) \cos t$$

$$c) -\sin t \quad d) -\cos t$$

$$-31 \text{ وښیاست چې: } \frac{\cos \theta \cdot \sin 2\theta}{1 + \cos 2\theta} = \sin \theta \text{ دی؟}$$

$$\frac{\cos 8x + \cos 4x}{\cos 8x - \cos 4x} = -\cot 6x \cot 2x \quad -32 \text{ وښیاست چې:}$$

$$\frac{\sin 4x + \sin 6x}{\cos 4x - \cos 6x} = \cot x \quad ,$$

$$\frac{\sin x - \sin 3x}{\cos x + \cos 3x} = -\tan x$$

$$\frac{\sin x - \sin 3x}{\cos x - \cos 3x} = -\cot 2x \quad ,$$

$$\frac{\sin t + \sin 3t}{\cos t + \cos 3t} = \tan 2t$$

$$\cos(x+y) \cos y + \sin(x+y) \sin y \quad -33 \text{ افاده مساوي ده په:}$$

$$a) \sin x$$

$$b) \cos x$$

$$c) -\sin x$$

$$d) -\cos x$$

$$\sin(x-y) \cos y + \cos(x-y) \sin y = ? \quad -34$$

$$a) \sin x$$

$$b) \cos x$$

$$c) -\sin x$$

$$d) -\cos x$$

$$-35 \text{ د هغې قطاع مساحت چې شعاع یې } 2m \text{ او مرکزي زاویه یې } 0,5 \text{ radian وي، مساوي}$$

ده په:

$$a) 3m^2$$

$$b) 2m^2$$

$$c) 1m^2$$

$$d) \text{ درې واړه سمې نه دي}$$

$$-36 \text{ که د یوې دایرې د یوې قطاع مساحت } 200\text{cm}^2 \text{ او مرکزي زاویه یې } 2 \text{ radian وي، د}$$


دې دایرې شعاع مساوي ده په:

$$a) 14.14\text{cm}$$


$$b) -14.14\text{cm}$$

$$c) 14\text{cm}$$

$$d) \text{ درې واړه غلط دي.}$$



شیرم خیرکی مختلط عددونه



مختلط عددونه (Complex Numbers)

$$z = \sqrt{3} - 2i$$

Real Part of $z = ?$
Imaginary Part of
 $z = ?$

آيا ويلاى شى چې د $x^2 + 9 = 0$ معادله ولې د حقيقي عددونو په سټ کې حل نه لري؟
آيا پوهېږئ چې د حقيقي عددونو سټ د مختلطو عددونو د سټ يو فرعي سټ دی؟

موهومي عددونه (Imaginary Numbers):

$\sqrt{-1} = i$ يا $i^2 = -1$ دی د i توري له يوناني کلمې (iota) څخه اخيستل شوی دی چې $\sqrt{-1} = i$ ته، د موهومي عددونو واحد وايي.
لومړی مثال: $\sqrt{-16}$ پيدا کړئ.

$$\sqrt{-16} = \sqrt{(-1) \cdot 16} = \sqrt{-1} \sqrt{16} = i \sqrt{16} = \pm 4i$$

دويم مثال: د $x^2 + a^2 = 0$ معادله حل کړئ.
حل:

$$x^2 + a^2 = 0$$

$$x^2 = -a^2$$

$$x = \pm \sqrt{-a^2} = \pm \sqrt{(-1) \cdot (a^2)} = \pm a \sqrt{-1} = \pm ai$$

ai او $-ai$ موهومي عددونه دي (چې a يو حقيقي عدد دی).

د (i) طاقتونه (Powers of i):

ليدل کېږي چې د $i^2 = -1$ يا $i = \sqrt{-1}$ په مرسته موهومي عددونه ساده کولای شو. په یاد ولرئ چې د حقيقي عددونو مربع مثبت او د موهومي عددونو مربع منفي ده.

$$i = \sqrt{-1} \quad i^2 = (\sqrt{-1})^2 = -1 \quad i^3 = i^2 \cdot i = (-1) \cdot (i) = -i$$

$$i^4 = (\sqrt{-1})^4 = [(\sqrt{-1})^2]^2 = (-1)^2 = 1 \quad \text{يا} \quad i^4 = i^2 \cdot i^2 = (-1)(-1) = 1$$

$$i^5 = i^4 \cdot i = (1)(i) = i \quad i^6 = (i^4) \cdot (i^2) = (1) \cdot (-1) = -1$$

$$i^7 = (i)^6 \cdot (i) = (-1) \cdot (i) = -i \quad i^8 = i^7 \cdot i = (-i) \cdot (i) = -i^2 = -(-1) = 1$$

(i) ته موهومي واحد وايي.

له دې ځايه نتيجه په لاس راځي، که د موهومي واحد توان $n=4$ يا يوداسې عددوي چې پر څلورو د وېش وړ وي، نو له يوه (1) سره مساوي دی.

درېم مثال:

$$i^8 = i^4 \cdot i^4 = 1 \cdot 1 = 1$$

$$i^{12} = i^4 \cdot i^4 \cdot i^4 = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

$$i^{16} = i^4 \cdot i^4 \cdot i^4 \cdot i^4 = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

⋮

$$i^{4n} = i^4 \cdot i^4 \dots i^4 = 1$$

$$i^{4n+1} = i^{4n} \cdot i = 1 \cdot i = i$$

$$i^{4n+2} = i^{4n} \cdot i^2 = 1 \cdot (-1) = -1$$

$$i^{4n+3} = i^{4n} \cdot i^2 \cdot i = 1(-1)i = -i$$

فعالیت

$(i)^{61}, (i)^{-37}$ و $(i)^{256}$ طاقتونو قیمت پیدا کړئ.

څلورم مثال: i^{54}, i^{1998} او i^{89} پیدا کړئ.


حل: که د 54 عدد پر 4 ووېشو، پاتې (باقي) یې 2 ده، نو:

$$i^{54} = i^{52} \cdot i^2 = i^{4 \cdot 13} \cdot i^2 = (i^4)^{13} \cdot i^2 = (1) \cdot i^2 = (1) \cdot (-1) = -1$$

$$i^{1998} = i^{4(499)} \cdot i^2 = 1 \cdot i^2 = i^2 = -1$$

$$i^{89} = i^{4 \cdot 22} \cdot i = 1 \cdot i = i$$

هغه عددونه چې $\sqrt{-1}$ یې یو فکتور وي، د موهومي عددونو په نوم یادېږي. د 1 طبیعي توانونه یو له $i, 1, -i$ او -1 عددونو څخه دي. د حقیقي عددونو مربع مثبت اود موهومي عددونو مربع منفي ده.



د عددونو ستونه د تاریخ په اوږدوکې د اړتیاوو او د ریاضي د علم له انکشاف سره سم منځ ته راغلي دي، لکه: څرنګه چې پوهېږئ، د طبیعي عددونو سټ $IN = \{1,2,3,4,\dots\}$ ټولو مسائلو ته ځواب نه شي ویلای. د مثال په ډول د $3x = 0$ معادله د طبیعي عددونو په سټ کې حل نه لري، ښکاره خبره ده چې ځواب یې $x = 0$ دی، نو یو بل سټ ته

اړتیا پیدا شوه چې د مکملو عددونو سټ $W = \{0,1,2,3,\dots\}$ دی. دا سټ هم ځینو پوښتنو ته ځواب نه شي ورکولای، لکه: د $x + 2 = 0$ معادله د مکملو عددونو په سټ کې حل نه لري، ځکه چې ځواب یې $x = -2$ دی چې -2 د مکملو عددونو په سټ کې شامل نه دی، نو یو بل سټ ته اړتیا پیدا شوه چې منفي عددونه هم ولري چې د تامو عددونو د سټ (Integer Numbers set) یا $I = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ په نامه یادېږي، خو د عددونو په دې سټ کې هم د $2x + 1 = 2$ معادلې حل نشته، ځکه چې حل یې $x = \frac{1}{2}$ دی، نو د ناطقو عددونو سټ (Rational Numbers Set) منځ ته راغی خو د $x^2 - 2 = 0$ معادله د ناطقو یا ګویا عددونو په سټ کې هم حل نه لري، ځکه چې، ددې معادلې حل $x = \sqrt{2}$ دی چې $\sqrt{2}$ د غیرو ناطقو عددونو (Irrational Numbers) په سټ کې شامل دی، نو د غیر ناطقو عددونو سټ منځ ته راغی د ناطقو او غیر ناطقو عددونو د سیټونو مجموعې ته د حقیقي عددونو سټ (Real Numbers Set) وایي. خود حقیقي عددونو سټ هم ځینو پوښتنو ته ځواب نه شي ورکولای، لکه: د $x^2 + 16 = 0$ یا د $x^2 + 1 = 0$ د معادلو حل د حقیقي عددونو په سټ کې نه شته دی.

یا په بل عبارت منفي عددونه د حقيقي عددونو په سټ کې جفت جذر نه لري، لکه: $\sqrt{-25}$, $\sqrt{-16}$ او نور، خو هغه معادلې چې د حقيقي عددونو په سټ کې حل نه لري، د مختلطو عددونو په سټ کې حل لري. په 1795م. کال کې یو جرمني ریاضي پوه گوس (Gauss) د مختلطو عددونو مفهوم په لاندې ډول وړاندې کړ. که یو مختلط عدد په Z سره وښایو $z = a + bi$ چې د یو مختلط عدد معیاري شکل دی چې a د z عدد حقيقي برخه (Real Part of z) او bi د z د مختلط عدد موهومي برخه (Imaginary Part of z) ده، د مختلطو عددونو سټ داسې تعریف کېږي: $C = \{z \mid z = a + bi, a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$ د Z یو مختلط عدد د یوې مرتبې جوړې په شکل هم لیکلای شو: $z = a + bi = (a, b)$, $z = a - bi = (a, -b)$ که $a=0$ شي: $Z = 0 + bi = bi$ چې ته خالص موهومي عدد (Pure imaginary number) وایي او که $b = 0$ وي، نو $z = a + 0 \cdot i = a$ چې a یو خالص حقيقي عدد (Pure real number) دی، په یاد ولرئ چې مختلط عددونه، لکه: حقيقي عددونه د ترتیب خاصیت نه لري.

صفری مختلط عدد (Zero Complex Number):

هغه عدد دی چې حقيقي او موهومي دواړه برخې یې صفرونه وي. $(b = 0 \quad a = 0)$ ، نو $z = a + bi = 0 + 0i = 0$ صفری مختلط عدد دی.

فعالیت

په $4 + 3i$ او $2 - 5i$ مختلطو عددونو کې حقيقي او موهومي برخې وښیاست.

لومړی مثال: د $1 - i$, $\sqrt{3} - 3i$, $5i$ او $2 - 5i$ په مختلطو عددونو کې حقيقي او موهومي برخې وښیاست.

حل: په $1 - i$ کې حقيقي برخه یې 1 او موهومي برخه یې $-i$ ده.

د $\sqrt{3} - 3i$ مختلط عدد کې حقيقي برخه يې $\sqrt{3}$ او موهومي برخه يې $-3i$ ده، په $2 - 5i$ مختلط عدد کې حقيقي برخه يې 2 او موهومي برخه يې $-5i$ ده. په $5i$ کې حقيقي برخه صفر او موهومي برخه يې $5i$ ده.

دويم مثال: د $6i$, -9 , 0 , $9 - i$ او $i - 1$ مختلط عددونه په معياري شکل (Standard Form) وليکئ.

حل: څرنگه چې $z = a + bi$ ته د مختلط عدد معياري شکل وايي چې a ته د مختلط عدد حقيقي برخه او bi يې موهومي برخه ده. په لاندې جدول کې پورتنی مختلط عددونه په معياري شکل بنودل شوي دي.

مختلط عددونه	معياري شکل ($z = a + bi$)
$6i$	$0 + 6i$
-9	$-9 + 0i$
0	$0 + 0i$
$9 - i$	$9 - i$
$i - 1$	$-1 + i$

$z = a + bi$ د يوه مختلط عدد معياري شکل دی چې a ته د مختلط عدد حقيقي برخه او bi يې موهومي برخه ده، که $a=0$ وي، نو bi خالصه موهومي برخه او که $b=0$ وي، نو a د مختلط عدد خالصه حقيقي برخه ده او هغه معادلې چې د حقيقي عددونو په سټ کې حل نه لري، د مختلطو عددونو په سټ کې حل لري.

پوښتنې

1- د $(i)^{-33}, (i)^{79}, (i)^{202}, (2i)^2$ او $(3i)^2$ قیمتونه پیدا کړئ.

2- لاندې عددونه د مختلطو عددونو په معیاري شکل ولیکئ.

$$-i-4, \quad 5i, \quad -4i+\sqrt{2}, \quad -3i$$

3- $7-i, 5+3i, -3i$ مختلط عددونه د مرتبو جوړو په شکل ولیکئ.

4- $-i$ په مختلط عدد کې حقیقي برخه مساوي ده په:

$$a) 1, \quad b) -1, \quad c) 0, \quad d) 2$$

5- د $\sqrt{-16}$ عدد جذر مساوي دی په:

$$a) \pm 4, \quad b) -4, \quad c) \pm 4i, \quad d) \pm 2$$

د موهومي عددونو څلورگونې عمليې

$$4i + 3i = 7i$$

$$4i - 3i = i$$

$$4i - (-3i) = 7i$$

آيا د $3i$ او $4i$ موهومي عددونه جمع کولای

شئ؟

آيا د $10i$ او $50i$ موهومي عددونو د ضرب

حاصل يو حقيقي عدد دی؟

د موهومي عددونو جمع او تفریق: موهومي عددونه کولای شو چې په لاندې ډول يې جمع او تفریق کړو.

a: د جمعي عمليه: د دوو موهومي عددونو د جمعي حاصل يو موهومي عدد دی.

لومړی مثال: د $(7i + 8i)$ او $5i$ او $\sqrt{7}i$ د جمعي حاصل پيدا کړئ.

حل:

$$7i + 8i = (7 + 8)i = 15i$$

$$\sqrt{7}i + 5i = (\sqrt{7} + 5)i$$

b: د تفریق عمليه: د دوو عددونو د تفریق حاصل يو موهومي عدد دی.

دویم مثال: $7i - 4i$ او $9i - 13i$ د تفریق حاصل پيدا کړئ.

$$7i - 4i = (7 - 4)i = 3i$$

$$9i - 13i = (9 - 13)i = -4i$$

c: د ضرب عمليه: د دوو موهومي عددونو د ضرب حاصل يو حقيقي (Real number) عدد دی.

دریم مثال: د $(10i) \cdot (5i)$ او $(\sqrt{9}i) \cdot (\sqrt{4}i)$ د ضرب حاصل پيدا کړئ.

$$(10i) \cdot (5i) = (10) \cdot (5) \cdot i \cdot i = 50i^2 = -50$$

حل:

ځکه چې $i^2 = -1$ دی نو $50i^2 = 50 \cdot (-1) = -50$ چې -50 يو حقيقي عدد

(Real number) دی.

$$(\sqrt{4}i) \cdot (\sqrt{9}i) = \sqrt{4 \cdot 9} \cdot i \cdot i = \sqrt{36} \cdot i^2 = 6 \cdot (-1) = -6$$

د موهومي عددونو د ضرب په عملیه کې د تبدیلی خاصیت (Commutative Property)

$$\boxed{(ai) \cdot (bi) = (bi) \cdot (ai) = -ab} \quad \text{صدق کوي یعنې:}$$

فعالیت

$$\left(\frac{2}{3}i\right) \cdot \left(-\frac{3}{5}i\right) \text{ د ضرب حاصل په لاس راوړئ.}$$

d : د وېش عملیه: د دوو موهومي عددونو د وېش حاصل یو حقیقي عدد دی.

$$\text{څلورم مثال: } \frac{\sqrt{-7}}{\sqrt{-5}}, \frac{5i}{7i} \text{ او } \frac{\sqrt{13}i}{\sqrt{3}i} \text{ د وېش حاصل په لاس راوړئ.}$$

حل:

- 1) $\frac{5i}{7i} = \frac{5}{7}$ ($\frac{5}{7}$ یو حقیقي عدد دی)
- 2) $\frac{\sqrt{13}i}{\sqrt{3}i} = \frac{\sqrt{13}}{\sqrt{3}}$ ($\frac{\sqrt{13}}{\sqrt{3}}$ یو حقیقي عدد دی)
- 3) $\frac{\sqrt{-7}}{\sqrt{-5}} = \frac{\sqrt{-1}}{\sqrt{-1}} \cdot \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{7}i}{\sqrt{5}i} = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{5}}$

فعالیت

$$36i \text{ پر } -2i \text{ ووېشئ.}$$

د موهومي عددونو د جمعي او ضرب په عملیو کې د تبدیلی خاصیت صدق کوي. د دوو موهومي عددونو د ضرب او وېش حاصل یو حقیقي عدد دی.

پوښتنې

$$(1) \text{ جمع یې کړئ. } \sqrt{-1}b + \sqrt{-1}c, \quad \sqrt{-7} + \sqrt{-4}, \quad \sqrt{7}i + \sqrt{7}i$$

$$(2) \text{ تفریق یې کړئ. } \sqrt{5}i - \sqrt{5}i, \quad 12i - 7i, \quad 5i - 2i$$

$$(3) \text{ لاندې موهومي عددونه سره ضرب او تقسیم کړئ.}$$

$$\frac{13i}{26i}, \frac{16i}{-4i}, \quad (3i) \cdot (5i), \quad (\sqrt{7}i) \cdot (-7i), \quad \left(\frac{7}{4}i\right) \cdot \left(-\frac{2}{9}i\right)$$

د مختلطو عددونو د جمعې او تفریق عمليې:

$$(1+2i)+(-1-2i)=0$$

آیا د $3x - 2yi = 6 + i$ له مساوات څخه د x

او y قیمتونه په لاس راوړلای شئ؟

آیا پوهېږئ چې کوم عدد ته د مختلطو عددونو د

جمعې د عمليې د عینیت عنصر وایي؟

مساوي مختلط عددونه (Equal Complex Numbers): دوه مختلط عددونه

هغه وخت سره مساوي دي چې د دواړو عددونو حقيقي او موهومي برخې یو له بله سره مساوي

وي. د $z_1 = a + bi$ او $z_2 = x + yi$ عددونه هغه وخت سره مساوي دي چې $x=a$ او $y=b$ وي.

لومړی مثال: که چېرې $z_1 = x_1 + 2y_1i$ او $z_2 = 3 - 5i$ وي، نو هغه وخت $z_1 = z_2$ دی چې: $x_1 = 3$ او $y_1 = -\frac{5}{2}$ وي.

فعالیت

1- که چېرې $z_1 = \sqrt{2}x + \sqrt{3}yi$ او $z_2 = -5 - 6i$ وي، د $z_1 = z_2$ له مخې د x او y قیمتونه پیدا کړئ.

2- که چېرې $2 + mi = k + 3i$ وي د m او k حقيقي عددونو قیمت پیدا کړئ.

د مختلطو عددونو د جمعې عمليې: د مختلطو عددونو د جمعې عمليې داسې تعريف شوې

ده. که چېرې $z_1 = a + bi$ او $z_2 = c + di$ وي، نو:

$$z_1 + z_2 = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d) \cdot i$$

یا په بل عبارت د دوو مختلطو عددونو د جمعې حاصل یو بل داسې مختلط عدد دی چې حقیقي برخه یې د دواړو عددونو د حقیقي برخو او موهومي برخه یې د دې دواړو عددونو د موهومي برخو له مجموعې څخه په لاس راغلي وي.

دویم مثال: که چېرې $z_1 = 2 - 3i$ او $z_2 = 3 + 4i$ وي، $z_1 + z_2$ پیدا کړئ

$$z_1 + z_2 = (2 - 3i) + (3 + 4i) = (2 + 3) + (-3 + 4)i = 5 + i$$

په همدې ډول:

$$(3 - 4i) + (-2 + 6i) = (3 - 2) + (-4 + 6)i = 1 + 2i$$

$$(-9 + 7i) + (3 - 15i) = (-9 + 3) + (7 - 15)i = -6 - 8i$$

$0 + 0i$ د مختلطو عددونو د جمعې د عملیې د عینت عنصر (additive identity) دی، ځکه

$$(a + bi) + (0 + 0i) = (a + 0) + (b + 0)i = a + bi \quad \text{چې:}$$

همدارنگه د $a + bi$ عدد جمعې معکوس (additive inverse) د $-a - bi$ عدد دی، ځکه

$$(a + bi) + (-a - bi) = (a - a) + (b - b)i = 0 + 0i$$

چې:

فعالیت

د $(3x - yi) + (5x + 3yi)$ د جمعې حاصل په لاس راوړئ.

د مختلطو عددونو د تفریق عملیه: د دوو مختلطو عددونو د تفریق حاصل یو بل داسې

مختلط عدد دی چې حقیقي برخه یې د حقیقي برخو او موهومي برخه یې د موهومي برخو د تفریق

له حاصل څخه په لاس راغلي وي یعنې: $(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$

لومړی مثال: $(-4 + 3i) - (6 - 7i) = (-4 + 3i) + (-6 + 7i) = -10 + 10i$

دویم مثال: $(12 - 5i) - (8 - 3i) = (12 - 8) + (-5 + 3)i = 4 - 2i$

دوه مختلط عددونه هغه وخت سره مساوي دي چې د دواړو عددونو حقيقي او موهومي برخې يو له بله سره مساوي وي. د دوو مختلطو عددونو د جمعي حاصل يو داسې مختلط عدد دی چې حقيقي برخه يې د حقيقي برخو او موهومي برخه يې د موهومي برخو له مجموعې څخه په لاس راغلي وي، په همدې ډول د دوو مختلطو عددونو د تفریق حاصل يو داسې مختلط عدد دی چې حقيقي برخه يې د دواړو عددونو د حقيقي برخو او موهومي برخه يې د دواړو عددونو د موهومي برخو له حاصل تفریق څخه په لاس راغلي وي.

پوښتنې

1- لاندې مختلط عددونه جمع کړئ.

$$\begin{aligned} (2 + 5i) + (3 + 4i) & , & (13 - 12i) + (13 + 12i) \\ (-3 + 6i) + (10 - 7i) & , & (\sqrt{3} - ci) + (d + 5ci) \end{aligned}$$

2- لاندې مختلط عددونه يو له بله تفریق کړئ.

$$\begin{aligned} (5 - i) - (7 + 3i) \\ (2\sqrt{3} + 5 \cdot \sqrt{7} i) - (\sqrt{3} + 3\sqrt{7} i) \\ (3c + 4di) - (3c + 8di) \end{aligned}$$

3- د لاندې مختلطو عددونو جمعي معکوس پيدا کړئ.

$$2 + 3i , (2, -3) , \sqrt{2} + \sqrt{3} i$$

4- که $(x, y \in IR)$ او $3x + 2iy - ix + 5y = 7 + 5i$ وي، د x او y قيمتونه پيدا کړئ.

5- لاندې عمليې سرته ورسوئ او خپل ځوابونه د $a + bi$ په شکل وليکئ

$$(2 + 3i) + (-5 + 2i)$$

$$(-5 - 4i) - (-2 - \sqrt{2}i)$$

$$(2 + 3i) + (-5 - i)$$

$$(6 - 5i) + (3 + 2i)$$

$$(3.7 + 6.1i) - (1 + 5.9i)$$

$$(8 + \frac{3}{4}i) - (-7 + \frac{2}{3}i)$$

$$(-6 - \frac{5}{8}i) + (4 + \frac{1}{2}i)$$

$$(-2 + 5i) + (3 - i)$$

$$(3 + \frac{3}{5}i) - (-11 + \frac{7}{15}i)$$

$$(-4 - \frac{5}{6}i) + (13 + \frac{3}{8}i)$$

$$(-7 - \sqrt{-72}) + (8 + \sqrt{-50})$$

$$(\sqrt{3} + \sqrt{-2}) - (\sqrt{12} + \sqrt{8})$$

6- د لاندې مختلطو عددونو جمعې معکوس پیدا کړئ.

$$2 - 3i$$

$$8 + 11i$$

$$1 - i$$


$$-1 + i$$

$$5 - 8i$$

$$-13 + 13i$$

$$-5i$$

$$2i$$



د مختلطو عددونو ضرب

آيا کولای شئ چې د $(2-3i)(3+4i)$

مختلطو عددونو د ضرب حاصل په لاس

راوړئ؟

د $i^2 = -1$ په نظر کې نیولو سره د دوو مختلطو عددونو ضرب په لاندې ډول دی که:

$z_1 = a + bi$ او $z_2 = c + di$ وي.

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = ac + adi + bci + bdi^2$$

$$= ac + adi + bci + bdi^2$$

$$= ac + (ad + bc)i + bd(-1)$$

$$z_1 \cdot z_2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

لومړی مثال: د $(5-4i) \cdot (7-2i)$ د ضرب حاصل په لاس راوړئ.

حل:

$$(5-4i)(7-2i) = 5(7) + 5(-2i) + (-4i)(7) - 4i(-2i) = 35 - 10i - 28i + 8i^2$$

$$= 35 - 38i + 8(-1)$$

$$= 35 - 38i - 8$$

$$= 27 - 38i$$

فعالیت

د $(2-3i)(3+4i)$ د ضرب حاصل په لاس راوړئ.

څرنگه چې $(a+bi)(1+0i) = a \cdot 1 + a \cdot 0i + bi \cdot 1 + bi \cdot 0i = a + bi$ دی، نو $1+0i$ ته

د مختلطو عددونو د ضرب د عمليې د عینیت عنصر (Multiplicative identity) وایي

$$(3+5i)(1+0i) = 3+5i$$

لکه:

د یوه مختلط عدد مزدوج (Conjugate of a Complex Number):

د $z = x + yi$ د مختلط عدد مزدوج $\bar{z} = x - yi$ دی په دې ډول چې:

$$z \cdot \bar{z} = (x + yi) \cdot (x - yi) = x^2 - (yi)^2 = x^2 + y^2$$

$$z \cdot \bar{z} = x^2 + y^2$$

$$z + \bar{z} = (x + yi) + (x - yi) = 2x \quad , \quad 2x \operatorname{Re}(z)$$

$$z - \bar{z} = (x + yi) - (x - yi) = 2yi \quad , \quad 2yi \operatorname{Im}(z)$$

دویم مثال: د $z = 3 + 4i$ د عدد مزدوج $\bar{z} = 3 - 4i$ دی، $z + \bar{z}$ او $z \cdot \bar{z}$ په لاس راوړئ:

$$z \cdot \bar{z} = (3 + 4i) \cdot (3 - 4i) = 3(3) + 3(-4i) + 4i(3) + 4i(-4i)$$

$$= 9 - 16i^2 = 9 - 16(-1) = 9 + 16 = 25$$

$$z + \bar{z} = (3 + 4i) + (3 - 4i) = 6$$

(6 یو حقیقي عدد دی)

$$z - \bar{z} = (3 + 4i) - (3 - 4i) = 8i$$

(8i یو موهومي عدد دی)

فعالیت

د $z_1 = 5 - 3i$ ، $z_2 = 7 + i$ او $z_3 = \sqrt{5} + \sqrt{7}i$ مختلطو عددونو مزدوجونه پیدا کړئ.

څرنګه چې ومولیدل، د یو مختلط عدد د مزدوج د پیدا کولو لپاره، یوازې د موهومي برخې علامه تغیروو لکه:

مزدوج یې	عدد
i	-i
1+i	1-i
-4-2i	-4+2i
-5i-6	5i-6

د یو مختلط عدد ضربی معکوس (Multiplicative inverse)

پوهېږو چې د $a + bi$ د عدد مزدوج $a - bi$ دی او

$$(a + bi) \cdot (a - bi) = a^2 - (b^2 i^2) = a^2 - b^2(-1) = a^2 + b^2$$

د $a + bi$ عدد د ضربي معکوس د پیدا کولو له پاره د $\frac{1}{a + bi}$ عدد د مختلط عدد په معیاري شکل لیکو، نو د $\frac{1}{a + bi}$ د عدد صورت او مخرج په $a - bi$ کې ضربوو. $(a - bi)$ د مخرج مزدوج دی.

$$\frac{1}{a + bi} \cdot \frac{a - bi}{a - bi} = \frac{(a - bi)}{(a + bi)(a - bi)} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}i$$

$$\frac{1}{a + bi} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}i$$

د $(a + bi)$ د عدد ضربي معکوس $(\frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}i)$ دی.

دریم مثال: د $2 - 3i$ د عدد ضربي معکوس پیدا کړئ.

$$\frac{1}{2 - 3i} \cdot \frac{2 + 3i}{2 + 3i} = \frac{2 + 3i}{4 - 9i^2} = \frac{2 + 3i}{4 + 9} = \frac{2 + 3i}{13} = \frac{2}{13} + \frac{3}{13}i$$

څلورم مثال: د $x^2 + 4$ افاده تجزیه کړئ.

$$x^2 + 4 = x^2 - (-1) \cdot 4 = x^2 - (i)^2 \cdot 4 = x^2 - (2i)^2 = (x - 2i)(x + 2i)$$

فعالیت

د $5 + 3i$ او $\sqrt{2} - 4i$ مختلطو عددونو ضربي معکوس پیدا کړئ.

که چېرې $z = x + yi$ او $w = x' + y'i$ دوه مختلط عددونه وي، نو $z \cdot w$ په دې ډول تعریف

$$z \cdot w = (xx' - yy') + (xy' + x'y)i$$

شوی دی.

دیو مختلط عدد د مزدوج د پیدا کولو لپاره یوازې د موهومي برخې علامه تغیر او $a + bi$ د مختلط

عدد ضربي معکوس $(\frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}i)$ دی.

پوښتنې

1- لاندې مختلط عددونه سره ضرب کړئ.

$$\begin{array}{ll} (2+i)(3-2i) & , \quad (3+i)(3-i) \\ (-2+3i)(4-2i) & , \quad (2-5i)(2+5i) \\ (5+2i)(5-3i) & , \quad (\sqrt{6}+i)(\sqrt{6}-i) \\ (\sqrt{3}+\sqrt{2}i)(\sqrt{3}-\sqrt{2}i) & \end{array}$$

2- د لاندې مختلطو عددونو ضربې معکوس پیدا کړئ.

$$1-i \quad , \quad 2+4i \quad , \quad 5-3i \quad , \quad 3a-4bi \quad , \quad (7,4)$$

3- لاندې افادې تجزیه کړئ.

$$x^2+16 \quad , \quad x^2+8 \quad , \quad x^2+5 \quad , \quad x^2+7$$


4- د $(-3+2i)^2$ او $(2+i)^2$ قیمتونه په لاس راوړئ.

5- که $z=4-3i$ وي، $8z-z^2$ پیدا کړئ.

6- دا معادله حل کړئ. $x+yi=(2-3i)(2+3i)$.

7- وښایست چې: $\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$ د i مربع جذر دی.

8- وښایست چې: $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$ د $-i$ دریم جذر دی.



د دوو مختلطو عددونو وېش Division of two complex numbers

آيا د $\frac{-2-2i}{-5+6i}$ د وېش حاصل (خارج
قسمت) په لاس راوړلای شى؟

څرنگه چې د $\frac{a+bi}{c+di}$ عدد په مخرج کې c حقيقي عدد او di موهومي عدد دى، نو لومړى بايد
مخرج په حقيقي عدد بدل کړو، ددې لپاره صورت او مخرج، د مخرج په مزدوج کې ضربوو چې
دې عمليې ته گویاکول (Rationalization) وايي.

لومړى مثال: د $\frac{4+3i}{2+5i}$ د وېش حاصل په لاس راوړئ.

حل: د $2+5i$ مزدوج $2-5i$ دى، صورت او مخرج د مخرج په مزدوج يا $2-5i$ کې
ضربوو.

$$\begin{aligned}\frac{4+3i}{2+5i} &= \frac{4+3i}{2+5i} \cdot \frac{2-5i}{2-5i} = \frac{8-20i+6i-15i^2}{4-10i+10i-25i^2} = \frac{8-14i-15(-1)}{4-25(-1)} \\ &= \frac{23-14i}{29} = \frac{23}{29} - \frac{14}{29}i\end{aligned}$$

ليدل کېږي چې د وېش په حاصل کې حقيقي او موهومي برخې سره جلا دي.

فعاليت

د $\frac{1+i}{1-i}$ د وېش حاصل په لاس راوړئ او خپل ځواب د مختلط عدد په معياري شکل وليکئ.

تعریف

که $z_1 = a + bi$ و $z_2 = c + di$ وي، $\frac{z_1}{z_2}$ په لاندې ډول تعريف شوی دی

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{ac - adi + bci - bdi^2}{c^2 - d^2i^2} = \frac{ac + bd - (ad - bc)i}{c^2 + d^2}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} - \frac{ad - bc}{c^2 + d^2}i$$

دویم مثال: د $z_1 = 2 - 3i$ عدد پر $z_2 = 1 + i$ وېشئ او بیا یې امتحان کړئ.

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2 - 3i}{1 + i} = \frac{(2 - 3i)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{-1 - 5i}{2} = -\frac{1}{2} - \frac{5}{2}i$$

$$(1 + i)\left(-\frac{1}{2} - \frac{5}{2}i\right) = -\frac{1}{2} - \frac{5}{2}i - \frac{1}{2}i - \frac{5}{2}i^2 = -\frac{1}{2} - 3i + \frac{5}{2} = 2 - 3i$$

درېم مثال: د $\frac{3+2i}{5-i}$ د وېش حاصل په لاس راوړئ.

حل:

$$\frac{3+2i}{5-i} = \frac{(3+2i)(5+i)}{(5-i)(5+i)} = \frac{15+3i+10i+2i^2}{25-i^2} = \frac{15+13i-2}{25+1} = \frac{13+13i}{26} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$$

که $z = x + yi$ او $w = x' + y'i$ دوه مختلط عددونه وي، نو $\frac{z}{w}$ داسې تعريف شوی دی.

$$\frac{z}{w} = \frac{xx' + yy'}{x'^2 + y'^2} + \frac{x'y - xy'}{x'^2 + y'^2}i, \quad (x'^2 + y'^2 \neq 0)$$

د یو مختلط عدد د مزدوج خاصیتونه:

که z_1 او z_2 دوه مختلط عددونه وي:

$$1) \quad \overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$$

$$2) \quad \overline{z_1 - z_2} = \overline{z_1} - \overline{z_2}$$

$$3) \overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2} = \overline{z_2} \cdot \overline{z_1}$$

$$4) \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$$

$$5) z + \bar{z} = 2x$$

$$6) z - \bar{z} = 2yi$$

$$7) \overline{\overline{z}} = z$$

لومړۍ مثال: که $z_1 = 4 + 5i$ او $z_2 = -3 + 2i$ وي، وښیاست چې:

$$\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2} \quad \text{او} \quad \overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$$

حل:

$$z_1 + z_2 = (4 + 5i) + (-3 + 2i) = 1 + 7i \Rightarrow \overline{z_1 + z_2} = 1 - 7i$$

$$\overline{z_1} + \overline{z_2} = (4 - 5i) + (-3 - 2i) = 1 - 7i$$

$$\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2} \quad \text{په پایله کې}$$

$$z_1 \cdot z_2 = (4 + 5i) \cdot (-3 + 2i) = -12 - 10 + (8 - 15)i = -22 - 7i$$

$$\Rightarrow \overline{z_1 \cdot z_2} = -22 + 7i$$

$$\overline{z_1} \cdot \overline{z_2} = (4 - 5i) \cdot (-3 - 2i) = -12 - 8i + 15i + 10i^2 = -12 - 8i + 15i - 10 = -22 + 7i$$

$$\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2} = -22 + 7i \quad \text{په پایله کې}$$

دویم مثال: که $z = x + yi$ وي $z + \bar{z}$ او $z - \bar{z}$ پیدا کړئ.

$$\text{حل: } z + \bar{z} = (x + yi) + (x - yi) = 2x, \quad z - \bar{z} = (x + yi) - (x - yi) = 2yi$$

فعالیت

که $z = 2 + 3i$ وي، $\overline{\overline{z}}$ ، $\overline{z + \bar{z}}$ او $\overline{z - \bar{z}}$ پیدا کړئ.

پوښتنې

1- د وېش حاصل يې پيدا کړئ:

$$\frac{7-i}{3-5i}, \quad \frac{5-2i}{6-i}, \quad \frac{3-4i}{2-5i}, \quad \frac{1+i}{1-i}$$

2- که $z_1 = -a - 3bi$ او $z_2 = 2a - 3bi$ وي. وښايست چې:

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}} \quad \text{او} \quad \overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2} \quad \text{دی.}$$

3- د وېش حاصل پيدا کړئ او خپل ځوابونه د $a + bi$ په شکل وليکئ.

$$a : \frac{2}{5-i} \quad b : \frac{3-i}{2+i} \quad c : \frac{2-3i}{3}$$

4- د $\frac{6+\sqrt{-36}}{3+\sqrt{-9}}$ د وېش حاصل مساوي دی په:

$$a : 1 \quad b : 2 \quad c : 3i \quad d : -2$$

5- خپل ځوابونه د $a + bi$ په شکل وليکئ.

$$\frac{3+4i}{4i} \quad \frac{-5}{2-3i} \quad \frac{6}{1+3i}$$

$$\frac{7}{7-2i} \quad \frac{-4+8i}{2-4i} \quad \frac{3-2i}{-6+4i}$$

$$\frac{1}{i}$$

د مختلطو عددونو په ساحه کې د دویمې درجې یو مجهوله معادلې حل:

$$x^2 + x + 4 = 0$$

$$x_1 = ?$$

$$x_2 = ?$$

آیا د $x^2 + x + 4 = 0$ معادلې جذرونه پیدا

کولای شئ؟

د یوې دویمې درجې یو مجهوله معادلې عمومي شکل $ax^2 + bx + c = 0$ ، $(a \neq 0)$ دی. که $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ معادله دوه د مختلفو علامو لرونکي حقيقي جذرونه لري. که $\Delta = 0$ معادله دوه مساوي جذرونه لري. که $\Delta < 0$ معادله د حقيقي عددونو په سټ کې حل نه لري، خو د مختلطو عددونو په ساحه کې دوه جذرونه لري.

لومړی مثال: د $x^2 - 10x + 26 = 0$ معادله حل کړئ.

حل: $a = 1$ $b = -10$ $c = 26$ دی.

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{10 \pm \sqrt{(-10)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 26}}{2 \cdot 1} = \frac{10 \pm \sqrt{-4}}{2}$$

$$= \frac{10 \pm 2i}{2} = 5 \pm i \quad \Rightarrow \quad x_1 = 5 + i \quad x_2 = 5 - i$$

فعالیت

دا جذرونه په پورتنۍ معادله کې وضع او امتحان یې کړئ.

دویم مثال: د $4x^2 + 4ix + 15 = 0$ معادله حل کړئ.

حل:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (4i)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 15 = 16i^2 - 240 = -256$$

$$\pm \sqrt{\Delta} = \pm \sqrt{-256} = \pm \sqrt{256(-1)} = \pm 16i$$

$$x_1 = \frac{-4i + 16i}{2 \cdot 4} = \frac{12i}{8} = \frac{3}{2}i$$

$$x_2 = \frac{-4i - 16i}{8} = -\frac{5}{2}i$$

دريم مثال: $x^2 + 3ix - 2 = 0$ معادله د محمد بن موسی د فورمول په مرسته، د مختلطو عددونو په ساحه کې حل کړئ.

$$\Delta = b^2 - 4ac = (3i)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2) = 3^2 \cdot i^2 + 8 = -9 + 8 = -1$$

$$\pm \sqrt{\Delta} = \pm \sqrt{-1} = \pm i$$

$$x_{1,2} = \frac{-3i \pm i}{2 \cdot 1} \quad x_1 = \frac{-4i}{2} = -2i \quad x_2 = \frac{-2i}{2} = -i$$

فعالیت

د $x^2 + 3 = 0$ ، $x^2 - 6x + 18 = 0$ او $x^2 - 4x + 13 = 0$ معادلې حل کړئ.

پوښتنې

(1) هغه دویمه درجه معادله پیدا کړئ چې جذرونه یې $(3 + 2i)$ او $(3 - 2i)$ وي.
(2) لاندې معادلې حل کړئ.

$$x^2 - 4x + 13 = 0 \quad , \quad x^2 - 6x + 18 = 0 \quad , \quad -4x^2 + 3x - 5 = 0$$

$$x^2 + 8x + 41 = 0 \quad , \quad x^4 - 1 = 0 \quad , \quad 3x^2 + x + 2 = 0$$

(3) داسې دویمې درجې معادلې په لاس راوړئ چې جذرونه یې په لاندې ډول راکړل شوي دي.

$2 + 5i$, $2 - 5i$	$1 + i$, $1 - i$
$4i$, $-4i$	$5i$, $-5i$
$2i$, $3i$	i , $\frac{1}{i}$
$\frac{2}{3} + \frac{1}{2}i$, $\frac{2}{3} - \frac{1}{2}i$	$2 - i$, $2 + i$

د څپرکي لنډيز

• منفي عددونه د حقيقي عددونو په سټ کې جفت جذرنه لري، خو د مختلطو عددونو په سټ کې منفي عددونه جفت جذر لري.

• مختلط عددونه د حقيقي او موهومي عددونو له يو ځای کېدو څخه په لاس راځي.

• د حقيقي عددونو مربع مثبت، خو د موهومي عددونو مربع منفي ده

$$i^2 = -1 \Rightarrow i = \sqrt{-1}$$

• داسې عددونو ته چې $\sqrt{-1}$ يې يو فکتور وي، موهومي عددونه وايي.

• د مختلطو عددونو سټ C په لاندې ډول تعريف شوی دی:

$$C = \{z / z = a + bi, a, b \in \mathbb{R}, i = \sqrt{-1}\}$$

• د يو مختلط عدد معياري شکل $z = a + bi$ دی چې a ته د z د عدد حقيقي برخه او bi ته د z

موهومي برخه وايي يا $a = \text{Re}(z)$ او $bi = \text{Im}(z)$

• د i د مختلفو توانونو د پيدا کولو لپاره د i توان پر 4 وېشو چې له يوه سره مساوي کېږي او که پوره

پرې نه وېشل کېږي، نو د i د توري توان پر 4 د وېشلو له پاتې (باقي مانده) سره مساوی دی، لکه:

$$i^{4k+r} = i^r \quad \text{يا} \quad i^{4k+4} \cdot i^3 = (1)(i)^3 = -i \quad \text{يا} \quad i^{1379} = i^{4 \cdot 344} \cdot i^3$$

• که د $z = a + bi$ په مختلط عدد کې $b = 0$ وي، نو a ته خالص حقيقي عدد او که

$a = 0$ وي، bi ته خالص موهومي عدد وايي.

• هغه مختلط عدد چې حقيقي او موهومي برخې يې دواړه صفرونه وي، صفري مختلط عدد ورته

وايي. ($a = 0, b = 0$)

• دوه مختلط عددونه هغه وخت سره مساوي دي چې د دواړو عددونو حقيقي او موهومي برخې

$$\text{Im}(z_1) = \text{Im}(z_2) \quad \text{او} \quad \text{Re}(z_1) = \text{Re}(z_2) \quad \text{وي.}$$

• د دوو مختلطو عددونو د جمعې حاصل يو بل داسې مختلط عدد دی چې حقيقي برخه يې د

دواړو عددونو د حقيقي برخو او موهومي برخه يې د دواړو عددونو د موهومي برخو له مجموعې

څخه عبارت ده.

- د دوو مختلطو عددونو د تفریق حاصل داسې یو مختلط عدد دی چې حقیقي برخه یې د دواړو عددونو د حقیقي برخو او موهومي برخه یې د دواړو عددونو د موهومي برخو د تفریق له حاصل څخه عبارت ده.

• که $z_1 = x_1 + y_1 i$ او $z_2 = x_2 + y_2 i$ وي، نو د مختلطو عددونو د جمعې، تفریق، ضرب او وېش عمليې داسې تعریف شوي دي.

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)i$$

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + (y_1 - y_2)i$$

$$z_1 \cdot z_2 = x_1 x_2 - y_1 y_2 + (x_1 y_2 + y_1 x_2)i$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + \frac{y_1 x_2 - y_2 x_1}{x_2^2 + y_2^2} i, \quad (z_2 \neq 0)$$

• د $z = x + yi$ مختلط عدد مزدوج له $\bar{z} = x - yi$ څخه عبارت دی.

$$z\bar{z} = x^2 + y^2$$

$$z + \bar{z} = 2x$$

$$z - \bar{z} = 2yi$$

$$\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$$

$$\overline{z_1 - z_2} = \overline{z_1} - \overline{z_2}$$

$$\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2} = \overline{z_2} \cdot \overline{z_1}$$

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$$

• د $z = a + bi$ عدد جمعې معکوس $-a - bi$ دی او ضربې معکوس یې

$$\frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2} i \text{ دی.}$$

- $0 + 0i = (0, 0)$ د مختلطو عددونو د جمعې د عمليې د عینیت عنصر او $1 + 0i$ د ضرب د عمليې د عینیت عنصر دی.
- هغه دویمه درجې معادلې چې د حقیقي عددونو په سټ کې حل نه لري، د مختلطو عددونو په سټ کې حل لري.

د فصل پوښتنې:

(1) $(i)^{51}$ مساوي دي په:

- a) 1 b) -1 c) i d) -i

(2) i^{-98} موږ هومي عدد مساوي دی په:

- a) 1 b) -1 c) i d) -i

(3) i^{67} موږ هومي عدد مساوي دی په:

- a) -i b) 1 c) -1 d) i

(4) $7i - 4i$ مساوي دی په:

- a) -3i b) 3i c) 3 d) -3

(5) $3i \cdot 4i$ مساوي دی په:

- a) -12 b) 12 c) 12i d) -12i

(6) $\frac{64i}{8i}$ مساوي دی په:

- a) -8 b) 8 c) 8i d) -8i

(7) $\frac{7}{9}i \cdot \frac{2}{9}i$ مساوي دی په:

- a) $-\frac{14}{81}$ b) $\frac{14}{81}$ c) $-\frac{14}{81}i$ d) $\frac{14}{81}i$

(8) $\frac{\sqrt{-11}}{\sqrt{-5}}$ مساوي دی په:

- a) $\sqrt{\frac{11}{5}}$ b) $\frac{-11}{5}$ c) $\frac{-11}{5}i$ d) $\frac{11}{5}i$

(9) $\frac{\sqrt{-1}\sqrt{5}}{\sqrt{-1} \cdot 5}$ مساوي دی په:

- a) $\frac{\sqrt{5}}{5}$ b) $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ c) $\frac{5}{3}i$ d) درې واړه سم نه دي

$$(10) \quad -\frac{xi}{\sqrt{y}i} \text{ مساوي دی په:}$$

$$a) \frac{x}{\sqrt{y}} \quad b) \frac{-x}{\sqrt{y}} \quad c) \frac{xi}{\sqrt{y}} \quad d) \frac{x}{y}$$

11) لاندې مختلط عددونه جمع کړئ.

$$\begin{array}{ll} (3+4i) + (2+5i) & (a+bi) + (c+di) \\ (1+i) + (1-i) & (2+3i) + (2-3i) \end{array}$$

12) لاندې مختلط عددونه تفریق کړئ.

$$\begin{array}{ll} (4+3i) - (4+4i) & (3-2i) - (3+2i) \\ (4+4i) - (4+3i) & (1+i) - (1-i) \end{array}$$

$$(13) \quad (2a+ib) - (2a-ib) \text{ مساوي دي په:}$$

$$a) -ib \quad b) -2ib \quad c) 2ib \quad d) 4a$$

$$(14) \quad (2-3i)(2+3i) \text{ د ضرب حاصل مساوي دی په:}$$

$$a) -13 \quad b) 13i \quad c) 13 \quad d) 9i$$

15) لاندې مختلط عددونه د $a+bi$ په شکل ولیکئ.

$$\begin{array}{ll} 4(2+5i) - (3-4i) & (4-3i)(2+i) \\ i(3-2i)^2 & i^{51} \end{array}$$


16) که $z_1 = 2-4i$ او $z_2 = 1-i$ وي، وښیاست چې:

$$\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2} \quad , \quad \overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2} \quad , \quad \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$$


17) د لاندې مختلطو عددونو جمعي او ضربي معکوس پیدا کړئ.

$$3x - \frac{1}{2}yi \quad 2a - bi \quad 2+5i \quad -7+3i \quad -6+2i \quad 3-i \quad \sqrt{2}+i$$

18) د $5x^2 + 2x + 1 = 0$ معادله حل کړئ.



اووم خپرکی تحلیلی هندسه



تحليلي هندسه هغه علم دی چې د الجبر تخنیکونه له هندسې سره یو ځای کوي. یا په بل عبارت تحليلي هندسه موږ ته دا توان راکوي چې د هندسي مسائلو په حلولو کې له الجبري میتودونو او معادلو څخه ګټه واخلو، همدارنګه د هندسې له اصولو څخه په الجبري مساواتو (معادلو) کې ګټه واخلو.


هندسه د الجبر یوه پخوانۍ څانګه ده. یونانیانو تقریباً څلور پېړۍ ترمخه په دې برخه کې په منظمه توګه څېړنه او مطالعه کړې وه چې تقریباً (300) کاله پخوا اوکلید (Euclid) دیارلس کتابونه تشریح او تفسیر کړي وو.

د تحليلي هندسې مخترع یو فرانسوي عالم رین ډکارټس (Rene Descartes) و چې په (1596-1650 م.ب) کې یې ژوند کاوه الجبري میتودونه یې په هندسه کې معرفي او ګټه یې ترې واخیستله چې د تحليلي هندسې (Analytic geometry) یا (همغږي هندسې) (Coordinate geometry) په نامه یادېږي. نوموړي په (1637 م) کال کې یو کتاب د (La geometry) په نامه ولیکه. لنډه دا چې په څه ډول د هندسې او الجبر څخه یو ځای ګټه اخیستل کېږي. په دې فصل کې زموږ موخه داده چې په لنډ ډول ددې مضمون ځینې اساسات مطالعه کړو.

د وضعیه کمیاتو سیستم یا

کوارډنټ سیستم

(Coordinate system)



آیا د $(2,0)$ ، $(-4,7)$ ، $(2,2)$ ، $(0,-1)$ او د $(0,-2)$ نقطې د وضعیه کمیاتو په سیستم کې ټاکلای شئ؟


فعالیت

د وضعیه کمیاتو په مستوي کې د XX' او YY' یو پر بل دوه عمود خطونه رسم کړئ. ددې دوو خطونو د تقاطع ټکي (نقطې) ته (O) وایې چې د O نقطې ته د وضعیه کمیاتو د محورونو مبدا (Origin) وایي.

دوه یو پر بل عمود خطونه د کوارډنټ د محورونو (Coordinate axes) په نامه یادېږي. چې د XX' افقي خط د X محور او د YY' عمودي خط د Y له محور څخه عبارت دی. ښکاره ده ټول عددونه چې د X پر محور د مبدا ښي خواته واقع دي، مثبت او که د مبدا کیني خواته واقع وي، منفي دي. همدارنګه هغه عددونه چې د Y پر محور له مبدا پورته واقع دي، مثبت او که له مبدا لاندې واقع دي، منفي عددونه دي.

فرضو چې که P په مستوي کې یوه نقطه وي، کولای شو چې د P نقطه د یوې مرتبې جوړې ($OrderPair$) په واسطه وښایو. په دې ډول چې د P له نقطې څخه د X او Y له محورونو سره موازي مستقیم خطونه رسموو. چې دا مستقیم خطونه د Y محور د S په نقطه کې او د X محور د R په نقطه کې قطع کوي. چې د $OR = x$ مستقیمه فاصله او $OS = y$ ده. په نتیجه کې د P د نقطې موقعیت د (x, y) د مرتبې جوړې په واسطه د وضعیه کمیاتو په سیستم کې ټاکل کېږي.

په مستوي کې هره مرتبه جوړه د یوې نقطې په واسطه او د مستوي هره نقطه د (x, y) د حقیقي عددونو د مرتبې جوړې په واسطه ښودل کېږي. چې x او y د X او Y له محورونو څخه د P د



نقطې مستقيمي فاصلې دي چې دې سیستم ته کارتيزني يا کوارډنېټ سیستم (Coordinate System) وايي.

د مرتبې جوړې لومړنۍ مرکبې ته د X مختصه او دويمې ته د Y مختصه (Y -Coordinate) وايي. د کوارډنېټ محورونه مستوي په څلورو ناحيو (ربعو) (quadrants)

وېشي. په دې ډول چې په لومړنۍ ناحيه (ربع) کې، $x > 0$


، $y > 0$ په دويمه ربع کې $x < 0$ ، $y > 0$ په دريمه ربع

کې $x < 0$ ، $y < 0$ او په څلورمه ربع کې $x > 0$ او $y < 0$ دي.

لومړی مثال: د $A(-2, 3)$ ، $B(-4, -2)$ ، $C(2, 5)$ ، $D(3, -5)$ ، $E(0, 2)$ او $F(-2, 0)$

نقطې د وضعيه کمياتو په سیستم کې وټاکي.

حل:



فعاليت

- وښايست کومې نقطې چې د X پر محور پرتې دي، د Y مختصې يې صفر او کومې نقطې چې د Y پر محور پرتې دي، د X مختصې يې صفر دي.
- ووياست چې د $(2, 3)$ ، $(-2, 3)$ ، $(2, -3)$ ، $(-2, -3)$ ، $(0, 4)$ او $(4, 0)$ نقطې په کومو ربعو کې واقع دي.

د دوو نقطو ترمنځ فاصله (Distance between two points):


آيا کولای شئ چې ووياست، د $A(4, 8)$ او $B(1, 2)$ د نقطو ترمنځ فاصله څو واحده ده؟
که $P_1(x_1, y_1)$ او $P_2(x_2, y_2)$ په مستوي کې دوې نقطې وي. موږ کولای شو چې د P_1 او

P_2 ترمنڻ فاصلہ يا $d = |P_1 P_2|$ د دوو نقطو ترمنڻ فاصلہ د $P_1 P_3 P_2$ د قائم الزاويه مثلث له مخي د فيثاغورث د قضیي په اساس پيدا ڪرو، لکه څرنگه ڇي په شڪل کي ليدل ڪيري.

$$(\overline{P_1 P_2})^2 = (\overline{P_1 P_3})^2 + (\overline{P_2 P_3})^2$$

$$d = |P_1 P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$





پام مو وي ڇي که د $P_1(x_1, y_1)$ او $P_2(x_2, y_2)$ نقطي پر افقي خط باندي واقع وي، په دې حالت کي $y_1 = y_2$ ڪيري، لکه: څرنگه ڇي د (a) په شڪل کي ليدل ڪيري.

$$d = |P_1 P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + 0} = |x_2 - x_1|$$

او که د P_1 او P_2 نقطي پر عمودي خط باندي واقع وي، په دې حالت کي $x_1 = x_2$ دی، لکه: ڇي د (b) په شڪل کي ښودل شوي دي.

$$d = |P_1 P_2| = \sqrt{0 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(y_2 - y_1)^2} = |y_2 - y_1|$$



دويم مثال: د $P_1(3, -2)$ او $P_2(-1, -5)$ نقطو ترمنڻ فاصلہ پيدا ڪري.

حل:

$$\begin{aligned} \overline{P_1 P_2} &= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \\ &= \sqrt{(-1 - 3)^2 + [-5 - (-2)]^2} = \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2} = \sqrt{25} = 5 \end{aligned}$$


فعالیت

د $P_1(8,0)$ او $P_2(2,0)$ نقطو ترمنځ فاصله پیدا کړئ.

درېم مثال: د فاصلې د فورمول په مرسته وښایست چې $A(-2,-3)$ ، $B(2,1)$ او $C(-2,5)$ د یو قائم الزاویه مثلث راسونه دي.

حل:

$$\begin{aligned} |AB| &= \sqrt{[2 - (-2)]^2 + [1 - (-3)]^2} = \sqrt{32} \\ |BC| &= \sqrt{(-2 - 2)^2 + (5 - 1)^2} = \sqrt{32} \\ |CA| &= \sqrt{[-2 - (-2)]^2 + [5 - (-3)]^2} = \sqrt{64} \\ |AB|^2 + |BC|^2 &= 32 + 32 = 64 \\ |CA|^2 &= 64 \end{aligned}$$



څرنگه چې: $|CA|^2 = |AB|^2 + |BC|^2$ دی نو د $\triangle ABC$ مثلث یو قائمه زاویه مثلث دی.


فعالیت

وښایست چې $A(-6,3)$ ، $B(3,-5)$ او $C(-1,5)$ نقطې د قائمه زاویه مثلث راسونه دي.

څلورم مثال: که $C(0,0)$ د دایرې مرکز او د $P(3,4)$ نقطه د دایرې د محیط یوه نقطه وي، ددې دایرې د شعاع اوږدوالی پیدا کړئ.

حل:

$$\begin{aligned}\overline{PC} = R &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(3 - 0)^2 + (4 - 0)^2} \\ &= \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5\end{aligned}$$



د وضعيه کمياتو په مستوي کې هغه نقطې چې د X پر محور پرتې دي، د Y مختصې يې صفر او کومې نقطې چې د Y پر محور پرتې دي د X مختصې يې صفر دي.

د $P(x_1, y_1)$ او $Q(x_2, y_2)$ د دوو نقطو تر منځ فاصله د $d = |PQ| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ له فورمول څخه په لاس راځي.

1- په لاندې راکړل شوو نقطو کې د کومې نقطې فاصله د وضعیه کمیاتو له مبدا څخه 15 واحد

ده ؟

a: $(\sqrt{176}, 7)$

b: $(10, -10)$

C: $(1, 15)$

d: $(\frac{15}{2}, \frac{15}{2})$

2- وښیاست چې د $A(0, 2)$ ، $B(\sqrt{3}, 1)$ او $C(0, -2)$ نقطې د یو قایمه زاویه مثلث راسونه

دي.

3 - د $(0, 5)$ او $(0, -3)$ نقطو تر منځ فاصله پیدا کړئ.


4 - د $A(-\frac{1}{2}, 3)$ او $B(-1, \frac{-3}{4})$ نقطو تر منځ فاصله پیدا کړئ.

5 - د $(7, 11)$ او $(1, 3)$ نقطو تر منځ فاصله پیدا کړئ.

6 - د $(3, 6)$ او $(1, 2)$ نقطو تر منځ فاصله پیدا کړئ.

7 - د $(3, 7)$ او $(12, 19)$ نقطو تر منځ فاصله پیدا کړئ.

د هغې نقطې د وضعیه کمیاتو پیدا کول چې یو قطعه خط په یوه نسبت باندې وېشي:



آیا کولای شئ د هغه مستقیم خط د تنصیف د نقطې وضعیه کمیات پیدا کړئ چې د $A(3,1)$ او $B(-2,4)$ له نقطو څخه تېرېږي؟ که د P د نقطې وضعیه کمیات (x, y) وي

چې د $\overline{P_1 P_2}$ مستقیم خط د r په نسبت وېشي یا $r = \frac{P_1 P}{PP_2}$ وي. د $P_1 M P$ او $P N P_2$ د مثالونو له مشابهت څخه لرو چې:

$$\frac{P_1 P}{PP_2} = \frac{P_1 M}{PN} = \frac{x - x_1}{x_2 - x} = r$$

$$x - x_1 = rx_2 - rx$$

$$x + rx = rx_2 + x_1$$

$$(1+r)x = rx_2 + x_1$$

$$x = \frac{x_1 + rx_2}{1+r}$$

$$\frac{P_1 P}{PP_2} = \frac{PM}{P_2 N} = \frac{y - y_1}{y_2 - y} = r$$

$$y - y_1 = ry_2 - ry$$

$$y + ry = ry_2 + y_1$$

$$(1+r)y = ry_2 + y_1$$


$$y = \frac{y_1 + ry_2}{1+r}$$

لومړی مثال: د P نقطې وضعیه کمیات پیدا کړئ، که هغه مستقیم خط چې د $P_1(-6,3)$ او $P_2(5,-2)$ له نقطو څخه تېرېږي د $\frac{2}{3}$ په نسبت وېشي یا $\frac{P_1 P}{PP_2} = \frac{2}{3}$ وي.

$$x_1 = -6 \quad x_2 = 5 \quad r = \frac{2}{3}$$

$$x = \frac{rx_2 + x_1}{1+r} = \frac{\frac{2}{3} \cdot 5 - 6}{1 + \frac{2}{3}} = -\frac{8}{5}$$

حل




$$y = \frac{ry_2 + y_1}{1+r} = \frac{\frac{2}{3}(-2) + 3}{1 + \frac{2}{3}} = \frac{-\frac{4}{3} + 3}{1 + \frac{2}{3}} = 1$$

نو د P نقطې وضعیه کمیات $P(-\frac{8}{5}, 1)$ دي چې د $\overline{P_1 P_2}$ خط د $\frac{2}{3}$ په نسبت وېشي.

متوجه باید اوسو چې که د P نقطه د

$\overline{P_1 P_2}$ قطعه خط داخلياً د r په نسبت و وېشي، $r > 0$ او که خارجاً یې و وېشي، نو $r < 0$ دی.



د مثال په ډول په شکل کې لیدل کېږي چې که د P نقطه

د $\overline{P_1 P_2}$ قطعه داخلياً د r په نسبت و وېشي یا په بل

عبارت که $P_1 P$ او PP_2 همجهت وي، $r > 0$

او که د P نقطه د $\overline{P_1 P_2}$ قطعه خط خارجاً د r

په نسبت و وېشي یا داچې $P_1 P$ او PP_2 مختلف

الجهت وي، $r < 0$ دی، نو $\frac{P_1 P}{PP_2} = -r$ لکه:

چې په پورتنی شکل کې لیدل کېږي.

دویم مثال: د P د نقطې وضعیه کمیات پیدا کړئ، که هغه مستقیم خط چې د $P_1 (-8, 4)$ او

$P_2 (2, -1)$ له نقطو څخه تېرېږي.

a : داخلياً یې د $\frac{2}{3}$ په نسبت و وېشي. b : خارجاً یې د $\frac{2}{3}$ په نسبت و وېشي.

د a حل:

$$r = \frac{2}{3}$$

$$x = \frac{rx_2 + x_1}{1+r} = \frac{\frac{2}{3} \cdot 2 - 8}{1 + \frac{2}{3}} = \frac{-20}{\frac{5}{3}} = -4, \quad y = \frac{ry_2 + y_1}{1+r} = \frac{\frac{2}{3}(-1) + 4}{1 + \frac{2}{3}} = \frac{10}{\frac{5}{3}} = 2$$

نو د p د نقطې وضعیه کمیات چې د $\overline{P_1 P_2}$ قطعه خط داخلي د $\frac{2}{3}$ په نسبت وېشي له $(-4, 2)$

څخه عبارت دي

د حل: څرنگه چې د p نقطه د $\overline{P_1 P_2}$ قطعه خط خارجاً د $\frac{2}{3}$ په نسبت وېشي، نو:

$$r = -\frac{2}{3}$$

$$x = \frac{\left(-\frac{2}{3}\right) \cdot 2 - 8}{1 - \frac{2}{3}} = -28, \quad y = \frac{\left(-\frac{2}{3}\right)(-1) + 4}{1 - \frac{2}{3}} = 14$$

د p د نقطې وضعیه کمیات چې د $\overline{P_1 P_2}$ قطعه خط خارجاً د $\frac{2}{3}$ په نسبت وېشي له $(-28, 14)$

څخه عبارت دي.

فعالیت

د p د نقطې وضعیه کمیات پیدا کړئ، په داسې حال کې هغه قطعه خط چې د $A(4, 6)$ او

$B(-2, 3)$ له نقطو څخه تېرېږي، داخلي یې د $\frac{1}{2}$ په نسبت وېشي.

که د p نقطه د $\overline{P_1 P_2}$ د مستقیم خط د تنصیف نقطه وي، په دې حالت کې $r = 1$ دی او د p

$$\text{نقطې وضعیه کمیات عبارت دي له: } x = \frac{x_1 + x_2}{2} \text{ او } y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$


دریم مثال: د هغه قطعه خط د تنصیف د نقطې وضعیه کمیات پیدا کړئ چې د $(-10, 4)$ او

$(7, -5)$ له نقطو څخه تېرېږي.

حل:

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{-10 + 7}{2} = -\frac{3}{2}$$

$$y = \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{4 - 5}{2} = -\frac{1}{2}$$



د p د نقطې وضعیه کمیات چې د $\overline{P_1 P_2}$ قطعه خط د r په نسبت وېشي.

د $\overline{P_1 P_2}$ قطعه خط د تنصیف د نقطې وضعیه کمیات او $x = \frac{rx_2 + x_1}{1+r}$, $y = \frac{ry_2 + y_1}{1+r}$

عبارت دي له: $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$, $y = \frac{y_1 + y_2}{2}$ که د p نقطه د $\overline{P_1 P_2}$ قطعه خط داخلياً د r

په نسبت و وېشي، نو r مثبت او که خارجاً يې و وېشي، نو r منفي دی.

پوښتنې

1 - د $\overline{AB}$ مستقیم خط د تنصیف د نقطې وضعیه کمیات $(2, -1)$ دي، که $A(-1, -3)$ وي،

د B د نقطې وضعیه کمیات پیدا کړئ.


2 - د هغه قطعه خط د تنصیف د نقطې وضعیه کمیات پیدا کړئ چې د $A(3, 1)$ او $B(-2, -4)$

له نقطو څخه تېرېږي.

3 - د هغې نقطې وضعیه کمیات پیدا کړئ په داسې حال کې هغه قطعه خط چې د $A(4, 6)$ او

$B(-2, 3)$ له نقطو څخه تېرېږي

a: داخلياً يې د $\frac{1}{2}$ په نسبت و وېشي. b: خارجاً يې د $\frac{1}{2}$ په نسبت و وېشي.




د یو مستقیم خط میل

(Slope of a straight Line)

کولای شئ چې ووايئ د کومې مایلې
سطحې میل زیات دی؟

د زاویه چې د l مستقیم خط یې د X د محور له مثبت جهت سره جوړوي، د مستقیم خط د میل د زاوې په نامه یادېږي.



لکه څرنگه چې په شکل کې لیدل کېږي که د l خط د X له محور سره موازي وي $\theta = 0$ او که د l له محور سره موازي وي، نو $\theta = 90^\circ$ ده.

څه وخت چې موږ پر مایله سطحه (inclined plane) پورته خواته حرکت کوو، په یو وخت کې افقي فاصله (run) او عمودي فاصله (rise) طی کوو. که د AB د مستقیم خط میل په m و ښایو.

$$m = \frac{\text{rise}}{\text{run}} = \frac{y}{x} = \tan \theta$$

د مستقیم خط میل د هغه زاوې له $\tan$ څخه عبارت دی چې مستقیم خط یې د X د محور له مثبت جهت سره جوړوي، که $0 < \theta < 90^\circ$ وي، نو د مستقیم خط میل مثبت او که $90^\circ < \theta < 180^\circ$ وي میل منفي دی او که $\theta = 0$ وي $\tan 0^\circ = 0$ دی، نو میل یې صفر او که $\theta = 90^\circ$ وي، نو په دې حالت کې د مستقیم خط میل تعریف شوی نه دی، ځکه چې $\tan 90^\circ$ تعریف شوی نه دی.

فعالیت

د X او Y د محورونو د میل په برخه کې څه فکر کوئ؟

د هغه مستقیم خط میل چې عمود نه وي او د $P(x_1, y_1)$ او $Q(x_2, y_2)$ له نقطو څخه تېرېږي.

$$m = \tan \theta = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$


ځکه لکه څرنگه چې په شکل کې لیدل کېږي.

$$\widehat{RPQ} = \hat{\theta}$$

$$\overline{PR} = x_2 - x_1$$

$$\overline{QR} = y_2 - y_1$$

$$m = \tan \theta = \frac{\overline{QR}}{\overline{PR}} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



که د A ، B ، او C درې نقطې داسې ولرو چې د $\overline{AB}$ د مستقیم خط میل د $\overline{BC}$ د مستقیم خط له میل سره مساوي وي، نو د A ، B ، او C نقطې په یوه مستقیم خط باندې واقع دي.

لومړی مثال: د هغه مستقیم خط میل پیدا کړئ چې د $P_1(2, 4)$ او $P_2(6, 10)$ له نقطو څخه

تېرېږي.

حل:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{10 - 4}{6 - 2} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$


$$m = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{4 - 10}{2 - 6} = \frac{-6}{-4} = \frac{3}{2}$$

یا:

دویم مثال: و بنیاست چې د $A(-3, 6)$ ، $B(3, 2)$ او $C(6, 0)$ درې نقطې پر یوه مستقیم خط

باندې واقع دي.

$$\overline{AB} \text{ د مستقیم خط میل } = \frac{2 - 6}{3 - (-3)} = \frac{-4}{6} = -\frac{2}{3}$$




$$\overline{BC} \text{ د مستقیم خط میل د } = \frac{0-2}{6-3} = -\frac{2}{3}$$

څرنگه چې د $\overline{AB}$ او $\overline{BC}$ مستقیمو خطونو میلونه سره مساوي دي. نو د A ، B ، او C نقطې په یوه مستقیم خط باندې واقع دي.

نتیجه: د یوه مستقیم خط میل د مستقیم خط په ټولو نقطو کې سره مساوي دی.

فعالیت

- د هغه مستقیم خط میل پیدا کړئ چې د $(-2, 4)$ او $(5, 1)$ له نقطو څخه تېرېږي.
- د مستقیم خط د میل په مرسته وښایست چې د $(4, -5)$ ، $(7, 5)$ او $(10, 15)$ نقطې پر یوه مستقیم خط پرتې دي.



که د l_1 او l_2 دوه مستقیم خطونه وي او میلونه یې په ترتیب سره m_1 او m_2 وي، نو:

1- که l_1 د l_2 سره موازي وي $m_1 = m_2$ دی.

ځکه چې د شکل مطابق $\theta_1 = \theta_2$ دی

$$\tan \theta_1 = \tan \theta_2$$

$$m_1 = m_2$$

2- که l_1 او l_2 یو پر بل عمود وي، نو:

$$m_1 m_2 + 1 = 0 \text{ یا } m_1 = -\frac{1}{m_2}$$


$$m_1 \cdot m_2 = -1 \text{ دي.}$$

د یو مستقیم خط میل چې د $P_1(x_1, y_1)$ او د

$P_2(x_2, y_2)$ له نقطو څخه تېرېږي، د

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \text{ له فورمول څخه په لاس راځي د } X \text{ د محور او د هغو مستقیمو}$$

خطونو میل چې د X له محور سره موازي وي صفر او د Y د محور او د هغو مستقیمو خطونو میل چې د Y له محور سره موازي وي تعریف شوی نه دی. که د یوه مستقیم خط د میل زاویه حاده وي، میل یې مثبت او که منفرجه وي، میل یې منفي دی او که د مستقیم خط د میل زاویه صفر وي، میل یې صفر دی.




پوښتنې


- 1 - د هغه مستقیم خط میل پیدا کړئ چې د $(3, -2)$ او $(2, 7)$ له نقطو څخه تېرېږي.
- 2 - که $A(8, 6)$ ، $B(-4, 2)$ او $C(-2, -6)$ د یو مثلث رأسونه وي، د مثلث د هرې ضلعې میل پیدا کړئ.
- 3 - د مستقیم خط د میل په مرسته وښایست چې د $(a, 2b)$ ، $(c, a+b)$ او $(2c-a, 2a)$ نقطې پر یو مستقیم خط باندې واقع دي.
- 4 - د $\overline{AB}$ مستقیم خط چې د $A(1, -2)$ او $B(2, 4)$ له نقطو او د $\overline{CD}$ مستقیم خط چې د $C(4, 1)$ او $D(-8, 2)$ له نقطو څخه تېرېږي، دا دواړه خطونه سره:
 - a: موازي دي b: عمود دي c: هېڅ یو
- 5 - د $y = 3$ مستقیم خط او د $x = 3$ مستقیم خط یو له بله سره څه اړیکه لري؟
 - a - موازي دي b - عمود دي c - هېڅ یو
- 6 - د $x = -1$ او $x = 3$ خطونه سره: a - موازي دي b - عمود دي c - هېڅ یو
- 7 - د $y = -\sqrt{3}$ مستقیم خط میل مساوي دی په:
 - a - 1 b - صفر c - 1- d - تعریف شوي نه دی
- 8 - د $x = 0,03$ مستقیم خط میل مساوي دی په:
 - a - 1 b - صفر c - 1- d - تعریف شوی نه دی.

د یو مستقیم خط معادله

(Equation of a straight Line)



آیا کولای شی د $\overline{CD}$ د مستقیم خط معادله پیدا کړئ چې د X له محور سره موازي وي.

1- د هغه مستقیم خط معادله چې د X له محور سره موازي وي.

ټولې نقطې چې د l پر مستقیم خط پرتې وي، د X له محور څخه مساوي فاصلې لري یا په بل عبارت د ټولو هغو نقطو د Y مختصې چې د X له محور سره پر موازي خط واقع دي سره مساوي دي. که د X له محور څخه د l د خط فاصلې ته (b) ووايو د l د مستقیم خط معادله $y = b$ ده.

که $b > 0$ وي، نو د l خط د X له محور څخه پورته او که


$b < 0$ وي، نو د l خط د X له محور لاندې او که

$b = 0$ وي، نو د l خط د X پر محور پروت دی.

لومړی مثال: د هغه مستقیم خط معادله پیدا کړئ چې

د $(2, 3)$ له نقطې څخه تېرېږي او د X له محور سره موازي وي.


حل: $y = 3$ ددې خط معادله ده



فعالیت


د X له محور معادله پیدا کړئ.

2- د هغه مستقیم خط معادله چې د Y له محور سره موازي وي: ټولې نقطې چې



د l پر خط چې د Y له محور سره موازي دی، پرتې وي، د Y له محور څخه مساوي فاصلې لري که د Y له محور څخه د l د مستقیم خط فاصلې ته a ووايو چې a ددې نقطو لومړنۍ مختصه ده، نو د l د خط معادله $x = a$ ده.

که $a > 0$ وي د l خط د Y د محور ښي خوا ته او که $a < 0$ وي د l خط د Y د محور کښي خوا ته او که $a = 0$ وي، نو د l خط د Y پر محور منطبق دی.




دویم مثال: د هغه مستقیم خط معادله پیدا کړئ چې د $(2,3)$ له نقطې څخه تېر شي او د Y له محور سره موازي وي.
حل: $x = 2$ ددې خط معادله ده.

فعالیت

د Y د محور معادله ولیکئ.

3. د هغه مستقیم خط معادله چې میل او د Y له محور سره یې د تقاطع نقطه معلومه وي یا د مستقیم خط معیاري معادله:

که $P(x, y)$ د l مستقیم خط یوه نقطه وي او $C(0, b)$ د Y له محور سره د مستقیم خط د تقاطع نقطه وي، نو د l د مستقیم خط میل عبارت دی له:



$$m = \frac{y-b}{x-0} = \frac{y-b}{x}$$

$$y = mx + b \quad \text{یا} \quad y - b = mx$$

که $b = 0$ وي، د مستقیم خط معادله $y = mx$ ده چې په دې حالت کې مستقیم خط د وضعیه کمیاتو له مبدا څخه تېرېږي.

دریم مثال: د هغه مستقیم خط معادله پیدا کړئ چې:

-a میل یې 2 او د Y محور په 5 کې قطع کړي.

-b د Y محور په $\frac{4}{3}$ کې قطع کړي او پر هغه خط عمود وي چې میل یې 6 - دی.

حل:

$$y = mx + b \Rightarrow y = 2x + 5 \quad \text{a: } m = 2 \text{ او } b = 5$$

$$b: \text{ ددې خط میل } m_2 = -\frac{1}{m_1} = -\frac{1}{-6} = \frac{1}{6} \\ b = \frac{4}{3} \text{ او } m = \frac{1}{6} \text{ دی؛ نو:}$$

$$y = mx + b \Rightarrow y = \frac{1}{6}x + \frac{4}{3}$$


دا معادله کولای شو، د $6y = x + 8$ ، $6y - x = 8$ او یا $x - 6y + 8 = 0$ په شکل ولیکو.

4 - د هغه مستقیم خط معادله چې میل او یوه نقطه یې معلومه وي:

د l د مستقیم خط معادله چې میل یې m او د $Q(x_1, y_1)$ له نقطې څخه تېرېږي.

که $p(x, y)$ د l د مستقیم خط یوه اختیاري نقطه وي. څرنگه چې د $Q(x_1, y_1)$ او $P(x, y)$

نقطې په یوه مستقیم خط واقع دي، نو د l د مستقیم خط میل مساوي دی په:



څلورم مثال: د هغه مستقیم خط معادله پیدا کړئ چې میل یې (-2) او د $(5,1)$ له نقطې څخه تېرېږي.

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 1 = -2(x - 5)$$

$$y = -2x + 11$$

$$2x + y - 11 = 0 \quad \text{یا}$$


5: د هغه مستقیم خط معادله چې د دوی نقطې یې معلومې وي:

د l د خط میل چې عمود نه وي، د $Q(x_1, y_1)$ او $R(x_2, y_2)$ له نقطو څخه تېرېږي او $P(x, y)$ د دې خط یوه کيفي نقطه وي، څرنگه چې د مستقیم خط میل په هره نقطه کې سره مساوي دي، نو لرو چې:

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y - y_2}{x - x_2} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1) \quad \text{یا}$$



پنځم مثال: د هغه مستقیم خط معادله پیدا کړئ چې د $(-2,1)$ او $(6,-4)$ له نقطو څخه تېرېږي.

حل:

$$y - 1 = \frac{-4 - 1}{6 - (-2)} [x - (-2)]$$

$$y_1 = 1, \quad x_1 = -2$$

$$y_2 = -4, \quad x_2 = 6$$

$$y - 1 = \frac{-5}{8} (x + 2) \quad \text{یا} \quad 5x + 8y + 2 = 0$$

6: د هغه مستقیم خط معادله چې له محورونو سره یې تقاطع معلومه وي:

که $P(x, y)$ د l د مستقیم خط یوه کيفي نقطه وي او د l مستقیم خط د X محور په a کې او د Y محور په b کې قطع کړي یا د X محور د $A(a, 0)$ او د Y محور د $B(0, b)$ په نقطه کې قطع کوي چې د A ، B او P نقطې د l پر مستقیم خط واقع دي.

د هغه مستقیم خط له معادلې څخه چې دوی نقطې یې معلومې وي لرو چې:

$$x_1 = a, y_1 = 0 \quad x_2 = 0, y_2 = b$$


$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1), \quad y - 0 = \frac{b - 0}{0 - a}(x - a) \Rightarrow -ay = b(x - a)$$

$$-ay = bx - ab$$

$$bx + ay = ab$$

دواړه خواوې پر ab وېشو

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$



شپږم مثال: د هغه مستقیم خط معادله پیدا کړئ چې د X محور په $(2, 0)$ او د Y محور په

$(0, -4)$ کې قطع کوي.

حل: $a = 2$ او $b = -4$ ده.

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

$$\frac{x}{2} + \frac{y}{-4} = 1$$


$$2x - y - 4 = 0 \quad \text{یا}$$

اووم مثال: په شکل کې که د OAB مثلث متساوی الساقین وي، د $\overline{AB}$ د مستقیم خط معادله

په داسې حالت کې پیدا کړئ چې ددې مثلث د $\overline{AB}$

ضلع د $P(2, 3)$ له نقطې څخه تېرېږي.

حل: د $\overline{AB}$ د مستقیم خط میل مساوي دی په:



$$\overline{AB} = \frac{a - 0}{0 - a} = -1 \quad \text{د مستقیم خط میل}$$

نو اوس د هغه مستقيم خط معادله چې ميل يې (-1) او د $P(2,3)$ له نقطې څخه تېرېږي عبارت ده له:

$$y - 3 = -1(x - 2) \text{ يا } x + y - 5 = 0$$

د هغه مستقيم خط معادله چې ميل او د Y له محور سره يې تقاطع معلومه وي عبارت ده له:

$$y = mx + b \text{ د هغه مستقيم خط معادله چې ميل او يوه نقطه يې معلومه وي عبارت ده له:}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1) \text{ ، د هغه مستقيم خط معادله چې دوې نقطې يې معلومې وي عبارت ده له:}$$

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) \text{ اود هغه مستقيم خط معادله چې له محورونو سره يې د تقاطع}$$

$$\text{نقطې معلومې وي: } 1 = \frac{x}{a} + \frac{y}{b} \text{ ده.}$$

پوښتنې

1- د لاندې مستقيمو خطونو معادلې پيدا کړئ چې:

a: د هغه افقي خط معادله پيدا کړئ چې له $(-9, 7)$ نقطې څخه تېرېږي.

b: د هغه مستقيم خط معادله چې د X پر محور عمود او له $(3, -5)$ نقطې څخه تېرېږي.

2- د لاندې مستقيمو خطونو معادلې پيدا کړئ چې:

a: ميل يې 7 او د $(5, -6)$ له نقطې څخه تېر شي.

b: ميل يې صفر او د $(-3, 8)$ له نقطې څخه تېرېږي.

c: د $(5, -8)$ له نقطې څخه تېرېږي او ميل يې تعريف شوی نه وي.

d: د $(-3, -5)$ او $(-1, 9)$ له نقطو څخه تېرېږي.

e: ميل يې 4- او د Y محور په 9- کې قطع کړي.


3- د هغه مثلث د ضلعو معادلې پيدا کړئ چې راسونه يې $A(-3, 2)$ ، $B(5, 4)$ او $C(3, -8)$ وي.

4- د هغه مستقيم خط معادله پيدا کړئ چې د $(-6, -4)$ له نقطې څخه تېرېږي او پر هغه خط

عمود وي چې ميل يې $\frac{-3}{2}$ وي.

5- د هغه مستقيم خط معادله پيدا کړئ چې د $(5, -11)$ له نقطې څخه تېرېږي او له هغه خط

سره موازی وي چې ميل يې 24- وي.



7 - د مستقیم خط نورمال معادله

آیا ویلای شئی دیوه مستقیم خط نورمال خط

کوم خط ته وایي؟

د l د مستقیم خط معادله که p د هغه عمود خط اوږدوالی وي چې د وضعیه کمیاتو له مبدا څخه د l پر خط عمود وي او θ د عمود خط د میل زاویه وي.

عبارت ده له: $x \cos \theta + y \sin \theta = p$ یا $x \cos \theta + y \sin \theta - p = 0$

د l مستقیم خط د X محور د A په نقطه کې او د Y محور د B په نقطه کې قطع کوي، که $P(x, y)$ د $\overline{AB}$ د مستقیم خط یوه کیفی نقطه وي او د $\overline{OR}$ خط د l پر خط عمود وي، نو: $|\overline{OR}| = p$ دی چې د $\overline{OR}$ خط ته د l د خط نورمال خط وایي او P د نورمال اوږدوالی دی. د ORA او ORB په قائمه زاویه مثلثونو کې لرو چې:

$$\cos \theta = \frac{p}{OA} \quad \text{یا} \quad OA = \frac{p}{\cos \theta}$$

$$\cos(90^\circ - \theta) = \frac{p}{OB} \quad \text{یا} \quad OB = \frac{p}{\cos(90^\circ - \theta)} = \frac{p}{\sin \theta}$$

له مثلثاتو پوهېږو: $\cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$

څرنګه چې د $\overline{AB}$ مستقیم خط د X محور په $(OA, 0)$ او د Y محور په $(0, OB)$ کې قطع کوي، نو د $\overline{AB}$ د مستقیم خط معادله عبارت ده له:

$$\frac{x}{OA} + \frac{y}{OB} = 1$$

$$\frac{\frac{x}{P}}{\cos\theta} + \frac{\frac{y}{P}}{\sin\theta} = 1$$

$$x \cos\theta + y \sin\theta = P$$

یا:

چې $x \cos\theta + y \sin\theta = P$ یا $x \cos\theta + y \sin\theta - P = 0$ د مستقیم خط نورمال معادله ده.

لومړی مثال: که د هغه عمود خط اوږدوالی چې د وضعیه کمیاتوله مبدا څخه د l پر خط عمود وي 5 واحد وي او ددې عمود خط د میل زاویه 120° وي، د l د مستقیم خط میل، نورمال معادله یې او د Y له محور سره یې د تقاطع نقطه پیدا کړئ.

حل: $\theta = 120^\circ$ او $P = 5$ دی.

$$x \cos 120^\circ + y \sin 120^\circ = 5$$

$$-\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y = 5 \quad \left(\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}, \quad \sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$x - \sqrt{3}y + 10 = 0$$

د l خط د میل د پیدا کولو لپاره د $y = mx + b$ په شکل لیکو:

$$y = \frac{x}{\sqrt{3}} + \frac{10}{\sqrt{3}}$$

نو د l خط میل $m = \frac{1}{\sqrt{3}}$ او د Y محور د $(0, \frac{10}{\sqrt{3}})$ په نقطه کې قطع کوي.

فعالیت

د هغه مستقیم خط نورمال معادله پیدا کړئ چې د نورمال اوږدوالی یې 10 واحد او نورمال یې د X د محور له مثبت جهت سره د 30° زاویه جوړوي.

8- د مستقیم خط عمومي معادله: (General equation of a straight Line)

د $ax + by + c = 0$ معادله د x او y دوه متحول له لري a ، b ، او c ثابت عددونه دي چې a او b دواړه په یو وخت کې صفر نه وي، د مستقیم خط د عمومي معادلې په نامه یادېږي.

- 1) که $a \neq 0$ او $b = 0$ وي، نو $x = -\frac{c}{a}$ يا $ax + c = 0$ دا د هغه مستقیم خط معادله ده چې د Y له محور سره موازي وي ددې خط مستقیمه فاصله د Y له محور څخه $-\frac{c}{a}$ ده.
- 2) که $a = 0$ او $b \neq 0$ وي، نو معادله د $by + c = 0$ شکل نيسي يا $y = -\frac{c}{b}$ چې دا د هغه مستقیم خط معادله ده چې د X له محور سره موازي دی. د X له محور څخه ددې خط مستقیمه فاصله $\frac{-c}{b}$ ده.
- 3) که $a \neq 0$ او $b \neq 0$ وي، نو:

$$by = -ax - c \quad \text{يا} \quad y = \frac{-a}{b}x - \frac{c}{b} = mx + b$$

دا د هغه مستقیم خط معادله ده چې میل يې $m = \frac{-a}{b}$ دی او د Y محور په $\frac{-c}{b}$ کې قطع کوي.

1- د مستقیم خط د عمومي معادلې بدلول په معیاري شکل:

د $ax + by + c = 0$ عمومي معادله د معیاري معادلې په شکل عبارت ده له:

$$by = -ax - c \quad \text{يا} \quad y = \frac{-a}{b}x - \frac{c}{b} = mx + b$$

چې ددې خط میل $m = \frac{-a}{b}$ او د Y محور په $\frac{-c}{b}$ کې قطع کوي.

دویم مثال: د $5x - 12y + 39 = 0$ مستقیم خط عمومي معادله په معیاري شکل واړوئ.

حل:

$$12y = 5x + 39 \quad \text{يا} \quad y = \frac{5}{12}x + \frac{39}{12}$$

چې میل يې $m = \frac{5}{12}$ او د Y محور په $\frac{39}{12}$ کې قطع کوي.

2- د مستقیم خط د عمومي معادلې بدلول د هغه مستقیم خط د معادلې په شکل

چې میل او یوه نقطه يې معلومه وي.

د $ax + by + c = 0$ په معادله کې د مستقیم خط میل $\frac{-a}{b}$ او یوه نقطه یې $(\frac{-c}{a}, 0)$ ده، نو:

$$y = \frac{-a}{b}(x + \frac{c}{a}) \qquad m = \tan \theta = \frac{-a}{b}$$

دریم مثال: د $5x - 12y + 39 = 0$ د مستقیم خط عمومي معادله د هغه خط د معادلې په

شکل تبدیله کړئ چې میل او یوه نقطه یې معلومه وي.

حل: د $5x - 12y + 39 = 0$ مستقیم خط یوه نقطه $(\frac{-39}{5}, 0)$ ده او میل یې

$$\frac{5}{12} \text{ دی، نو:}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 0 = \frac{5}{12}(x + \frac{39}{5}) \Rightarrow y = \frac{5}{12}x + \frac{39}{12}$$

3- د عمومي معادلې بدلول د هغه مستقیم خط د معادلې په شکل چې دوې

نقطې یې معلومې وي.

هغه خط چې معادله یې $ax + by + c = 0$ وي، د $(\frac{-c}{a}, 0)$ او $(0, \frac{-c}{b})$ له نقطو تېرېږي.

$$y_1 = 0 \qquad x_1 = \frac{-c}{a} \qquad y_2 = \frac{-c}{b} \qquad x_2 = 0$$

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

$$y - 0 = \frac{\frac{-c}{b} - 0}{0 + \frac{c}{a}}(x + \frac{c}{a}) = \frac{\frac{-c}{b}}{\frac{c}{a}}(x + \frac{c}{a}) = -\frac{c}{b} \cdot \frac{a}{c}(x + \frac{c}{a})$$

$$y = \frac{-a}{b}(x + \frac{c}{a})$$

څلورم مثال: د $5x - 12y + 39 = 0$ مستقیم خط عمومي معادله د هغه مستقیم خط د معادلې

په شکل ولیکئ چې دوې نقطې یې معلومې وي.

حل: د $5x - 12y + 39 = 0$ خط د $P_1(-\frac{39}{5}, 0)$ او $P_2(0, \frac{39}{12})$ له نقطو څخه تېرېږي.

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1)$$

$$\text{یا} \quad \frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{y - 0}{x + \frac{39}{5}} = \frac{\frac{39}{12} - 0}{0 + \frac{39}{5}}$$

4- د یو مستقیم خط د عمومي معادلې بدلول د هغه مستقیم خط د معادلې په شکل چې د X او Y له محورونو سره یې د تقاطع نقطې معلومې وي.

$$ax + by + c = 0$$

$$ax + by = -c$$

دواړه خواوې په $(-c)$ وېشو:

$$\frac{ax}{-c} + \frac{by}{-c} = 1$$

$$\frac{x}{\frac{-c}{a}} + \frac{y}{\frac{-c}{b}} = 1$$

یا

پنځم مثال: د $5x - 12y + 39 = 0$ معادله د هغه مستقیم خط معادلې ته واړوئ چې له محورونو سره یې د تقاطع نقطې معلومې وي.

$$5x - 12y = -39$$

دواړه خواوې په -39 وېشو:

$$\frac{5x}{-39} - \frac{12y}{-39} = 1$$

$$-\frac{x}{\frac{39}{5}} + \frac{y}{\frac{39}{12}} = 1$$

په دې معنا چې دا مستقیم خط د X محور د $(-\frac{39}{5}, 0)$ او د Y محور د $(0, \frac{39}{12})$ په نقطه کې قطع کوي.

فعالیت

د $3x - 2y = 6$ مستقیم خط د تقاطع د نقطو وضعیه کمیات د X او Y ، له محورونو سره پیدا کړئ.

5: د یوه مستقیم خط د عمومي معادلې بدلول په نورمال شکل:

څرنگه چې پوهېږو د مستقیم خط نورمال معادله $x \cos \theta + y \sin \theta = P$ ده او عمومي معادله $ax + by + c = 0$ یا $ax + by = -c$ ده چې دواړه د یوه مستقیم خط ښودونکي دي، نو د ضریبونو نسبتونه یې د k د یوه ثابت عدد سره مساوي دی.

$$\frac{a}{\cos \theta} = \frac{b}{\sin \theta} = \frac{-c}{P} = k$$

$$\frac{P}{-c} = \frac{\cos \theta}{a} = \frac{\sin \theta}{b} = \frac{\sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}}{\pm \sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{1}{\pm \sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\frac{\cos^2 \theta}{a^2} = \frac{\sin^2 \theta}{b^2} = \frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{a^2 + b^2} \quad \text{ځکه چې:}$$

$$\text{په نتیجه کې: } \cos \theta = \frac{a}{\pm \sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{او} \quad \sin \theta = \frac{b}{\pm \sqrt{a^2 + b^2}}$$

د $x \cos \theta + y \sin \theta - p = 0$ په معادله کې د $\cos \theta$ او $\sin \theta$ د قیمتونو په لیکلو سره لرو چې:

$$\frac{ax}{\pm \sqrt{a^2 + b^2}} + \frac{by}{\pm \sqrt{a^2 + b^2}} + \frac{c}{\pm \sqrt{a^2 + b^2}} = 0$$

$$\frac{ax + by}{\pm \sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{-c}{\pm \sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\frac{b}{\sin \theta} = k, \quad \frac{a}{\cos \theta} = k$$

او یا

$$\text{نو: } k \cos \theta = a, \quad k \sin \theta = b, \quad k^2 \cos^2 \theta = a^2, \quad k^2 \sin^2 \theta = b^2$$

$$k^2 \cos^2 \theta + k^2 \sin^2 \theta = a^2 + b^2$$

$$k^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = a^2 + b^2$$

$$k = \pm \sqrt{a^2 + b^2}$$

یا:

د $ax + by = -c$ معادلې دواړه خواوې په K وېشو، نو لرو چې:

$$\frac{ax + by + c}{\pm \sqrt{a^2 + b^2}} = 0 \quad \text{یا} \quad \frac{a}{\pm \sqrt{a^2 + b^2}} x + \frac{b}{\pm \sqrt{a^2 + b^2}} y = -\frac{c}{\pm \sqrt{a^2 + b^2}}$$

ددې لپاره چې د p قیمت هر وخت مثبت وي، نو د مخرج د جذر علامه د C مخالفه علامه ده او

که $c = 0$ وي، د جذر علامه د b د علامې په شان ده.

شپږم مثال: $2x - 3y + 6 = 0$ معادله په نورمال شکل واړوئ.

حل: د معادلې دواړه خواوې په $\sqrt{2^2 + (-3)^2} = \pm \sqrt{13}$ باندې وېشو. ددې لپاره چې ښي خوا

مثبت وي د $\sqrt{13}$ علامه باید منفي ونيول شي:

$$-\frac{2}{\sqrt{13}}x + \frac{3}{\sqrt{13}}y - \frac{6}{\sqrt{13}} = 0 \quad \text{یا} \quad \frac{2x - 3y + 6}{-\sqrt{13}} = 0$$

نو θ په دویمه ناحیه (ریځه) کې ده.

له مثلثاتي جدول څخه لرو چې $\theta = 123^\circ 40'$ ده، نو ددې مستقیم خط نورمال معادله عبارت ده

$$x \cos 123^\circ 40' + y \sin 123^\circ 40' - \frac{6}{\sqrt{13}} = 0 \quad \text{له:}$$

فعالیت

د $5x - 12y + 39 = 0$ مستقیم خط معادله په نورمال شکل تبدیله کړئ.

دیوه مستقیم خط نورمال معادله $x \cos \theta + y \sin \theta - p = 0$ او د مستقیم خط عمومي معادله

$ax + by + c = 0$ ده. د مستقیم خط عمومي معادله د نورمال معادلې په شکل عبارت له:

$$\frac{ax}{\pm \sqrt{a^2 + b^2}} + \frac{by}{\pm \sqrt{a^2 + b^2}} + \frac{c}{\pm \sqrt{a^2 + b^2}} = 0$$

پوښتنې

1 - د $x \cos 60^\circ + y \sin 60^\circ - 7 = 0$ مستقيم خط نورمال معادله د مستقيم خط په

عمومي معادله تبديله کړئ.

2 - د $x \cos 225^\circ + y \sin 225^\circ - 6 = 0$ مستقيم خط نورمال معادله، د مستقيم خط

په عمومي معادله واړوئ.

3 - د مستقيم خط لاندې عمومي معادلې په نورمال شکل واړوئ.


$$15y - 8x + 3 = 0$$

$$2x + 5y - 2 = 0$$

$$2x + 4y + 7 = 0$$

د یوې نقطې فاصله له یوه مستقیم خط څخه:

(Distance of a point from a line)



آیا د $(2,2)$ نقطې فاصله د $x + y = 1$ له


خط څخه پیدا کولای شئ؟

که د P نقطې فاصله، لکه: څنگه چې په شکل کې لیدل کېږي د $\overline{AB}$ له خط څخه چې د P نقطه پر $\overline{AB}$ واقع نه وي، d فرض کړو (د $\overline{AB}$ خط نه عمود وي او نه افقي) د P له نقطې څخه د $\overline{A'B'}$ مستقیم خط له $\overline{AB}$ سره موازي رسم کړئ، په دې حالت کې د AB د خط نورمال معادله عبارت ده له: $x \cos \theta + y \sin \theta - p = 0$ څرنگه چې د $A'B'$ مستقیم خط د AB له خط سره موازي دی، نو د $A'B'$ د خط نورمال معادله عبارت ده له:

$$d = x \cos \theta + y \sin \theta - p \quad \text{یا} \quad x \cos \theta + y \sin \theta - (p + d) = 0$$

څرنگه چې د $P(x_1, y_1)$ نقطه د $\overline{A'B'}$ پر مستقیم خط پرته ده، نو په پورتنۍ معادله کې په ترتیب سره د x او y ، پرځای x_1 او y_1 ږدو، نولرو چې:

$$d = x_1 \cos \theta + y_1 \sin \theta - p$$



چې دا معادله د $\overline{AB}$ له خط څخه د p د نقطې فاصله ښيي، که چېرې د AB د خط معادله په نورمال شکل راکړل شوي وي او که د $\overline{AB}$ د خط معادله په عمومي شکل $(ax + by + c = 0)$ راکړل شوي وي، نو:

$$\text{خرنگه چې: } \sin \theta = \frac{b}{\pm \sqrt{a^2 + b^2}}, \cos \theta = \frac{a}{\pm \sqrt{a^2 + b^2}} \text{ او } p = \frac{-c}{\pm \sqrt{a^2 + b^2}}$$

که دا قیمتونه د AB د مستقیم خط په نورمال معادله کې وضع کړو، لرو چې:

$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\pm \sqrt{a^2 + b^2}}$$

د فاصلې په معادله کې که د P نقطه او د وضعیه کمیاتو مبدا د AB د خط یوې خواته واقع وي، نو د d قیمت منفي کېږي. او که د P نقطه او مبدا د AB د خط دواړو خواوو ته واقع وي د d قیمت مثبت دی. خرنګه چې فاصله هر وخت مثبت ده، نو باید چې مطلقه قیمت یې په پام کې ونیسو. (د C علامه د مخرج د جذر د علامې مخالفه علامه ده)

لومړی مثال: د $P(-2, 8)$ د نقطې فاصله د $4x + 3y - 11 = 0$ له خط څخه پیدا کړئ.
حل: $a = 4$ ، $b = 3$ او $c = -11$ ده، خرنګه چې د C علامه منفي ده، نو د جذر علامه باید مثبت وي.

$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|4(-2) + 3(8) - 11|}{\sqrt{(4)^2 + (3)^2}} = \frac{|-8 + 24 - 11|}{\sqrt{25}} = \frac{5}{5} = 1$$

فعالیت

د $(5, 8)$ نقطې فاصله د $3x - 2y + 7 = 0$ له مستقیم خط څخه پیدا کړئ.

د دوو موازي خطونو تر منځ فاصله:

:(Distance between two parallel lines)

د دوو موازي خطونو تر منځ فاصله پر یو ددې خطونو د یوې نقطې فاصله ده، له بل موازي خط څخه:

دویم مثال: د $2x - 5y + 13 = 0$ او $2x - 5y + 6 = 0$ موازي مستقیمو خطونو تر منځ فاصله پیدا کړئ.

حل: یوه نقطه په یو ددې موازي خطونو باندې پیدا کوو، د مثال په ډول که د

$$2x - 5y + 13 = 0$$

په معادله کې $x = 1$ وي، نو $y = 3$ کېږي.

اوس نو د $(1, 3)$ نقطې فاصله د $2x - 5y + 6 = 0$ له مستقیم خط څخه د فاصلې د فورمول

$$d = \frac{ax_1 + by_1 + c}{\pm \sqrt{a^2 + b^2}}$$

په مرسته په لاس راوړو.

$$d = \frac{|2(1) - 5(3) + 6|}{\sqrt{(2)^2 + (-5)^2}} = \frac{|2 - 15 + 6|}{\sqrt{4 + 25}} = \frac{7}{\sqrt{29}}$$

يادونه: د وضعيه کمياتو له مبدا څخه د $ax + by + c = 0$ مستقیم خط فاصله د $\frac{|C|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ څخه عبارت ده.

فعاليت

د $3x + 2y = 10$ او $y = -\frac{3}{2}x + 7$ د موازي خطونو ترمنځ فاصله پيدا کړئ.

درېم مثال: د $2x + y + 2 = 0$ او $6x + 3y - 8 = 0$ د مستقیمو موازي خطونو ترمنځ

فاصله پيدا کړئ.

حل: که د $2x + y + 2 = 0$ په معادله کې $x = 0$ وي، $y = -2$ کېږي. اوس د $(0, -2)$ او

د $6x + 3y - 8 = 0$ د مستقیم خط فاصله په لاس راوړو:

$$d = \frac{ax_1 + by_1 + c}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|6(0) + 3(-2) - 8|}{\sqrt{36 + 9}} = \frac{14}{3\sqrt{5}}$$

د $P(x_1, y_1)$ د نقطې فاصله له يوه مستقیم خط څخه د $d = x_1 \cos \theta + y_1 \sin \theta - P$ او يا

$$d = \frac{ax_1 + by_1 + c}{\pm \sqrt{a^2 + b^2}}$$

له فورمول څخه په لاس راځي.

1- د هرو دوو جوړو موازي خطونو ترمنځ فاصله پيدا کړئ چې معادلې يې په لاندې ډول دي:

$$3x - 4y + 3 = 0 \quad \text{او} \quad 3x - 4y + 7 = 0$$

$$12x + 5y - 6 = 0 \quad \text{او} \quad 12x + 5y + 13 = 0$$

$$x + 2y - 5 = 0 \quad \text{او} \quad 2x + 4y = 1$$

2- د $P(6, -1)$ نقطې فاصله له $6x - 4y + 9 = 0$ مستقيم خط څخه پيدا کړئ.

3- د $3x + 6y - 8 = 0$ او $2x + 4y + 5 = 0$ موازي خطونو ترمنځ فاصله مساوي ده

په:

a) $\frac{31}{\sqrt{5}}$ b) $\frac{31}{6\sqrt{5}}$ c) $6\sqrt{5}$ d) هېڅ يو


4- د $(1, 2)$ د نقطې فاصله د $\frac{3}{5}x - \frac{4}{5}y + 2 = 0$ مستقيم خط څخه مساوي ده په:

a: 2 b: 1 c: 3 d: $\frac{1}{2}$

5- د $(-2, 7)$ نقطې فاصله له $24x + 7y - 2 = 0$ مستقيم خط څخه مساوي ده په:

a: 0,04 b: $\frac{1}{25}$ c: 4×10^{-2} d: درې واړه سم دي

دایره (Circle)



آیا د هغې دایرې معادله پیدا کولای شئ چې مرکز یې د وضعیه کمیاتو په مبدأ کې او شعاع یې 4 واحد وي؟

تعریف

دایره د هغو نقطو سټ دی چې له یوې ثابتې نقطې څخه یې فاصلې مساوي وي. چې دې ثابتې نقطې ته د دایرې مرکز (Center) او مساوي فاصلې ته د دایرې شعاع (Radius) وایي.

د دایرې معادله (Equation of circle): که $C(h, k)$ د دایرې مرکز، r د دایرې شعاع او $P(x, y)$ د دایرې په محیط یوه نقطه وي، د شکل له مخې د فیثاغورث د قضیې په اساس لرو چې:

$$(\overline{CP})^2 = (x - h)^2 + (y - k)^2$$

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$(\overline{CP} = r)$$

چې دې معادلې ته د دایرې معیاري معادله وایي. که د دایرې مرکز د وضعیه کمیاتو په مبدأ کې وي، نو


په دې حالت کې $h = k = 0$ دی او د دایرې

معادله: $(x - 0)^2 + (y - 0)^2 = r^2$ یا

$$x^2 + y^2 = r^2$$

ده، او که $r = 0$ وي داسې دایرې ته نقطوي

دایره (Point circle) وایي.



لومړۍ مثال: د هغې دایرې معادله پیدا کړئ چې مرکز یې $(-3, 5)$ او د شعاع اوږدوالی یې (7) واحد وي.

حل: $r = 7$, $k = 5$ او $h = -3$

$$(x + 3)^2 + (y - 5)^2 = 7^2$$

$$x^2 + y^2 + 6x - 10y - 15 = 0$$

فعالیت

د هغې دایرې معادله پیدا کړئ چې مرکز یې د وضعیه کمیاتو په مبدا کې او شعاع یې 3 واحد وي.

د یوې دایرې عمومي معادله (General form of an equation of a circle):

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$x^2 - 2hx + h^2 + y^2 - 2ky + k^2 - r^2 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2hx - 2ky + h^2 + k^2 - r^2 = 0$$

یا:

که $-h = g$ ، $-k = f$ او $h^2 + k^2 - r^2 = c$ فرض شي، نو لرو چې:

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0 \quad \text{یا} \quad (x + g)^2 + (y + f)^2 = g^2 + f^2 - c$$

چې دې معادلې ته د دایرې عمومي معادله وایي چې مرکز یې $(-g, -f)$ او شعاع یې $r = \sqrt{g^2 + f^2 - c}$ ده.

که $g^2 + f^2 - c > 0$ وي دایره حقیقي ده.

که $g^2 + f^2 - c = 0$ دایره نقطوي ده.

که $g^2 + f^2 - c < 0$ دایره مجازي ده. (دایره وجود نه لري)

$$\text{او یا که د } x^2 + y^2 - 2hx - 2ky + h^2 + k^2 - r^2 = 0$$

په معادله کې $-2h = a$ ، $-2k = b$ او $h^2 + k^2 - r^2 = c$ عوض کړو لرو چې

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0 \quad \text{چې دا هم د دایرې عمومي معادله ده، ځینې وختونه د دایرې}$$

عمومي معادله داسې هم ښودل کېږي.

$$Ax^2 + By^2 + Dx + Ey - F = 0 \quad \text{په دې ډول چې } A = B \quad \text{او هم علامه وي، نو دا هم}$$

ددایرې عمومي معادله ده.

خاص حالتونه:

1- که د $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ د دایرې په معادله کې $h = 0$ وي، نو د دایرې مرکز د Y پر محور پروت دی او د دایرې معادله دا شکل $x^2 + (y-k)^2 = r^2$ غوره کوي.

2- او که $k = 0$ وي، د دایرې مرکز د X پر محور پروت دی او د دایرې معادله دا: $(x-h)^2 + y^2 = r^2$ ده.

3- که $k = r$ وي، دایره د X پر محور مماس ده او د دایرې معادله $(x-h)^2 + (y-r)^2 = r^2$ ده.

4- او که $h = r$ وي، دایره د Y پر محور مماس ده او د دایرې معادله $(x-r)^2 + (y-k)^2 = r^2$ ده.

5- یوه دایره هغه وخت د وضعیه کمیاتو له مبدا څخه تېرېږي چې د $h^2 + k^2 = r^2$ رابطه صدق کړي.

6- یوه دایره هغه وخت د X او Y پر محورونو مماس ده چې معادله یې دا $(x-r)^2 + (y-r)^2 = r^2$ شکل ولري.


دویم مثال: د $x^2 + (y-5)^2 = 10$ دایرې مرکز د Y پر محور پروت دی.

د $(x-1)^2 + (y-5)^2 = 25$ دایره د X له محور سره مماس ده.

د $(x+3)^2 + y^2 = 9$ دایرې مرکز د X پر محور پروت دی.

فعالیت

په شکل کې وښایست چې د دویم مثال، د لومړۍ دایرې مرکز د Y پر محور پروت دی، دویمه دایره د X له محور سره مماس ده او د دویمې دایرې مرکز د X پر محور واقع دی.



درېم مثال: د هغې دایرې عمومي او معیاري معادلې پیدا

کړئ چې د مرکز وضعیه کمیات یې $(-2, 3)$ او شعاع یې

6 واحد وي او هم دا دایره رسم کړئ.

(د دایرې معیاري معادله)

$$(x+2)^2 + (y-3)^2 = 6^2$$

(د دایرې عمومي معادله)

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 23 = 0$$

څلورم مثال: وښایست چې $5x^2 + 5y^2 + 24x + 36y + 10 = 0$ د یوې دایرې معادله ده او هم ددې دایرې د مرکز وضعیه کمیات او د شعاع اوږدوالی پیدا کړئ.

حل: د معادلې دواړه خواوې پر 5 وېشو، نو لرو چې:

$$x^2 + y^2 + \frac{24}{5}x + \frac{36}{5}y + 2 = 0$$

چې $g = \frac{12}{5}$ ، $f = \frac{18}{5}$ او $c = 2$ دی.


د دایرې مرکز $(-g, -f) = \left(-\frac{12}{5}, -\frac{18}{5}\right)$

او د دایرې شعاع: $r = \sqrt{g^2 + f^2 - c} = \sqrt{\frac{144}{25} + \frac{324}{25} - 2} = \sqrt{\frac{418}{25}} = \frac{\sqrt{418}}{5}$

پنځم مثال: د هغې دایرې معادله پیدا کړئ چې د $x^2 + y^2 - 8x + 4 = 0$ له دایرې سره متحد المركز (Concetric) وي او د $x + 2y + 6 = 0$ له مستقیم خط سره مماس وي.

حل: د $x^2 + y^2 - 8x + 4 = 0$ دایرې مرکز $C_1(-g, -f)$

دی.



$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

$$2g = -8 \Rightarrow g = -4 \Rightarrow -g = 4$$

$$2f = 0 \Rightarrow f = 0$$

د $C_1(4,0)$ نقطه د هغې دایرې مرکز هم دی چې غواړو معادله یې

پیدا کړو، نو د C_1 وضعیه کمیات د $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ په معادله کې وضع کوو، لرو

$$(x-4)^2 + (y-0)^2 = r^2$$

چې:

ددې لپاره چې د C_2 ددایرې شعاع پیدا کړو، نو څرنګه چې دایره د $x + 2y + 6 = 0$ له مستقیم خط سره مماس ده. نو د $(4,0)$ د نقطې فاصله له دې مستقیم خط څخه د دایرې شعاع ده

$$d = r = \frac{|4(1) + 2(0) + 6|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{10}{\sqrt{5}} \quad \text{یا} \quad r^2 = \frac{100}{5} = 20$$

نو ددې دایرې معادله عبارت ده له: $(x-4)^2 + y^2 = 20$ یا $x^2 + y^2 - 8x - 4 = 0$
شپږم مثال: د هغې دایرې معادله پیدا کړئ چې د $B(6,5)$ او $A(4,1)$ له نقطو څخه تېرېږي او مرکز یې د $4x + y - 16 = 0$ پر مستقیم خط پروت وي.

حل: که د ایرې مرکز $C(h,k)$ وي، نو د دایرې معادله $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ ده، څرنگه

چې مرکز یې د $4x + y - 16 = 0$ پر مستقیم خط واقع دی، نو $4h + k = 16$ دی.
 $|AC|^2 = |BC|^2$ او $|AC| = |BC|$ او $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

$$(h-4)^2 + (k-1)^2 = (h-6)^2 + (k-5)^2$$

$$4h + 8k = 44$$

$$\pm 4h \pm k = \pm 16$$

$$7k = 28$$

$$k = 4 \quad \Rightarrow \quad h = 3$$

$$r^2 = (3-4)^2 + (4-1)^2 = 10$$

$$(x-3)^2 + (y-4)^2 = 10 \Rightarrow x^2 + y^2 - 6x - 8y + 15 = 0$$

چې دا د غوښتل شوې دایرې عمومي معادله ده.

فعالیت

د هغې دایرې معادله پیدا کړئ چې د $(0,0)$ او $(2,0)$ له نقطو څخه تېرېږي او د $y-1=0$ له خط سره مماس وي.

اووم مثال: د هغې دایرې د مرکز وضعیه کمیات او د شعاع اوږدوالی پیدا کړئ چې معادله یې
 $x^2 + y^2 - 4x + 4y - 9 = 0$

حل:

$$x^2 + y^2 - 4x + 4y - 9 = 0$$

$$x^2 - 4x + y^2 + 4y - 9 = 0$$

$$x^2 - 4x + (-2)^2 - (-2)^2 + y^2 + 4y + 2^2 - 2 - 9 = 0$$

$$(x-2)^2 + (y+2)^2 = 17$$

نو مرکز يې $(2-2)$ او شعاع يې $r = \sqrt{17}$

د هغې دایرې معادله چې مرکز يې د وضعیه کمیاتو په مبدا کې واقع وي له $x^2 + y^2 = r^2$ څخه

عبارت ده او که مرکز يې د وضعیه کمیاتو په مبدا کې واقع نه وي او (h, k) يې مرکز وي: معادله

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0 \quad \text{یا} \quad (x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$$

او یا $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ ده.

پوښتنې

1 - د هغې دایرې معادله پیدا کړئ چې:

a: د مرکز مختصات يې $(5, -2)$ او $r = 4$ وي

b: د مرکز مختصات يې $(\sqrt{2}, -3\sqrt{3})$ او شعاع يې $r = 2\sqrt{2}$ وي.

c: مرکز يې $(0, 0)$ او د $(1, 2)$ له نقطې څخه تېرېږي.

d: د مرکز مختصات يې $(0, 0)$ او د $(-3, -4)$ له نقطې څخه تېرېږي.

e: د مرکز مختصات يې $(8, -6)$ او د وضعیه کمیاتو له مبدا څخه تېرېږي

2 - لومړۍ وېنېاست چې لاندې راکړل شوی معادلې د دایرې معادلې دي، بیا يې د مرکز وضعیه


کمیات او د شعاع اوږدوالی پیدا کړئ.

$$x^2 + y^2 + 12x - 10y = 0 \quad , \quad 5x^2 + 5y^2 + 14x + 12y = 0$$

$$x^2 + y^2 - 6x + 4y + 13 = 0 \quad , \quad 3x^2 + 3y^2 - 2x + 4y - 1 = 0$$

$$a(x^2 + y^2) + 2gx + 2fy + c = 0$$

د یو مستقیم خط حالتونه له یوې دایرې سره:



کولای شئ چې ووايستد $3x - 4y + 20 = 0$
مستقیم خط د $x^2 + y^2 = 25$ دایره په څو
نقطو کې قطع کوي؟

د $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ دایرې معادله په پام کې نیسو او غواړو چې د یو مستقیم خط حالت له دایرې سره وڅېړو چې آیا دا مستقیم خط دایره په دوو نقطو کې قطع کوي، یا مستقیم خط پر دایره مماس دی او یا دا چې مستقیم خط دایره نه قطع کوي.
د x او یا y قیمت د مستقیم خط له معادلې څخه په لاس راوړو او د دایرې په معادله کې یې وضع کوو. یوه دویمه درجه یو مجهوله معادله په لاس راځي.
1) که په دې معادله کې $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ وي، مستقیم خط دایره په دوو نقطو کې قطع کوي.

2) که $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ وي مستقیم خط له دایرې سره مماس دی.

3) او که $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ مستقیم خط دایره نه قطع کوي.

لومړی مثال: آیا د $2x = y + 7$ مستقیم خط د $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 12 = 0$ دایره قطع کوي؟ د تقاطع د نقطو وضعیه کمیات یې پیدا کړئ.

حل: د مستقیم خط له معادلې څخه $y = 2x - 7$ ده چې د y قیمت د دایرې په معادله کې وضع کوو.

$$x^2 + (2x - 7)^2 - 8x - 2(2x - 7) + 12 = 0$$

$$5x^2 - 40x + 75 = 0$$

$$x^2 - 8x + 15 = 0 \quad \text{یا}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-8)^2 - 4 \cdot 15 = 64 - 60 = 4 > 0$$

نو دا مستقیم خط دایره په دوو نقطو کې قطع کوي او د تقاطع د نقطو وضعیه کمیات یې عبارت دي له:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{8 \pm \sqrt{4}}{2}$$

$$x_1 = 5, \quad x_2 = 3$$

د y قیمت د پیدا کولو لپاره د $x_1 = 5$ او $x_2 = 3$ قیمتونه د مستقیم خط په معادله کې وضع کوو، نو لرو چې:

$$y_1 = 2x_1 - 7 = 2 \cdot 5 - 7 = 3$$

$$y_2 = 2x_2 - 7 = 2 \cdot 3 - 7 = -1$$

نو دا خط دایره د $(3, -1)$ او $(5, 3)$ په نقطو کې قطع کوي.

دویم مثال: آیا د $x + 3y - 5 = 0$ مستقیم خط د $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 5 = 0$ له دایرې سره مماس دی که نه؟

حل: د مستقیم خط له معادلې څخه لرو چې $x = 5 - 3y$ دی، د x دا قیمت د دایرې په معادله کې وضع کوو:

$$(5 - 3y)^2 + y^2 - 2(5 - 3y) + 4y - 5 = 0$$

$$y^2 - 2y + 1 = 0$$

او $\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 = 0$ نو دا مستقیم خط له دایرې سره مماس دی او د تماس د نقطې وضعیه کمیات یې عبارت دي له:

$$y = \frac{2 \pm \sqrt{0}}{2} = 1$$


$$x = 5 - 3 \cdot 1 = 2$$

نو مستقیم خط د $(2, 1)$ په نقطه کې پر دایره مماس دی.

فعالیت

آیا د $x - y + 1 = 0$ مستقیم خط د $x^2 + y^2 - 5 = 0$ له دایرې سره مماس دی، که دایره په دوو نقطو کې قطع کوي او یا دا چې دایره نه قطع کوي؟

د مماس معادله او د مماس اوږدوالی



آیا د هغه مماس معادله پیدا کولای شئ چې د

$$x^2 + y^2 = 13 \quad \text{په نقطه کې د } P(-3, -2)$$

په دایره مماس وي؟

که یو مستقیم خط پر هغه دایره چې مرکز یې $C(h, k)$ او د $p_1(x_1, y_1)$ په نقطه کې پر دایره

مماس وي، نو د شعاع میل مساوي دی په: $m = \frac{k - y_1}{h - x_1}$

او څرنگه چې شعاع د تماس په نقطه کې پر مماس عمود ده، نو د مماس میل له $-\frac{h - x_1}{k - y_1}$ سره مساوي دی.

څرنگه چې د مستقیم خط یوه نقطه $P_1(x_1, y_1)$ او میل یې $-\frac{h - x_1}{k - y_1}$ دی.

د مستقیم خط د $y - y_1 = m(x - x_1)$ معادلې په نظر کې نیولو سره لرو چې:

$$y - y_1 = -\frac{h - x_1}{k - y_1}(x - x_1)$$


چې دا د هغه مماس معادله ده چې د $P_1(x_1, y_1)$ په نقطه کې پر دایره مماس دی.

او که د دایرې مرکز د وضعیه کمیاتو په مبدا کې وي، نو په دې حالت کې $h = k = 0$ دی او د

مماس معادله دا شکل اختیاروي.

$$yy_1 + xx_1 = x_1^2 + y_1^2 \quad \text{یا} \quad y - y_1 = -\frac{x_1}{y_1}(x - x_1)$$

څرنگه چې $x_1^2 + y_1^2 = r^2$ ، نو د مماس معادله $yy_1 + xx_1 = r^2$ ده.



لومړی مثال: د هغه مستقیم خط معادله پیدا

کړئ چې د $(3,4)$ په نقطه کې د $x^2 + y^2 = 25$

پر دایره مماس وي:

حل: څرنګه چې د دایرې مرکز د وضعیه کمیانو

په مبدا کې دی، نو: $y \cdot 4 + x \cdot 3 = 25$

نود مماس معادله عبارت ده له: $3x + 4y = 25$

او یا $3x + 4y - 25 = 0$

دویم مثال: د هغه مستقیم خط معادله پیدا کړئ چې د $P(3,5)$ په نقطه کې پر هغې دایرې مماس

دي چې مرکزي $(1,2)$ دی.

$$h = 1 \quad k = 2$$

$$x_1 = 3 \quad y_1 = 5$$

$$y - y_1 = -\frac{h - x_1}{k - y_1}(x - x_1)$$

$$m = -\frac{1-3}{2-5} = -\frac{2}{3}$$

$$y - 5 = -\frac{2}{3}(x - 3)$$

$$2x + 3y = 21$$

$$2x + 3y - 21 = 0$$

یا:

د مماس اوږدوالی

که د $P_1(x_1, y_1)$ له نقطې څخه چې له دایرې د باندې واقع ده، د $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

پر دایره د P_1T مماس د شکل په شان رسم شي، د (T) د تماس نقطه د دایرې له مرکز (C) سره


ونښلوو، د فیثاغورث د قضیې په اساس د P_1TC په قائمه زاویه مثلث کې لرو چې:

$$(\overline{P_1C})^2 = (\overline{P_1T})^2 + (\overline{CT})^2$$

$$(P_1 T)^2 = (P_1 C)^2 - (CT)^2 \quad \text{یا}$$

له بلې خوا: $(P_1 C)^2 = (x_1 - h)^2 + (y_1 - k)^2$ او $\overline{CT} = r$ نو د مماس اوږدوالی مساوي

$$\overline{P_1 T} = \sqrt{(x_1 - h)^2 + (y_1 - k)^2 - r^2} \quad \text{دی په:}$$



په یاد ولرئ چې د مماس په امتداد د مماس د اوږدوالی د پیدا کولو لپاره د دایرې له کومې خارجي نقطې څخه د X او Y قیمتونه د دایرې په معادله کې وضع کوو.

دریم مثال: د $(-5, 10)$ له نقطې څخه د $5x^2 + 5y^2 + 14x + 12y - 10 = 0$ پر دایره د

مماس اوږدوالی پیدا کړئ.

حل: د معادلې دواړه خواوې پر 5 وېشو، نو لرو چې: $x^2 + y^2 + \frac{14}{5}x + \frac{12}{5}y - 2 = 0$

$$\text{د مماس اوږدوالی} = \sqrt{(-5)^2 + (10)^2 - 14 + 24 - 2} = \sqrt{133}$$

فعالیت

د هغه مماس اوږدوالی پیدا کړئ چې د $P(-2, 2)$ له نقطې څخه د $x^2 + y^2 - 6x + 8y = 0$ پر دایره باندې مماس وي.

د دایرې په معادله کې د مستقیم خط د یو مجهول په وضع کولو سره، یوه دویمه درجه یو مجهوله معادله په لاس راځي، که په دې معادله کې $\Delta > 0$ وي، مستقیم خط دایره په دوو

نقطو کې قطع کوي او که $\Delta = 0$ وي خط پر دایره مماس دی او که $\Delta < 0$ وي، مستقیم خط دایره نه قطع کوي.

د هغه مستقیم خط معادله چې د $P_1(x_1, y_1)$ په نقطه کې پر هغه دایره چې مرکز یې (h, k) دی مماس وي، عبارت ده له:

$$y - y_1 = -\frac{h - x_1}{k - y_1}(x - x_1)$$

که د دایرې مرکز د وضعیه کمیاتو په مبدا کې وي، نو د مماس معادله: $yy_1 + xx_1 = x_1^2 + y_1^2$ یا $yy_1 + xx_1 = r^2$ ده، د مماس اوږدوالی د $P(x, y)$ له نقطې څخه چې د دایرې د باندې واقع ده او د دایرې مرکز (h, k) دی مساوی ده په:

$$PT = \sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2 - r^2}$$

پوښتنې

1 - د لاندې مستقیمو خطونو حالتونه له دایرو سره چې معادلې یې په لاندې ډول راکړل شوي دي وڅېړئ.

د دایرو معادلې

د مستقیمو خطونو معادلې

$$x^2 + y^2 - 4x - y - 3 = 0$$

$$3x - 2y + 3 = 0$$

$$2(x^2 + y^2) - 3x + 2y - 6 = 0$$

$$x - y - 1 = 0$$

$$x^2 + y^2 - x - 9y + 14 = 0$$

$$5x - y = 1$$


2- د هغه مستقیم خط معادله پیدا کړئ چې په $(2, -3)$ نقطه کې د $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 3 = 0$ له دایرې سره مماس وي.

3 - د هغه مماس اوږدوالی پیدا کړئ چې د $(-5, 4)$ له نقطې څخه د

$$5x^2 + 5y^2 - 10x + 15y - 131 = 0$$

4- د هغه مماس اوږدوالی پیدا کړئ چې د $(-2, -5)$ له نقطې څخه د $x^2 + y^2 + 8x + 5y = 7$ پر دایره مماس رسم شوی وي.

د مثلث د مساحت پیدا کول چې د راسونو وضعیه کمیات یې معلوم وي:



آیا دهغه مثلث مساحت پیدا کولای شئ
چې راسونه یې $(-3, 6)$ ، $(3, 2)$ او $(6, 0)$
وي؟

که P_1 ، P_2 او P_3 لکه چې په شکل کې لیدل کېږي د یوه مثلث راسونه وي. د X پر محور $P_1 A$ ، $P_2 C$ او $P_3 B$ درې عمود خطونه رسم کړئ.

د $P_3 B C P_2$ ذونقې مساحت + د $P_1 A B P_3$ ذونقې مساحت = د $P_1 P_2 P_3$ مثلث مساحت
- د $P_1 A C P_2$ ذونقې مساحت

لکه څرنگه چې پوهېږو:

د ذونقې مساحت = (د موازي ضلعو د نیمایي مجموعه) $\times$ (د موازي ضلعو ترمنځ فاصله)

نو:

$$\begin{aligned} \Delta_{P_1 P_2 P_3} &= \frac{1}{2} (|P_1 A| + |P_3 B|) (|AB|) + \frac{1}{2} (|P_3 B| + |P_2 C|) (|BC|) \\ &\quad - \frac{1}{2} (|P_1 A| + |P_2 C|) (|AC|) \\ &= \frac{1}{2} [(y_1 + y_3)(x_3 - x_1)] + \frac{1}{2} [(y_3 + y_2)(x_2 - x_3)] - \frac{1}{2} [(y_1 + y_2)(x_2 - x_1)] \\ &= \frac{1}{2} (x_3 y_1 + x_3 y_3 - x_1 y_1 - x_1 y_3 + x_2 y_3 + x_2 y_2 \\ &\quad - x_3 y_3 - x_3 y_2 - x_2 y_1 - x_2 y_2 + x_1 y_1 + x_1 y_2) \\ &= \frac{1}{2} [x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)] \end{aligned}$$

مثال: که چپری $A(4,-5)$ ، $B(5,-6)$ او $C(3,1)$ د یوه مثلث راسونه وي، ددې مثلث مساحت پیدا کړئ.

حل: $x_1 = 4$ ، $y_1 = -5$ ، $x_2 = 5$ ، $y_2 = -6$ $x_3 = 3$ $y_3 = 1$

$$\Delta ABC \text{ د مثلث مساحت} = \frac{1}{2} [x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)]$$

$$= \frac{1}{2} [4(-6 - 1) + 5(1 + 5) + 3(-5 + 6)]$$

$$= \frac{1}{2} (-28 + 30 + 3) = \frac{1}{2} \cdot 5 = \frac{5}{2} = 2.5$$

□

که د P_1 P_2 P_3 مثلث راسونه $P_1(x_1, y_1)$ ، $P_2(x_2, y_2)$ او $P_3(x_3, y_3)$ وي، نو

د مثلث مساحت د $\frac{1}{2} [x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)]$ له فورمول څخه په لاس راځي.

پوښتنې

- 1 - د هغه مثلث مساحت پیدا کړئ چې راسونه یې $A(0,0)$ ، $B(8,6)$ او $C(12,4)$ وي.
- 2 - که دیوه مثلث راسونه $A(4,0)$ ، $B(-4,0)$ او $C(0,3)$ وي، ددې مثلث مساحت پیدا کړئ.
- 3 - د هغه څلور ضلعي مساحت پیدا کړئ چې راسونه یې $A(1,0)$ ، $B(6,2)$ ، $C(8,6)$ او $D(2,4)$ وي.

د څپرکي لنډيز:

- د وضعيه کمياتو په مستوي کې هغه نقطې چې د X پر محور پرتې دي، د Y مختصه يې صفر او کومې نقطې چې د Y پر محور پرتې دي د X مختصه يې صفر ده

• د $P(x_1, y_1)$ او $Q(x_2, y_2)$ د دوو نقطو ترمنځ فاصله د $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ له فورمول څخه په لاس راځي.

- د p د نقطې وضعيه کميات چې د $\overline{P_1 P_2}$ قطعه خط د r په نسبت وېشي عبارت دي له:

$$x = \frac{rx_2 + x_1}{1+r} \quad y = \frac{ry_2 + y_1}{1+r}$$
 عبارت دي له:

$x = \frac{x_1 + x_2}{2} \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}$ که p نقطه د $\overline{P_1 P_2}$ خط داخلي د r په نسبت ووېشي نو r مثبت او که خارجي وي وېشي، نو r منفي دی.

- د يو مستقيم خط ميل چې د $P_1(x_1, y_1)$ او $P_2(x_2, y_2)$ له نقطو څخه تېرېږي د $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$ له فورمول څخه په لاس راځي د X د محور او د هغو خطونو ميل چې د Y له محور سره موازي وي صفر او د Y د محور او د هغو خطونو ميل چې د Y له محور سره موازي وي، تعريف شوي نه دي. که د يوه مستقيم خط د ميل زاويه حاده وي، ميل يې مثبت او که منفرجه وي ميل يې منفي دی.

- د هغې مستقيم خط معادله چې ميل او د Y له محور سره يې تقاطع معلومه وي، عبارت ده له:

$$y = mx + b$$

د هغه مستقيم خط معادله چې ميل او يوه نقطه يې معلومه وي، عبارت ده له:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

د هغه مستقيم خط معادله چې دوي نقطې يې معلومې وي عبارت ده له:

او يا $y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$ د هغه مستقيم خط معادله چې

له محورونو سره یې د تقاطع نقطې معلومې وي: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ ده.

• د یوه مستقیم خط نورمال معادله $x \cos \theta + y \sin \theta - p = 0$ او د مستقیم خط عمومي معادله $ax + by + c = 0$ ده.

• د $P(x_1, y_1)$ د نقطې فاصله له یوه مستقیم خط څخه د $d = x \cos \theta + y \sin \theta - P$ او یا $d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\pm \sqrt{a^2 + b^2}}$ له فورمول څخه په لاس راځي.

• د هغې دایرې معادله چې مرکز یې د وضعیه کمیاتو په مبدا کې واقع وي له $x^2 + y^2 = r^2$ څخه عبارت ده او که مرکز یې د وضعیه کمیاتو په مبدا کې واقع نه وي او (h, k) یې مرکز وي، معادله یې: $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

یا $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ او یا $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$

• د دایرې په معادله کې د مستقیم خط د یو مجهول په وضع کولو سره، یوه دویمه درجه یو مجهوله معادله په لاس راځي، که په دې معادله کې $\Delta > 0$ وي، مستقیم خط دایره په دوو نقطو کې قطع کوي او که $\Delta = 0$ وي خط پر دایره مماس دی او که $\Delta < 0$ وي، خط دایره نه قطع کوي.

• د هغه مستقیم خط معادله چې د $P_1(x_1, y_1)$ په نقطه کې پر هغه دایره چې مرکز یې (h, k) دی مماس وي عبارت ده له: $y - y_1 = -\frac{h - x_1}{k - y_1}(x - x_1)$ او که د دایرې مرکز د وضعیه کمیاتو په مبدا کې وي، نو د مماس معادله یې:

$yy_1 + xx_1 = r^2$ یا $yy_1 + xx_1 = x_1^2 + y_1^2$ ده او د PT مماس اوږدوالی د $P(x_1, y_1)$ له نقطې څخه چې له دایرې د باندې واقع ده او مرکز یې (h, k) دی، مساوي ده په:

$$\overline{PT} = \sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2 - r^2}$$

□

• که د یوه مثلث رأسونه $P_1(x_1, y_1)$ ، $P_2(x_2, y_2)$ او $P_3(x_3, y_3)$ وي، نو $P_1 P_2 P_3$ د مثلث مساحت د $\frac{1}{2}[x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)]$ له فورمول څخه په لاس راځي.

د څپرکي پوښتنې:

1 - د لاندې هرې جوړې نقطو ترمنځ فاصله پيدا کړئ او همدارنگه ددې مستقيمو خطونو د تنصيف د نقطو وضعيه کميات پيدا کړئ چې د A او B له دوو نقطو څخه تېرېږي.

$$A(3,1), B(-2,-4) \quad A(-8,3), B(2,-1)$$

$$A(-\sqrt{5}, -\frac{1}{3}), B(-3\sqrt{5}, 5)$$

2 - که $A(\sqrt{3}, -1)$ ، $B(0, 2)$ او $C(h, -2)$ د يوه قايم الزاويه مثلث راسونه وي او د $\hat{A} = 90^\circ$ وي، د (h) قيمت پيدا کړئ.

3 - د p د نقطې وضعيه کميات پيدا کړئ، په داسې حال کې هغه مستقيم خط چې د $A(1, 4)$ او $B(5, 6)$ له نقطو څخه تېرېږي د $\frac{AP}{PB} = 2$ په نسبت و وېشي.

4 - د هغه مستقيم خط معادله پيدا کړئ چې ميل يې (-2) او د Y محور په 3 کې قطع کړي.

5 - د $x = \sqrt{7}$ او $y = -\sqrt{7}$ د خطونو ميل پيدا کړئ.

6 - د y د محور ميل مساوي دی په:

تعريف شوی نه دی d) 0 c) 1 b) -1 a)

7 - د يوه مستقيم خط ميل $m = \frac{2}{3}$ دی، دهغه خط ميل چې پر دې خط عمود وي، مساوي دی په:

a) $\frac{2}{3}$ b) $-\frac{2}{3}$ c) $\frac{3}{2}$ d) $-\frac{3}{2}$

8 - د هغو مستقيمو خطونو ميل پيدا کړئ چې د لاندې راکړل شوو نقطو له جوړو څخه تېرېږي.

(4, 8) او (4, 6) (2, 7) او (3, -2) (5, 11) او (-2, 4)

9 - د $4x - y + 2 = 0$ او $12x - 3y + 1 = 0$ مستقيم خطونه:

نه موازي او نه عمود دي c) عمود دي b) موازي دي a)

10 - د $3x - 4y + 3 = 0$ او $3x - 4y + 7 = 0$ مستقيمو خطونو ترمنځ فاصله پيدا کړئ.

11 - د هغه مستقيم خط معادله پيدا کړئ چې د $(-4, 7)$ له نقطې تېر شي او د

$$2x - 7y + 4 = 0 \text{ له مستقيم خط سره موازي وي.}$$

- 12 - د $P(6, -1)$ نقطې فاصله د $6x - 4y + 9 = 0$ له مستقیم خط څخه پیدا کړئ.
- 13 - د p د نقطې وضعیه کمیات په داسې حال کې پیدا کړئ چې $\overline{P_1 P_2}$ مستقیم خط چې د $P_1(2, -5)$ او $P_2(6, 3)$ له نقطو څخه تېرېږي د $\frac{3}{4}$ په نسبت ووېشي.
- 14 - د لاندې مستقیمو خطونو معادلې نورمال شکل ته واړوئ.
- $$2x + 5y - 2 = 0 \qquad 2x - 3y + 6 = 0$$
- 15 - د هغه مستقیم خط میل چې د $(4, 0)$ او $(-4, 0)$ له نقطو څخه تېرېږي مساوي دی په:
- a) 1 b) -1 c) 0 d) تعریف شوي نه دی
- 16 - د هغه مستقیم خط معادله پیدا کړئ چې د نورمال اوږدوالی یې 10 واحد او نورمال خط یې د X محور له مثبت جهت سره د 30° زاویه جوړوي.
- 17 - د هغه مثلث مساحت پیدا کړئ چې راسونه یې $A(2, 3)$ ، $B(-1, 1)$ او $C(4, -5)$ وي.
- 18 - د هغه مثلث مساحت چې راسونه یې $A(1, 4)$ ، $B(2, -3)$ او $C(3, -10)$ دي مساوي دی په:
- a) 1 b) 2 c) 0 d) هېڅ یو
- 19 - د $x + 2y = 6$ د مستقیم خط د تقاطع نقطې د $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 39 = 0$ له دایرې سره پیدا کړئ.
- 20 - د هغې دایرې معادله پیدا کړئ چې د $A(1, 1)$ ، $B(2, -1)$ او $C(3, -2)$ له نقطو څخه تېرېږي.
- 21 - د هغې دایرې معادله پیدا کړئ چې د $A(3, -1)$ او $B(0, 1)$ له نقطو څخه تېرېږي او مرکز یې د $4x - 3y - 3 = 0$ پر مستقیم خط واقع وي.
- 22 - د $4x^2 + 4y^2 - 8x + 12y - 25 = 0$ دایرې د مرکز وضعیه کمیات او شعاع اوږدوالی یې پیدا کړئ.
- 23 - د هغې دایرې معادله پیدا کړئ چې د $A(4, 1)$ او $B(6, 5)$ له نقطو څخه تېرېږي او مرکز یې د $4x + y - 16 = 0$ پر مستقیم خط باندې واقع وي.

- 24 - که دیوه مثلث رأسونه $A(5,-6)$ ، $B(-3,5)$ او $C(-1,2)$ وي، دا مثلث:
- مختلف الاضلاع دی c) متساوي الساقين دی b) متساوي الاضلاع دی a)
- 25 - که دیوه مثلث رأسونه په ترتيب سره $(5,4)$ ، $(4,10)$ او $(7,8)$ وي دا مثلث:
- مختلف الاضلاع دی c) متساوي الساقين دی b) متساوي الاضلاع دی a)
- 26 - که $P(-8,4)$ او $Q(2,-1)$ وي د A د نقطې مختصات پيدا کړئ که د A نقطه د PQ خط داخلاً او خارجاً د $\frac{2}{3}$ په نسبت و وېشي.
- 27 - د $x - y + 1 = 0$ مستقيم خط د تقاطع نقطې له $x^2 + y^2 = 5$ دایرې سره پيدا کړئ.
- 28 - که د $x + ay - 5 = 0$ مستقيم خط د $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 0$ پر دایره مماس وي، د a قیمت پيدا کړئ.
- 29 - د هغې دایرې معادله چې د $(0,0)$ او $(2,0)$ له نقطو څخه تېرېږي او د $y - 1 = 0$ له مستقيم خط سره مماس وي، عبارت ده له:
- a) $x^2 + y^2 - 4x = 0$ b) $x^2 + y^2 - 2x = 0$ c) $x^2 + y^2 + 2x = 0$
- 30 - هغه دایره چې معادله یې $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 14 = 0$ ده:
- a) حقيقي ده b) نقطوي ده c) موهومي ده
- 31 - هغه دایره چې معادله یې $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 5 = 0$ ده:
- a) موهومي ده b) نقطوي ده c) حقيقي ده
- 32 - که $A(4,-3)$ او $B(-2,-5)$ وي د A او B د نقطو ترمنځ فاصله پيدا کړئ او هم د $\overline{AB}$ د خط د تنصيف نقطې وضعیه کميات پيدا کړئ.
- 33 - که دیوه مثلث رأسونه $A(-6,3)$ ، $B(3,-5)$ او $C(-1,5)$ وي، وښیاست چې دا مثلث قايم الزاویه مثلث دی.
- 34 - وښیاست چې $A(0,0)$ ، $B(a,0)$ ، $C(0,b)$ او $D(a,b)$ د یو مستطیل رأسونه دي او هم وښیاست چې د مستطیل د قطرونو اوږدوالی سره مساوي دی.
- 35 - وښیاست چې $A(3,1)$ ، $B(6,2)$ او $C(9,3)$ نقطې پر یوه مستقيم خط واقع دي.

36 - دهغه مستقيمو خطونو معادلې پيدا کړئ چې د لاندې هرو جوړولو له نقطو څخه تېرېږي.

(5,8)	(1,2)	(3,5)	(8,15)
(-1,-3)	(2,-1)	(-2,-1)	(3,-4)
(0,3)	(5,0)	(0,2)	(-2,0)


37 - دهغه مستقيم خط معادله چې د (5,8) او (-1,10) له نقطو څخه تېرېږي عبارت ده له:

$$a: y = -\frac{1}{3}x + 9\frac{2}{3}$$

$$b: y = -\frac{x}{3} + 9\frac{2}{3}$$

$$c: y = -\frac{1}{3}x + \frac{29}{3}$$


d: درې واړه سم دي



اتم خیر کی احصائیہ



د فریکونسي څو ضلعي گراف (Frequency Polygon graph)



مخامخ شکل په پام کې ونیسئ، آیا کولای شئ د راکړل شوي منحنی لاندې مساحت پیدا کړئ؟
آیا ویلای شئ چې تر منحنی لاندې مساحت له څه شي سره برابر دی؟

فعالیت

د فریکونسيو مخامخ جدول په نظر کې ونیسئ.

کلاسونه	د کلاس (صنف) مرکز	فریکونسي
10-13	11.5	3
13-16	14.5	6
16-19	17.5	7
19-22	20.5	4

• د هر کلاس (صنف) مرکز د لومړۍ مختصې او اړونده فریکونسي یې د دویمې مختصې په حیث د مرتبو جوړو په شکل په نظر کې ونیسئ.

• ددې مرتبو جوړو موقعیت د قایمو وضعیه کمیانو په سیستم کې وټاکئ.
• هغه نقطې چې په مستوي کې له دې مرتبو جوړو څخه په لاس راځي، سره ونښلوئ.

آیا کولای شئ چې ددې گراف لاندې مساحت پیدا کړئ؟

• د X پر محور د گراف دواړو خواوو ته $(8.5, 0)$ او $(38.5, 0)$ نقطې زیاتې کړئ. په لاس راغلی گراف د فریکونسي جدول له مستطیلې گراف سره یوځای رسم کړئ او د مستطیلونو مساحت د منحنی لاندې مساحت سره پرتله کړئ.

په څو ضلعي گراف کې د هر کلاس مرکز پر افقي محور اود هر کلاس مطلقه فریکونسي یا نسبي

فريکونسي پر عمودي محور بنودل کېږي، د کلاس مرکز (منځني نقطه) او د کلاس د فريکونسيو په مقابل کې په مستوي کې يوه نقطه ټاکل کېږي چې عرض يې د کلاس مرکز او اوږدوالی يې د هماغه کلاس له فريکونسيو سره برابر دی، د جدول د کلاسونو په شمېر په مستوي کې په هماغه اندازه نقطې په لاس راځي. که د کلاسونو په اول او اخر کې دوي نورې د $(x_1 - c, 0)$, $(x_n + c, 0)$ اختياري نقطې زياتې کړئ، څرنگه چې c د هر کلاس وسعت دی يعنې (پاسني سرحد منفي د هماغه صنف لاندینی سرحد) چې ددې نقطو له نښلولو څخه يو گراف په لاس راځي چې د فريکونسي څو ضلعي گراف نومېږي.

مثال: د لاندې جدول د ډيټا (Data) مستطيلي (هستوگرام) او د فريکونسيو څو ضلعي گرافونه يې رسم کړئ.


CL = د کلاسونو حدود	11-16	16-21	21-26	26-31	31-36
f_i = مطلقه فريکونسي	3	5	8	7	2
X_i = د کلاسونو مرکز	13.5	18.5	23.5	28.5	33.5

پوهېږو چې $c = 5$ ده، ددې لپاره چې دوه اختياري نقطې په لاس راوړو، نو:

$$(x_1 - 5, 0) = (13.5 - 5, 0) = (8.5, 0)$$


$$(x_n + 5, 0) = (33.5 + 5, 0) = (38.5, 0)$$

ددې نقطو $(8.5, 0)$ او $(38.5, 0)$ په اضافه کولو سره گراف رسموو:



د فريکونسي څو ضلعي گراف

مستطيلي گراف د فريکونسيو څو ضلعي گراف سره:



له پورتنی گراف څخه لیدل کیږي چې:

- د فريکونسيو څو ضلعي گراف راسونه تر مطالعې لاندې د فريکونسيو له جدول د اړونده مستطیل

د پورتنی ضلعي منځني نقطه سره واقع دي.

- د فريکونسيو څو ضلعي گراف د لاندې سطحې مساحت د مستطيلي گراف له مساحت سره برابر

دی.

- د نسبي فريکونسيو څو ضلعي گرافونه زیات د متصلو ډیټاوو (Data) له پاره کارول کیږي.

پوښتنې

1 - د نهم اولسم ټولگيو د 24 زده کوونکو د تنې لوړوالی د سانتي متر په حساب په لاندې ډول راکړل شوی دی.

138	107	136	128	148	118
142	129	115	123	133	123
121	128	122	144	126	135
152	98	117	153	141	126

د پورتنۍ ډیټا (Data) لپاره د فریکونسي یو جدول ترتیب کړئ. ډیټا (Data) په شپږو طبقو ووېشئ، ددې ډیټا (Data) د ښودلو لپاره کوم ډول گراف ښه دی، د فریکونسيو څو ضلعي گراف رسم کړئ.

د ساقې او پاڼې گراف



موږ د عددونو په نړۍ کې ژوند کوو، هر تن د خپل هیواد د ټولنې د یو غړی په حیث یوه خاصه شمېره لري چې د نورو مشخصو په شان د اهمیت وړ ده. آیا ویلای شئ چې دا شمېره څه شی ده؟ او آیا تاسو هم خپله شمېره پیژنئ؟

فعالیت

- په لاندې جدول کې د سانتي متر په حساب د 20 نویو پیدا شوو ماشومانو د تنې لوړوالی چې په تصادفي ډول انتخاب شوی دی، راکړل شوی دی.

45	46	47	43	49	40	42	46	45	43
43	43	48	49	47	49	48	49	47	45

- پورتنی ډیټا (Data) له کوچني عدد څخه لوی عدد ته ترتیب کړئ.
- لیدل کېږي چې په دې ټولو عددونو کې د 4 رقم مشترک دی، کولای شو چې دا رقمونه په لاندې ډول ولیکو.

$$40 + (0, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9)$$

- له 0 تر 9 پورې رقمونه هر یو رقم څو وارې تکرار شوی دی.

پورتنی رقمونه په لاندې شکل لیکو.

4	0			
	2			
	3	3	3	3
	5	5	5	
	6	6		
	7	7	7	
	8	8		
	9	9	9	9

• که د عددونو پورتنی شکل د 90° زاویې په اندازه کینې خوا ته دوران ورکړئ، دا شکل له کوم ډول گراف سره مشابه دی؟

ډیټا عموماً د عددونو په شکل وي. له دې عددونو څخه څرنگه چې په پورتنی فعالیت کې ولیدل شول، کولای شو، گراف یې جوړ کړو چې دا گراف د ساقې او پانې د گراف په نامه یادېږي. او که دې گراف ته د 90° زاویې په اندازه کینې خواته دوران ورکړو، میله یې گراف لاس ته راځي. د مثال په ډول که ډیټا د صفر او 100 ترمنځ وي، کولای شو، لکه: د 37 عدد 3 په ساقه او (7) د پانې په حیث ولیکو.

د ساقې او پانې گراف د هغو ډیټا (Data) لپاره چې تر ټولو لوی او تر ټولو کوچنی ډیټا (Data) ترمنځ توپیر یې لږ وي، مناسب دی.

لومړی مثال: د کتابونو په یو پلورنځي کې 20 ډوله کتابونه چې هر ډول شمېر یې په لاندې جدول کې راکړل شوی دی، ددې ډیټا (Data) د ساقې او پانې گراف رسم کړئ.

10	11	15	23	27	28	38	38	39	39
40	41	44	45	46	46	52	57	58	65

حل: ښکاره ده چې د ډیټا (Data) د کینې خوا اولني عددونه 1.2.3.4.5 او 6 دي. چې دا عددونه د ساقې لپاره په نظر کې نیسو. او د هرې څانگې اړونده ډیټا ورته ددې عددونو مخکې لیکو چې په لاندې ډول لاس ته راځي.

ساقه	پانې			
1	0	1	5	
2	3	7	8	
3	8	8	9	9
4	0	1	4	5 6 6
5	2	7	8	
6	5			

که د کتاب مخ ته د ساعت د ستنې حرکت په مخالفه خوا کې د 90° زاوې په اندازه دوران ورکړو. دا گراف د میله یي گراف په شکل بدلېږي چې په لاندې ډول یې لیکلای شو.

6						6
5						6
4			9	5		
3	5	8	9	4	8	
2	1	7	8	1	7	
1	0	3	8	0	2	5
	1	2	3	4	5	6

دویم مثال: د ریاضي په یوه امتحان کې لاندې نتیجې له زده کوونکو څخه پلاس راغلي دي، ددې ډیتا لپاره د ساقې او پانې گراف رسم کړئ.

25 45 46 50 50 50 55 55 55 55
55 57 58 58 60 60 62 65 67 72

حل: د ساقې د رسم لپاره له لسیزو رقمونو او د پانې د ترسیم لپاره له یوویزو رقمونو څخه استفاده کوو:

ساقه	پانې
2	5
3	
4	5 6
5	0 0 0 5 5 5 5 5 7 8 8
6	0 0 2 5 7
7	2

1- د لاندې ډیټا (Data) لپاره د ساقې او پانې گراف رسم کړئ.

7.9	8.3	10.9	11.7	8.4	9.1	6.8	12.5
11.2	7.8	12	11.3	8.4	13	6.8	

پاملرنه: د ساقې او پانې د گراف د ښودلو لپاره د 8.3 عدد د 83 په شکل او د 11.2 عدد د 112 په شکل او د 12 عدد د 120 په شکل لیکو.


رېځې (څلورمې)



په مخامخ شکل کې که دا د خلکو ټولنه نظر د
دوی د تنې د لوړوالي په نسبت په څلورو مساوي
برخو و وېشل شي، هره برخه یې په کوم نامه
یادوي ؟

فعالیت

مخامخ شکل یو مستطیل دی چې د Q_1 , Q_2 او Q_3 خطونو په واسطه په څلورو مساوي برخو وېشل شوی دی.



- د مستطیل د مساحت څو فیصده مساحت د Q_1 د خط لاندې، څو فیصده مساحت د Q_1 د خط له پاسه واقع دی ؟
- د مستطیل څو فیصده مساحت د Q_2 تر خط لاندې او څو فیصده مساحت د Q_2 د خط له پاسه دی ؟
- د مستطیل څو فیصده مساحت د Q_3 تر خط لاندې او څو فیصده مساحت د Q_3 د خط له پاسه دی ؟

هغه عددونه چې ترتیب شوي ډیټا په څلورو مساوي برخو وېشي، دغه عددونو ته لومړۍ ربع، دویمه ربعه او دریمه ربع وایي او په Q_1 , Q_2 او Q_3 سره ښودل کېږي.

لومړۍ ربع هغه مقدار دی چې 25% ډیټا له هغې لاندې او 75% ډیټا له هغې پورته واقع وي.

دویمه ربع هغه مقدار دی چې 50% ډیټا له هغې لاندې او 50% ډیټا له هغې پورته واقع وي.

دریمه ربع هغه مقدار دی چې 75% ډیټا ترې لاندې او 25% ډیټا یې له پاسه واقع وي.

که ډیټا (Data) په صعودي ډول ترتیب کړو، د ډیټا (Data) میانه د Q_2 سره مساوي لومړنۍ نیمایي

ډیټا (Data) میانه له Q_1 سره مساوي او همدارنګه د دویمې نیمایي میانه له Q_3 سره مساوي ده.

د ربعو د پیدا کولو په وخت کې لاندې پړاونه په پام کې ونیسئ.

- دیتا (Data) په صعودي ډول ترتیب کړئ.
- ترتیب شوی دیتا ته له (1) څخه تر n پورې شمېره (کوډ) ورکړئ.
- د P ام موقعیت ($P=1,2,3$) دلاندې رابطې په مرسته په لاس راځي.

$$C_{QP} = \frac{P \cdot n}{4} + \frac{1}{2}$$

- د ربعي د موقعیت په اساس، د ربعي مقدار وټاکئ.
- مثال:** فرض کړئ په لاس راغلي دیتا (مشاهدي) په لاندې ډول راکړل شوي وي.

140 100 120 80 85 90

د لومړي او دريمې ربعي ځايونه وټاکئ.

د لومړي او دريمې ربعي مقدارونه پلاس راوړئ.

د دیتا شمېره: 6 5 4 3 2 1

دیتا: 140 120 100 90 85 80

د لومړي او دريمې ربعي ځايونه عبارت دي له:

$$C_{Q_1} = \frac{1 \cdot 6}{4} + \frac{1}{2} = 2$$

$$C_{Q_3} = \frac{3 \cdot 6}{4} + \frac{1}{2} = 5$$

نو د لومړي او دريمې ربعي مقدارونه مساوي دي په:

$$Q_1 = 85$$

$$Q_3 = 120$$


پوښتنې

فرض کړئ په لاس راغلي دیتا په لاندې ډول راکړل شوي وي.

85 140 160 120 80 90 100

- لومړي او دريمه ربعي (خلورمې) پيدا کړئ.
- له ميانې تر مخه عددونه وليکئ.
- له ميانې وروسته عددونه په لاس راوړئ.

صندوقچه یی گراف



د یوې تختې کاغذ له څلورو کنجونو څخه څلور مربعگانې چې هره ضلع یې 5cm وي، جلا کړئ، بیا د کاغذ څنډې له پورته خواڅخه قات کړئ.
کوم شکل چې په لاس راځي، له څه شي سره ورته والی لري؟

فعالیت

د هغه ناروغانو شمېر چې د 17 ورځو، په موده کې یوه روغتون ته راغلي دي، په لاندې ډول ثبت شوي دي.

11	10	15	23	14	27	16	17	24
28	13	31	31	18	25	26	19	

- میانه یې پیدا کړئ.
- هغه عددونه ولیکي چې د میانې تر مخې نیمایي کې پراته دي.
- ددې عددونو لپاره میانه پیدا کړئ.
- هغه عددونه ولیکي چې د میانې په وروسته نیمایي کې پراته دي.
- ددې عددونو لپاره میانه پیدا کړئ.


• دویمه ربع (څلورمه) یا Q_2 کوم عدد دی؟

صندوقچه یی یا جعبه یی گراف: دا یو داسې تصویري گراف دی چې د ډیټا (Data) تیت والی د نورو گرافونو په نسبت ښه روښانه کوي، د اگراف د لاندېنیو اندازو پر بنیاد د ډیټا (Data) گراف ښکاره کوي.

الف) تر ټولو کوچنی ډیټا ب) لومړنی ربع (څلورمه) ج) میانه

د) دریمه ربع ه) تر ټولو لویه ډیټا

صندوقچه یی گراف د ربعو او له زیات نه زیات او کم تر کمه ډیټا (Data) ښودونکی دی.



کولای شو د صندوقچه یې گراف د رسمولو پراوونه په لاندې ډول ولیکو:

الف) تر ټولو کوچنی ډیټا پیداکړئ. ب) تر ټولو لویه ډیټا پیداکړئ

ج) میانه پیداکړئ د) لومړۍ ربع پیداکړئ

ه) دریمه ربع پیداکړئ و) گراف رسم کړئ.

مثال: که په یو ښار کې د 15 ورځو په موده کې د ترافیکي پیښو شمېر په لاندې ډول راکړل شوي

وي، صندوقچه یې گراف یې رسم کړئ.


12	10	15	23	14	27	16	34
41	43	32	18	25	31	19	

حل: پورتنی ډیټا په ترتیب لیکو.

10 12 14 15 16 18 19 23 25 27 31 32 34 41 43

نو: تر ټولو کوچنی ډیټا = 10 تر ټولو لویه ډیټا = 43

میانه = 23 لومړۍ ربع = $Q_1 = 15$ دریمه ربع = $Q_3 = 32$



پورتنی گراف صندوقچه یې گراف دی چې 50% ډیټا د صندوق په داخل کې (د لومړۍ، دریمې او ربعي ترمنځ) پرتې دي، 25% یې 10 او 15 ترمنځ او 25% ډیټا د 32 او 43 ترمنځ پرته ده.

د نارمل منحني د مرکزي ټاکوونکو پرتله کول

$$\text{mod} = ?$$

$$\text{med} = ?$$

$$\bar{x} = ?$$

آيا کولای شو چې د نارمل منحني په مرسته
مرکزي ټاکوونکی پلاس راوړو؟

لاندې کوم منحني چې وینئ، په احصائیه کې یوله مشهورو منحني گانو څخه دی، کولای شو چې زیاتې طبیعي پیښې ددې منحني په مرسته وښایو. نارمل منحني یو متناظره منحني دی چې د یوه زنگ په شان شکل لري.

• آیا د اوسط، میاني او موډ د مرکزي ټاکوونکو ځایونه په دې منحني کې بنودلای شئ؟


فعالیت

- که په یوه ټولګي کې ټول زده کوونکي ښې نمرې واخلي:
- آیا څه فکر کوئ چې ددوی د نمرو اوسط هم ښه دی؟
- آیا د اوسط لوړوالی د ټولګي د تعلیمي وضعي پر ښه والي دلالت کوي؟
- ددې لپاره چې د ټولګي وضع ښه ارزایي کړی، نیم ټولګی باید ښې نمرې واخلي.
- هغه کومه نمره ده چې د نیمایي ټولګي د زده کوونکو نمرې له هغې زیاتې وي؟

- که میانه له اوسط خخه ډېره کوچنۍ وي، له دې خخه څه شی په لاس راځي؟
 - که میانه له اوسط خخه ډېره لویه وي، له دې خخه څه شی په لاس راځي؟
- د پورتنی فعالیت او د منحنی له متناظر والی خخه نتیجه په لاس راځي چې د میانې او اوسط ځای په نارمل منحنی کې یو دی او څرنگه چې نارمل منحنی اعظمي نقطه لري، نو له همدې سببه د موډ ځای هم له اوسط او میانې سره مساوي دی یعنې:

$$\bar{X} = \text{mod} = \text{md}$$

که نارمل منحنی، متناظره نه وي، په دې حالت کې لرو چې:




- که چېرې اوسط او میانه سره مساوي وي، له اوسط او میانې خخه تر مخه او له اوسط او میانې خخه وروسته ډیتاګانې سره مساوي دي.

- که اوسط د میانې کینې خواته پروت وي، د هغو ډیتا شمېر چې د اوسط بڼې خواته پرتي دي، د هغو ډیتا (Data) له شمېر خخه چې د اوسط کینې خواته پرتي دي، زیات دی، لکه: د a به شکل کې.

- که اوسط د میانې بڼې خواته پروت وي، د هغه ډیتا (Data) شمېر چې د اوسط بڼې خواته پرتي دي، د هغه ډیتاوو (Data) له شمېر خخه چې د اوسط کینې خواته پرتي دي، لږ دي.

لکه د b به شکل کې

مثال: په لاندې گراف کې اوسط او میانه پیدا کړئ.



حل:

= میانه

$$\text{med} = \frac{4+5}{2} = \frac{9}{2} = 4.5$$


= اوسط

$$\bar{x} = \frac{a \cdot 1 + a \cdot 2 + a \cdot 3 + a \cdot 4 + a \cdot 5 + a \cdot 6 + a \cdot 7 + a \cdot 8}{a + a + a + a + a + a + a + a}$$

$$\bar{x} = \frac{36a}{8a} = 4.5$$


مثال: په لاندې گراف کې د موډ تقریبي قیمت پرته له محاسبې په گوته کړئ.

حل:



پوښتنې

1- دلاندې صندوقچه یې ګراف په نظر کې نیولو سره لاندې اړوندو پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ.



- په پورتنۍ ګراف کې میانه څومره ده؟
- په دې ډیتا کې لومړنۍ، ربع د 8 عدد دی، دا عدد، څه شی ښیي؟
- دریمه ربع څو ده؟ دا عدد، د څه شي ښودونکی ده؟
- دا چې میانه د صندوق کینې خواته ده، د څه شي ښکارندویه دی؟
- دا چې د کینې خوا د عددونو شمېر نظر ښې خوا ته زیات دی دا زیاتوالی د څه ښکاره کوونکی دی؟


2- د یوه هېواد د فوټبال ملي ټیم د لوبغاړو عمرونه په لاندې ډول دي.

25	24	26	19	31	18	23	22	25	26
25	27	23	29	25	25	33	31	26	

د لاندې نتیجو څخه کومه یوه سمه ده؟

- د هغو لوبغاړو شمېر چې عمرونه یې له اوسط څخه لوړ وي، ډېر دي.
- د هغو لوبغاړو شمېر چې عمرونه یې له میانې څخه لوړ وي، ډېر دي.
- د هغو لوبغاړو شمېر چې عمرونه یې له اوسط څخه ښکته وي، ډېر دي.
- د هغو لوبغاړو شمېر چې عمرونه یې له اوسط څخه ډېر وي د هغه لوبغاړو له شمېر سره مساوي دی چې عمرونه یې له اوسط څخه لږ دي.

ربعي انحراف



$$X_n - X_1 = ?$$

$$Q_3 - Q_1 = ?$$

که د یوې ټولنې د احصائیوي تغیراتو لمن لویه وي، آیا فکر کوئ چې د ډیټا د تحول ساحه به له ټولنې څخه نامناسبه پایله وړاندې کړي؟

فعالیت

له یو موزیم څخه د لیدونکو شمېر په 12 ورځو کې په لاندې ډول دی.

0 1 2 8 7 6 5 9 10 6 15 11

- ددې ډیټا (Data) د تحول ساحه پلاس راوړئ.
- په عمومي ډول پورتنۍ ډیټاوې د کومو دوو عددونو ترمنځ تیت شوي دي؟
- یو په څلورمه برخه ډیټا له پورته اوبښکته خوا څخه حذف کړئ او بیا د پاتې ډیټا (Data) د تحول ساحه پیدا کړئ.
- دا د تحول دوه ساحې چې په لاس راغلي دي، یو له بله سره یې پرتله کړئ، کومه یو ه یې ډېر تیت والي ښيي؟
- په ځینو وختونو کې د تحول ساحه د دوو ډېرو کوچنیو او یا ډېرو لویو مقدارونو له سببه، نامناسبه تعبیرونه له ټولنې څخه موږ ته په لاس راکوي.
- نو له دې امله د نورو ټاکنو څخه چې د ربعو د انحراف په نامه یادېږي، ګټه اخیستل کېږي، تر څو د ټولنې د تحول ساحه په ښه ډول وټاکي.

که Q_1 او Q_3 په ترتیب سره د ډیټا د سټ، لومړۍ ربع او دریمه ربع وي، نو د ربعو انحراف په (Q) سره ښودل کېږي او په لاندې ډول تعریف شوي دي.

$$Q = Q_3 - Q_1$$

ربعي انحراف یو له هغو ټاکنو څخه دی چې د ډیټا (Data) تیت والې ښکاره کوي. داسې چې د لومړۍ او دریمې ربعې له تعریف څخه پوهېږو چې 50% ټولنه د $Q_3 - Q_1$ په فاصله کې پرته ده. په هره اندازه چې دا فاصله لږه وي، ډیټا سره نژدې دي، یا په بل عبارت د هغوی

تیت والې لږ دی.

ځېنې وختونه د ربعو (څلورمو) انحراف د $Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$ په شکل تعریفوي او دې ته د ربعو نیمایې لمن وایي.

مثال: دلاندې عددونو د ربعو (څلورمو) انحراف پیدا کړئ.

36 35 29 30 31 25 24 23 22 22 20

حل: لومړی عددونه په صعودي ډول ترتیب کوو او بیا ورته یوه شمېره ټاکو:

20 22 22 23 24 25 29 30 31 35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

$$C_{Q_n} = \frac{P \cdot n}{4} + \frac{1}{2}$$

$$C_{Q_3} = \frac{3 \cdot 11}{4} + \frac{1}{2} = \frac{33}{4} + \frac{1}{2} = \frac{33+2}{4} = \frac{35}{4} = 8.75$$

$$Q_3 = 30.75$$

نوله دې ځایه:

$$C_{Q_1} = \frac{1 \cdot 11}{4} + \frac{1}{2} = \frac{11}{4} + \frac{1}{2} = \frac{11+2}{4} = \frac{13}{4} = 3.25$$

همدارنگه:

$$Q_1 = 22.25$$

نوله دې ځایه:

د لومړنۍ او دریمې، ربعي قیمتونه

په ترتیب سره 22.25 او 30.75 دي نو:

$$Q = Q_3 - Q_1 = 30.75 - 22.25 = 8.5$$


پوښتنې

1 - د لاندې ډیټا د تحول ساحه، د ربعو (څلورمو) انحراف او موډ پیدا کړئ او وویاست چې د ډیټا گڼوالی په کومه ساحه کې ډېر دی.

5 11 12 14 15 15 16 17 30

2 - د لاندې ډیټا د تحول ساحه او د څلورمو انحراف پیدا او د لومړي پوښتنې د تحول د ساحې او د څلورومو د انحراف سره یې پرتله یې کړئ.

27 24 21 29 28 26 23 22



واریانس (variance)

که ستاسو لامبو ښه زده نه وي او وغواړي چې په داسې ډنډ کې ولامبي چې ژور والی یې په ټولو برخو کې یو شان نه وي. ددې لپاره چې په ډاډه زړه ولامبي، کوم معلومات باید ولري؟

فعالیت

که د لمبا په یو ډنډ کې د یوځای ژوروالی 1.5 متره او ډبل ځای ژوروالی یې 2.5 متره وي.

- ددې ډنډ د دواړو ځایونو د ژوروالي اوسط پیدا کړئ.
- ددې دوو ډنډونو د انحرافونو مربع له حسابي اوسط څخه پیدا کړئ.
- ددې دوو ډنډونو د انحرافو د مربعگانو مجموعه پیدا کړئ.
- د پورتنیو ډنډونو (Data) مجموعه د مجموعې د غړو پر شمېر وېشي.
- د $x_1, x_2, \dots, x_n$ ډنډ د واریانس د پیدا کولو لپاره لاندې پړاوونه په نظر کې ونیسئ.
- د ډنډ اوسط پیدا کړئ یعنې:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

- د انحرافونو د مربعگانو مجموعه یعنې:

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = (x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2$$

په لاس راوړئ.

- پورتنۍ مجموعه د مجموعې د غړو پر شمېر (n) وېشي او په S^2 یې وښيي:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}$$

چې دلته S^2 د واریانس په نامه یادېږي. واریانس برابر دی د انحرافونو د مربع اوسط له اوسط څخه. **پاملرنه:** ځینې وختونه واریانس د پیدا کولو لپاره له دې لاندې فورمول څخه هم گټه اخلي.

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \bar{x}^2$$

ثبوت: پورتنی فورمول کولای شو، په لاندې ډول لاس ته راوړو.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \Rightarrow \sum_{i=1}^n x_i = n\bar{x} \quad \text{پوهېږو چې:}$$

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2)}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \frac{\sum_{i=1}^n 2x_i\bar{x}}{n} + \frac{\sum_{i=1}^n \bar{x}^2}{n}$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - 2\bar{x} \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} + \frac{n\bar{x}^2}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - 2\bar{x} \cdot \bar{x} + \bar{x}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \bar{x}^2$$

مثال: د لاندې ډیټا (Data) واریانس د دواړو فورمولونو په مرسته پیدا کړئ.

1 5 6 7 9

الف: د $S^2 = \frac{\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2}{5}$ له فورمول څخه څرنگه چې $i = 1, 2, 3, 4, 5$

$$\bar{x} = \frac{1+5+6+7+9}{5} = 5.6$$

$$S^2 = \frac{(1-5.6)^2 + (5-5.6)^2 + (6-5.6)^2 + (7-5.6)^2 + (9-5.6)^2}{5}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(-4.6)^2 + (-0.6)^2 + (0.4)^2 + (1.4)^2 + (3.4)^2}{5} \\
 &= \frac{21.16 + 0.36 + 0.16 + 1.96 + 11.56}{5} = \frac{35.2}{5} = 7.04 \\
 &S^2 = \frac{\sum_{i=1}^5 x_i^2}{5} - \bar{x}^2
 \end{aligned}$$

ب: له دې فورمول $S^2 = \frac{\sum_{i=1}^5 x_i^2}{5} - \bar{x}^2$ څخه هم کولی شو چې همدا قیمت په لاس راوړو

$$\begin{aligned}
 S^2 &= \frac{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2}{5} - \bar{x}^2 = \frac{192}{5} - (5.6)^2 \\
 &= 38.4 - 31.36 = 7.04
 \end{aligned}$$

يادونه: که ډیټا په گروپونو (کلاسونو) کې ترتیب شوي وي او د کلاسونو مرکزونه $x_1, x_2, \dots, x_n$ او $f_1, f_2, \dots, f_n$ فریکونسي هم راکړل شوي وي. په دې حالت کې د واریانس د پیدا کولو لپاره له لاندې فورمول څخه کار واخلو:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n f_i (x_i - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n f_i} = \frac{\sum_{i=1}^n f_i (x_i - \bar{x})^2}{N}$$

داسې چې $N = \sum_{i=1}^n f_i$ دی.

د واریانس د واحد ټاکل مشکل دي. په عمومي ډول په عمل کې مطلقه قیمت یې نیول کېږي، ځېنې وخت د متحول د واحد مربع د واریانس د واحد په حیث گڼل کېږي.


پوښتنې

د هغو ساعتونو شمېر چې زده کوونکو په یوه اونۍ کې د لوبو کولو لپاره ټاکلي دي، په لاندې ډول راکړل شوي دي.

3 2 1 4 3 2 2

ددې ډیټا (Data) وړانګې پیدا کړئ.

معیاري انحراف



که S دوریانس جذر $\bar{X}$ دیتا اوسط وي
مخامخ شکل کوم ډول ټاکونکی توضیح کوي؟

فعالیت

که S^2 د $x_1, x_2, \dots, x_n$ دیتا واریانس وي. آیا څه فکر کوئ چې د S^2 او S واحدونه سره څه توپیر لري؟ فرض کړئ چې په یوه اونۍ کې یوې کارخانې ته د توکو د فرمایشونو د تسلیمې وخت له ځېنو ټاکونکو سره، لکه: انحراف، د انحراف مطلقه قیمت د انحرافو مربع په لاندې جدول کې راکړل شوی وي، څرنگه چې:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^5 x_i}{n} = \frac{8+9+6+4+8}{5} = \frac{35}{5} = 7$$

ورکړې وخت په ورځ x_i	$\bar{x}$	انحراف $x_i - \bar{x}$	د انحراف مطلقه قیمت $ x_i - \bar{x} $	د انحرافونو مربع $(x_i - \bar{x})^2$
8	7	1	1	1
9	7	2	2	4
6	7	-1	1	1
4	7	-3	3	9
8	7	1	1	1

- د ډیټا (جامو) د ورکړې د وخت اوسط پیدا کړئ.
 - د انحرافو د مطلقه قیمت اوسط یا په لنډ ډول د انحراف اوسط (AD) پیدا کړئ.
 - د توکو د ورکړې وخت واریانس پیدا کړئ.
 - د واریانس مربع جذر محاسبه کړئ.
 - د واریانس د مربع جذر واحد د واریانس له واحد سره پرتله کړئ.
 - د واریانس له فورمول څخه مو زده کړل چې په توان ورپلو سره نه یوازې دا چې د واریانس اندازه کولو مقیاس له شک سره مخامخ کوي، بلکې انحرافونه هم لوی ښیي.
 - ددې لپاره چې دا ستونزې له مینځه یوسو، په کار ده چې د واریانس مربع جذر په لاس راوړو.
 - د واریانس جذر د ډیټا (Data) د تیت والي، یو بل ټاکوونکی د معیاري انحراف یا مطلق تیت والي په نوم را پیژني.
 - معیاري انحراف چې د S په سمبول ښودل کېږي، د واریانس له مربع جذر سره مساوي دی.
- په دې معنا:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \bar{x}^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}\right)^2}$$

د معیاري انحراف یا د مطلق تیت والي واحد هم هغه د متحول واحد دی.
پورتنی رابطه په لاندې ډول ثبوت کېږي:

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2\bar{x}x_i + \bar{x}^2) \\ &= \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\bar{x} \sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n \bar{x}^2 \right) = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2n\bar{x}^2 + n\bar{x}^2 \right) \\ &= \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2 \right) = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \right)^2 \right) = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n} \right) \\ S^2 &= \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \right)^2 \Rightarrow S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \right)^2} \end{aligned}$$

مثال: د 5 ناروغانو د بدن د حرارت درجې په لاندې ډول راکړل شوي دي.

38 39 39 40 41

معياري انحراف يې پيدا کړئ
حل:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{38+39+39+40+41}{5} = \frac{197}{5} = 39.4$$

$$S^2 = \frac{(38-39.4)^2 + (39-39.4)^2 + (39-39.4)^2 + (40-39.4)^2 + (41-39.4)^2}{5}$$

$$S^2 = \frac{(-1.4)^2 + (-0.4)^2 + (-0.4)^2 + (0.6)^2 + (1.6)^2}{5}$$

$$S^2 = \frac{1.96+0.16+0.16+0.36+2.56}{5} = \frac{5.2}{5} = 1.04$$

$$S = \sqrt{1.04} = 1.01980$$

پاملرنه: د فریکونسيو له جدول څخه، معياري انحراف په تقریبي ډول په لاندې ډول په لاس راځي:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n f_i (x_i - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n f_i}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n f_i x_i^2}{\sum_{i=1}^n f_i} - \bar{x}^2}$$

چې $\bar{x}$ د ډیټا، اوسط، x_i د کلاس مرکز او f_i د کلاس فریکونسي نښي.

پوښتنې

د څلورو ټلويزوني سټیشنونو د ښوونې او روزنې د پروگرامونو د خپرولو د ساعتونو شمېر په لاندې ډول راکړل شوی دی، د ډیټا معياري انحراف پيدا کړئ.

1 3 4 5

• **د فريکونسي څو ضلعي گراف:** د هغو مرتبو جوړو نقطې چې عرض يې د کلاس مرکز او اوږدوالی يې د هماغه کلاس له فريکونسي سره مساوي دی، يوه له بلې سره ونښلوو، د فريکونسي څو ضلعي گراف په لاس راځي، د فريکونسي په څو ضلعي گراف کې دوې نورې اختياري نقطې د صفر په فريکونسي د کلاسونو (گروپونو) په لومړۍ او اخيرنۍ برخه کې ډېروو، تر څو د فريکونسي څو ضلعي گراف له محور سره ونښلوي.

• **د ساقې او پاڼې گراف:** د ساقې او پاڼې د گراف د رسمولو لپاره له عددونو څخه گټه اخيستل کېږي. احصائيو ديتا د عددونو په شکل راوړو، بيا له دې عددونو څخه د ساقې او پاڼې گراف رسموو. دا ډول گراف د هغو ديتا (Data) لپاره چې د رقمونو د شمېر له مخې تر ټولو لوی او کوچنی رقم تر منځ توپير لري، مناسب دی.

• **ربعي:** هغه عدد چې مرتبه جامعه په دوو مساوي برخو ووېشي، د ميانې په نوم يادېږي. اوس هغه عددونه په نظر کې ونيسئ چې مرتبه جامعه په څلورو مساوي برخو ووېشي، دا عددونه په Q_1, Q_2 او Q_3 سره ښودل کېږي، دې عددونو ته په ترتيب سره لومړۍ ربع، دويمه ربع او د دريمه ربع وايي. ښکاره ده چې Q_2 ميانه ده.

• **صندوقچه يې يا جعبه يې گراف:** له دې گراف څخه د هغې ديتا (Data) لپاره چې سره نژدې دي يا هغه ديتاوې چې د اوسط پر شاوخوا راټولې شوي دي او يا هم هغه ديتا چې تر ټولو لويو يا تر ټولو کوچنيو ديتاگانو پر شاوخوا راټولې شوي وي، گټه اخيستل کېږي، دا گراف يو تصويري گراف دی چې تر ټولو لويې ديتا، تر ټولو کوچنۍ ديتا، ميانې، لومړۍ ربعي او دريمې ربعي په اساس ښکاره کوي.

• **د نارمل منحني په بنياد د مرکزي ټاکونکو پرتله کول:** څه وخت چې وغواړو مرکزي ټاکونکي (اوسط، ميانه، او موډ) له نارمل منحني څخه په گټه اخيستنې سره پرتله کړو: په دې حالت کې که نارمل منحني متناظر وي، نو اوسط، ميانه او موډ سره مساوي دي. که نارمل منحني متناظر نه وي، نو مرکزي ټاکونکي نظر خپل موقعيت ته د منحني ښې خوا يا کينې خواته قيمتونه اخلي.

• **ربعي انحراف:** که Q_1 او Q_3 په ترتيب سره د ديتا (Data) لومړۍ ربع او دريمه ربع وي، کولای شو چې د څلورمو (ربعي) انحراف (Q) په لاندې ډول وليکو

$$Q = Q_3 - Q_1$$

له پورتنۍ تعريف څخه ښکاري چې 50% ټولنه د $Q_3 - Q_1$ په فاصله کې پرته ده. په هره اندازه

چې دا فاصله لږه وي، ډیټا گڼې دي او د ډیټا تیت والی لږ دی.

• **واریانس:** د تیت والی ټاکونکي هغه مقدارونه دي چې د ډیټا (Data) د تیت والی حالت نسبت

یو بل ته او نسبت یې اوسط ته ټاکي.

واریانس د تیت والی له ټاکونکو څخه یو مهم ټاکونکی دی چې په S^2 سره ښودل کېږي او له لاندې رابطې څخه په لاس راځي:

$$S^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

د واریانس پیدا کول د فریکونسي په جدول کې له دې فورمول څخه په لاس راځي:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n f_i (x_i - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n f_i} \quad (x_i \text{ د کلاس مرکز دی})$$

• **معیاري انحراف:** د واریانس مربع جذر په S ښیي چې معیاري انحراف ورته وایي:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$


د معیاري انحراف پیدا کول د فریکونسي له جدول څخه د لاندې فورمول څخه په لاس راځي:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n f_i (x_i - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n f_i}} \quad (x_i \text{ د کلاس مرکز دی})$$

د څپرکي پوښتنې

1 - لاندې گراف د باد سرعت په 19 ورځو کې ښکاره کوي، په گراف کې د راکړل شوو اطلاعاتو پر بنسټ د باد سرعت لپاره د فريکونسي څو ضلعي گراف رسم کړئ. که چېرې يوې کشتۍ ته د حرکت لپاره لږ تر لږه په يوه ساعت کې 5 کيلو متره د باد سرعت ته اړتيا وي، نو څو ورځې د کشتۍ د حرکت کولو لپاره مناسبې دي؟

په دې پوښتنه کې ولې د فريکونسي څو ضلعي گراف، نظر مستطيلي گراف ته مناسب دی؟



2 - د فريکونسي څو ضلعي گراف هغه گراف دی چې په افقي محور او د عمودي محور پر مخ ښودل کېږي.

(ب) نسبي فريکونسي، د کلاسونو مرکز

(الف) د کلاسونو مرکز، نسبي فريکونسي

(د) د کلاس مرکز، مطلقه فريکونسي

(ج) د کلاسونو حدود، مطلقه فريکونسي

3 - د ساقې او پاڼې گراف راکړل شوی دی:

- له دې گراف څخه په لاس راغلي ډيټا وليکئ.

ساقه	پاڼې
1	0 3 3 4
2	0 2 4 8 8
3	2

4 - کوم گراف ته د 90° په اندازه (د ساعت د عقربې د حرکت په مخالف لوري ته) دوران ورکړو، تر څو ميله يې گراف لاس ته راشي.

ب) مستطيلي گراف


الف) د ساقې او پانې گراف

د) دایروی گراف

ج) د فریکونسي د خو ضلعي گراف

5: لاندې گراف د الف، ب او ج د دریو ټولگیو د ریاضي ازموینې نمرې ښکاره کوي، گراف ته

په پاملرنې سره لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ.



- د کوم ټولگی د تحول ساحه زیاته ده؟
- د کوم ټولگی د نمرې میانه تر ټولو زیاته ده؟ او د کوم ټولگی د نمرې میانه تر ټولو لږه ده؟
- د کوم ټولگی د نمرې تیت والی تر ټولو ډېر دی.
- ددې دریو ټولگیو د ازموینې نمرې له کمزوري څخه د قوي په لور ترتیب کړئ.

6: په گراف کې د a مقدار عبارت دی له:

الف) میانه ب) اوسط ج) دریمه ربع د) موډ

7: د غذايي موادو د توليد دوه فابريکې د A او B په نامه، د 48 گرامو په قطيو کې بسکيت خرڅوي.

• په تصادفي ډول د دواړو فابريکو د بسکيت له قطيو څخه 5 قطي ټاکل شوي دي او په پوره غور سره يې وزنونه معلوم شوي دي چې په لاندې ډول دي.

A:	48.08	48.32	47.96	47.84	47.96
B:	49.16	48.84	48.88	49.08	49

• په قطيو کې کومه فابريکه زيات بسکيت خرڅوي؟ د پوښتنې د حل لپاره له کوم ټاکونکي څخه استفاده کوي؟

• د بسکيت په وېشلو کې کومې فابريکې يو شان عمل کړی دی؟

8: که د ډيټا د تحول ساحه صفر وي. د ډيټا په برخه کې څه نتيجه اخلي؟


9: د هغه ساعتونو شمېر چې زده کوونکو په يوه اونۍ کې د لويو لپاره ټاکلې دي، په لاندې ډول راکړل شوي دي.

1 5 7 9

ددې ډيټا (Data) ورايانس پيدا کړئ.

10: په لاندې جدول کې ورايانس پيدا کړئ.

x_i	25	35	45
f_i	10	25	15



فہم خپرکی د ریاضی منطق






د شهودي درک استدلال:

پخوا تر ډېر و پېرېو پورې خلکو فکر کاوه چې
ځمکه هواره ده او ستوري د ځمکې پر شاوخوا
څرخېږي.
آيا پوهېږي چې ځمکه کروي ده؟
آيا لمر د ځمکې پر شاوخوا او که ځمکه د لمر
پر شاوخوا څرخېږي؟

تعريف: هغه طبيعي يا حسي پوهه چې دهغې په مرسته د يوې موضوع سموالی يا حقيقت او يا يو مفهوم پر ته له استدلاله قبلوو، له شهودي درک څخه عبارت دی چې کيدلی شي، دوخت په مختلفو مرحلو کې يوله بله سره توپير ولري.

فعاليت

د لاندې شکل په نظر کې نيولو سره د مستقيم خط پر مخ د A او B دوي نقطې په پام کې ونيسئ.



يو سړی غواړي چې ددې مستقيم خط پر مخ د A له نقطې څخه د B نقطې ته لاړ شي چې د $\overline{AB}$ د قطعې خط منځنۍ نقطه A_1 کې توقف وکړي او بل وار چې د A_1 نقطې ته رسيدلي دی، ددې لپاره چې د B نقطې ته ورسېږي، بيا د A_2 په نقطه (د $\overline{A_1B}$ د قطعې خط دتصيف نقطه) کې توقف وکړي، که په همدې ډول دوام ورکړي، نو لاندې پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ:

- آيا په پورته ډول چې د خط پر مخ د هرو دوو نقطو په منځنۍ نقطه کې توقف وکړي، پای لری؟
- که په همدې ډول تر پایه دوام ورکړي، دا سړی به د B نقطې ته ورسېږي؟
- که دا سړی توقف و نه کړي او يا له لارې بيرته راونه گرځي، نو نه يوازې چې د B نقطې ته به ورسېږي، بلکې ترې تېر به هم شي. په دې اساس ددې مسلې د واقعيت او ستاسو د شهودي درک ترمنځ څه توپير شته؟

له پورتنې فعالیت څخه لاندې نتیجه لاس ته راځي:

نتیجه: د شهودي درک نتیجه هر وخت صحیح نه وي، خو کېدای شي چې د قضیو دحل لپاره یو ښه بنسټ وي.

له هغه مثال څخه چې په پورتنې فعالیت کې مو ترې استفاده وکړه او یاداسې نور مثالونه دا ددې په معنا نه دي چې د شهودي درک استدلال گمراه کوونکی دی، بلکې برعکس په زیاتو حالتونو کې د شهودي درک استدلال د مسلؤ دحل، د انگیزې د پیدا کولو او د نورو سوالونو د طرح کولو سبب گرځي.

لومړی مثال: د شهودي درک په استدلال سره په اسانۍ سره حکم کولای شو چې دوه موازي خطونه یو بل نه قطع کوي.

څرنګه چې ددې مسلې په قبلولو کې استدلال په کار وړل شوی نه دی، په واقعیت یو احساس دی چې پر اساس یې داحکم منل کېږي، نو دا ډول نتیجه اخیستنه د شهودي درک په نامه یادوو.

دویم مثال: که یوه نقطه د داسې دایرې د باندې پرته وي چې قطر یې 4 واحد وي. ددې نقطې د فاصلې د مطالعه کولو لپاره چې له 2 واحد څخه زیاته ده، نه شو ویلای چې دا استدلال یو شهودي درک دی، ځکه دمسئلې د وضاحت لپاره لازمه ده چې استدلال وکړو. څرنګه چې د دایرې د مرکز فاصله له محیط څخه 2 واحد ده. نقطه د دایرې د باندې واقع ده، نو له دې امله د دایرې له مرکز څخه د نقطې فاصله د 2 واحد څخه لویه ده. یعنې پرته له استدلال څخه د طبیعي پوهې او یا غریزه یې احساس په واسطه نه شو کولای، مسئله درک او صحت یې قبول کړو.

پوښتنې

- 1- د دوو نقطو ترمنځ لنډه فاصله له یوه مستقیم خط څخه عبارت ده، آیا ددې مسئلې درک کول یو شهودي درک دی؟ څرنګه استدلال کوئ؟
- 2- له لاندې حکمونو څخه کوم یو یې د شهودي استدلال په طریقه د درک وړ دی؟
 - a- د یوې متوازي الاضلاع مقابلې زاوې سره مساوي دي.
 - b- د لوزي (معین) قطرونه یو پر بل عمود او یو بل نیمایي کوي.
 - c- په یوه قایم الزاویه مثلث کې و تر، له هرو دوو ضلعو څخه لوی دی.



تمثيلي يا گماني استدلال

ووايه زما په لاسونو کې څه شی دی؟ تقريباً
گرد دی، رنگ يې سپين دی او دسپينو په منځ
کې يو ژړ شى دی؟

د منطق يوه ښوونکي غوښتل چې دخپل يوه زده کوونکي قياسي استدلال وازمايي، خپل مخ يې هغه ته ورواړوه او ورته وېي ويل:

پوهېږئ چې گمان او يا تمثيل حقيقت ته د رسيدو پل دی. د لوست په جريان کې مو زده کړل چې تمثيلي استدلال موږ حقيقت ته نژدې کوي، ليکن هر وخت سوچه حقيقت نه دی.

ښوونکي په داسې حال کې چې په خپلو لاسونو کې يې د چرگې هگۍ پټه کړي وه، له زده کوونکي وپوښتل: ووايه زما په لاسونو کې څه شی دی؟ تقريباً گرد دی، رنگ يې سپين دی او دسپينو په منځ کې يو ژړ شى دی.

زده کوونکى چې په همدې وخت کې له زراعتي فارم نه راغلى و، له ژور فکر کولو وروسته يې ښوونکى ته مخ ورواړوه او وېي ويل:

استاده فکر کوم چې دسپين شوي شلغم (ټيپر) په منځ کې گازره ده.

تعريف


د دوو پېښو ترمنځ د ورته والي پيداکول او دهغوى په باره کې د يوشان نتيجې اخيستلو ته تمثيلي يا قياسي (گماني) استدلال وايي.

فعاليت

يوه ښوونکى يو شوخ زده کوونکى چې لوست يې اخلاص، له ټولگي څخه وويست. دټولگي د باندې يې د خپل ټولگي بل زده کوونکى وليده چې هغه هم له ټولگي څخه د باندې و تلى دی. دپورتني تعريف په نظر کې نيولو سره له لاندې اړيکو څخه کوم يو يې يو تمثيلي يا قياسي استدلال دی.

- دويم زده کوونکي د لوست په وخت کې تفريح کوي.

- دویم زده کوونکي هم شوخي کړي ده.
- ناروغه دی، نه غواړي چې په ټولګۍ کې واوسي.
له تعريف او د زده کوونکو له فعاليت څخه لاندې نتيجه په لاس راځي:
نتيجه: قياس يا تمثيل په حقيقت کې د مختلفو مفهومونو په منځ کې د ورته والي پيداکول دي. له دې سببه تمثيلونه کېدای شي، د ډېرو مفهومونو يا درياضي د قضيو د درک کولو لپاره شهودي زمينه پيداکړي. تمثيلي استدلال د ثبوت په حيث نه شمارل کېږي، بلکې د ثبوت لپاره زمينه برابروي.
لومړی مثال: په عامه ژبه (مارخوړلی له برگ پرې څخه ډارېږي) دا يو قياسي استدلال دی، ځکه چې برگ پرې له مار سره پر تله شوی دی او د هغوی په منځ کې ورته والی ليدل شوی دی.
دویم مثال: له تمثيلي استدلال څخه په ګټه، ددې حقيقت درکول چې د دوو منفي عددونو حاصل ضرب مثبت عدد او د يو منفي او يو مثبت عدد حاصل ضرب منفي عدد دی، داسې په لاس راوړو: مثلاً ددې حقيقت د درک کولو لپاره چې که چېرې د يوه زده کوونکي لياقت د (+) په علامه او نا لايق والی د (-) په علامې سره په پام کې ونيسو او ددې دواړو عملونو د حاصل (دی) لپاره (+) او (نه دی) لپاره (-) په پام کې ونيسو، له تمثيل او يا قياس څخه ګټه اخلو او که دوی سره ترکيب کړو په نتيجه کې لرو چې:



پوښتنې

- 1 - دا بيان چې (بختور کال د هغه کال له پسرلي نه معلومېږي)، په لاندې کوم استدلال باندې دلالت کوي.
a- شهودي درک استدلال.
b- قياسي استدلال.
c- هيڅ ډول استدلال په کې نشته دی.
2- د قياسي استدلال په مرسته په کوم مثلث کې د فيثاغورث د قضې په اساس لاندې نتيجه ثبوت کېدلای شي:

$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

استقرايې استدلال:



يو زده کوونکی په لومړنۍ صنفې ازموینه کې 100 نمرې اخلي او په دویم او دریم صنفې ازموینو کې هم 100 نمرې اخلي. په اخرنۍ ازموینه کې څه نتیجه اخیستلای شئ چې دا زده کوونکی به څو نمرې واخلي؟

فعالیت

د مسلسلو طاقو طبیعي عددونو د جمعې حاصل په پام کې نیسو، ددې کار لپاره له یو 1 له عدد څخه پیل وکړئ او تش ځایونه پکې وپیل.

$$1+3 = \boxed{} = ()^2$$

$$1+3+5 = \boxed{} = ()^2$$

$$1+3+5+7 = \boxed{} = ()^2$$

$$1+3+5+7+9 = \boxed{} = ()^2$$

پورتنیو پوښتنو ته په پاملرنې سره لیدل کېږي چې د طاقو طبیعي عددونو د جمعې حاصل د طبیعي عددونو د شمېر له پوره مربع سره مساوي دی.

- آیا کولای شو نتیجه واخلو چې هر وخت د طاقو مسلسلو عددونو د جمعې حاصل ددې عددونو د شمېر له مربع سره مساوي دی؟

- کوښښ وکړئ له n طاقو مسلسلو عددونو د جمعې د حاصل لپاره فورمول په لاس راوړئ.

ډېورټني فعالیت د سرته رسولو په اساس لاندې نتیجه په لاس راځي.

نتیجه: استقرايې استدلال د یو شمېر مشاهدو پر بنسټ د عمومي نتیجې اخیستنې طریقه ده. په

حقیقت کې یوې کوچنۍ نمونې ته په لویه نمونه عمومیت ورکول دي.

لومړی مثال: (موتې د خروار نمونه ده) دا خبره استقرايې استدلال ته اشاره کوي، ځکه په دې مثال

کې له یوې کوچنۍ نمونې څخه د کل نتیجه اخیستل کېږي، په حقیقت کې له مسئلې څخه د یو شمېر مشاهدو پر بنسټ نتیجه اخیستل شوي ده، نو له استقرایي استدلال څخه کار اخیستل شوی دی.

دویم مثال: یو زده کوونکی په اتفاقي ډول په څو مرحلو کې درې مسلسل عددونه سره ضرب کړل او وې لیدل چې د ضرب حاصل د 6 عدد مضرب دی. له دې کار څخه نتیجه اخلي چې (د هر دروو مسلسل عددونو د ضرب حاصل د 6 عدد مضرب دی).

نوموړې زده کوونکي کوم استدلال کړي دي.

الف: شهودي استدلال ب: قیاسي (ګمانی) ج: استقرایي استدلال د: هېڅ یو

حل: استقرایي استدلال

پوښتنې

1- هغه طریقه چې د یوه محدوده شمېر ډیټا پر اساس ترینه عمومي نتیجه اخیستل کېږي، څرنگه یو استدلال دی.

الف: قیاسي یا تمثیلي استدلال ب: استقرایي استدلال

ج: د شهودي درک استدلال

2- د عددونو ترتیب ته په پاملرنې سره لاندې تش ځایونه ډک کړئ:

$$1 \times 8 + 1 = \boxed{}$$

$$12 \times 8 + 2 = \boxed{}$$

$$123 \times 8 + 3 = \boxed{}$$

$$1234 \times 8 + 4 = \boxed{}$$

3-

(a) د دویمې پوښتنې حل ته په پام سره کېدای شي چې د عددونو پورتنی ترتیب ته تر بې نهایت پورې دوام ورکړي؟


(b) د محاسبه کولو پرته او د پورتنیو پوښتنو په پاملرنې سره اټکل کړئ چې کوم عددونه د لاندې پوښتنو په تش ځایونو کې را تلای شي:

$$12345 \times 8 + 5 = \boxed{}$$

$$123456 \times 8 + 6 = \boxed{}$$

د رياضي د استقرا استدلال

د دوو مینو لوبه :



آيا تاسو کله د دوو مینو لوبه تر
سره کړې ده؟

پوهېږئ چې د دوو مینو په لوبه کې د لومړۍ څښتنې لوبدل، د دویمې څښتنې پرمخ چې یوه دبلې څنگ ته پرته وي، په ترتیب سره لومړنۍ پر دویمه، دویمه پر دریمه... تر پایه پورې پر مخکته ولوبېږي، داد څښتنو یو پر بله لوبدل چې د پورته شکل په شان په مساوي فاصلو یو دبل څنگ ته پریوزي، د علاقه مندانو لپاره یو په زړه پورې تصویر ښکاره کوي. لیدل کېږي چې د k ام څښتنې لوبدل د $k+1$ ام د څښتنې دلوېدلو سبب ګرځي، اوس نو که د څښتنو لوبدل له یوې ټاکلې شمېرې څخه پیل شي، له هغې څخه وروسته څښتنې یو پر له پسې راولېږي او ټولې څښتنې د ځمکې مخ نیسي.

فعالیت

پوهېږئ چې $100 = 1 + 8 + 27 + 64$ دی، که دا عددونه د مکعبونو د مجموعې په شکل په لاندې ډول ولیکو:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 = 10^2$$

- آیا هر وخت د مسلسلو طبیعي عددونو د مکعبونو مجموعه د عددونو د مجموعې له مربع سره مساوي ده؟

- آیا کولای شئ د پورتنۍ پوښتنې د حل لپاره یوه عمومي طریقه وویاست، د پورتنۍ پوښتنې د ځواب لپاره لاندې جدول ډک کړئ.

د متوالي عددونو شمېر	د متوالي طبيعي عددونو معکوبه	د معکوبو مجموعه	د عددونو د مجموعې مربع
1	1^3		1^2
2	$1^3 + 2^3$		
3	$1^3 + 2^3 + 3^3$	36	
4	$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3$		10^2
n	$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$		$\left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$

د $n=1$ ، $n=2$ ، $n=3$ او $n=4$ د طبيعي مسلسلو عددونو د مکعبونو د مجموعې

لپاره د فورمول سمالي وازمائی.

$$\left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

- اوس که د n مسلسلو طبيعي عددونو لپاره پورتنی فورمول قبول کړو يعنې که:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

وي، نو د $n+1$ د مسلسلو طبيعي عددونو لپاره يې ثبوت کړئ يا داچې وښايست:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 = \left[\frac{(n+1)(n+2)}{2} \right]^2$$

د پورتنی فعالیت له سرته رسولو څخه لاندې نتیجه لاس ته راځي.

نتیجه: که چېرې $P(n)$ د n طبيعي عددونو په برخه کې يو حکم راکړل شوی وي، که د $n=1$ لپاره $P(1)$ صحيح وي، په دویم پر اوکې که د $P(k)$ له سمالي څخه $P(k+1)$ په لاس راشي، نو دا ادعا د $P(n)$ د هر n طبيعي عدد لپاره هم سمه ده.

لومړی مثال: وښايست چې $P(n) = 4^{2n} - 1$ د هر طبيعي عدد لپاره پر 5 د وېش وړ دی.

حل: د $n=1$ لپاره سمه ده ځکه چې:

$$n=1, \quad P(1) = 4^{2 \cdot 1} - 1 = 4^2 - 1 = 16 - 1 = 15$$

ليدل کېږي چې $P(1) = 15$ پر 5 د وېش وړ دی.

قبلوو چې د k طبيعي عدد لپاره پورتنی ادعا سمه ده يعنې: $P(k) = 4^{2k} - 1$ پر 5 د وېش وړ

دی.

څرنگه چې پر 5 د وېش وړ دی، نو کولای شو په لاندې ډول یې ولیکو

$$P(k) = 4^{2k} - 1 = 5r \dots\dots\dots (*)$$

غواړو وښایو چې د $n = k + 1$ لپاره دا ادعا سمه ده، نو لرو چې:

$$n = k + 1, \quad P(k + 1) = 4^{2(k+1)} - 1 \dots\dots\dots (**)$$

د (*) د رابطې دواړه خواوې په 4^2 کې ضربوو.

$$4^2 (4^{2k} - 1) = 5r \cdot 4^2$$

$$4^{2k+2} - 4^2 = 5r \cdot 16 \Rightarrow 4^{2(k+1)} - 1 = 15 + 16 \cdot (5r)$$

$$4^{2(k+1)} - 1 = 5(3 + 16r)$$

د پورتنۍ مساوات له ښي خوا $5 \cdot (3 + 16r)$ څخه ښکاري چې د مساوات کینه خوا پر 5 د وېش وړ ده.

نو اړخني مساوات ښکاره کوي چې $P(k + 1) = 4^{2(k+1)} - 1$ هم پر 5 دوېش وړ دی، څرنگه چې د $P(k)$ له سموالي څخه د $P(k + 1)$ سموالي نتیجه شوه، نو د ریاضي د استقرا د اصل په اساس پورتنۍ ادعا $P(n)$ د هر طبیعي عدد (n) لپاره سمه ده.

یادونه: د ریاضي د استقرا په مرسته د ریاضي د حکمونو د ثبوتولو لپاره لومړی $P(1)$ په لاس راوړو، بیا $P(k)$ د استقرا د حکم په حیث په پام کې نیسو او په همدې ترتیب له فرضیې څخه حکم ثبوتوو.

دویم مثال: د ریاضي د استقرا په مرسته ثبوت کړئ چې لاندې رابطه د هر طبیعي عدد n لپاره سمه ده:

$$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + n(n + 1) = \frac{n(n + 1)(n + 2)}{3}$$

حل: په پورتنۍ رابطه کې د $n = 1$ لپاره لرو چې:

$$n = 1, \quad P(1) = 1 \times 2 = \frac{1(1 + 1)(1 + 2)}{3} = \frac{1 \times 2 \times 3}{3} = 2$$

$$\Rightarrow 2 = 2$$

نود $n = 1$ لپاره پورتنۍ رابطه سمه ده، که د $n = k$ لپاره یې سمه قبوله کړو، نو د $n = k + 1$ لپاره یې داسې ثبوتوو، لرو چې:

$$n = k, P(k) = 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + k \times (k+1) = \frac{k(k+1)(k+2)}{3}$$

د استقرا فرضیه:

د $P(k)$ په فرضولو سره $P(n)$ رابطه د $n = k+1$ په نظر کې نیولو سره د رابطې سموالی ښکاره کړو، نو لروچې:

$$\begin{aligned} n = k+1, \quad P(k+1) &= 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + (k+1)(k+2) \\ &= \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3} \end{aligned}$$

د استقرا حکم:

د استقرا د فرضیې په نظر کې نیولو سره لروچې:

$$\begin{aligned} P(k+1) &= [1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + k(k+1)] + (k+1)(k+2) \\ &= \frac{k(k+1)(k+2)}{3} + (k+1)(k+2) = \frac{k(k+1)(k+2) + 3(k+1)(k+2)}{3} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3} \\ \Rightarrow 1 \times 2 + 2 \times 3 + \dots + (k+1)(k+2) &= \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3} \end{aligned}$$

دا رابطه د $n = k+1$ لپاره سمه ده، نو په دې ډول د $P(n)$ رابطه د هر طبیعي عدد (n) لپاره سمه ده.

پوښتنې

1 - د ریاضي د استقرا په مرسته وښیاست چې د هر طبیعي عدد n لپاره لروچې:

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

2 - د ریاضي د استقرا په مرسته وښیاست چې:

$$2 + 6 + 10 + \dots + (4n-2) = 2n^2 \quad (\text{i})$$

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2 \quad (\text{ii})$$



استنتاجی (نتیجوی) استدلال:

آیا کولای شو د شپې په تیاره کې له رڼا څخه پرته
شیان ووينو؟

فعالیت

- درې مختلف داسې ستونه وليکئ چې د هر سټ عناصر درې اختیاري مسلسل طبیعي عددونه وي.
- د هر سټ د عناصرو د ضرب حاصل جلا، جلا په لاس راوړئ.
 - آیا ویلای شو چې دا د ضرب حاصلونه:
 - (I): پر 2 د وېش وړ دي؟ ولې؟
 - (II): پر 3 د وېش وړ دي؟ ولې؟
 - آیا ویلای شو چې د دریو مسلسلو طبیعي عددونو د ضرب حاصل هروخت پر 6 د وېش وړ دي؟ ولې؟
 - د دریو مسلسلو طبیعي عددونو د ضرب حاصل موهلی پر 6 د وېش وړ قبول کړو، د پورتنی فعالیت له سرته رسولو څخه لاندې نتیجه لاس ته راځي.

نتیجه: داسې طریقې ته چې د حقایقو سموالی یې په لومړۍ پړاو کې ومنو او عمومي نتیجه ترې لاس ته راوړو، استنتاجي استدلال یا د نتیجې اخیستنې طریقه ورته وایي یا په بل عبارت استنتاجي استدلال هغه طریقه ده چې سموالی مو ثبوت کړی یا منلی وي.

څه وخت چې له استنتاجي استدلال څخه استفاده کوو، ډاډمن یو چې نتیجه یې هر وخت سمه ده.

لومړی مثال: د لاندې جدول پړاونو ته په دقت سره وگورئ موږ څرنگه له عددونو سره چې د هر

پړاو حقیقت او سموالی منو، بل پړاوت ته څو او نتیجه په لاس راوړو.

د یادونې وړ ده چې په جدول کې په اختیاري ډول عدد ټاکل شوی دی، تاسو کولای شئ چې ددې

عدد پر ځای بل هر عدد چې موغوبښتی وي، وټاکئ، وگورئ چې د هر عدد لپاره نتیجه یوشان ده.

12	7	4	یو عدد په خپله خوښه وټاکئ.
17	12	9	له لومړي عدد سره 5 جمع کړئ.
34	24	18	اوس یې دوه برابره کړئ.
30	20	14	له حاصل څخه د 4 عدد کم کړئ.
15	10	7	پر 2 یې ووېشئ.
3	3	3	هغه عدد چې لومړی موټاکلی و، له عدد څخه کم کړئ.

اساسي خبره داده چې موږ په حقیقت کې د هغه عبارت پر بنسټ چې سموالی یې موږ قبول کړی دی، بله نتیجه لاس ته راوړو، دا مسئله موږ ډاډ من کوي چې دهر اختیاري عدد په ټاکلو سره نتیجه هر وخت یوشان له 3 سره مساوي ده.

پوښتنې

1 - ښکاره کړئ چې د دوو طاقو عددونو د جمعې حاصل هر وخت یو جفت عدد دی.

2 - ثبوت کړئ چې هر صحیح طاق عدد د $2k + 1$ په شکل دی.

3 - د سرو زرو په 9 سکوکې یوه تقلبي ده چې له نورو سکو څخه یې وزن کم دی.

څرنگه کولای شو چې د نورو وزنونو څخه د استفادې کولو پرته د پله یي ترازو په واسطه له دوه واره

تللو سره تقلبي سکه پلاس راوړو؟



د مثال د نفي کولو استدلال:

یوموتی د خروار نمونه ده.

که د یو جنس یوه کوچنی نمونه پي کیفیته وي.
آیا کولای شو ادعا وکړو چې ددې جنس لویه
کنله ښه کیفیت لري؟

فعالیت

کولای شو، ډېر طبیعي عددونه د مسلسلو عددونو د جمعې د حاصل په ډول ولیکو، لکه:

$$9 = 2 + 3 + 4$$

- پورتنی مثال ته په پاملرنې سره لاندې تش ځایو نه ډک کړئ؟

$$15 = \boxed{} + 2 \boxed{} + 4 + 5$$

$$\boxed{} = \boxed{} + 5 + \boxed{} + 7$$

$$\boxed{} = 12 + \boxed{} + \boxed{} + 14$$

$$74 = 17 + \boxed{} + 19 + \boxed{}$$

- آیا کولای شو چې هر طبیعي عدد د مسلسلو عددونو د جمعې د حاصل په شکل ولیکو؟

- که چېرې ځواب مو (نه) وي، نومثال پي وویاست.

د پورتنی فعالیت له سرته رسولو څخه لاندې نتیجه لاس ته راځي.

نتیجه: کله چې له مثال سره وښایو چې عمومي نتیجه سمه نه ده او د ادعا ناسموالی ښکاره کړو دې

ته د مثال د نفي کولو استدلال وایي.

مثال: د مسلې د ثبوت لپاره همدو مره کافي ده چې وښایو چې د X او Y دوه غیر ناطق عددونه

ليکن ددوی د جمعې حاصل $x+y$ یو ناطق عدد دی.

ددې لپاره که د $x = 1 + \sqrt{2}$ او $y = 1 - \sqrt{2}$ وټاکو، لرو چې:

$$x + y = (1 + \sqrt{2}) + (1 - \sqrt{2}) = 1 + 1 = 2$$

ليدل کېږي چې ددې دواړو عددونو د جمعې حاصل د 2 عدد دی چې یو ناطق عدد دی، په داسې حال کې چې x او y غیر ناطق (ګنگ) عددونه دي، نو دا ادعا نه شو کولای چې د دوو غیر ناطقو عددونو د جمعې حاصل هر وخت یو غیر ناطق عدد دی.

پوښتنې

1- د مثال د نفې کولو په استدلال سره وښیاست چې (د هر مثبت حقيقي عدد مربع د عدد له مکعب څخه کوچنی ده)

2- دلاندې کوم یو بیان لپاره د نفې مثال وجود نه لري؟

(a) د دوو ناطقو عددونو مجموعه یو ناطق عدد دی.

(b) د هر مثبت عدد مربع له عدد څخه لویه ده.

(c) دوې زاوې چې متناظرې ضلعي یې سره موازي وي، دا دوې زاوې سره مساوي هم دي.

(d) د دوو طاقو عددونو مجموعه یو جفت عدد دی.

(e) د دوو غیر ناطقو عددونو د ضرب حاصل، غیر ناطق عدد نه دی.

د خلف برهان يا غير مستقيم ثبوت:

$$a^2 = \text{جفت} \Rightarrow a = ?$$

جفت
طاق


$$b^2 = \text{طاق} \Rightarrow b = ?$$

جفت
طاق

که د یوه عدد مربع جفت وي آیا خپله عدد جفت دی که طاق؟
آیا کولای شو چې دا ادعا وکړو، که د هر عدد مربع جفته وي، خپله عدد جفت دی؟
که وښایو چې خپله عدد طاق نه دی، څه نتیجه اخلي؟

فعالیت

د ABC مثلث د لاندې شکل په شان په پام کې ونیسئ:



- د $\hat{A}$ د زاوېې ناصف رسم کړئ.

- که $\overline{BD} \neq \overline{CD}$ وي، نو د $\overline{AB}$ او $\overline{AC}$ ضلعې سره څه اړیکه لري؟

- که فرض کړو چې که $\overline{BD} \neq \overline{CD}$ وي، خو $\overline{AB} \neq \overline{AC}$ دی، دا مسئله موږ کومې نتیجه ته

رسوي؟

نتیجه: که د خپلې ادعا د عکس په فرضولو او یاد قبلولو په نتیجه کې د فرض شوي ادعا خلاف ته

ورسېږو، نو په دې حالت کې زموږ فرض شوی ادعا سمه ده، دا ډول استدلال د غیر مستقیم ثبوت

(برهان خلف) په نامه یادېږي.

يادونه: په ياد ولرئ څه وخت چې له غير مستقيم ثبوت څخه گټه اخلو، لاندې پړاوونه په پام کې

نيسو:

لومړی پړاو: فرضوو چې مطلوبه ادعا سمه نه ده.

دويم پړاو: ښکاره کوو چې دا فرض د اسې نتيجه په لاس راكوي چې پېژندل شوي حقيقتونه نفي كوي.

درېم پړاو: اوس چې نتيجه نفي شوي ده، نومعلومه خبره ده چې د لومړي پړاو فرض سم نه دی، نو مطلوب سم دی.

مثال: وښايست که n^2 يو جفت طبعي عدد وي، نو n هم جفت دی؟

ددې مسئلې د ثبوت لپاره فرضوو، سره ددې چې n^2 جفت دی، خو n يو طاق عدد دی، نو کولای

شو چې n د $n = 2k + 1$ په شکل وليکو، په داسې حال کې چې k يو تام عدد دی، نو ددې
$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4(k^2 + k) + 1$$

عدد مربع مساوي ده په:

$$\Rightarrow n^2 = 4(k^2 + k) + 1$$

پورتنې مساوات ښکاره کوي چې n^2 يو طاق عدد دی چې دا د فرض خلاف ده، نو په نتيجه کې دا

فرض چې n يو طاق عدد دی، ناسمه ده او دې نتيجه ته رسېږو چې n هم يو جفت عدد دی، ځکه

دا فرض چې n طاق عدد دی، موږ دې نتيجه ته ورسولو چې n^2 هم طاق عدد دی

پوښتنه

وښايست چې $\sqrt{3}$ يو غير ناطق عدد دی.

د ریاضی منطق او دیان استنتاج



له څنگ ملگری څخه د یو خبر اوریدل به څه
نتیجه ولري؟
آیا خبر سم دی که ناسم؟

تعریف

یوې خبرې جملې ته بیان وايي چې نتیجه یې په سموالي یا ناسم والي پای ته ورسېږي.

فعالیت

لاندې جملې په پام کې ونیسئ او وښایست چې له هغو څخه کومه یوه یې بیان
نه دی او منطقي نتیجه یې څه ده؟

- i) نن ورځ باران نه اوري.
- ii) آیا نن ورځ باران نه اوري؟
- iii) بارانه اووره..
- iv) څه زیات باران اوري!

له پورتنی فعالیت څخه لاندې نتیجه لاس ته راځي.
نتیجه:

1 - هر جمله نه شی کېدای چې بیان وي. یوه جمله کېدای شي یوه حکمي، تعجبې پوښتنه او یا یو خبر وي.

2 - هر خبري جمله سمه یا ناسمه ده.

یادونه: که یو بیان ته P ووايو، د سم بیان د لیکلو طریقه $P \equiv T$ او د ناسم بیان د لیکلو طریقه

$P \equiv F$ دی، سر بیره پر دې $\sim P$ د بیان نفی ښيي.
هغه جدول ته چې د یو بیان ارزیابي په کې صورت نیسي، د صحت د جدول په نامه یادېږي، نو د P د هریان لپاره لروچې:

P	$\sim P$
T	F
F	T


مثال: د (مسکا د لسم ټولګي زده کوونکې ده $P =$) بیان لپاره د صحت جدول ترتیب کړئ.
حل: د پورتنی بیان د ارزیابي لپاره پوهېږو چې نو موږی بیان سم او یا ناسم دی.
که بیان سم وي، نو کولای شو چې ولیکو $P \equiv T$ او $\sim P \equiv F$ دی.
نو د P د بیان د نفی حالت عبارت دی له « P سم نه دی» یعنې: $\sim P \equiv F$ دی. دا بیان د دې په معنا دی چې مسکا د لسم ټولګي زده کوونکې نه ده، یعنې P ناسم دی.
که $P \equiv F$ وي، نو په دې حالت کې $\sim P = T$ دی. د پورتنی ځواب صحت په لاندې جدول کې گورو:

P	$\sim P$
T	F
F	T

د بیانونو ترکیب

که د p او q دوه بیانونه را کړ شوي وي، په دې حالت کې:

- 1 - $p \wedge q$ ترکیب د p او q د بیانونو د عطفی ترکیب یا (منطقي "او") په نامه یادېږي، د " $\wedge$ " علامه د (او) په معنا په کار وړل شوي ده.
- 2 - $p \vee q$ ترکیب د p او q د بیانونو د فصلي ترکیب (منطقي "یا") په نامه یادېږي، د " $\vee$ " علامه د (یا) په معنا په کار وړل شوي ده.
- 3 - $p \Rightarrow q$ د مشروط ترکیب او یا د (که p نو q ویل کېږي) په نامه یادېږي، د $\Rightarrow$ علامه ښکاره کوي چې p د شرطی ترکیب اساس چې q ترې نتیجه کېږي.
- 4 - $p \Leftrightarrow q$ د دوو خواوو د شرطی ترکیب په نامه او یا د (که او یوازې که) په نامه یادېږي. د ($\Leftrightarrow$) علامه ښکاره کوي چې که p د شرطی ترکیب اساس وي q ترې نتیجه کېږي او که q د شرطی ترکیب اساس وي، p ترې نتیجه کېږي. په دې ډول د p د بیانونو او (که او یوازې که) ترکیب لاندې د صحت په جدول کې گورو:



p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	F	T	T	F
F	F	F	F	T	T

لومړۍ مثال: که چېرې $P \equiv (2 + 4 = 6)$ او (دمنفي عدد مربع) $q \equiv$ بیانونه راکړل شوي وي د $p, q, \sim p, \sim q, p \wedge q, p \vee q, \sim (p \wedge q), \sim (p \vee q)$ د بیانونو نتیجه پلاس راوړی.

حل: پورتنیو بیانونو ته په توجه سره ددې بیانونو ارزښت عبارت دی له:

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$\sim (p \wedge q)$	$\sim (p \vee q)$
T	F	F	T	F	T	T	F

دویم مثال: د سموالي (صحت) د جدول په تر ټیولو سره ښکاره کړئ چې د $P \vee (p \Rightarrow q)$ بیان هر وخت سم دی.

حل:

p	q	$p \Rightarrow q$	$p \vee (p \Rightarrow q)$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	T	T
F	F	T	T

د سموالي د جدول په اخیږني ستون کې وینو چې د $p \vee (p \Rightarrow q)$ بیان هر وخت سم دی.

پوښتنې

- 1 - د صحت د جدول په تر ټولو سره وښایست چې د $(p \Rightarrow q) \vee \sim (\sim p \vee q)$ بیان هر وخت سم دی - متوجه اوسئ چې P او $\sim P$ یوله بله مستقل نه دی.
- 2 - د صحت د جدول په جوړولو سره وښایست چې د $(p \Rightarrow q)$ او د $\sim (p \vee q)$ د بیانونو ارزښت سره مساوي دی یعنې:

$$p \Rightarrow q \equiv \sim (p \vee q)$$

د فصل لندیز

د ریاضي استدلال:

هغه طریقه چې د هغې په واسطه د ریاضي د یو بیان سموالی په لاس راځي، د ریاضي د استدلال په نامه یادېږي.

شهودی درک:

هغه طبیعي یا حسي پوهه چې د هغې په مرسته د یوې موضوع سموالی یا حقیقت او یا یو مفهوم پرته له استدلاله قبلو، له شهودي درک څخه عبارت ده چې د وخت په مختلفو مرحلو کې یوله بله سره توپیر لري.

تمثيلي یا قیاسي استدلال:

د دوو پېښو تر منځ د ورته والی پیدا کول او د هغوی په باره کې یوشان نتیجې اخیستلو ته تمثيلي یا قیاسي استدلال وايي.

استقرایي استدلال:

هغه طریقه چې د یو شمېر مشاهدو پر اساس ور څخه عمومي نتیجه اخیستل کېږي یعنې د جز نه کل په لاس راځي د استقرایي استدلال په نامه یادېږي.

د ریاضي د استقرا استدلال:

که چېرې $P(n)$ د n د طبیعي عددونو په برخه کې یو حکم راکړل شوی وي، که د $n=1$ لپاره $P(1)$ سم وي او په دویم پړاو کې د $p(k)$ له سموالي څخه د $p(k+1)$ سموالی په لاس راشي، نو د $p(n)$ بیان د هر طبیعي عدد (n) لپاره سم دی او درياضي د استقرا د استدلال په نامه یادېږي.

نتیجوي استدلال:

له هغه حقیقتونو څخه په گټه اخیستنه چې صحیح والی یې په پیل کې منل شوی وي، عمومي نتیجه لاس ته راوړل شي، د استنتاجي استدلال یا د نتیجه اخیستنې د طریقې په نامه یادېږي. یا په بل عبارت هغه طریقه ده چې سم والی مو ثبوت یا قبول کړی وي.

د نفی مثال استدلال:

کله چې له مثال سره وښایو چې عمومي نتیجه سمه نه ده او د ادعا ناسموالی په عمومي ډول ښکاره کړو، دې ته د مثال د نفی کولو استدلال وایي.

غیر مستقیم ثبوت:

که د خپلې ادعا یا قضیې د عکس په فرضولو یا قبولولو د فرض شوي ادعا خلاف ته ورسېږو، نو په دې حالت کې فرضیه ناسمه او خلاف یې سم دی. دې ډول استدلال ته غیرمستقیم ثبوت (برهان خلف) وایي.

بیان:

یوې خبرې جملې ته چې نتیجه یې سمه یا ناسمه وي، د بیان په نامه یادېږي، یوه جمله چې نتیجه یې سمه او یا ناسمه نه وي، بیان نه دی.

د بیانونو ترکیب:

که د p او q دوه بیانونه راکړل شوي وي، په دې حالت کې:

1- د $p \wedge q$ ترکیب د p او q دوه بیانونه د عطفی ترکیب یا (منطقي "او") په نامه یادېږي. چې د p او q د بیان په شکل ویل کېږي.

2- د $p \vee q$ ترکیب د p او q د بیانونو د فصلی ترکیب (منطقي "یا") په نامه یادېږي، د ($\vee$) علامه د (یا) په معنا په کار وړل شوي ده.

3- (که چېرې نو) او یا د " $\Rightarrow$ " منطقي علامه د $p \Rightarrow q$ د p او q مشروط بیان دی، که p نو q ویل کېږي، د $\Rightarrow$ علامه ښکاره کوی چې p د شرطي ترکیب اساس دی، ددې لپاره چې q له هغې نتیجه شي.

4- که یوازې که یا دا " $\Leftrightarrow$ " منطقي علامه د p او q د بیانونو دوو خواوو شرطي ترکیب دی چې د (p که او یوازې که q) دی.

د فصل پوښتنې

- 1 - له لاندې ځوابونو څخه ستاسو په نظر کوم یو سم دی؟
 - الف - په مشاهداتو کې خطا د استقرایي طریقې له ستونزو څخه یوه ستونزه ده.
 - ب - د ریاضي د استدلال له قوي طریقو څخه یوه هم استقرایي طریقه ده.
 - ج - د ریاضي په استقرایي طریقې کې یوه ستونزه د مشاهداتو کموالی دی.
 - د - د الف او ج ځوابونه سم دي.
- 2 - له لاندې ځوابونو څخه کوم یو بې سم نه دی؟

استقرایي استدلال

 - الف - د ریاضي له مسائلو څخه یوه قوي طریقه ده.
 - ب - د مسائلو په برخه کې موږ ته د عمومي قوانینو لارښوونه کوي.
 - ج - د مسائلو دحل لپاره له ریاضي پرته یوه طریقه ده.
 - د - د مسائلو د حلولو لپاره د ریاضي طریقه نه ده.
- 3 - د شهود په برخه کې له لاندې ځوابونو څخه کوم یو بې سم (صحیح) دی؟
 - الف - دداسې نتیجې د اخیستنې لپاره چې سل په سلو کې سمه ده.
 - ب - له شهود څخه په ګټه اخیستنه پر ډاډ سره نه شوو ویلای چې نتیجه سل په سلو کې سمه ده.
 - ج - شهود د ریاضي د ښه درک کولو لپاره دی.
 - د - له شهود څخه په ګټه اخیستنه، کولای شو د ثبوت لپاره قطعي ګمان له حتمي استدلال سره وکړو.
- 4 - له لاندې ځوابونو څخه کوم یو بې سم نه دی؟
 - الف: استقرایي استدلال له جز څخه کل ته رسیدل دي.
 - ب: استقرایي استدلال له کل څخه جز ته رسیدل دي.
 - ج: له استقرایي استدلال څخه نه شو کولای چې د ریاضي د دقیق ثبوت لپاره ګټه واخلو.
 - د: استقرایي استدلال دیو شمېر مشاهدو پر اساس یوه کلي نتیجه ده.
- 5 - د استنتاجي استدلال پر اساس له لاندې ځوابونو څخه کوم یو بې سم نه دی؟
 - الف: که واوره اوري ځمکه نمجنه کېږي، ځمکه نمجنه ده، نو واوره وریدلي ده.
 - ب: د یوه ښوونځي ټول فارغان له کمپیوټر سره بلد او په ریاضي ښه پوهېږي، ضمیر چې له همدې ښوونځي څخه فارغ شوی دی. نو له کمپیوټر سره ښه بلد او په ریاضي ښه پوهېږي.
 - ج: که یوه څلور ضلعي مربع وي، نو قطرونه یې یو پر بل عمود دي، که د څلور ضلعي قطرونه یو پر بل عمود وي، نو دا څلور ضلعي مربع ده.

د: که د یوه مثلث دوې ضلعې سره مساوي وي، متساوي الساقين مثلث دی او که د مثلث درې ضلعې سره مساوي وي، متساوي الاضلاع مثلث دی، نو هر متساوي الاضلاع مثلث، متساوي الساقين مثلث دي.

6 - د قياسي استدلال په واسطه وښايست د هرې زاوېې لپاره $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ ده.
7 - د استقرايي استدلال په واسطه وښايست چې د n مسلسلواقاو طبيعي عددونو مجموعه له n^2 سره مساوي ده.

8 - له استقرايي استدلال سره وښايست چې د هر طبيعي عدد n لپاره لاندې مساوات سم دی.
$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

9 - د استنتاجي استدلال په اساس ثبوت کړئ چې د دوو جفتو عددونو د جمعې حاصل هر وخت جفت عدد دی؟

10 - له یوه مثال سره وښايست چې د $2^n + 3$ افاده د هر طبيعي عدد لپاره هر وخت لومړنی عدد نه دی.

11 - د غیر مستقيم ثبوت د استدلال په واسطه وښايست که n یو طبيعي اختیاری عدد وی او هم n^2 طاق وي، نو n هم طاق دی.

12 - د (باران اوري او ورېځ نشته دی، نو باران نه اوري) د ترکیبي بیانونو لپاره د صحت جدول جوړ کړئ، په داسې حال کې که

(α = باران اوري) او (ورېځ ده β) سره وښايو. (1) عدد د سم اود (0) عدد د ناسم لپاره په کار یوسي.

α	β	$-\alpha$	$-\beta$	$\alpha \wedge -\beta$	$\alpha \wedge -\beta \Rightarrow -\alpha$
1	1				
1	0				
0	1				
0	0				

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library